

# Catálogo de las plantas vasculares de Chile

## Catalogue of the vascular plants of Chile

ROBERTO RODRIGUEZ<sup>1</sup>, CLODOMIRO MARTICORENA<sup>†</sup>, DIEGO ALARCÓN<sup>3,4</sup>, CARLOS BAEZA<sup>1</sup>, LOHENGRIN CAVIERES<sup>3,4</sup>, VÍCTOR L. FINOT<sup>2</sup>, NICOL FUENTES<sup>1</sup>, ANDREA KIESSLING<sup>1</sup>, MARITZA MIHOC<sup>3,4</sup>, ANÍBAL PAUCHARD<sup>5</sup>, EDUARDO RUIZ<sup>1</sup>, PAULINA SANCHEZ<sup>5</sup> & ALICIA MARTICORENA<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.

<sup>2</sup>Departamento de Producción Animal, Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción, Casilla 537, Chillán, Chile.

<sup>3</sup>Ecobiosis, Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.

<sup>4</sup>Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Casilla 653, Santiago, Chile.

<sup>5</sup>Laboratorio de Invasiones Biológicas, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Victoria 631, Concepción, Chile.

\*amartic@udec.cl

### RESUMEN

Se presenta un catálogo de las plantas vasculares que crecen en Chile. Está organizado por divisiones, Pteridophyta (Lycopodiopsida y Polypodiopsida), Pinophyta (Gnetopsida y Pinopsida) y Magnoliophyta (Liliopsida y Magnoliopsida), y dentro de cada grupo, las jerarquías taxonómicas (Familia, Género, Especies y taxones infraespecíficos) están ordenados alfabéticamente. Se incluye además un índice alfabético de géneros con indicación de la familia y grupo a que pertenecen. De acuerdo a este catálogo la flora de las plantas vasculares que crecen en Chile, comprende 186 familias, 1121 géneros y 5471 especies, de éstas, 4655 corresponden a especies nativas, de las cuales 2145 son endémicas de Chile y 816 las especies introducidas.

**PALABRAS CLAVE:** Altitud, distribución geográfica, flora chilena, listado, origen.

### ABSTRACT

A catalog of vascular plants growing in Chile is presented. It is organized by divisions, Pteridophyta (Lycopodiopsida and Polypodiopsida), Pinophyta (Gnetopsida and Pinopsida) and Magnoliophyta (Liliopsida and Magnoliopsida), and within each group, the taxonomic hierarchies (Family, Genus, Species and infraspecific taxa) are arranged alphabetically. In accordance with this catalogue, the flora of vascular plants of Chile comprise 186 families, 1121 genera and 5471 species, 4655 species are native, 2145 of these are endemic to Chile and 816 species are introduced.

**KEYWORDS:** Checklist, Chilean flora, geographic distribution, elevation, origin.

## INTRODUCCIÓN

La taxonomía, en lo que se refiere a la nomenclatura, está en constante revisión, provocando cambios en los nombres de los componentes de una flora. En muchos géneros de plantas vasculares chilenas, las especies son conocidas desde hace más de dos siglos, sin embargo, existe una gran cantidad de géneros que han sido recientemente revisados lo que ha repercutido en cambios nomenclaturales y variaciones en

el número de los integrantes que comprenden las distintas jerarquías. Dado lo dinámico de esta disciplina, es preciso tomar conciencia de la necesidad de actualizar continuamente estos conocimientos debido a que constituyen la base para muchas otras disciplinas, siendo una herramienta fundamental al momento de evaluar el impacto ambiental de las actividades productivas sobre la flora del país.

El primer catálogo de la flora chilena lo publicó Federico Philippi (1881), debido a su antigüedad y por las citas de

numerosos nombres de plantas que no existen en el país, actualmente está totalmente obsoleto. En dicho trabajo se incluyó información referente al nombre científico, autor de la especie, familia, citas bibliográficas y sinónimos para cada especie. Alrededor de un siglo después, Clodomiro Marticorena y Max Quezada (1985) publicaron el Catálogo de la flora vascular de Chile, actualizando de buena manera los nombres dados por Philippi y lo que se conocía taxonómicamente de la flora del país hasta esa fecha. Ese trabajo constituyó el primer intento de unificar y reunir todo el conocimiento disperso de la flora de Chile en una sola publicación, sirviendo como referente durante más de 20 años, y sintetizando la información sobre las clases, familias, géneros, especies, categorías infraespecíficas, autores y origen (nativo o introducido) para cada una de las especies de plantas vasculares presentes en el país.

Posterior a la publicación de estos trabajos han aparecido listas y catálogos regionales que fueron modificando algunos nombres de la flora chilena. Arroyo *et al.* (1990) contribuyen al conocimiento de la flora anual nativa de Chile continental, Henríquez *et al.* (1995) publican el Catálogo de la flora de la Región de Magallanes, luego Marticorena *et al.* (1998a, 1998b) el Catálogo de la flora vascular de Juan Fernández y el Catálogo de la flora vascular de la Región de Antofagasta, después Marticorena *et al.* (2001) publican el Catálogo de la Flora Vascular de la IV Región de Coquimbo, y por último Squeo *et al.* (2008) el Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Atacama.

Con la aparición del Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga *et al.* 2008) se actualizó gran parte del conocimiento taxonómico y la información de la distribución geográfica de las especies nativas e introducidas de Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Este catálogo ha sido de gran impacto en la aplicación correcta de los nombres para las plantas vasculares del Cono Sur de Sudamérica, considerando además del texto impreso, la continua corrección y actualización periódica de la base de datos del Instituto de Botánica Darwinion.

Desde el año 2008 a la fecha han aparecido nuevas publicaciones relacionadas a la flora, como tratamientos de familias de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 2011), los estudios de distribución geográfica que amplían la presencia de algunas especies en otras regiones del país o en países vecinos, y tratamientos taxonómicos de familias y géneros que modifican el listado de especies nativas, endémicas e introducidas de Chile. Cabe destacar, la reciente publicación del libro *Plants of Oceanic Islands. Evolution, Biogeography, and Conservation of the Flora of Juan Fernández (Robinson Crusoe) Archipelago* (Stuessy *et al.* 2018), que permitió acceder a una detallada y actualizada revisión de los taxones presentes en el archipiélago, información que también ha sido incluida en este trabajo.

Un esfuerzo adicional permitió corregir, actualizar y depurar el registro de las especies introducidas en el país.

Nuevos registros, cambio en el estatus (origen) de algunas especies, corrección y validación del rango de distribución y la evaluación de la nomenclatura de estas especies permiten entregar el detalle a escala regional de este componente de la flora del país.

Dentro de las dificultades que se presentaron durante la realización del presente catálogo se encontraron varias especies cuya presencia en el país es dudosa, géneros que no han sido estudiados en su totalidad y que se desconoce su estado actual y nombres que no han podido ser corroborados por no poseer material de herbario disponible. Por ejemplo, las especies o combinaciones publicadas en revistas sin comité editorial y de difícil acceso, en su gran mayoría no han podido ser aceptadas. La imposibilidad, en algunos casos, de acceder a la publicación original, o bien la ausencia del material *typus* en los herbarios mencionados en los protólogos impidieron incluirlas.

El presente Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, constituye una nueva actualización, corrección y síntesis de la información taxonómica y geográfica de la flora de Chile incluyendo su territorio insular y la actual regionalización. Este nuevo catálogo viene a cubrir una necesidad nacional por saber qué especies crecen en el territorio, y se espera que sea también un incentivo para actualizar el conocimiento de grupos difíciles que no han sido tratados con nuevas técnicas y herramientas sistemáticas.

Como se señaló al comienzo, la taxonomía es dinámica, por lo que luego habrá que actualizar este catálogo, para esto, versiones actualizadas podrán ser consultadas en la página de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción en un intento de aportar al conocimiento y valorización de nuestro patrimonio a partir de esta disciplina.

## MATERIALES Y MÉTODOS

El Catálogo de las plantas vasculares de Chile reúne la información de los taxones que se encuentran en Chile continental e insular (Archipiélago de Juan Fernández, Isla de Pascua e Islas Desventuradas).

La actualización de los niveles taxonómicos de división, clase, orden y familia siguen lo propuesto por Stevens (2001 en adelante). La actualización de los nombres científicos a nivel de especie se realizó utilizando toda la información bibliográfica disponible, tomando como base el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Marticorena & Quezada 1985), Bibliografía botánica taxonómica de Chile (Marticorena 1992), Bibliografía botánica taxonómica de Chile, Suplemento 1 (Marticorena 1996), Catálogo del Cono Sur (Zuloaga *et al.* 2008), monografías y revisiones taxonómicas publicadas después de 2008 y que están relacionadas con cambios nomenclaturales en la flora chilena principalmente aquellos realizados en el marco del

Proyecto Nueva Flora de Chile. Las abreviaturas de los nombres de los autores presentan el formato propuesto por Brummitt & Powel (1992) seguido por The International Plant Names Index (IPNI).

De forma complementaria se revisaron especímenes de herbario, especialmente del Herbario de la Universidad de Concepción (CONC) y del Museo Nacional de Historia Natural (SGO). A raíz de estos estudios en este catálogo se incluye nueva información y en algunos casos se añaden notas para aclarar la nomenclatura y otra información relevante.

En cuanto a distribución geográfica, se actualizó con la nueva división administrativa del país agregando las nuevas regiones de Arica y Parinacota, Ñuble y Los Ríos, además se aclararon varias dudas con respecto a la presencia en Chile Continental e Insular de numerosas especies. Para cada una de las áreas se ha señalado con un acrónimo (Tabla 1). En cuanto al origen se consideraron tres categorías: nativas, endémicas de Chile e introducidas.

TABLA 1. Acrónimos utilizados para señalar cada una de las Regiones de Chile continental e insular. / Acronyms used to indicate each one of the Regions of continental and insular Chile.

REGIÓN	ACRÓNIMO
Arica y Parinacota	AYP
Tarapacá	TAR
Antofagasta	ANT
Atacama	ATA
Coquimbo	COQ
Valparaíso	VAL
Metropolitana de Santiago	RME
Libertador Bernardo O'Higgins	LBO
Maule	MAU
Ñuble	NUB
Biobío	BIO
Araucanía	ARA
Los Ríos	LRI
Los Lagos	LLA
Aisén	AIS
Magallanes	MAG
Juan Fernández	JFE
Isla de Pascua	IPA
Islas Desventuradas	IDE

Finalmente, este catálogo incluye información sobre División, Clase, Familia, Género, Especie, y categorías infraespecíficas. Los nombres aceptados incluyen Autor(es), Sinónimos (considerando solo los nombres citados para

Chile), datos de Hábito (Árbol, Árbol pequeño, Arbusto, Subarbusto, Hierba), Ciclo de vida (anual, bienal, perenne), Estatus (endémico, nativo, introducido), Distribución en las regiones de Chile (según acrónimos), Rango altitudinal, presencia en Países vecinos (Argentina, Bolivia, Perú), Nombres vulgares en los casos que corresponda y Notas.

Para las plantas introducidas, el punto de partida fue la información que se obtuvo del Catálogo de la Flora Vasculosa de Chile (Marticorena & Quezada 1985) y la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Universidad de Concepción (LIB). A partir de esta información y de la incorporación de trabajos y publicaciones recientes en la materia, se corrige y depura el registro de especies introducidas en el país. En el presente catálogo, se compilan nuevos registros, se cambia el estatus (origen) de algunos taxones, y se corrige y valida el rango de distribución de estas especies en Chile continental e insular según la regionalización vigente. A su vez, y al igual que con las especies nativas, se evalúa y actualiza la nomenclatura, permitiéndonos entregar el detalle a escala regional de este componente de la flora del país. En este trabajo se detalla la misma información que para las especies nativas, a excepción de la información en relación a los sinónimos y su presencia en países vecinos.

El Anexo 1 contiene la lista alfabética de los géneros, con su correspondiente familia y clase.

Ejemplo del formato:

## ANACARDIACEAE

### Schinus

*Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera

Sinónimos: *Amyris polygama* Cav., *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera var. *chilensis* F.A. Barkley, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera fma. *ovatus* (Lindl.) Cabrera, *Schinus dependens* Ortega var. *brevifolia* Fenzl ex Engl., *Schinus huyngan* Kuntze, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera var. *parviflorus* (Marchand) F.A. Barkley, *Duvaua crenata* Phil., *Litrea crenata* Phil., *Schinus dependens* Ortega var. *parviflorus* Marchand

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Huingán.

Nota: Especie muy polimorfa, con variaciones especialmente en las hojas, lo que ha motivado la creación de variedades, subespecies y formas, las que han sido reunidas en una sola especie.

## RESULTADOS

De acuerdo a los registros, un total de 6 clases y 56 órdenes representan los niveles superiores de organización y se informa la presencia en el país de 5471 taxones distribuidos

en 1121 géneros y 186 familias. Del total, 4655 corresponden a taxones nativos (85,1%), 2145 de ellos son endémicos de Chile (39,2%), mientras que las introducidas suman 816 (14,9%) (Tabla 2).

TABLA 2. Estadística de las plantas vasculares en la flora de Chile de acuerdo a su clase taxonómica. / Statistics of vascular plants of Chile, according to taxonomic class.

CLASE	ENDÉMICA	NATIVA	INTRODUCIDA	TOTAL
Lycopodiopsida	1	10	1	12
Polypodiopsida	55	94	4	153
Gnetopsida	2	4	0	6
Pinopsida	1	8	3	12
Liliopsida	401	617	216	1234
Magnoliopsida	1685	1777	592	4054
Total	2145	2510	816	5471

Desde la publicación de Marticorena & Quezada (1985), se han incorporado numerosos registros, tanto de especies nativas como de introducidas. Algunos ejemplos de los cambios que se presentan en este catálogo corresponden a: nivel de familia, la prevalencia de los nombres Apiaceae, Asteraceae y Brassicaceae, reemplazando el uso de los nombres de las familias Umbelliferae, Compositae y Cruciferae respectivamente. Fusión de algunas familias como Caesalpiniaceae y Mimosaceae cuyos representantes en Chile quedan reunidos bajo la familia Fabaceae; Ledocarpaceae y Vivianiaceae fusionadas bajo la familia Francoaceae; Flacourtiaceae quedando incluida bajo Salicaceae, la inclusión de Eucryphiaceae dentro de Cunoniaceae y Empetraceae y Epacridaceae dentro de Ericaceae. La segregación de géneros que quedan en familias independientes como Calceolariaceae que incluye a *Calceolaria* y *Jovellana*, Quillajaceae familia monotípica con *Quillaja* como único representante y Heliotropiaceae incluyendo a *Heliotropium*.

A nivel de género, el cambio de nombres como *Pseudognaphalium*, *Austrolycopodium* y *Diphassium* que reemplazan a los representantes chilenos de los géneros *Gnaphalium* y *Lycopodium* respectivamente. Nombres de géneros que han pasado a la sinonimia y por lo tanto deberían dejar de usarse en Chile como son: *Mimulus* (que pasa a ser *Erythranthe*), *Mulinum* y *Laretia* (que pasan a la sinonimia de *Azorella*), *Satureja* (cuyas especies quedaron entre los géneros *Micromeria* y *Gardoquia*) y *Wendtia* (que queda incluida bajo *Balbisia*). La segregación de especies en géneros independientes como *Blumenbachia*, *Grausa*, *Nasa* y *Pinnasa* antes incluidas en *Loasa* y, *Amphiscirpus*, *Ficinia*, *Phylloscirpus*, *Rhodoscirpus* y *Zameioscirpus* antes incluidos en *Scirpus*. La fusión de géneros como

*Echinocactus*, *Eriosyce*, *Islaya*, *Neoporteria* y *Pyrrhocactus* quedando incluidos en *Eriosyce*.

A nivel de especie, se presenta la sinonimia de numerosos taxones, nuevas combinaciones, revalidaciones y corrección en la denominación de otros. Se destaca la inclusión de especies nativas descritas en la última década como *Alstroemeria marticorenae*, *Bipinnula gabriel*, *Chorizanthe novoana*, *Viola farkasiana* y *Weberbauerella chilensis* y la incorporación de nuevos registros para la flora introducida como por ejemplo *Dittrichia viscosa* y *Cotoneaster francheti* entre varios otros.

Finalmente, para la entrega de la información de los rangos de distribución de especies nativas e introducidas ha sido fundamental el apoyo con material herborizado depositado en el Herbario de la Universidad de Concepción y el Herbario del Museo de Historia Natural, validando una vez más la importancia de estas entidades en la generación del conocimiento base de estas disciplinas.

La información de este catálogo se mantendrá actualizada periódicamente, en la medida en que surjan nuevos cambios taxonómicos o nuevos registros de plantas vasculares para Chile. En tal sentido, invitamos a colaborar con información que complemente este proceso de actualización, contactando al correo electrónico de correspondencia.

## AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) por su iniciativa del VIII concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo que financió el Proyecto N° 004/2016 “Actualización de la lista de las plantas nativas y endémicas de Chile”, al Dr. Fernando Zuloaga del Instituto de Botánica

Darwinion (Argentina) que entregó desinteresadamente la base de datos del catálogo del Cono Sur, pilar fundamental para lograr el objetivo del proyecto. A la Dra. Mary Kalin Arroyo de la Universidad de Chile por su constante apoyo y estímulo para el estudio de la flora de Chile. Nuestra gratitud a los colaboradores Nicolás García (Amaryllidaceae), Patricio Novoa (Orchidaceae) y Silvia Arroyo-Leuenberger (*Leucocoryne*) que revisaron los respectivos grupos. Nuestro agradecimiento a Gloria Rojas del Museo Nacional de Historia Natural (SGO) por las facilidades otorgadas en el estudio de las colecciones científicas, a Rosa Montero, Claudia Flores y Sonia Maldonado del Herbario de la Universidad de Concepción (CONC) por su constante labor con la organización del herbario.

## REFERENCIAS

- ARROYO, M.T.K., MARTICORENA, C., MUÑOZ, M. 1990. A checklist of the native annual flora of Continental Chile. *Gayana Botánica* 47: 119-135.
- BRUMMITT, R.K., POWELL, C.E. (eds.). 1992. Author of plant names. Royal Botanic Gardens, Kew. 732 pp.
- HENRÍQUEZ, J.M., PISANO, E., MARTICORENA, C. 1995. Catálogo de la flora vascular de Magallanes (XIIª Región), Chile. *Anales del Instituto de la Patagonia* 23: 5-30.
- MARTICORENA, C. 1992. Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile. *Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden* 41: 1-587.
- MARTICORENA, C. 1996. Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile. Suplemento 1. *Gayana Botánica* 53(1): 1-263.
- MARTICORENA, C., MATTHEI, O., RODRÍGUEZ, R., ARROYO, M.T.K., MUÑOZ, M., SQUEO, F., ARANCIO, G. 1998b. Catálogo de la flora vascular de la Segunda Región (Región de Antofagasta), Chile. *Gayana Botánica* 55: 23-83.
- MARTICORENA, C., QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. *Gayana Botánica* 42: 1-157.
- MARTICORENA, C., RODRÍGUEZ, R. (eds.). 2011. Flora de Chile 3(1). Misodendraceae a Zygophyllaceae. Ediciones Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 148 pp.
- MARTICORENA, C., SQUEO, F.A., ARANCIO, G., MUÑOZ, M. 2001. Catálogo de la flora vascular de la IV Región de Coquimbo. En: Squeo, F.A., Arancio, G., Gutiérrez, J.R. (eds.), Libro Rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo. Capítulo 7: 105-142.
- MARTICORENA, C., STUESSY, T.F., BAEZA, C. 1998a. Catalogue of the vascular flora of the Robinson Crusoe or Juan Fernández Islands, Chile. *Gayana Botánica* 55: 187-211.
- PHILIPPI, F. 1881. *Catalogus plantarum vascularium chilensium adhuc descriptarum*. Santiago de Chile. viii, 378 pp.
- SQUEO, F.A., ARROYO, M.T.K., MARTICORENA, A., ARANCIO, G., MUÑOZ, M., NEGRITTO, M., ROJAS, G., ROSAS, M., RODRÍGUEZ, R., HUMAÑA, A.M., BARRERA, E., MARTICORENA, C. 2008. Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Atacama. En: Squeo, F.A., Arancio, G., Gutiérrez, J.R. (eds.), Libro Rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama. Capítulo 6: 97-120.
- STEVENS, P.F. 2001 onwards. Angiosperm Phylogeny Website. Version 14, July 2017. URL: <http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/> Accedido: Mayo 18, 2018.
- STUESSY, T.F., CRAWFORD, D.J., LÓPEZ-SEPÚLVEDA, P., BAEZA, C.M., RUIZ, E. (eds.). 2017. *Plants of Oceanic Islands. Evolution, Biogeography, and Conservation of the Flora of the Juan Fernández (Robinson Crusoe) Archipelago*. Cambridge University Press. 465 pp.
- ZULOAGA, F.O., MORRONE, O., BELGRANO, M.J. (eds.), MARTICORENA, C. (Chile), MARCHESI, E. (Uruguay) (eds. asoc.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). *Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden* 107 (3 vols.): i-xcvi, 1-3348.



## CATÁLOGO TAXONÓMICO

### **PTERIDOPHYTA**

#### **LYCOPODIOPSIDA**

##### **ISOETACEAE**

###### **Isoetes**

###### ***Isoetes araucaniana*** Macluf & Hickey

Hierba acuática. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 800-1500 m.

###### ***Isoetes chubutiana*** Hickey, Macluf & W.C. Taylor

Sinónimos: *Isoetes valdiviensis* H.P. Fuchs, nom. nud.,

*Isoetes meyeri* H.P. Fuchs, nom. nud.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 700-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

###### ***Isoetes hieronymi*** U. Weber

Sinónimos: *Isoetes argentina* A.A. Eaton ex Palmer, nom.

nud., *Isoetes lechleri* auct. non Mett.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

###### ***Isoetes savatieri*** Franchet

Sinónimos: *Calamaria savatieri* (Franchet) Kuntze, *Isoetes*

*lechleri* Mett. var. *savatieri* (Franchet) L.D. Gómez

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS,

MAG.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

##### **LYCOPODIACEAE**

###### **Austrolycopodium**

###### ***Austrolycopodium alboffii*** (Rolleri) Holub

Sinónimos: *Lycopodium alboffii* Rolleri, *Lycopodium*

*magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *nanum* (Albov) Looser

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

###### ***Austrolycopodium confertum*** (Willd.) Holub

Sinónimos: *Lycopodium confertum* Willd., *Lycopodium*

*chonoticum* Phil., *Lycopodium confertum* Willd. var.

*barrosii* Looser, *Lycopodium barrosii* (Looser) Herter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

###### ***Austrolycopodium erectum*** (Phil.) Holub

Sinónimos: *Lycopodium erectum* Phil., *Lycopodium*

*magellanicum* (P. Beauv.) Sw. var. *erectum* (Phil.) Looser,

*Lycopodium looseri* Herter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 1200-2800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

###### ***Austrolycopodium magellanicum*** (P. Beauv.) Holub

Sinónimos: *Lepidotis magellanica* P. Beauv., *Lycopodium*

*magellanicum* (P. Beauv.) Sw.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 300-1600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Pinpinela.

###### ***Austrolycopodium paniculatum*** (Desv. ex Poir.) Holub

Sinónimos: *Lycopodium paniculatum* Desv. ex Poir.,

*Lycopodium dendromorphum* Kunze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 700-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Palmita, pimpinela, licopodio, musgo,

llanka-lawen.

###### **Diphasium**

###### ***Diphasium gayanum*** (J. Rémy) Holub

Sinónimos: *Lycopodium gayanum* J. Rémy, *Lycopodium*

*skottsbergii* (Herter ex Nessel) Herter, *Lycopodium*

*scariosum* G. Forst. var. *gayanum* (J. Rémy) Nessel,

*Lycopodium scariosum* auct. non G. Forst., *Lycopodium*

*jussiaei* (jussieui) auct. non Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 300-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Palmita, pinpinela.

## Huperzia

### *Huperzia fuegiana* (Roiv.) Holub

Sinónimos: *Urostachys fuegianus* (Roiv.) Herter, *Lycopodium fuegianum* Roiv., *Urostachys selago* (L.) Herter var. *hessei* Herter ex Nessel, *Huperzia selago* auct. non (L.) Schrank & Mart., *Lycopodium selago* auct. non L.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## SELAGINELLACEAE

### Selaginella

#### *Selaginella apoda* (L.) Spring

Hierba. Anual o perenne. Introducida.  
Distribución: BIO, LRI.

## POLYPODIOPSIDA

### ASPLENIACEAE

#### Asplenium

##### *Asplenium dareoides* Desv.

Sinónimos: *Asplenium magellanicum* Kaulf., *Asplenium concisum* Desv., *Asplenium philippi* Gand., *Asplenium dareoides* Desv. var. *dentatum* G. Kunkel  
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 5-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Filu-lahuén.

##### *Asplenium gilliesii* Hook.

Sinónimos: *Asplenium gilliesianum* Hook. & Grev.  
Hierba saxícola. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

##### *Asplenium macrosorum* Bertero ex Colla

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 30-500 m.

##### *Asplenium obtusatum* G. Forst. var. *obtusatum*

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: IPA, IDE.

Rango altitudinal: 2-190 m.

##### *Asplenium obtusatum* G. Forst. var. *sphenoides* (Kunze) C. Chr. ex Skottsbo.

Sinónimos: *Asplenium sphenoides* Kunze, *Asplenium chondrophyllum* Bertero ex Colla, *Asplenium consimile* J. Remy, *Asplenium obliquum* G. Forst. var. *sphenoides* (Kunze) Mett., *Asplenium obliquum* G. Forst. var. *chondrophyllum* (Bertero ex Colla) Mett.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 2-500 m.

##### *Asplenium patagonicum* R.A. Rodr. & R. Guzmán

Sinónimos: *Asplenium longifolium* Phil. ex Gotschl., nom. nud., *Asplenium monanthes* auct. non L.  
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 10-320 m.

##### *Asplenium peruvianum* Desv.

Sinónimos: *Asplenium fragile* C. Presl var. *lomense* Weath., *Asplenium fragile* C. Presl  
Hierba saxícola. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 200-200 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

##### *Asplenium polyodon* G. Foster var. *squamulosum* (C. Chr.) R.A. Rodr.

Sinónimos: *Asplenium adiantoides* (L.) C. Chr. var. *squamulosum* C. Chr.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: IPA.  
Rango altitudinal: 2-120 m.  
Nombre vulgar: Nehe nehe.

##### *Asplenium stellatum* Colla

Sinónimos: *Asplenium fernandezianum* Kunze, *Asplenium lunulatum* Sw. var. *stellatum* (Colla) C. Chr.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 90-1800 m.

##### *Asplenium trilobum* Cav.

Sinónimos: *Asplenium trapezoides* Sw., *Asplenium parvulum* Hook., *Asplenium trilobum* Cav. var. *trapezoides* (Sw.) G. Kunkel  
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 5-600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Asplenium triphyllum*** C. Presl

Sinónimos: *Asplenium imbricatum* Hook. & Grev.

Hierba saxícola. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.

Rango altitudinal: 4300-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**Pleurosorus**

***Pleurosorus papaverifolius*** (Kunze) Fée

Sinónimos: *Gymnogramme papaverifolia* Kunze,

*Pleurosorus immersus* Fée, *Gymnogramma chilensis*

Brack., *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var. *nana*

Villagrán, *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var.

*hirsuta* Villagrán, *Asplenium ciliatum* C. Presl ex Bertero,

*Asplenium subglandulosum* (Hook. & Grev.) Salvo, Prada

& Díaz subsp. *papaverifolium* (Kunze) Salvo, Prada & Díaz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

**ATHYRIACEAE**

**Diplazium**

***Diplazium fuenzalidae*** Espinosa

Sinónimos: *Athyrium fuenzalidae* (Espinosa) Gunckel,  
comb. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 200-400 m.

Nombre vulgar: Nehe nehe.

**BLECHNACEAE**

**Blechnum**

***Blechnum arcuatum*** J. Remy

Sinónimos: *Blechnum bibraeae* Mett.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,  
MAG.

Rango altitudinal: 5-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Blechnum asperum*** (Klotzsch) J.W. Sturm

Sinónimos: *Lomaria aspera* Klotzsch

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 15-415 m.

***Blechnum blechnoides*** Keyserl.

Sinónimos: *Lomaria leyboldtiana* Phil., *Blechnum valdiviense* C. Chr., *Blechnum leyboldtianum* (Phil.) C. Chr., *Lomaria blechnoides* auct. non Bory, *Spicanta leyboldtiana* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,  
MAG.

Rango altitudinal: 1-1100 m.

Nombre vulgar: Iquide.

***Blechnum chilense*** (Kaulf.) Mett.

Sinónimos: *Lomaria chilensis* Kaulf., *Lomaria gilliesii* Hook. & Grev., *Lomaria reedii* Phil., *Blechnum gilliesii* (Hook. & Grev.) Mett., *Blechnum reedii* (Phil.) Espinosa, *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. var. *reedii* (Phil.) Looser, *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. fma. *imbricatum* Kunkel, *Blechnum cordatum* auct. non (Desv.) Hieron.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 5-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Costilla de vaca, palmilla, quilquil, iquide.

***Blechnum corralense*** Espinosa

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 15-1200 m.

***Blechnum cycadifolium*** (Colla) J.W. Sturm

Sinónimos: *Lomaria cycadifolia* Colla, *Lomaria lanuginosa* Kunze, *Blechnum lanuginosum* (Kunze) J.W. Sturm, *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *cycadifolium* (Colla) C. Chr., *Struthiopteris cycadifolia* (Colla) Ching.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 180-1200 m.

***Blechnum hastatum*** Kaulf.

Sinónimos: *Blechnum trilobum* C. Presl, *Blechnum ciliatum* C. Presl, *Lomaria hastata* (Kaulf.) Kunze, *Blechnum remotum* C. Presl, *Lomaria pubescens* (Hook.) Kunze, *Lomaria triloba* (C. Presl) Fée, *Blechnum hastatum* Kaulf. var. *minor* Hook., *Blechnum parvulum* Phil., *Blechnum australe* L. var. *triloba* (C. Presl) Hieron., *Blechnum australe* L. var. *hastata* (Kaulf.) Hieron., *Blechnum australe* L. fma. *trilobum* (C. Presl) Rosenst., *Blechnum auriculatum* Cav. fma. *remotum* (C. Presl) C. Chr. & Skotts., *Blechnum auriculatum* Cav. fma. *parvula* (Phil.) C. Chr. & Skotts., *Blechnum auriculatum* Cav. var. *trilobum* (C. Presl) Osten & Herter, *Blechnum auriculatum* Cav. var. *hastatum* (Kaulf.) Looser, *Blechnum auriculatum* Cav. var. *parvulum* (Phil.) Looser, *Blechnum hastatum* Kaulf. fma. *alternatum*



G. Kunkel, *Blechnum hastatum* Kaulf. fma. *punctatum* (Looser) G. Kunkel, *Blechnum hastatum* Kaulf. var. *trilobum* (C. Presl) G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel subsp. *parvulum* (Phil.) Kunkel fma. *imbricatum* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel var. *valdiviense* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel subsp. *parvulum* (Phil.) G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel var. *brevifolium* fma. *nervosum* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel var. *brevifolium* fma. *semidecurrans* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel var. *brevifolium* fma. *acuminatum* G. Kunkel, *Taenitis sagittaefera* Bory, *Mesothema remotum* (C. Presl) C. Presl, *Mesothema trilobum* (C. Presl) C. Presl, *Parablechnum ciliatum* (C. Presl) C. Presl, *Blechnopteris hastata* (Kaulf.) Trevis., *Struthiopteris hastata* (Kaulf.) Trevis., *Struthiopteris remota* (C. Presl) Trevis., *Struthiopteris triloba* (C. Presl) Trevis., *Spicanta hastata* (Kaulf.) Kuntze, *Blechnum auriculatum* auct. non Cav., *Mesothema hastatum* (Kaulf.) C. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 5-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Palmilla, quilquil, arriquilquil.

***Blechnum longicauda*** C. Chr.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 5-500 m.

***Blechnum magellanicum*** (Desv.) Mett.

Sinónimos: *Lomaria magellanica* Desv., *Lomaria setigera* Gaudich., *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *setigerum* (Gaudich.) C. Chr., *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *bipinnatifidum* G. Kunkel

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Katalapi.

***Blechnum microphyllum*** (Goldm.) C.V. Morton

Sinónimos: *Lomaria microphylla* Goldm., *Lomaria australis* Kunze, *Lomaria gayana* J. Remy, *Blechnum gayanum* (J. Remy) J.W. Sturm, *Blechnum gayanum* (J. Remy) J.W. Sturm fma. *germainii* (Hook.) Looser, *Lomaria germainii* Hook., *Lomaria andicola* Phil., *Lomaria araucana* Phil., *Blechnum germanii* (Hook.) H. Christ, *Blechnum andicola* (Phil.) C. Chr., *Blechnum araucanum* (Phil.) C. Chr., *Blechnum poeppigianum* J.W. Sturm

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 5-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Blechnum mochaenum*** G. Kunkel var. *fernandezianum* (Looser) de la Sota

Sinónimos: *Blechnum blechnoides* (Bory) Keyserl. var. *fernandezianum* Looser

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 100-1100 m.

***Blechnum mochaenum*** G. Kunkel var. *mochaenum*

Sinónimos: *Lomaria lechleri* T. Moore

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 5-1350 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Blechnum paschale*** (C. Chr.) Christenh

Sinónimos: *Doodia paschalis* C. Chr.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 100-100 m.

Nombre vulgar: Nehe nehe.

***Blechnum penna-marina*** (Poir.) Kuhn

Sinónimos: *Polypodium penna-marina* Poir., *Blechnum alpinum* Mett., *Blechnum alpinum* Mett. var. *elongatum* Mett., *Blechnum uliginosum* (Phil.) C. Chr., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var. *uliginosa* (Phil.) C. Chr., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn fma. *polypodioides* (Desv. ex Gaudich.) C. Chr., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var. *polypodioides* (Desv. ex Gaudich.) Looser, *Lomaria polypodioides* Desv. ex Gaudich., *Lomaria uliginosa* Phil., *Lomaria uliginosa* Phil. var. *magellanica* Phil., *Polypodium penna-marina* Poir., *Lomaria penna-marina* (Poir.) Mett.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 3-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Pinque.

***Blechnum schottii*** (Colla) C. Chr.

Sinónimos: *Lomaria schottii* Colla, *Lomaria bella* Phil., *Lomaria fernandeziana* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 50-820 m.

***Blechnum x rodriguezii*** Aguiar, Quintanilla & Amigo  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 150-585 m.

## CYSTOPTERIDACEAE

### Cystopteris

***Cystopteris apiiformis*** Gand.  
Sinónimos: *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. var. *apiiformis* (Gand.) C. Chr.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## DAVALLIACEAE

### Davallia

***Davallia solida*** (G. Forster) Sw.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Nota: La expedición Franco-Belga de 1934 (Tardieu-Blot 1936), reporta la presencia de esta especie para la Isla de Pascua. Sin embargo, esta especie nunca más ha sido encontrada.

## DENNSTAEDTIACEAE

### Dennstaedtia

***Dennstaedtia glauca*** (Cav.) C. Chr. ex Looser  
Sinónimos: *Dicksonia lambertiana* J. Remy, *Davallia glauca* Cav., *Dennstaedtia lambertyana* (J. Remy) H. Christ  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 300-2360 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### Histiopteris

***Histiopteris incisa*** (Thunb.) J. Sm.  
Sinónimos: *Pteris incisa* Thunb., *Litobrochia incisa* (Thunb.) C. Presl, *Pteris flavescens* Colla, *Pteris patens* Kunze, *Pteris vespertilionis* Labill. var. *flavescens* (Colla) J. Agardh, *Litobrochia appendiculata* (Kaulf.) J. Remy, *Litobrochia patens* (Kunze) J. Remy, *Histiopteris incisa* (Thunb.) J. Sm. var. *flavescens* (Colla) C. Chr., *Pteris vespertilionis* auct. non Labill.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 5-580 m.  
Países limítrofes: Perú.

### Hypolepis

***Hypolepis poeppigii*** (Kunze) R.A. Rodr.  
Sinónimos: *Polypodium poeppigii* Kunze, *Phegopteris poeppigii* (Kunze) Fée ex J. Remy, *Phegopteris sturmii* Phil., *Hypolepis rugosula* (Labill.) J. Sm. var. *poeppigii* (Kunze) C. Chr. & Skotts., *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. var. *pubescens* Phil., *Hypolepis poeppigiana* Mett., *Hypolepis chilensis* Fée, *Phegopteris poeppigii* (Kunze) Fée var. *hirsuta* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 25-650 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Wilel-lawen, pesebre.

### Microlepia

***Microlepia strigosa*** (Thunb. ex Murray) C. Presl  
Sinónimos: *Trichomanes strigosus* Thunb. ex Murray  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: IPA.  
Rango altitudinal: 100-300 m.

## DICKSONIACEAE

### Dicksonia

***Dicksonia berteriana*** (Colla) Hook.  
Sinónimos: *Davallia berteriana* Colla, *Balanium berterianum* Kunze  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 200-700 m.

***Dicksonia externa*** C. Chr. & Skotts.  
Sinónimos: *Dicksonia berteriana* (Colla) Hook. var. *virgata* C. Chr. & Skotts.  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 200-700 m.

### Lophosoria

***Lophosoria quadripinnata*** (J.F. Gmel.) C. Chr.  
Sinónimos: *Polypodium quadripinnatum* J.F. Gmel., *Polypodium pruinaum* Sw., *Polypodium cinereum* Cav.,

*Cyathea discolor* Bory, *Alsophila pruinata* (Sw.) Kaulf. ex Kunze, *Lophosoria pruinata* (Sw.) C. Presl, *Lophosoria quadripinnata* (J.F. Gmel.) C. Chr. fma. *viridifolia* G. Kunkel

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 5-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Palmita, palmilla, helecho o palmita de Valdivia, ampe.

### Thyrsopteris

*Thyrsopteris elegans* Kunze

Sinónimos: *Dicksonia elegans* (Kunze) Mett., *Panicularia berterii* Colla

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 700-1000 m.

## DRYOPTERIDACEAE

### Dryopteris

*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA.

*Dryopteris karwinskyana* (Mett.) Kuntze

Sinónimos: *Aspidium karwinskyanum* Mett., *Dryopteris espinosai* Hicken, *Thelypteris espinosae* (Hicken) R.A. Rodr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 420 m.

Nota: Considerado extinto en la Isla de Pascua por Jean-Yves Meyer (2013) porque no ha sido observado o recolectado desde hace más de 75 años.

### Elaphoglossum

*Elaphoglossum fonkii* (Phil.) T. Moore

Sinónimos: *Elaphoglossum mathewsii* auct. non (Fée) T. Moore, *Acrostichum fonkii* Phil.

Hierba saxícola. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

*Elaphoglossum gayanum* (Fée) T. Moore

Sinónimos: *Acrostichum gayanum* Fée

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

*Elaphoglossum lindenii* (Bory ex Fée) T. Moore

Sinónimos: *Elaphoglossum squamatum* auct. non. (Sw.) T. Moore, *Acrostichum squamosum* Cav., *Acrostichum lindenii* Bory ex Fée

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 400 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

*Elaphoglossum porteri* Hicken

Sinónimos: *Elaphoglossum rudolphii* Espinosa

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 600-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

*Elaphoglossum skottsbergii* Krajina

Sinónimos: *Elaphoglossum gayanum* auct. non (Fée) T. Moore, *Elaphoglossum tahitense* auct. non Brack.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 400-500 m.

### Megalastrum

*Megalastrum glabrius* (C. Chr. & Skotts.) Sundue, Rouhan & R.C. Moran

Sinónimos: *Dryopteris inaequalifolia* (Colla) C. Chr. var. *glabrior* C. Chr. & Skotts., *Ctenitis inaequalifolia* (Colla) Ching var. *glabrior* (C. Chr. & Skotts.) G. Kunkel, *Megalastrum inaequalifolium* (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. *glabrius* (C. Chr. & Skotts.) R.A. Rodr.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200-600 m.

*Megalastrum inaequalifolium* (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran

Sinónimos: *Polypodium inaequalifolium* Colla, *Dryopteris villosa* (L.) Kuntze var. *berteroana* (Hook.) C. Chr., *Dryopteris skottsbergii* C. Chr., *Dryopteris inaequalifolia* (Colla) C. Chr., *Ctenitis inaequalifolia* (Colla) Ching

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200-600 m.

*Megalastrum masafuerae* Sundue, Rouhan & R.C. Moran

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 100 m.

***Megalastrum spectabile*** (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran  
Sinónimos: *Megalastrum spectabile* (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. *philippianum* (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran, *Polypodium spectabile* Kaulf., *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr., *Ctenitis spectabilis* (Kaulf.) G. Kunkel, *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr. var. *philippiana* C. Chr., *Ctenitis spectabilis* (Kaulf.) G. Kunkel var. *philippiana* (C. Chr.) R.A. Rodr., *Polypodium contractum* Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pesebre.

### **Polystichum**

***Polystichum andinum*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Polystichum chilense*** (Christ) Diels var. *chilense*

Sinónimos: *Polystichum bridgesii* Schott, *Aspidium aculeatum* (L.) Sw. var. *chilensis* C. Chr., *Aspidium bridgesii* (Schott) J.W. Sturm, *Aspidium pauciuspis* J.W. Sturm, *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *chilense* (H. Christ) C. Chr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pelomén-lahuén.

***Polystichum chilense*** (Christ) Diels var. *dusenii* (C. Chr.)

Looser ex R.A. Rodr.

Sinónimos: *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *dusenii* C. Chr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Polystichum fuentesii*** Espinosa

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: IPA.

Nota: Considerado extinto en la Isla de Pascua por Jean-Yves Meyer (2013) porque no ha sido observado o recolectado desde hace más de 75 años.

***Polystichum multifidum*** (Mett.) T. Moore

Sinónimos: *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *autranii* Hicken, *Aspidium multifidum* Mett., *Dryopteris metteniana* Kuntze, *Dicksonia andina* Phil., *Polystichum pearcei* Phil., *Polystichum nahuelhuapiense* Diem, *Aspidium pearcei* (Phil.) F. Phil., *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *pearcei* (Phil.) R.A. Rodr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Polystichum plicatum*** (Poepp. ex Kunze) Hicken

Sinónimos: *Polystichum elegans* J. Remy, *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl fma. *genuina* Hicken, *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl fma. *latifolia* Hicken, *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl var. *elegans* (J. Remy) C. Chr., *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl var. *plicatum* (Poepp.) C. Chr., *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze var. *laxum* Kunze, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze var. *rigidum* Kunze, *Aspidium elegans* (J. Remy) J.W. Sturm

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Polystichum subintegerrimum*** (Hook. & Arn.) R.A. Rodr.

Sinónimos: *Polystichum brongniartianum* J. Remy, *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *brongniartianum* (J. Remy) C. Chr., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *subintegerrimum* (Hook. & Arn.) C. Chr., *Aspidium subintegerrimum* Hook. & Arn., *Aspidium brongniartianum* (J. Remy) J.W. Sturm

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

***Polystichum tetragonum*** Fée

Sinónimos: *Polystichum vestitum* auct. non (G. Forst.) C. Presl

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200 m.

### **Rumohra**

***Rumohra adiantiformis*** (G. Forst.) Ching

Sinónimos: *Polypodium adiantiforme* G. Forst., *Aspidium coriaceum* Sw., *Polystichum coriaceum* Schott, *Nephrodium duriusculum* C. Presl, *Polystichum adiantiforme* (G. Forst.) J. Sm.

Hierba. Perenne. Nativa.



Distribución: COQ, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Pereq, calahuala, yerba del lagarto.

***Rumohra berteroaana*** (Colla) R.A. Rodr.  
Sinónimos: *Aspidium berterianum* Colla, *Aspidium flexum* Kunze, *Polystichum berterianum* (Colla) C. Chr., *Aspidium capense* auct. non Willd.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 200-1200 m.

## EQUISETACEAE

### Equisetum

***Equisetum bogotense*** Kunth  
Sinónimos: *Equisetum flagelliforme* Kunze, *Equisetum flagelliferum* Kunze ex Milde, *Equisetum chilense* C. Presl ex Milde, *Equisetum rinihuense* G. Kunkel  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 10-3200 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Limpia plata, yerba, yerba de la plata.

***Equisetum giganteum*** L.  
Sinónimos: *Equisetum poeppigianum* Mett., *Equisetum lechleri* Milde, *Equisetum tarapacatum* Phil., *Hippochaete gigantea* (L.) Holub, *Equisetum xylochaetum* Mett.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ARA.  
Rango altitudinal: 20-2800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Cola de caballo, sojosojo.

***Equisetum pyramidale*** Goldm.  
Sinónimos: *Equisetum ramosissimum* Desf. var. *scaberium* Milde, *Equisetum philippi* Gand., *Equisetum scandens* J. Remy, *Equisetum giganteum* L. var. *chilense* Milde, *Equisetum ramosissimum* Desf. var. *affine* Milde, *Equisetum araucanum* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 10-2600 m.  
Nombre vulgar: Cola de caballo.

## GLEICHENIACEAE

### Sticherus

***Sticherus cryptocarpus*** (Hook.) Ching  
Sinónimos: *Dicranopteris cryptocarpa* (Hook.) Looser, *Gleichenia cryptocarpa* Hook., *Mertensia cryptocarpa* (Hook.) J. Remy, *Sticherus cryptocarpus* (Hook.) Ching var. *looserianus* G. Kunkel  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 20-2200 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Hierba loza, cola de gallo, ampe.

***Sticherus lepidotus*** (R.A. Rodr.) R.A. Rodr. & Ponce  
Sinónimos: *Gleichenia lepidota* R.A. Rodr.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 500-1100 m.

***Sticherus litoralis*** (Phil.) Nakai  
Sinónimos: *Mertensia litoralis* Phil., *Gleichenia litoralis* (Phil.) C. Chr., *Dicranopteris pedalis* (Kaulf.) Looser var. *litoralis* (Phil.) Looser, *Gleichenia pedalis* (Kaulf.) Sprengel var. *litoralis* (Phil.) Looser, *Dicranopteris litoralis* (Phil.) Looser  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 3-1040 m.

***Sticherus quadripartitus*** (Poir.) Ching  
Sinónimos: *Polypodium quadripartitum* Poir., *Gleichenia acutifolia* Hook., *Mertensia acutifolia* (Hook.) J. Remy, *Gleichenia bibraeae* Mett. ex Kuhn, *Dicranopteris quadripartita* (Poir.) Looser, *Gleichenia quadripartita* (Poir.) T. Moore, *Mertensia magellanica* Desv., *Mertensia quadripartita* (Poir.) Poir., *Sticherus quadripartitus* (Poir.) Ching fma. *bipartitus* G. Kunkel, *Sticherus quadripartitus* (Poir.) Ching fma. *simplex* G. Kunkel  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Yerba loza, palmita, pata de cucho.

***Sticherus squamulosus*** (Desv.) Nakai var. ***gunckelianus*** (Looser) R.A. Rodr. & Ponce  
Sinónimos: *Gleichenia squamulosa* (Desv.) T. Moore var. *gunckeliana* (Looser) Duek, *Dicranopteris squamulosa* (Desv.) Looser var. *gunckeliana* Looser  
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-100 m.



***Sticherus squamulosus*** (Desv.) Nakai var. *squamulosus*  
Sinónimos: *Gleichenia pedalis* (Kaulf.) Spreng.,  
*Dicranopteris pedalis* (Kaulf.) Looser, *Sticherus pedalis*  
(Kaulf.) Ching, *Gleichenia squamulosa* (Desv.) T. Moore,  
*Mertensia squamulosa* Desv., *Mertensia pedalis* Kaulf.,  
*Mertensia oligocarpa* Phil., *Gleichenia oligocarpa* (Phil.)  
C. Chr., *Dicranopteris oligocarpa* (Phil.) Looser, *Sticherus*  
*oligocarpus* (Phil.) Nakai, *Sticherus squamulosus* (Desv.)  
Nakai var. *glaber* (T. Moore) Nakai, *Dicranopteris*  
*squamulosa* (Desv.) Looser  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.  
Rango altitudinal: 3-1500 m.  
Nombre vulgar: Yerba loza, palmita, huedahue.

## HYMENOPHYLLACEAE

### **Hymenoglossum**

***Hymenoglossum cruentum*** (Cav.) C. Presl  
Sinónimos: *Hymenophyllum cruentum* Cav.  
Hierba epífita. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,  
MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Helecho película, sanguinaria, seda de la  
luma.

### **Hymenophyllum**

***Hymenophyllum caudiculatum*** Mart. var. *productum* (C.  
Presl) C. Chr.  
Sinónimos: *Hymenophyllum caudatum* Bosch,  
*Hymenophyllum patagonicum* Gand., *Sphaerocionium*  
*productum* C. Presl, *Mecodium caudiculatum* (Mart.)  
Copel. fma. *productum* (C. Presl) G. Kunkel, *Mecodium*  
*caudiculatum* (Mart.) Copel. fma. *nanum* G. Kunkel  
Hierba epífita. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Pallante chilote.

***Hymenophyllum cuneatum*** Kunze var. *cuneatum*  
Sinónimos: *Hymenophyllum cumingii* C. Presl, *Mecodium*  
*cuneatum* (Kunze) Copel., *Hymenophyllum polyanthos*  
auct. non (Sw.) Sw.  
Hierba epífita. Perenne. Endémica.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 400-1000 m.

***Hymenophyllum cuneatum*** Kunze var. *rarifforme* C. Chr.  
& Skottsbo.  
Sinónimos: *Hymenophyllum terminale* Phil.,  
*Hymenophyllum cuneatum* Kunze fma. *imbricata* C. Chr.  
& Skottsbo., *Mecodium cuneatum* (Kunze) Copel. var.  
*rarifforme* (C. Chr. & Skottsbo.) G. Kunkel  
Hierba epífita. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 300-500 m.

***Hymenophyllum darwinii*** Hook.f. ex Bosch  
Sinónimos: *Hymenophyllum abruptum* Hook. var.  
*brevifrons* (Kunze) Franch., *Hymenophyllum skottsbergii* C.  
Chr., *Hymenophyllum rarum* R. Br. var. *darwinii* (Bosch)  
Neger  
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,  
MAG.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum dentatum*** Cav.  
Sinónimos: *Hymenophyllum bridgesii* Hook.,  
*Hymenophyllum trichocaulum* Phil., *Sphaerocionium*  
*bridgesii* (Hook.) Klotzsch, *Leptocionium dentatum* (Cav.)  
Bosch, *Meringium dentatum* (Cav.) Copel.  
Hierba epífita. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Shushu-lahuén.

***Hymenophyllum dicranotrichum*** (C. Presl) Hook. ex  
Sadeb.  
Sinónimos: *Hymenophyllum chiloense* Hook., *Leptocionium*  
*dicranotrichum* C. Presl, *Trichomanes spinulosum* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-600 m.

***Hymenophyllum falklandicum*** Baker  
Sinónimos: *Hymenophyllum falklandicum* Baker var.  
*elongatum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum glebarium*  
H. Christ ex C. Chr., *Hymenophyllum caespitosum* auct.  
non Gaudich., *Hymenophyllum falklandicum* Baker var.  
*falklandicum* fma. *andinum* Diem & J.S. Licht.  
Hierba epífita. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum ferrugineum*** Colla  
Sinónimos: *Hymenophyllum frankliniae* Colenso,  
*Hymenophyllum berteroi* Hook., *Sphaerocionium*

*ferrugineum* (Colla) Copel., *Hymenophyllum ferrugineum*  
Colla var. *donatii* Looser, *Hymenophyllum subtilissimum*  
Kunze

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-1400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum fuciforme* Sw.**

Sinónimos: *Hymenophyllum semiteres* Colla, *Leptocionium fuciforme* (Sw.) C. Presl, *Mecodium fuciforme* (Sw.) Copel.  
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum krauseanum* Phil.**

Sinónimos: *Hymenophyllum magellanicum* Willd. ex Kunze var. *krauseanum* (Phil.) C. Chr., *Hymenophyllum dichotomum* Cav. var. *krauseanum* (Phil.) C. Chr., *Hymenophyllum plicatum* Kaulf. var. *krauseanum* (Phil.) Looser, *Meringium krauseanum* (Phil.) G. Kunkel  
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum nahuelhuapiense* Diem & J.S. Licht.**

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 200-800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum pectinatum* Cav.**

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-3600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv.**

Sinónimos: *Trichomanes peltatum* Poir., *Hymenophyllum menziesii* C. Presl, *Hymenophyllum meyeri* C. Presl, *Hymenophyllum megachilum* C. Presl, *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv. var. *elongatum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum mettenii* Bosch, *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv. var. *minor* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv. var. *patagonicum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum unilaterale* Bory, *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm. var. *wilsoni* (Hook.) Sadeb., *Hymenophyllum wilsonii* Hook.  
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,

AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1400 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Hymenophyllum plicatum* Kaulf.**

Sinónimos: *Ptychophyllum plicatum* (Kaulf.) C. Presl, *Hymenophyllum quadrifidum* Phil., *Hymenophyllum plicatum* Kaulf. var. *quadrifidum* (Phil.) Looser, *Meringium plicatum* (Kaulf.) Copel., *Hymenophyllum dichotomum* auct. non Cav., *Hymenophyllum nigricans* Colla  
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum rugosum* C. Chr. & Skottsbo.**

Sinónimos: *Hymenophyllum rugosum* C. Chr. & Skottsbo. fma. *lanceolatum* C. Chr. & Skottsbo., *Hymenophyllum tunbrigense* auct. non (L.) Sm.  
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 400-700 m.

***Hymenophyllum secundum* Hook. & Grev.**

Sinónimos: *Hymenophyllum serra* C. Presl, *Meringium secundum* (Hook. & Grev.) Copel.  
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.  
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum seselifolium* C. Presl**

Sinónimos: *Didymoglossum magellanicum* Desv., *Hymenophyllum attenuatum* Hook., *Ptychophyllum magellanicum* Klotzsch, *Hymenophyllum bibraianum* J.W. Sturm, *Leptocionium attenuatum* (Hook.) Bosch, *Leptocionium magellanicum* (Desv.) Bosch, *Leptocionium seselifolium* (C. Presl) Bosch, *Meringium magellanicum* (Desv.) Copel., *Hymenophyllum magellanicum* (Desv.) Willd. ex Kunze  
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev.**

Sinónimos: *Myrmecostylum tortuosum* (Hook. & Grev.) C. Presl, *Leptocionium tortuosum* (Hook. & Grev.) Bosch, *Trichomanes beckeri* E.H.L. Krause ex Phil., *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *beckeri* (E.H.L. Krause ex Phil.) Espinosa, *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *bustillosii* Espinosa, *Meringium tortuosum* (Hook. & Grev.) Copel., *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev.

var. *glomeratum* Diem & J.S. Licht.  
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum tunbrigense*** (L.) Sm.  
Sinónimos: *Trichomanes tunbrigense* L., *Hymenophyllum antarcticum* C. Presl, *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm.  
var. *asperulum* (Kunze) Diem & J.S. Licht.  
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum umbratile*** Diem & J.S. Licht.  
Hierba epífita. Perenne. Nativa.  
Distribución: LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Serpyllopsis**

***Serpyllopsis caespitosa*** (Gaudich.) C. Chr. var. *caespitosa*  
Sinónimos: *Serpyllopsis caespitosa* (Gaudich.) C. Chr. var. *dusenii* (H. Christ) C. Chr., *Serpyllopsis caespitosa* (Gaudich.) C. Chr. var. *densifolia* (Phil.) C. Chr., *Serpyllopsis caespitosa* (Gaudich.) C. Chr. var. *elongata* (Hook.) C. Chr., *Hymenophyllum caespitosum* Gaudich., *Trichomanes caespitosum* (Gaudich.) Hook.f., *Leptocionium caespitosum* C. Presl, *Hymenophyllum dusenii* H. Christ  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Serpyllopsis caespitosa*** (Gaudich.) C. Chr. var. *fernandeziana* C. Chr. & Skottsbo.  
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 400-1400 m.

### **Trichomanes**

***Trichomanes exsectum*** Kunze  
Sinónimos: *Vandenboschia exsecta* (Kunze) Copel., *Polyphlebium exsectum* (Kunze) Ebihara & Dubuisson  
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, LRI, LLA, JFE.  
Rango altitudinal: 0-600 m.

***Trichomanes ingae*** C. Chr. & Skottsbo.  
Sinónimos: *Vandenboschia ingae* (C. Chr. & Skottsbo.) Copel., *Polyphlebium ingae* (C. Chr. & Skottsbo.) Ebihara

& Dubuisson  
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 100-400 m.

***Trichomanes philippianum*** J.W. Sturm  
Sinónimos: *Vandenboschia philippiana* (J.W. Sturm) Copel., *Polyphlebium philippianum* (J.W. Sturm) Ebihara & Dubuisson, *Trichomanes dichotomum* Phil.  
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 500-700 m.

## **MARSILEACEAE**

### **Marsilea**

***Marsilea mollis*** B.L. Rob. & Fernald  
Sinónimos: *Marsilea punae* de la Sota  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### **Pilularia**

***Pilularia americana*** A. Braun  
Sinónimos: *Pilularia valdiviana* Phil. ex Baker, nom. nud.  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 0-100 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

## **OLEANDRACEAE**

### **Arthropteris**

***Arthropteris altescandens*** (Colla) J. Sm.  
Sinónimos: *Polypodium altescandens* Colla, *Polypodium procurrans* Kunze, *Nephrolepis altescandens* (Colla) Baker  
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

## **OPHIOGLOSSACEAE**

### **Botrychium**

***Botrychium dusenii*** (H. Christ) Alston  
Sinónimos: *Botrychium ramosum* Asch. var. *patagonicum*

H. Christ, *Botrychium lunaria* (L.) Sw. var. *dusenii* H. Christ, *Botrychium matricariaefolium* A. Braun subsp. *patagonicum* (C. Chr.) R.T. Clausen  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Ophioglossum**

***Ophioglossum crotalophoroides*** Walter  
Sinónimos: *Ophioglossum tuberosum* Hook. & Arn., *Ophioglossum stipatum* Miers ex Colla, *Ophioglossum vulgatum* L. var. *crotalophoroides* (Walter) D.C. Eaton  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Ophioglossum fernandezianum*** C. Chr.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Ophioglossum melipillense*** J. Remy  
Sinónimos: *Ophioglossum lusitanicum* L. subsp. *coriaceum* (A.Cunn.) R.T. Clausen  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Ophioglossum reticulatum*** L.  
Sinónimos: *Ophioglossum peruvianum* C. Presl, *Ophioglossum vulgatum* L. var. *reticulatum* (L.) Luerss.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: IPA.  
Rango altitudinal: 10-45 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Tiapito.

***Ophioglossum vulgatum*** L.  
Sinónimos: *Ophioglossum nudicaule* L. var. *robustum* J.S. Licht., *Ophioglossum valdivianum* Phil., *Ophioglossum vulgatum* L. var. *valdivianum* (Phil.) J.S. Licht.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-300 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Huentru-lahuén.

## **POLYPODIACEAE**

### **Grammitis**

***Grammitis magellanica*** Desv.  
Sinónimos: *Polypodium magellanicum* (Desv.) J.W. Sturm, *Polypodium magellanicum* (Desv.) Copel., comb. illeg., *Grammitis billardieri* Willd. var. *magellanica* (Desv.) de la Sota, *Polypodium gramineum* auct. non Sw., *Polypodium billardieri* (Willd.) C. Chr. var. *magellanicum* (Desv.) C. Chr.  
Hierba epífita. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 30-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Grammitis patagonica*** (C. Chr.) Parris  
Sinónimos: *Grammitis repanda* Kunze ex Mett., *Polypodium patagonicum* C. Chr., *Grammitis ciliata* auct. non Colenso, *Polypodium jungermannioides* auct. non Klotzsch  
Hierba epífita. Perenne. Nativa.  
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Grammitis poeppigiana*** (Mett.) Pic. Serm.  
Sinónimos: *Polypodium poeppigianum* Mett., *Grammitis australis* R. Br. var. *nana* (Brack.) Franch., *Polypodium australe* Mett. var. *nanum* Brack. ex Macloskie, *Polypodium billardieri* (Willd.) C. Chr. var. *magellanicum* (Desv.) C. Chr. fma. *nanum* (Brack.) Franch. ex Skottsbr., *Grammitis billardieri* Willd. var. *magellanica* (Desv.) de la Sota fma. *nana* (Brack.) de la Sota, *Grammitis magellanica* Desv. fma. *nana* (Brack.) de la Sota ex T.R. Dudley, *Grammitis nana* auct. non Fée  
Hierba epífita. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Microsorium**

***Microsorium scolopendria*** (Burm.f.) Copel.  
Sinónimos: *Polypodium scolopendria* Burm.f., *Polypodium phymatodes* L., *Polypodium fuentesii* Hicken, *Phymatodes scolopendria* (Burm.f.) Ching, *Phymatosorus scolopendria* (Burm.f.) Pic.-Ser.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: IPA.

### **Pleopeltis**

***Pleopeltis macrocarpa*** (Bory ex Willd.) Kaulf.  
Sinónimos: *Polypodium macrocarpum* Bory ex Willd., *Polypodium lanceolatum* L., *Grammitis robusta* Phil.,



*Polypodium lanceolatum* L. var. *araucanum* (Phil.) Looser, *Phlebodium lanceolatum* (L.) J. Sm., *Drynaria lanceolata* (L.) Fée, *Drynaria macrocarpa* (Bory ex Willd.) Fée, *Lepicystis lanceolata* (L.) Diels, *Grammitis araucana* Phil., *Drynaria elongata* auct. non Feé

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

*Pleopeltis x cerro-altoensis* Danton & Boudrie

Hierba epífita. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

## Polypodium

*Polypodium masafuerae* Phil.

Sinónimos: *Pleopeltis masafuerae* (Phil.) de la Sota, *Polypodium macrocarpum* auct. non Presl

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-600 m.

*Polypodium pycnocarpum* C. Chr.

Sinónimos: *Polypodium squamatum* Phil., *Polypodium atacamense* Baker ex Ball, *Polypodium mollendense* Maxon

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## Synammia

*Synammia espinosae* (Weath.) G. Kunkel

Sinónimos: *Polypodium espinosae* Weath.

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 200-1000 m.

*Synammia feuillei* (Bertero) Copel.

Sinónimos: *Grammitis triloba* (Cav.) Desv., *Polypodium glaucescens* Bory, *Synammia triloba* (Cav.) C. Presl, *Synammia skottsbergii* G. Kunkel, *Polypodium synammia* (Fée ex J. Remy) C. Chr., *Polypodium feuillei* Bertero, *Polypodium feuillei* Bertero fma. *trilobum* (Cav.) Looser, *Polypodium feuillei* Bertero fma. *simplex* Looser, *Polypodium feuillei* Bertero fma. *basiscopicum* Looser, *Polypodium feuillei* Bertero var. *feuillei* fma. *unilaterale* G. Kunkel, *Polypodium feuillei* Bertero var. *feuillei*, *Polypodium feuillei* Bertero var. *minor* G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *feuillei*, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *feuillei* fma. *simplex* (Looser) G. Kunkel, *Synammia feuillei*

(Bertero) Copel. var. *feuillei* fma. *basiscopicum* (Looser) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *feuillei* fma. *unilaterale* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *feuillei* fma. *hastifolia* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *minor* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Mecosorus trilobus* (Cav.) Klotzsch, *Goniophlebium synammia* Fée ex J. Remy, *Goniophlebium trilobum* (Cav.) T. Moore, *Polypodium trilobum* auct. non Houtt., *Goniophlebium californicum* auct. non Fée, *Polypodium feuillei* Bertero var. *ibañezii* Looser, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *ibañezii* (Looser) G. Kunkel, nom. illeg.

Hierba epífita o saxícola. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Calahuala, hierba del lagarto, pillavilcún.

*Synammia intermedia* (Colla) G. Kunkel subsp. *intermedia*

Sinónimos: *Polypodium translucens* Kunze, *Polypodium intermedium* Colla, *Polypodium intermedium* Colla var. *basicompositum* C. Chr. & Skotts., *Polypodium intermedium* Colla var. *fernandezianum* Espinosa, *Synammia intermedia* (Colla) G. Kunkel subsp. *masatierrae* (C. Chr. & Skotts.) G. Kunkel, *Goniophlebium translucens* (Kunze) Fée

Hierba epífita. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

*Synammia intermedia* (Colla) G. Kunkel subsp.

*masafuerana* (C. Chr. & Skotts.) G. Kunkel

Sinónimos: *Polypodium intermedium* Colla subsp. *masafueranum* C. Chr. & Skotts.

Hierba epífita. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200 m.

## PSILOACEAE

### Psilotum

*Psilotum nudum* (L.) P. Beauv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Nota: La expedición Franco-Belga de 1934 (Tardieu-Blot 1936), reporta la presencia de esta especie para la Isla de Pascua. Sin embargo, esta especie nunca más ha sido encontrada.



## PTERIDACEAE

### **Adiantum**

#### ***Adiantum capillus-veneris* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

#### ***Adiantum chilense* Kaulf. var. *chilense***

Sinónimos: *Adiantum aethiopicum* L. var. *glabrum* Kuntze,

*Adiantum mochaenum* G. Kunkel

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Doradilla, helecho de palo negro, palito negro, culantrillo.

#### ***Adiantum chilense* Kaulf. var. *hirsutum* Hook. & Grev.**

Sinónimos: *Adiantum pubescens* C. Presl, *Adiantum*

*glanduliferum* Link, *Adiantum pilosum* Fée, *Adiantum*

*aethiopicum* L. var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) Kuntze,

*Adiantum poiretii* Wikstr. fma. *hirsutum* (Hook. & Grev.)

Hicken, *Adiantum weatherbyanum* Espinosa, *Adiantum*

*poiretii* Wikstr. var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) R.M. Tryon,

*Adiantum thalictroides* Willd. ex Schldl. var. *hirsutum*

(Hook. & Grev.) De la Sota

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,

NUB, BIO.

Rango altitudinal: 1700-3400 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

#### ***Adiantum chilense* Kaulf. var. *scabrum* (Kaulf.) Hicken**

Sinónimos: *Adiantum scabrum* Kaulf. var. *scabrum*,

*Adiantum aethiopicum* L. var. *scabrum* (Kaulf.) Kuntze,

*Adiantum philippianum* Espinosa, *Adiantum scabrum*

Kaulf. var. *philippianum* (Espinosa) Looser, *Adiantum*

*glanduliferum* auct. non Link

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### ***Adiantum excisum* Kunze**

Sinónimos: *Adiantum tenerum* auct. non Sw.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

#### ***Adiantum gertrudis* Espinosa**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

#### ***Adiantum pearcei* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-900 m.

#### ***Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *majus* Hook.**

Sinónimos: *Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *cuneifolium*

Meigen, *Adiantum sulfureum* auct. non Kaulf.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

#### ***Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *sulphureum***

Sinónimos: *Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *minus* Hook.,

*Adiantum subsulphureum* J. Remy, *Adiantum aethiopicum*

L. var. *sulphureum* (Kaulf.) Kuntze, *Adiantum sulphureum*

Kaulf. var. *subsulphureum* (J. Remy) Looser, *Adiantum*

*poiretii* Wikstr. var. *sulphureum* (Kaulf.) R.M. Tryon,

*Adiantum chilense* Kaulf. var. *sulphureum* (Hook.) Giúdice

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

### **Argyrochosma**

#### ***Argyrochosma chilensis* (J. Remy) Windham**

Sinónimos: *Pellaea chilensis* (J. Remy) C. Chr., *Notholaena*

*chilensis* (J. Remy) J.W. Sturm, *Cincinalis chilensis* J.

Remy, *Pellaea chilensis* Fée, nom. nud.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

#### ***Argyrochosma nivea* (Poir.) Windham**

Sinónimos: *Notholaena nivea* (Poir.) Desv., *Pellaea nivea*

(Poir.) Prantl, *Pteris nivea* Poir., *Acrostichum albidulum*

Sw., *Cincinalis nivea* (Poir.) Desv., *Gymnogramma nivea*

(Poir.) Mett., *Cincinalis tarapacana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 200-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chujchu, qusupe.

### **Astrolepis**

*Astrolepis sinuata* (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham  
Sinónimos: *Cheilanthes sinuata* (Lag. ex Sw.) Domin,  
*Notholaena sinuata* (Lag. ex Sw.) Kaulf., *Acrostichum*  
*sinuatum* Lag. ex Sw., *Gymnogramma sinuata* (Lag. ex  
Sw.) C. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### **Cheilanthes**

*Cheilanthes arequipensis* (Maxon) R.M. Tryon & A. F.  
Tryon

Sinónimos: *Notholaena arequipensis* Maxon

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2300-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

*Cheilanthes glauca* (Cav.) Mett.

Sinónimos: *Cheilanthes chilensis* Fée, *Allosorus hirsutus*  
C. Presl, *Acrostichum glaucum* Cav., *Pteris glauca* (Cav.)  
Cav., *Pteris microphylla* Colla, *Pellaea hirsuta* (C. Presl)  
Hook., *Pellaea glauca* (Cav.) J. Sm.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

*Cheilanthes hypoleuca* (Kunze) Mett.

Sinónimos: *Notholaena tomentosa* (Desv.) Desv., *Cincinnati*  
*tomentosa* Desv., *Notholaena hypoleuca* Kunze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,  
NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Doradilla.

*Cheilanthes mollis* (Kunze) C. Presl

Sinónimos: *Cheilanthes doradilla* (Colla) Domin,  
*Notholaena mollis* Kunze, *Notholaena doradilla* Colla

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO,  
LLA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Doradilla.

*Cheilanthes myriophylla* Desv.

Sinónimos: *Cheilanthes elegans* Desv., *Cheilanthes*  
*myriophylla* Desv. var. *elegans* (Desv.) Hicken, *Notholaena*  
*myriophylla* J. Sm.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 200-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

*Cheilanthes pilosa* Goldm.

Sinónimos: *Cheilanthes macleanii* Hook., *Cheilanthes*  
*andina* Hook.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 800-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

*Cheilanthes pruinata* Kaulf.

Sinónimos: *Cheilanthes mathewsii* Kunze, *Cheilanthes*  
*fasciculata* Goldm., *Cheilanthes micropteris* auct. non Sw.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2000-4800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chujchu, qusupe.

### **Cryptogramma**

*Cryptogramma fumariifolia* (Phil. ex Baker) H. Christ

Sinónimos: *Cryptogramma crispa* (L.) R. Br. var. *chilensis*  
(C. Chr.) Looser, *Allosorus crispus* Bernh. var. *chilensis*  
C. Chr., *Pellaea fumariaefolia* Phil. ex Baker, *Allosorus*  
*fumariaefolius* (Phil. ex Baker) Kuntze, *Pellaea fumariifolia*  
Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 900-1400 m.

Países limítrofes: Argentina.

### **Myriopteris**

*Myriopteris aurea* (Poir.) Grusz & Windham

Sinónimos: *Notholaena rufa* C. Presl, *Notholaena*  
*bonariensis* (Willd.) C. Chr., *Notholaena aurea* (Poir.)  
Desv., *Acrostichum bonariense* Willd., *Pteris aurea* Poir.,  
*Cheilanthes bonariensis* (Willd.) Proctor

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 600-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

### **Notholaena**

#### ***Notholaena sulphurea*** (Cav.) J. Sm.

Sinónimos: *Notholaena lepida* (Phil.) Looser, *Pteris sulphurea* Cav., *Chrysochosma sulphurea* (Cav.) Kümmerle, *Cheilanthes lepida* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### **Pellaea**

#### ***Pellaea myrtillofolia*** Mett. ex Kuhn

Sinónimos: *Allosorus andromedaefolius* auct. non (Kaulf.)

Kunze, *Pellaea andromedaefolia* auct. non (Kaulf.) Fée

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 100-2000 m.

Nombre vulgar: Coca, hierba coca, lendo del cerro.

#### ***Pellaea ternifolia*** (Cav.) Link

Sinónimos: *Allosorus ternifolius* Kunze ex Klotzsch, *Pteris ternifolia* Cav., *Cheilanthes ternifolia* (Cav.) T. Moore, *Pteris tryphylla* Bertero ex Colla, nom. nud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 200-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Qusupi, qusupe, yuquelahuén.

### **Pteris**

#### ***Pteris berteriana*** J. Agardh

Sinónimos: *Litobrochia berteriana* (J. Agardh) Fée, *Pteris comans* G. Forst. var. *berteriana*, *Pteris tenera* auct. non Kaulf., *Litobrochia decurrens* auct. non C. Presl, *Pteris comans* auct. non G. Forst., *Pteris incisa* auct. non Thunb.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

#### ***Pteris chilensis*** Desv.

Sinónimos: *Pteris tenera* Kaulf., *Pteris fernandeziana* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

#### ***Pteris semiadnata*** Phil.

Sinónimos: *Pteris marattiaefolia* Hook., *Pteris flexuosa* auct. non Kaulf.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 600-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

### **Trismeria**

#### ***Trismeria trifoliata*** (L.) Diels

Sinónimos: *Pityrogramma trifoliata* (L.) R.M. Tryon, *Acrostichum trifoliatum* L.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 0-2100 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### **Vittaria**

#### ***Vittaria ensiformis*** Sw.

Sinónimos: *Vittaria incurvata* Cav., *Vittaria elongata* auct., non Sw., *Vittaria costata* auct. non Kunze

Hierba saxícola. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

## **SALVINIACEAE**

### **Azolla**

#### ***Azolla filiculoides*** Lam.

Sinónimos: *Azolla magellanica* Willd., *Azolla squamosa* Molina, *Azolla arbuscula* Desv.

Hierba acuática. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 5-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Flor del pato, tembladerilla, luchecillo, jupajupa.

### **Salvinia**

#### ***Salvinia auriculata*** Aubl.

Hierba acuática. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL.

## **SCHIZAEACEAE**

### **Schizaea**

#### ***Schizaea fistulosa*** Labill.

Sinónimos: *Schizaea australis* Gaudich., *Schizaea palmata* Hombr. & Jacq., *Schizaea chilensis* Phil., *Schizaea fistulosa* Labill. var. *australis* (Gaudich.) Hook.f., *Microschizaea fistulosa* (Labill.) C.F. Reed, *Schizaea valdiviana* Phil. ex Hook. & Baker

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## THELYPTERIDACEAE

### Thelypteris

*Thelypteris argentina* (Hieron.) Abbiatti  
Sinónimos: *Aspidium argentinum* Hieron., *Dryopteris argentina* (Hieron.) C. Chr., *Lastrea argentina* (Hieron.) Copel., *Aspidium rivulorum* auct. non Link  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-3300 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Regalis.

*Thelypteris dentata* (Forssk.) E.P. St. John  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.

*Thelypteris interrupta* (Willd.) K. Iwats.  
Sinónimos: *Aspidium gongyloides* Schkuhr, *Dryopteris gongyloides* (Schkuhr) Kuntze, *Polypodium tottum* Thunb., *Pteris interrupta* Willd., *Thelypteris totta* (Thunb.) Schelpe  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: IPA.  
Rango altitudinal: 0-900 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## WOODSIACEAE

### Woodsia

*Woodsia montevidensis* (Sprengel) Hieron.  
Sinónimos: *Dicksonia montevidensis* Sprengel, *Woodsia crenata* (Kunze) Hieron.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## PINOPHYTA

### GNETOPSIDA

#### EPHEDRACEAE

##### Ephedra

*Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd.  
Sinónimos: *Ephedra breana* Phil., *Ephedra wraithiana* I.M. Johnst., *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *humboldtii* Stapf  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 500-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Pingo-pingo.

*Ephedra chilensis* C. Presl  
Sinónimos: *Ephedra rupestris* Benth., *Ephedra frustillata* Miers, *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *andina* (Poepp. ex C.A. Mey.) Stapf, *Ephedra andina* Poepp. ex C.A. Mey., *Ephedra andina* Poepp. ex C.A. Mey. fma. *abbreviata* Stapf ex Skottsb., *Ephedra araucana* Phil., *Ephedra bracteata* Miers, *Ephedra dumosa* Miers, *Ephedra monticola* Miers, *Ephedra nana* Dusén, *Ephedra patagonica* Phil. ex Stapf, *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *rupestris* (Benth.) Ball, *Ephedra humilis* Wedd., *Ephedra andina* Poepp. ex C.A. Mey. var. *humilis* Parlat.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 100-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Pingo-pingo, solupe, sulupe, transmontana.

*Ephedra gracilis* Phil. ex Stapf  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 10-1200 m.

*Ephedra multiflora* Phil. ex Stapf  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 2300-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Pingo-pingo.

*Ephedra ochreatea* Miers  
Sinónimos: *Ephedra ochreatea* Miers var. *striata* Gillies ex Miers  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 389-389 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Ephedra trifurcata* Zoellner  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 200-300 m.

## PINOPSIDA

### ARAUCARIACEAE

#### Araucaria

*Araucaria araucana* (Molina) K. Koch  
Sinónimos: *Araucaria imbricata* Pav., *Columbea quadrifaria* Salisb., *Pinus araucana* Molina, *Dombeya chilensis* Lam., *Araucaria chilensis* Mirb., *Araucaria dombeyi* Rich.  
Árbol. Nativo.  
Distribución: BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 600-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Araucaria, piñonero, pehuén.

### CUPRESSACEAE

#### Austrocedrus

*Austrocedrus chilensis* (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri  
Sinónimos: *Austrocedrus chilensis* (D. Don) Florin & Boutelje, comb. illeg., *Libocedrus chilensis* (D. Don) Endl., *Thuja andina* Poepp., *Thuja chilensis* D. Don  
Árbol. Nativo.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 250-1800 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Ciprés de la cordillera, ciprés, len.

#### Fitzroya

*Fitzroya cupressoides* (Molina) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Fitzroya patagonica* Hook.f. ex Lindl., *Libocedrus cupressoides* (Molina) Kuntze, *Pinus cupressoides* Molina  
Árbol. Nativo.  
Distribución: LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 100-1400 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Alerce, lahuén, lahual.

#### Pilgerodendron

*Pilgerodendron uviferum* (D. Don) Florin  
Sinónimos: *Juniperus uvifera* D. Don, *Libocedrus tetragona* (Hook.) Endl., *Thuja tetragona* Hook., *Libocedrus uvifera* (D. Don) Pilg.  
Árbol. Nativo.  
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Ciprés de las Guaitecas.

### PINACEAE

#### Pinus

*Pinus contorta* Douglas ex Loudon  
Árbol. Introducido.  
Distribución: ARA, AIS.

*Pinus pinaster* Aiton  
Árbol. Introducido.  
Distribución: NUB, BIO.  
Nombre vulgar: Pino marítimo.

*Pinus radiata* D. Don  
Árbol. Introducido.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.  
Nombre vulgar: Pino insigne.

### PODOCARPACEAE

#### Lepidothamnus

*Lepidothamnus fonkii* Phil.  
Sinónimos: *Dacrydium foncki* (Phil.) Ball  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 3-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Ciprés enano.

#### Podocarpus

*Podocarpus nubigena* Lindl.  
Árbol. Nativo.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 10-600 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Mañío, mañío de hojas punzantes, pino amarillo.



***Podocarpus saligna* D. Don**

Sinónimos: *Podocarpus chilinus* Rich.

Árbol. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 10-900 m.

Nombre vulgar: Mañío de hojas largas, mañío.

**Prumnopitys**

***Prumnopitys andina* (Poepp. ex Endl.) de Laub.**

Sinónimos: *Prumnopitys spicata* (Poepp. ex Endl.) Molloy & Muñoz-Schick, comb. illeg., *Podocarpus andina* Poepp. ex Endl., *Prumnopitys elegans* Phil., *Podocarpus spicatus* Poepp., *Podocarpus valdiviana* J. Nelson, *Stachycarpus andina* (Poepp. ex Endl.) Tiegh., *Nageia andina* (Poepp. ex Endl.) F. Muell.

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lleuque, uva de la cordillera.

**Saxegothaea**

***Saxegothaea conspicua* Lindl.**

Sinónimos: *Squamataxus albertiana* J. Nelson

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Mañío hembra, mañío.

**MAGNOLIOPHYTA**

**LILIOPSIDA**

**ALISMATACEAE**

**Alisma**

***Alisma lanceolatum* With.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

***Alisma plantago-aquatica* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

**Sagittaria**

***Sagittaria montevidensis* Cham. & Schlttdl. subsp. *chilensis* (Cham. & Schlttdl.) Bogin**

Sinónimos: *Sagittaria chilensis* Cham. & Schlttdl., *Sagittaria andina* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Lengua de vaca.

***Sagittaria montevidensis* Cham. & Schlttdl. subsp. *montevidensis***

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LRI.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Sagittaria rhombifolia* Cham.**

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**ALSTROEMERIACEAE**

**Alstroemeria**

***Alstroemeria achirae* Muñoz-Schick & Brinck**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 1500-1900 m.

***Alstroemeria andina* Phil. var. *andina***

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2900-3700 m.

***Alstroemeria andina* Phil. var. *venustula* (Phil.) Muñoz-Schick**

Sinónimos: *Alstroemeria venustula* Phil., *Alstroemeria andina* Phil. subsp. *venustula* (Phil.) Ehr. Bayer

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2300-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *angustifolia***

Sinónimos: *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *conferta* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *intermedia* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *solliana* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *acuminata* Herb.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

*Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *velutina* (Ehr. Bayer) Muñoz-Schick  
Sinónimos: *Alstroemeria angustifolia* Herb. subsp. *velutina* Ehr. Bayer  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 500-2000 m.

*Alstroemeria aurea* Graham  
Sinónimos: *Alstroemeria aurantiaca* D. Don, *Alstroemeria mutabilis* Kunze, *Alstroemeria chiloensis* Phil., *Alstroemeria araucana* Phil., *Alstroemeria ligtu* auct. non L., *Alstroemeria stenopetala* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 200-1900 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Liuto amarillo.  
Nota: Introducida en Magallanes según E. Domínguez.

*Alstroemeria citrina* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.

*Alstroemeria crispata* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 1100-3000 m.

*Alstroemeria cummingiana* Herb.  
Sinónimos: *Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *cummingiana* (Herb.) Ehr. Bayer  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

*Alstroemeria diluta* Ehr. Bayer subsp. *chrysantha* Ehr. Bayer  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-400 m.

*Alstroemeria diluta* Ehr. Bayer subsp. *diluta*  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 300 m.

*Alstroemeria exerens* Meyen  
Sinónimos: *Alstroemeria diazii* Phil., *Alstroemeria pallens* Phil., *Alstroemeria exserens* Meyen  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1500-2100 m.

*Alstroemeria garaventae* Ehr. Bayer  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1200-2000 m.

*Alstroemeria graminea* Phil.  
Sinónimos: *Taltalia graminea* (Phil.) Ehr. Bayer  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

*Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *hookeri*  
Sinónimos: *Alstroemeria rosea* Hook., *Alstroemeria hookeriana* Schult.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

*Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *maculata* Ehr. Bayer  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

*Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *recumbens* (Herb.) Ehr. Bayer  
Sinónimos: *Alstroemeria recumbens* Herb.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

*Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *sansebastianae* C.M. Baeza & E. Ruiz  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

*Alstroemeria kingii* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

*Alstroemeria leporina* Ehr. Bayer & Grau  
Sinónimos: *Alstroemeria hirtella* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 900-2000 m.

*Alstroemeria ligtu* L. subsp. *ligtu*  
Sinónimos: *Alstroemeria flava* Phil., *Alstroemeria lothiana* Utnet, *Alstroemeria chilensis* Lem., *Alstroemeria haemantha* Ruiz & Pav.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-800 m.  
Nombre vulgar: Liuto.

*Alstroemeria ligtu* L. subsp. *simsii* (Spreng.) Ehr. Bayer  
Sinónimos: *Alstroemeria haemantha* auct. non Ruiz & Pav.,  
*Alstroemeria simsii* Spreng., *Alstroemeria ciliata* Poepp.,  
*Alstroemeria pulchella* auct. non L.f., *Alstroemeria pulchella*  
L. f. var. *pilosa* Lindl., *Alstroemeria haemantha* Ruiz &  
Pav. var. *pilosa* (Lindl.) Herb., *Alstroemeria haemantha*  
Ruiz & Pav. var. *simsiana* Herb., *Alstroemeria quillotensis*  
Herb., *Alstroemeria macraeana* Herb., *Alstroemeria aurea*  
Graham var. *valparadisiaca* Herb., *Alstroemeria aurea*  
Meyen, hom. illeg., *Alstroemeria dentata* Klotzsch  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.

*Alstroemeria ligtu* L. subsp. *splendens* Muñoz-Schick  
Sinónimos: *Alstroemeria ligtu* L. subsp. *incarnata* Ehr.  
Bayer, nom. illeg.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1100-1400 m.

*Alstroemeria lutea* Muñoz-Schick  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR.

*Alstroemeria magnifica* Herb. var. *magenta* (Ehr. Bayer)  
Muñoz-Schick  
Sinónimos: *Alstroemeria magenta* Ehr. Bayer  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

*Alstroemeria magnifica* Herb. var. *magnifica*  
Sinónimos: *Alstroemeria gayana* Phil., *Alstroemeria*  
*magnifica* Herb. subsp. *gayana* (Phil.) Ehr. Bayer  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Nombre vulgar: Lirio morado.

*Alstroemeria magnifica* Herb. var. *sierrae* (Muñoz)  
Muñoz-Schick  
Sinónimos: *Alstroemeria sierrae* Muñoz  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.

*Alstroemeria magnifica* Herb. var. *tofoensis* Muñoz-Schick  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 600-700 m.

*Alstroemeria marticorenae* Negritto & C.M. Baeza  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.

*Alstroemeria mollensis* Muñoz-Schick & Brinck  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 2000-2200 m.

*Alstroemeria pallida* Graham  
Sinónimos: *Alstroemeria albiflora* C. Presl, *Alstroemeria*  
*rosea* Phil., *Alstroemeria ligtu* L. var. *andina* Phil.,  
*Alstroemeria nivalis* Phil., hom. illeg., *Alstroemeria*  
*nubigena* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1100-2800 m.

*Alstroemeria parvula* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2200-2600 m.

*Alstroemeria patagonica* Phil.  
Sinónimos: *Alstroemeria nana* Rendle, *Alstroemeria*  
*patagonica* Phil. fma. *biflora* Ravenna, *Alstroemeria*  
*pygmaea* auct. non Herb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Alstroemeria pelegrina* L.  
Sinónimos: *Alstroemeria amoena* Salisb., *Alstroemeria*  
*pelegrina* L. var. *albescens* Herb., *Alstroemeria gayana*  
Phil. var. *humilis* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

*Alstroemeria philippii* Baker var. *albicans* Muñoz-Schick  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 300-400 m.

*Alstroemeria philippii* Baker var. *philippii*  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.

*Alstroemeria piperata* A.R. Flores & J.M. Watson  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 1200-1500 m.

*Alstroemeria polyphylla* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 800-900 m.

*Alstroemeria presliana* Herb. subsp. *australis* Ehr. Bayer  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 200-1500 m.

*Alstroemeria presliana* Herb. subsp. *presliana*  
Sinónimos: *Alstroemeria chillanensis* Grau & Ehr.  
Bayer, *Alstroemeria diazii* auct. non Phil., *Alstroemeria epulauquensis* Ravenna  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1300-2300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Alstroemeria pseudospathulata* Ehr. Bayer  
Sinónimos: *Alstroemeria crocea* Phil., *Alstroemeria lacrima-solis* Ravenna, *Alstroemeria spathulata* auct. non C. Presl, *Alstroemeria oxyphylla* Ravenna, nom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 500-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Alstroemeria pulchra* Sims subsp. *lavandulacea* Ehr. Bayer  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 200-300 m.

*Alstroemeria pulchra* Sims subsp. *pulchra* var. *maxima* Phil.  
Sinónimos: *Alstroemeria magnifica* Herb. subsp. *maxima* (Phil.) Ehr. Bayer, *Alstroemeria spectabilis* Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-400 m.

*Alstroemeria pulchra* Sims subsp. *pulchra* var. *pulchra*  
Sinónimos: *Alstroemeria ligtu* L. var. *pulchra* (Sims) Baker, *Alstroemeria tricolor* Hook., *Alstroemeria flos-martinii* Ker Gawl., *Alstroemeria bicolor* Hook.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Nombre vulgar: Flor del águila, flor del traro.

*Alstroemeria revoluta* Ruiz & Pav.  
Sinónimos: *Alstroemeria herbertiana* Roem., *Alstroemeria reflexa* Roem., *Alstroemeria inconspicua* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.

*Alstroemeria schizanthoides* Grau var. *alba* Muñoz-Schick  
Sinónimos: *Alstroemeria modesta* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.

*Alstroemeria schizanthoides* Grau var. *schizanthoides*  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 800-1900 m.

*Alstroemeria spathulata* C. Presl  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 2000-3500 m.

*Alstroemeria traudliae* J.M. Watson & A.R. Flores  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 300-350 m.

*Alstroemeria umbellata* Meyen  
Sinónimos: *Alstroemeria sericantha* Schauer  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO.  
Rango altitudinal: 2000-3000 m.

*Alstroemeria versicolor* Ruiz & Pav.  
Sinónimos: *Alstroemeria meyeniana* Schauer, *Alstroemeria tigrina* Phil., *Alstroemeria sotoana* Phil., *Alstroemeria xanthina* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 200-2000 m.

*Alstroemeria violacea* Phil.  
Sinónimos: *Alstroemeria paupercula* Phil., *Alstroemeria violacea* Knight & Perry, nom. nud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-800 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Lirio del campo.

*Alstroemeria werdermannii* Ehr. Bayer var. *flavicans* Muñoz-Schick  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

*Alstroemeria werdermannii* Ehr. Bayer var. *werdermannii*  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

*Alstroemeria zoellneri* Ehr. Bayer  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1100-1800 m.

## Bomarea

***Bomarea dulcis*** (Hook.) Beauverd  
Sinónimos: *Bomarea engleriana* auct. non Kraenzl.,  
*Alstroemeria dulcis* Hook.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 2500-5200 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Bomarea involucrosa*** (Herb.) Baker  
Sinónimos: *Collania involucrosa* Herb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 3500-3700 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Bomarea salsilla*** (L.) Herb.  
Sinónimos: *Alstroemeria salsilla* L., *Alstroemeria oculata*  
Lodd., *Bomarea oculata* (Lodd.) M. Roem.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-300 m.  
Países limítrofes: Bolivia.  
Nombre vulgar: Salsilla, zalcilla.

## Leontochir

***Leontochir ovallei*** Phil. var. *luteus* Muñoz-Schick  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA.

***Leontochir ovallei*** Phil. var. *ovallei*  
Sinónimos: *Bomarea ovallei* (Phil.) Ravenna, *Alstroemeria*  
*ovallei* (Phil.) Hunz.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-100 m.  
Nombre vulgar: Garra de león.

## AMARYLLIDACEAE

### Allium

***Allium vineale*** L. var. *compactum* (Thuill.) Coss. & Germ.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ARA.

***Allium vineale*** L. var. *vineale*  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ARA.

## Amaryllis

***Amaryllis belladona*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, MAU, JFE.

## Clinanthus

***Clinanthus humilis*** (Herb.) Meerow  
Sinónimos: *Stenomesson humile* (Herb.) Baker, *Clitanthes*  
*humilis* Herb., *Stenomesson chilense* Ravenna  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 3000-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

## Famatina

***Famatina andina*** (Phil.) Ravenna  
Sinónimos: *Rhodophiala andina* Phil., *Hippeastrum*  
*andinum* (Phil.) Phil., *Bathya andina* (Phil.) Ravenna  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Países limítrofes: Argentina.

***Famatina cisandina*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, MAU.  
Rango altitudinal: 1800-2200 m.

***Famatina maulensis*** Ravenna  
Sinónimos: *Miltinea maulensis* (Ravenna) Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 1500 m.

## Gethyum

***Gethyum atropurpureum*** Phil.  
Sinónimos: *Solaria atropurpurea* (Phil.) Ravenna, *Solaria*  
*major* Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

***Gethyum cuspidatum*** (Harv. ex Baker) Muñoz-Schick  
Sinónimos: *Solaria cuspidata* (Harv. ex Baker) Ravenna,  
*Ancrumia cuspidata* Harv. ex Baker  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 100-200 m.



## Gilliesia

**Gilliesia dimera** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.

**Gilliesia graminea** Lindl.  
Sinónimos: *Gilliesia curicana* Ravenna, *Gilliesia gaudichaudiana* Kunth  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Gilliesia isopetala** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO.  
Rango altitudinal: 1000-1700 m.

**Gilliesia montana** Poepp. & Endl.  
Sinónimos: *Gilliesia monophylla* Reiche, *Miersia scalae* Gunckel, *Gilliesia nahuelbutae* Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

## Ipheion

**Ipheion sessile** (Phil.) Traub  
Sinónimos: *Brodiaea sessiliflora* (Baker) Baker, *Brodiaea sessilis* (Phil.) F. Meigen, *Milla sessiliflora* Baker, *Triteleia sessilis* Phil., *Tristagma sessile* (Phil.) Traub, *Tristagma leichtlinii* (Baker) Ravenna, *Milla leichtlinii* Baker, *Brodiaea leichtlinii* (Baker) Baker, *Tristagma leichtlinii* (Baker) Traub, *Triteleia leichtlinii* (Baker) G. Nicholson  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAU.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## Latace

**Latace andina** (Poepp.) Sassone fma. **andina**  
Sinónimos: *Zoellnerallium andinum* (Poepp.) Crosa, *Nothoscordum andinum* (Poepp.) Fuentes, *Nothoscordum bivalve* auct. non (L.) Britton, *Nothoscordum brevispathum* Phil., *Nothoscordum sellowianum* Kunth var. *brevispathum* (Phil.) Fuentes, *Nothoscordum strictum* Gay, *Ornithogalum andinum* Poepp., *Nothoscordum poeppigii* Fuentes, *Latace volkmanni* Phil., *Leucocoryne volkmanni* (Phil.) Engl.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, LLA.  
Rango altitudinal: 1500-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Latace andina** (Poepp.) Sassone fma. **lutea** (Ravenna) Sassone  
Sinónimos: *Nothoscordum andinum* (Poepp.) Fuentes fma. *luteum* Ravenna  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1500-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Latace serenense** (Ravenna) Sassone  
Sinónimos: *Nothoscordum serenense* Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 300-500 m.

## Leucocoryne

**Leucocoryne alliacea** Miers ex Lindl.  
Sinónimos: *Leucocoryne angustipetala* Gay, *Leucocoryne reflexa* Grau  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 900-2200 m.

**Leucocoryne angosturiae** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.

**Leucocoryne appendiculata** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 400-800 m.

**Leucocoryne arrayanensis** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 1700-2500 m.

**Leucocoryne candida** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO.  
Rango altitudinal: 700-800 m.

**Leucocoryne codehuensis** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO.

**Leucocoryne conconensis** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Leucocoryne conferta*** Zoellner  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, LBO.  
Rango altitudinal: 200-1200 m.

***Leucocoryne connivens*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.

***Leucocoryne conostyla*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.

***Leucocoryne coquimbensis*** F. Phil. var. *alba* Zoellner  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.

***Leucocoryne coquimbensis*** F. Phil. var. *coquimbensis*  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.

***Leucocoryne coronata*** Ravenna  
Sinónimos: *Leucocoryne narcissoides* Phil., *Pabellonia*  
*incrassata* (Phil.) Quezada & Martic., *Stemmatium*  
*narcissoides* Phil., *Leucocoryne incrassata* Phil.,  
*Chrysocoryne incrassata* (Phil.) Zoellner  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.

***Leucocoryne curacavina*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.

***Leucocoryne dimorphopetala*** (Gay) Ravenna  
Sinónimos: *Tristagma dimorphopetala* Gay, *Leucocoryne*  
*gayii* Baker  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.

***Leucocoryne editiana*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 2200 m.

***Leucocoryne foetida*** Phil.  
Sinónimos: *Leucocoryne odorata* Lindl.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, MAU.

***Leucocoryne fragrantissima*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 1500 m.

***Leucocoryne fuscostriata*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.

***Leucocoryne gilliesioides*** (Phil.) Ravenna  
Sinónimos: *Erinna gilliesioides* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 1400-1600 m.

***Leucocoryne inclinata*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 800-1000 m.

***Leucocoryne ixioides*** (Hook.) Lindl.  
Sinónimos: *Leucocoryne pauciflora* Phil., *Brodiaea ixioides*  
Hook.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA.  
Rango altitudinal: 800-1100 m.

***Leucocoryne leucogyna*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.

***Leucocoryne lilacea*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.

***Leucocoryne lurida*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.

***Leucocoryne macropetala*** Phil.  
Sinónimos: *Pabellonia oxypetala* (Phil.) Quezada &  
Martic., *Leucocoryne oxypetala* Phil., *Chrysocoryne*  
*oxypetala* (Phil.) Zoellner  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 800 m.

***Leucocoryne maulensis*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.

***Leucocoryne modesta*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 1300 m.

***Leucocoryne mollensis*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Leucocoryne montana*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.

***Leucocoryne pachystyla*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.

***Leucocoryne porphyrea*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 800-1500 m.

***Leucocoryne praealta*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 1000-1200 m.

***Leucocoryne purpurea*** Gay  
Sinónimos: *Leucocoryne ixioides* (Hook.) Lindl. var.  
*purpurea* (Gay) Baker  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.

***Leucocoryne quilimarina*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Leucocoryne rungensis*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 900-1100 m.

***Leucocoryne simulans*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 1800-2000 m.

***Leucocoryne subulata*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2000 m.

***Leucocoryne taguataguensis*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO.

***Leucocoryne talinensis*** L. Mansur & M. Cisternas  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 200-300 m.

***Leucocoryne tricornis*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2000 m.

***Leucocoryne unguifera*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO.

***Leucocoryne valparadisea*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.

***Leucocoryne violascens*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.

***Leucocoryne vittata*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.

#### **Leucojum**

***Leucojum vernal*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: JFE.

#### **Miersia**

***Miersia chilensis*** Lindl.  
Sinónimos: *Miersia major* Kunth, *Miersia rusbyi* Britton,  
*Miersia chilensis* Lindl. var. *bicolor* Muñoz-Schick  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Miersia cornuta*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 700-900 m.

***Miersia leporina*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 800 m.

***Miersia minor*** Kunth  
Sinónimos: *Miersia myodes* Bertero  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 220-600 m.

***Miersia tenuiseta*** Ravenna

Sinónimos: *Miersia tenuiseta* Ravenna fma. *castanea* Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

**Myostemma**

***Myostemma advena*** (Ker Gawl.) Ravenna

Sinónimos: *Amaryllis advena* Ker Gawl., *Hippeastrum hesperidius* Herb. var. *pallidum* Herb., *Hippeastrum pallidum* (Herb.) Pax, *Hippeastrum advenum* (Ker Gawl.) Herb., *Habranthus pallidus* Lodd., *Habenaria miniatus* D. Don ex Sweet, *Habranthus hesperius* Herb., *Amaryllis valparadisiaca* Steud., *Chlidanthus cumingii* C. Presl, *Rhodophiala advena* (Ker Gawl.) Traub  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, NUB.  
Rango altitudinal: 1400 m.  
Nombre vulgar: Añañuca.

***Myostemma ananuca*** (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores  
Sinónimos: *Hippeastrum ananuca* Phil., *Amaryllis ananuca* (Phil.) Traub & Moldenke, *Rhodophiala ananuca* (Phil.) Traub  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Añañuca.

***Myostemma araucana*** (Phil.) Ravenna  
Sinónimos: *Amaryllis araucana* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum araucanum* Phil., *Rhodophiala araucana* (Phil.) Traub  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 900-1500 m.  
Nombre vulgar: Añañuca.

***Myostemma bagnoldii*** (Herb.) J.M. Watson & A.R. Flores  
Sinónimos: *Habranthus bagnoldii* Herb., *Hippeastrum bagnoldii* (Herb.) Baker, *Hippeastrum bagnoldii* (Herb.) Baker var. *minor* Speg., *Amaryllis bagnoldii* (Herb.) D. Dietr., *Rhodophiala bagnoldii* (Herb.) Traub  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Nombre vulgar: Añañuca.

***Myostemma berteroaana*** (Phil.) Ravenna  
Sinónimos: *Hippeastrum berteroaanum* (Phil.) Baker, *Amaryllis berteroaana* (Phil.) Traub & Moldenke, *Habranthus berteroaanus* Phil., *Rhodophiala berteroaana* (Phil.) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO.  
Nombre vulgar: Añañuca.

***Myostemma maculata*** (L'Hér.) Ravenna  
Sinónimos: *Amaryllis maculata* L'Hér., *Rhodophiala maculata* (L'Hér.) Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ARA.  
Rango altitudinal: 0-300 m.  
Nombre vulgar: Añañuca.

***Myostemma monantha*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU.

***Myostemma montana*** (Phil.) Ravenna  
Sinónimos: *Hippeastrum montanum* (Phil.) Baker, *Amaryllis montana* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus montanus* Phil., *Rhodophiala montana* (Phil.) Traub  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, ARA.  
Nombre vulgar: Añañuca.

***Myostemma phycelloides*** (Herb.) Ravenna  
Sinónimos: *Amaryllis phycelloides* (Herb.) Steud., *Habranthus phycelloides* Herb., *Hippeastrum phycelloides* (Herb.) Baker, *Phycella phycelloides* (Herb.) Traub, *Rhodophiala phycelloides* (Herb.) Hunz.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, RME, MAU.  
Rango altitudinal: 0-2200 m.  
Nombre vulgar: Añañuca.

***Myostemma tiltiensis*** (Traub & Moldenke) Ravenna  
Sinónimos: *Hippeastrum laetum* Phil., *Amaryllis tiltiensis* Traub & Moldenke, *Amaryllis laeta* (Phil.) Traub & Uphof, *Rhodophiala tiltiensis* (Traub & Moldenke) Traub  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME.  
Nombre vulgar: Añañuca.

**Nothoscordum**

***Nothoscordum flavescens*** Kunth  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.

***Nothoscordum gracile*** (Dryand. ex Aiton) Stearn  
Sinónimos: *Allium gracile* Aiton, *Maligia gracilis* (Aiton) Raf.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO, LLA.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Nothoscordum gramineum*** (Sims) Beauverd  
Sinónimos: *Nothoscordum striatellum* (Lindl.) Kunth,  
*Ornithogalum gramineum* Sims, *Allium striatellum* Lindl.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Nothoscordum mahui*** Traub  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 300-400 m.

***Nothoscordum nidulans*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.

***Nothoscordum nublense*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

### **Phycella**

***Phycella angustifolia*** Phil.  
Sinónimos: *Hippeastrum angustifolium* (Phil.) Phil., comb.  
illeg., *Amaryllis philippiana* Traub & Uphof  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME.

***Phycella australis*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Amancay.

***Phycella cyrtanthoides*** (Sims) Lindl.  
Sinónimos: *Hippeastrum igneum* (Lindl.) Muñoz, *Phycella*  
*magnifica* Herb., *Amaryllis ignea* Lindl., *Amaryllis*  
*cyrtanthoides* Sims, *Amaryllis demissa* Steud.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA.  
Rango altitudinal: 1000-1500 m.

***Phycella gayana*** (Kuntze) Traub  
Sinónimos: *Hippeastrum gayanum* Kuntze, *Amaryllis*  
*gayana* (Kuntze) Traub & Uphof  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.

***Phycella scarlatina*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 2000 m.

### **Placea**

***Placea amoena*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 800-2000 m.

***Placea arzae*** Phil.  
Sinónimos: *Placea germainii* Phil. subsp. *arzae* (Phil.)  
Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 300-2000 m.  
Nombre vulgar: Macaya.

***Placea davidii*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.

***Placea lutea*** Phil.  
Sinónimos: *Placea germainii* Phil. subsp. *lutea* (Phil.)  
Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.

***Placea ornata*** Miers ex Lindl.  
Sinónimos: *Placea germainii* Phil., *Placea grandiflora*  
Lem.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 900-1700 m.  
Nombre vulgar: Lagañosa.

### **Pyrolirion**

***Pyrolirion tubiflorum*** (L'Hér.) M. Roem.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: TAR.

### **Rhodolirium**

***Rhodolirium andicola*** (Poepp.) Ravenna  
Sinónimos: *Amaryllis andicola* Poepp., *Amaryllis purpurata*  
(Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus andicola* (Poepp.)  
Herb., *Hippeastrum andicola* (Poepp.) Baker, *Hippeastrum*  
*purpuratum* Phil., *Rhodophiala purpurata* (Phil.) Traub,  
*Zephyranthes andicola* (Poepp.) Baker, *Rhodophiala*  
*andicola* (Poepp.) Traub  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 1200-1800 m.  
Países limítrofes: Argentina.



***Rhodolirium chilense*** (L'Hér.) Ravenna

Sinónimos: *Amaryllis chilensis* L'Hér., *Hippeastrum chilense* (L'Hér.) Baker, *Habranthus chilensis* (L'Hér.) Herb., *Rhodophiala chilensis* (L'Hér.) Traub, *Rhodolirium speciosum* (Herb.) Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Rhodolirium fulgens*** (Hook. f.) Ravenna

Sinónimos: *Hippeastrum fulgens* (Hook. f.) Phil., *Amaryllis fulgens* (Hook. f.) Traub & Uphof, *Habranthus fulgens* Hook. f., *Rhodophiala fulgens* (Hook. f.) Traub  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LLA.

***Rhodolirium laetum*** (Phil.) Ravenna

Sinónimos: *Rhodophiala laeta* Phil., *Rhodophiala uniflora* Phil., *Hippeastrum uniflorum* (Phil.) Baker, *Amaryllis uniflora* (Phil.) Traub & Uphof  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 1000 m.

***Rhodolirium montanum*** Phil.

Sinónimos: *Amaryllis rhodolirion* (Baker) Traub & Uphof, *Hippeastrum rhodolirion* (Phil.) Baker, *Rhodolirium andinum* Phil., *Rhodophiala rhodolirion* (Baker) Traub, *Amaryllis popetana* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum popetanum* Phil., *Rhodophiala popetana* (Phil.) Traub  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 2000-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Rhodophiala**

***Rhodophiala bakeri*** (Phil.) Traub

Sinónimos: *Amaryllis bakeri* (Phil.) Traub & Moldenke, *Habranthus bakeri* Phil., *Hippeastrum bakeri* (Phil.) Traub & Uphof, *Amaryllis bakeri* (Phil.) Traub & Uphof  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, ARA.

***Rhodophiala flava*** (Phil.) Traub

Sinónimos: *Hippeastrum solisii* Phil., *Amaryllis solisii* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus flavus* Phil., *Amaryllis flava* (Phil.) Traub & Uphof  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB.

***Rhodophiala lineata*** (Phil.) Traub

Sinónimos: *Hippeastrum lineatum* (Phil.) Baker, *Amaryllis lineata* (Phil.) Traub & Uphof, hom. illeg., *Habranthus*

*lineatus* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.

***Rhodophiala moelleri*** (Phil.) Traub

Sinónimos: *Hippeastrum moelleri* Phil., *Amaryllis moelleri* (Phil.) Traub & Moldenke, *Myostemma cautinensis* Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ARA.  
Rango altitudinal: 900-1000 m.

***Rhodophiala pratensis*** (Poepp.) Traub

Sinónimos: *Amaryllis pratensis* Poepp., *Hippeastrum pratense* (Poepp.) Baker, *Rhodophiala speciosa* (Herb.) Baker, *Amaryllis atacamensis* Traub & Uphof, *Habranthus speciosus* Herb., *Habranthus pratensis* (Poepp.) Herb., *Rhodophiala volckmannii* Phil., *Placea pratensis* F. Phil., nom. nud., *Rhodolirium speciosum* (Herb.) Ravenna, *Myostemma pratensis* (Poepp.) Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, MAU, NUB, BIO, LLA.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Rhodophiala rosea*** (Sweet) Traub

Sinónimos: *Hippeastrum roseum* (Sweet) Baker, *Amaryllis barlowii* Traub & Moldenke, *Habranthus roseus* Sweet, *Amaryllis rosea* (Sweet) Traub & Uphof, *Zephyranthes purpurea* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

***Rhodophiala splendens*** (Renjifo) Traub

Sinónimos: *Hippeastrum splendens* (Renjifo) Renjifo ex Phil., *Amaryllis splendens* (Renjifo) Traub & Moldenke, *Habranthus splendens* Renjifo  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.

**Solaria**

***Solaria miersioides*** Phil.

Sinónimos: *Solaria brevicolita* Ravenna  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, RME, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 900-2300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Speea**

***Speea humilis*** (Phil.) Loes. ex E.H.L. Krause

Sinónimos: *Speea triloba* Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO.

## Traubia

### ***Traubia modesta*** (Phil.) Ravenna

Sinónimos: *Hippeastrum modestum* (Phil.) Baker, *Lapiedra chilensis* F. Phil., *Amaryllis modesta* (Phil.) Traub & Uphof, *Traubia chilensis* (F. Phil.) Moldenke, *Rhodophiala modesta* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 0-100 m.

## Tristagma

### ***Tristagma ameghinoi*** (Speg.) Speg.

Sinónimos: *Brodiaea ameghinoi* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Tristagma berteroi*** (Kunth) S. Arroyo & Sassone

Sinónimos: *Brodiaea berteroi* (Kunth) Fuentes

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

### ***Tristagma bivalve*** (Hook. ex Lindl.) Traub

Sinónimos: *Triteleia bivalvis* Hook. ex Lindley, *Milla bivalvis* (Lindl.) Baker, *Hookera bivalvis* (Hook. ex Lindl.) Kuntze, *Brodiaea bivalvis* (Hook. ex Lindl.) Meigen, *Ipheion bivalve* (Hook. ex Lindl.) Traub, *Tristagma brevipes* (Kuntze) Traub, *Triteleia brevipes* Kuntze, *Milla brevipes* (Kuntze) Baker, *Brodiaea brevipes* (Kuntze) Baker, *Hookera brevipes* (Kuntze) Kuntze, *Ipheion brevipes* (Kuntze) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

### ***Tristagma circinatum*** (Sandw.) Traub

Sinónimos: *Brodiaea circinata* Sandwith

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Tristagma gracile*** (Phil.) Traub

Sinónimos: *Triteleia gracilis* Phil., *Brodiaea philippiana* Baker, *Ipheion gracile* (Phil.) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA.

### ***Tristagma graminifolium*** (Phil.) Ravenna

Sinónimos: *Garaventia graminifolia* (Phil.) Looser, *Nothoscordum graminifolium* (Phil.) Traub, *Steinmannia*

*graminifolia* F. Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 600-700 m.

### ***Tristagma nivale*** Poepp. fma. ***australe*** (Neger ex Dusén)

Ravenna

Sinónimos: *Tristagma australe* Neger ex Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Tristagma nivale*** Poepp. fma. ***nivale***

Sinónimos: *Milla nivalis* (Poepp.) Baker, *Tristagma philippii* Gandoger, *Tristagma fragrans* Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 300-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Tristagma patagonicum*** (Baker) Traub

Sinónimos: *Brodiaea patagonica* (Baker) Baker, *Milla patagonica* Baker

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Tristagma poeppigianum*** (Gay) Traub

Sinónimos: *Triteleia poeppigiana* Gay

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2400 m.

### ***Tristagma porrifolium*** (Poepp.) Traub

Sinónimos: *Triteleia porrifolia* Poeppig, *Milla porrifolia* (Poepp.) Baker, *Brodiaea porrifolia* (Poepp.) Meigen, *Hookera porrifolia* (Poepp.) Kuntze, *Ipheion porrifolium* (Poepp.) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

### ***Tristagma violaceum*** (Kunth) Traub

Sinónimos: *Triteleia violacea* Kunth, *Brodiaea violacea* (Kunth) Baker, *Ipheion violaceum* (Kunth) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB.

## APONOGETONACEAE

### Aponogeton

*Aponogeton distachyos* L.f.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: LLA.

## ARACEAE

### Colocasia

*Colocasia esculenta* (L.) Schott  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.  
Nombre vulgar: Taro (Rapa Nui).

### Landoltia

*Landoltia punctata* (G. Mey.) Les & D.J. Crawford  
Hierba acuática. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAG.

### Lemna

*Lemna gibba* L.  
Sinónimos: *Lemna parodiana* Giardelli  
Hierba acuática. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, LLA.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

*Lemna minuta* Kunth  
Sinónimos: *Lemna minima* Kunth, nom. nud., *Lemna minima* Phil. ex Hegelm., hom. illeg., *Lemna minuscula* Herter, nom. illeg., *Lemna valdiviana* Phil. var. *abbreviata* Hegelm., *Lemna valdiviana* Phil. var. *minima* Hegelm.  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Lenteja de agua.

*Lemna valdiviana* Phil.  
Sinónimos: *Lemna valdiviana* Phil. var. *platyclados* Hegelm., *Lemna valdiviana* Phil. var. *pellucida* Hegelm., *Lemna valdiviana* Phil. var. *robusta* Hegelm.  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, VAL, RME, MAU, ARA, LLA.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Lenteja de agua.

### Pistia

*Pistia stratiotes* L.  
Hierba acuática. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL.

### Spirodela

*Spirodela intermedia* W. Koch  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### Wolffia

*Wolffia brasiliensis* Wedd.  
Sinónimos: *Wolffia papulifera* C.H. Thoms., *Wolffia punctata* Griseb.  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Lenteja de agua.

### Wolffiella

*Wolffiella oblonga* (Phil.) Hegelm.  
Sinónimos: *Lemna oblonga* Phil., *Wolffiella oblonga* (Phil.) Hegelm., *Wolffiella lingulata* Hegelm. var. *minor* Hegelm.  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, MAU.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Lenteja de agua.

### Zantedeschia

*Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LLA, JFE.

## ARECACEAE

### Juania

*Juania australis* (Mart.) Drude ex Hook. f.  
Sinónimos: *Ceroxylon australe* Mart., *Nunnezharia chonta* (Phil.) Kuntze, *Morenia chonta* Phil.  
Árbol. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 200-800 m.  
Nombre vulgar: Chonta, palma chonta.

## Jubaea

### *Jubaea chilensis* (Molina) Baill.

Sinónimos: *Palma chilensis* Molina, *Cocos chilensis* (Molina) Kunth, *Micrococos chilensis* (Molina) Phil., *Jubaea spectabilis* Kunth, *Molinaea micrococos* Bertero  
Árbol. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 300 m.

Nombre vulgar: Palma Chilena.

## ASPARAGACEAE

### Cordyline

#### *Cordyline terminalis* (L.) Kunth

Arbusto. Introducido.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Ti (Rapa Nui).

### Herreria

#### *Herreria stellata* Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Herreria verticillata* Molina

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Nombre vulgar: Zarza.

### Oziroë

#### *Oziroë acaulis* (Baker) Speta

Sinónimos: *Scilla acaulis* Baker

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

#### *Oziroë arida* (Poepp.) Speta

Sinónimos: *Fortunatia arida* (Poepp.) Ravenna, *Oziroë arida* (Poepp.) Ravenna, *Ornithogalum aridum* Poepp., *Ornithogalum chloroleucum* Lindl., *Scilla chloroleuca* (Lindl.) Kunth, *Ornithogalum chilense* Phil., *Ornithogalum biflorum* (Ruiz & Pav.) D. Don var. *chloroleucum* (Lindl.) Baker, *Oziroë chloroleuca* (Poepp.) Speta

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

#### *Oziroë biflora* (Ruiz & Pav.) Speta

Sinónimos: *Fortunatia biflora* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Camassia biflora* (Ruiz & Pav.) Cocucci, *Scilla biflora* Ruiz

& Pav., *Scilla triflora* Phil., *Ornithogalum biflorum* (Ruiz & Pav.) D. Don

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Nombre vulgar: Lágrima de la virgen.

#### *Oziroë pomensis* Ravenna

Sinónimos: *Oziroë totorensis* Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 1800-3600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

### Trichopetalum

#### *Trichopetalum plumosum* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.

Sinónimos: *Trichopetalum stellatum* Lindl., *Trichopetalum gracile* Lindl., *Anthericum plumosum* Ruiz & Pav., *Bottionea thysanotoides* Colla, *Endocoma peruviana* Raf., *Endocoma parviflora* Raf.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Flor de la plumilla.

## ASPHODELACEAE

### Asphodelus

#### *Asphodelus fistulosus* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, ATA.

### Pasithea

#### *Pasithea caerulea* (Ruiz & Pav.) D. Don

Sinónimos: *Pasithea caerulea* (Ruiz & Pav.) D. Don var. *grandiflora* I.M. Johnst., *Anthericum caeruleum* Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Flor del queltehue, azulillo.

## ASTELIACEAE

### Astelia

*Astelia pumila* (G. Forst.) Gaudich.  
Sinónimos: *Astelia pumila* (G. Forst.) R. Br., comb. illeg.,  
*Melanthium pumilum* G. Forst.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## BROMELIACEAE

### Deuterocohnia

*Deuterocohnia chrysantha* (Phil.) Mez  
Sinónimos: *Pitcairnia chrysantha* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-800 m.  
Nombre vulgar: Chagual del jote.

### Fascicularia

*Fascicularia bicolor* (Ruiz & Pav.) Mez subsp. *bicolor*  
Sinónimos: *Fascicularia micrantha* (Phil.) Mez,  
*Fascicularia parviflora* Mez, *Bromelia bicolor* Ruiz  
& Pav., *Billbergia bicolor* (Ruiz & Pav.) Schult. f.,  
*Rhodostachys bicolor* (Ruiz & Pav.) Benth. ex Hook. f. ex  
Baker, *Rhodostachys micrantha* Phil., *Bromelia joinvillei* E.  
Morren  
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,  
LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 600 m.  
Nombre vulgar: Chupalla.

*Fascicularia bicolor* (Ruiz & Pav.) Mez subsp. *canaliculata*  
E.C. Nelson & Zizka  
Sinónimos: *Fascicularia kirchhoffiana* (Wittm.) Mez,  
*Bromelia albobracteata* Steud. ex Lechl., nom. nud.,  
*Rhodostachys albo-bracteata* (Steud. ex Baker) Baker,  
*Rhodostachys pitcairniifolia* (B. Verl.) Benth. var.  
*kirchhoffiana* Wittm.  
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-100 m.  
Nombre vulgar: Puñeña.

### Greigia

*Greigia berteroi* Skottsbo.

Sinónimos: *Hesperogreigia berteroi* (Skottsbo.) Skottsbo.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 600-700 m.

*Greigia landbeckii* (Lechl. ex Phil.) Phil. ex F. Phil.  
Sinónimos: *Bromelia landbeckii* Lechl. ex Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Nombre vulgar: Ñocha.

### Greigia pearcei

Mez  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 100-400 m.

*Greigia sphacelata* (Ruiz & Pav.) Regel  
Sinónimos: *Billbergia sphacelata* (Ruiz & Pav.) Schult. f.,  
*Bromelia discolor* Lindl., *Bromelia crassa* Steud., nom.  
nud., *Bromelia clandestina* Carrière, nom. nud., *Bromelia*  
*sphacelata* Ruiz & Pav.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Chupón.

### Ochagavia

*Ochagavia andina* (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner  
Sinónimos: *Rhodostachys andina* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 700-2500 m.

*Ochagavia carnea* (Beer) L.B. Sm. & Looser  
Sinónimos: *Ochagavia chamissonis* (Mez) L.B. Sm.  
& Looser, *Rhodostachys chamissonis* Mez, *Bromelia*  
*longifolia* auct. non Rudge, *Bromelia lindleyana* Lem., nom.  
illeg., *Bromelia carnea* Beer, *Rhodostachys grandiflora*  
Phil., *Ruckia ellemeti* Regel, *Pouretia argentea* Wittm.,  
nom. nud., *Rhodostachys carnea* (Beer) Mez, *Ochagavia*  
*grandiflora* (Phil.) Mez  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1100 m.  
Nombre vulgar: Cardoncillo.

### Ochagavia elegans

Phil.  
Sinónimos: *Rhodostachys elegans* (Phil.) Mez  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Nombre vulgar: Chupón.



***Ochagavia litoralis*** (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner  
Sinónimos: *Fascicularia litoralis* (Phil.) Mez, *Ochagavia lindleyana* Mez, *Placseptalia rebecae* Espinosa, *Fascicularia pitcairniifolia* (B. Verl.) Mez, *Hechtia pitcairniifolia* B. Verl., *Bromelia pitcairniifolia* (B. Verl.) K. Koch, *Rhodostachys pitcairniifolia* (B. Verl.) Benth., *Hechtia carnea* Wittm., nom. nud., *Rhodostachys litoralis* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, LBO.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

## **Puya**

***Puya alpestris*** (Poepp.) Gay subsp. ***alpestris***  
Sinónimos: *Pourretia alpestris* Poepp., *Puya whytei* Hook. f., *Puya pumila* Ravenna, *Pitcairnia coerulea* auct. non Benth.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

***Puya alpestris*** (Poepp.) Gay subsp. ***zoellneri*** Zizka  
Sinónimos: *Puya coerulea* auct. non Lindl., *Puya whytei* auct. non Hook.f., *Pitcairnia alpestris* L.H. Bailey, *Puya berteroniana* auct. non Mez  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

***Puya berteroniana*** Mez  
Sinónimos: *Pitcairnia alpestris* L.H. Bailey, nom. nud.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Nombre vulgar: Chagual.  
Nota: Según Zizka et al. (2013) esta especie sería un híbrido (*Puya x berteroniana* Mez).

***Puya boliviensis*** Baker  
Sinónimos: *Puya copiapina* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

***Puya chilensis*** Molina  
Sinónimos: *Puya quillotana* W. Weber, *Pourretia coarctata* Ruiz & Pav., *Pitcairnia chilensis* Lodd., *Puya suberosa* Molina, *Puya gigantea* Phil., *Puya chilensis* Molina var. *gigantea* Baker ex Mez  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO.  
Rango altitudinal: 1000-2500 m.  
Nombre vulgar: Puya.

***Puya coerulea*** Lindl. var. ***coerulea***  
Sinónimos: *Pourretia caerulea* Miers, nom. nud., *Pitcairnia coerulea* (Lindl) Benth., *Pitcairnia coerulea* auct. non Benth., *Puya violacea* auct. non Mez  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 500-2000 m.  
Nombre vulgar: Chagualillo.

***Puya coerulea*** Lindl. var. ***intermedia*** (L.B. Sm. & Looser) L.B. Sm. & Looser  
Sinónimos: *Puya paniculata* Phil., *Puya glabrata* Phil. ex Baker  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 400-700 m.

***Puya coerulea*** Lindl. var. ***monteroana*** (L.B. Sm. & Looser) L.B. Sm. & Looser  
Sinónimos: *Puya violacea* (Brongn.) Mez var. *monteroana* L.B. Sm. & Looser  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

***Puya coerulea*** Lindl. var. ***violacea*** (Brongn.) L.B. Sm. & Looser  
Sinónimos: *Puya rubricaulis* Steud., *Pourretia rubricaulis* Miers, *Pitcairnia violacea* Brongn., *Pourretia violacea* Linden, *Puya violacea* (Brongn.) Mez  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 400-1200 m.  
Nombre vulgar: Chagual chico.

***Puya gilmartiniae*** G.S. Varad. & A.R. Flores  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

***Puya pumila*** Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO.

***Puya venusta*** Phil.  
Sinónimos: *Pitcairnia venusta* (Phil.) Baker, *Pitcairnia sphaerocephala* Baker, *Puya coquimbensis* Mez, *Puya gaudichaudii* Mez  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 1000-1500 m.  
Nombre vulgar: Chagual.

## **Tillandsia**

### ***Tillandsia geissei* Phil.**

Hierba epífita. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 200-600 m.

### ***Tillandsia landbeckii* Phil.**

Hierba epífita. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 300-1500 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Calachunca.

### ***Tillandsia marconae* W. Till & Vitek**

Hierba epífita. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 600-800 m.  
Países limítrofes: Perú.

### ***Tillandsia tragophoba* M.O. Dillon**

Hierba epífita. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 200-500 m.

### ***Tillandsia usneoides* (L.) L.**

Sinónimos: *Renealmia usneoides* L., *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *ferruginea* (André) Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. fma. *cretacea* Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. fma. *ferruginea* André  
Hierba epífita. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-3300 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.  
Nombre vulgar: Barbón, barbas de viejo.

### ***Tillandsia virescens* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. fma. *virescens* (Ruiz & Pav.) L.B. Sm., *Tillandsia propinqua* Gay, *Diaphoranthema virescens* (Ruiz & Pav.) Beer, *Tillandsia stolpi* Phil.  
Hierba epífita. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO.  
Rango altitudinal: 450-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Calachunca.

## **BUTOMACEAE**

### **Hydrocleys**

#### ***Hydrocleys nymphoides* (Willd.) Buchenau**

Hierba acuática. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL.

## **COMMELINACEAE**

### **Commelina**

#### ***Commelina diffusa* Burm. f.**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.

#### ***Commelina erecta* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ANT, COQ, RME.

### **Tradescantia**

#### ***Tradescantia fluminensis* Vell.**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: LRI, JFE.

## **CORSIACEAE**

### **Arachnitis**

#### ***Arachnitis uniflora* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Flor de la araña.

## **CYPERACEAE**

### **Amphiscirpus**

#### ***Amphiscirpus nevadensis* (S. Watson) Oteng-Yeb.**

Sinónimos: *Schoenoplectus nevadensis* (S. Watson) Soják, *Scirpus nevadensis* S. Watson, *Scirpus nevadensis* S. Watson var. *remireoides* (Griseb.) Beetle, *Scirpus remireoides* Griseb., *Isolepis oreophila* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## **Bolboschoenus**

### ***Bolboschoenus maritimus*** (L.) Palla

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA.

## **Carex**

### ***Carex acaulis*** d'Urv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Carex acutata*** Boott

Sinónimos: *Carex anwandteri* Phil., *Carex foeminea* Steud.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

### ***Carex aematorhyncha*** E. Desv. var. ***aematorhyncha***

Sinónimos: *Carex filiformis* L. subsp. *aematorhyncha* (E. Desv.) Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Carex aematorhyncha*** E. Desv. var. ***corralensis*** (Phil.)

Kük.

Sinónimos: *Carex corralensis* Phil., *Carex filiforme* auct. non Gooden.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Carex andersonii*** Boott

Sinónimos: *Carex eleopsammodes* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Carex andina*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1200-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Carex aphylla*** Kunth

Sinónimos: *Carex ebracteata* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 700-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Carex araucana*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

### ***Carex argentina*** Barros

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU.

Rango altitudinal: 1000-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Carex atropicta*** Steud.

Sinónimos: *Carex lechleri* Phil., hom. illeg., *Carex leporina* auct. non L., p.p., *Carex pampae* Kalela, p.p., *Carex peraltae* Phil., *Carex fuegina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Carex austroamericana*** G.A. Wheeler

Sinónimos: *Carex andina* Phil. var. *subabscondita* Kük., p.p., *Carex andina* Phil. var. *subabscondita* auct. non Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Carex banksii*** Boott var. ***banksii***

Sinónimos: *Carex germana* Boott, *Carex trifida* Franch., hom. illeg., *Carex trifida* Cav. var. *franchetii* Kurtz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1900 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Carex banksii*** Boott var. ***fonskii*** (Phil.) Kük.

Sinónimos: *Carex fonskii* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Carex banksii*** Boott var. ***gilliesii*** (Phil.) Kük.

Sinónimos: *Carex dessaueri* Phil., *Carex gilliesii* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

***Carex berteriana*** E. Desv.

Sinónimos: *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *pungens* (Boeck.) Kük., *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *berteroana* (E. Desv.) Gunckel, *Carex pungens* Boeck., *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *colchaguensis* (Phil.) Kük., *Carex colchaguensis* Phil., *Carex moelleri* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Carex berteroniana*** Steud.

Sinónimos: *Carex paleata* Boott

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Carex bonariensis*** Desf. ex Poir.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Carex bracteosa*** Kunze ex Kunth

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Carex brongniartii*** Kunth

Sinónimos: *Carex hypoxanthus* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex caduca*** Boott

Sinónimos: *Carex ortegae* Phil., *Carex caduca* Boott var. *ortegae* (Phil.) Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex camptoglochin*** V.I. Krecz.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex canescens*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Carex capitata*** L.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex catamarcensis*** C.B. Clarke ex Kük.

Sinónimos: *Carex latibracteolata* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex chilensis*** Brongn. ex Duperrey

Sinónimos: *Carex riparia* Curtis var. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey) Kük., *Carex riparia* Curtis subsp. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey) Kük., *Carex vacillans* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex chillanensis*** Phil.

Sinónimos: *Carex melanolepis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex darwinii*** Boott var. *darwinii*

Sinónimos: *Carex incompta* Franch.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex darwinii*** Boott var. *serranoi* (Phil.) Kük.

Sinónimos: *Carex darwinii* Boott var. *robustior* Kük., *Carex serranoi* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Carex darwinii*** Boott var. *urolepis* (Franch.) Kük.

Sinónimos: *Carex darwinii* Boott var. *aristata* C.B. Clarke ex Kük., *Carex urolepis* Franch.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex decidua*** Boott

Sinónimos: *Carex decidua* Boott var. *minor* Kük., *Carex pedicellata* Phil., *Carex rahmeri* Phil., *Carex vulgaris* R.E. Fr. var. *antucensis* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA,

AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex distenta*** Kunze ex Kunth

Sinónimos: *Carex fuscula* d'Urv. var. *distenta* (Kuntze ex Kunth) Kük., *Carex huitensis* Steud., *Carex indecora* auct. non Kunth, *Carex pseudopunctata* Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex excelsa*** Poepp. ex Kunth

Sinónimos: *Carex lechleri* Steud., *Carex pseudocyperus* L. subsp. *haenkeana* auct. non (J. Presl & C. Presl) Kük., *Carex pseudocyperus* L. var. *haenkeana* (J. Presl & C. Presl) Kük., *Carex pseudocyperus* L. var. *lechleri* Boott, *Carex psilostachys* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cortadera.

***Carex fernandezensis*** Mack. ex G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 300-600 m.

***Carex firmicaulis*** Kalela

Sinónimos: *Carex andicola* G.A. Wheeler, *Carex nebularum* Phil. fma. *major* (Kük.) Kük., *Carex pycnostachya* Kar. & Kir. var. *major* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, LBO.

Rango altitudinal: 100-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex fuscula*** d'Urv. var. *fuscula* fma. *fuscula*

Sinónimos: *Carex hieronymi* Boeck., *Carex calbucana* Phil., *Carex fuscula* d'Urv. var. *hieronymi* (Boeck.) Kük., *Carex inconspicua* Steud. var. *fuscula* (d'Urv.) Kük., *Carex indecora* Kunth var. *humilis* Kunth, *Carex riparia* auct. non Curtis, *Carex valdiviana* Phil., *Carex fuscula* d'Urv. f. *elator* Kurtz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex fuscula*** d'Urv. var. *fuscula* fma. *indecora* (Kunth) Kük.

Sinónimos: *Carex indecora* Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex fuscula*** d'Urv. var. *pseudextensa* Kük.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

***Carex gayana*** E. Desv. var. *densa* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, LBO, MAU, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Carex gayana*** E. Desv. var. *gayana*

Sinónimos: *Carex nitens* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex gayana*** E. Desv. var. *rufa* Kük.

Sinónimos: *Carex gayana* E. Desv. var. *taurina* (Phil.) Kük., *Carex taurina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 500-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex gayana*** E. Desv. var. *shedonautos* (Steud.) Kük.

Sinónimos: *Carex shedonautos* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex hookeri*** Kunth

Sinónimos: *Carex beecheyana* Boott ex E. Desv.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, LLA.

***Carex hypoleucos*** E. Desv.

Sinónimos: *Carex nebularum* Phil. var. *kurtziana* (Kük.) Kük., *Carex kurtziana* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 1500-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.



***Carex inconspicua*** Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-2800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex kingii*** (Boott) Reznicek

Sinónimos: *Uncinia kingii* Boott  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 700-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex lamprocarpa*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.

***Carex lateriflora*** Phil.

Sinónimos: *Carex involucrata* Steud. ex Lechl., nom. nud.,  
*Carex trichodes* Steud. ex Boott var. *lateriflora* (Phil.)  
Kük., *Carex trichodes* Steud. ex Boott var. *major* Kük.,  
*Carex reicheana* Boeck.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 1000-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex macloviana*** d'Urv. var. *macloviana*

Sinónimos: *Carex festiva* Dewey, *Carex inciso-dentata*  
Steud., *Carex ovalis* auct. non Gooden., *Carex propinqua*  
Nees & Meyen, *Carex allomacros* Steud., *Carex macloviana*  
d'Urv. fma. *bracteata* Kük., *Carex pratensis* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex macloviana*** d'Urv. var. *pseudoleporina* Kük.

Sinónimos: *Carex leporina* auct. non L., p.p., *Carex*  
*leporina* L. var. *elatior* Boeck., *Carex leucocarpa* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex macloviana*** d'Urv. var. *thermarum* (Phil.) Kük.

Sinónimos: *Carex macloviana* d'Urv. var. *incrassata* Kük.,  
*Carex thermarum* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 1000-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex macrorrhiza*** Boeck.

Sinónimos: *Carex macrorrhiza* Boeck. var. *simplex* Kük.,  
*Carex bonplandii* auct. non Kunth, *Carex curvifolia* Boeck.,  
*Carex hypoleucos* auct. non E. Desv.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, RME.  
Rango altitudinal: 2000-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Carex macrosolen*** Steud.

Sinónimos: *Carex macrocarpa* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex magellanica*** Lam.

Sinónimos: *Carex atrata* L. var. *magellanica* (Lam.)  
Wahlenb., *Carex cernua* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,  
AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex malmei*** Kalela

Sinónimos: *Carex atropicta* Steud. var. *platycarpa* Phil. ex  
Kük.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, RME.  
Rango altitudinal: 2600-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex maritima*** Gunnerus

Sinónimos: *Carex incurva* Lightf. var. *misera* (Phil.) Kük.,  
*Carex melanocystis* E. Desv., *Carex melanocystis* E. Desv.  
var. *misera* (Phil.) Kük., *Carex misera* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAG.  
Rango altitudinal: 200-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Carex microglochis*** Wahlenb.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 200-4100 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Carex minutissima*** Barros

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 500-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex molinae*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 2200-2400 m.

***Carex moorei*** G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 600-800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex multispicata*** Kunze ex Kunth

Sinónimos: *Carex acutata* Boott var. *multispicata* (Kunze ex Kunth) Kük.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO.

***Carex nebularum*** Phil.

Sinónimos: *Carex propinqua* auct. non Nees & Meyen, *Carex pycnostachya* auct. non Kar. & Kir.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAU, NUB, AIS.  
Rango altitudinal: 1000-2200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex ochrostachya*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.

***Carex odontolepis*** Phil.

Sinónimos: *Carex banksii* Boott var. *odontolepis* (Phil.) Kük., *Carex promaucana* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, NUB, ARA.  
Rango altitudinal: 100-2300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex phalaroides*** Kunth

Sinónimos: *Carex chlorolepis* Steud., *Carex schenkiana* Boeck., *Uncinia phalaroides* (Kunth) Nees  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, BIO, ARA, LLA, JFE.  
Rango altitudinal: 0-300 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Carex pisanoi*** G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Carex pleioneura*** G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, COQ, RME.  
Rango altitudinal: 1900-3400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex poeppigii*** C.B. Clarke ex G.A. Wheeler

Sinónimos: *Carex lamprocarpa* Phil. var. *rotundata* Kük.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO.

***Carex pumila*** Thunb.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, MAG.

***Carex reichei*** Kük.

Sinónimos: *Carex aueri* Kalela  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex sagei*** Phil.

Sinónimos: *Carex barrosii* Nelmes, *Carex flava* L. subsp. *brevirostrata* Kük.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex setifolia*** Kunze ex Kunth

Sinónimos: *Carex pissisii* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Países limítrofes: Perú.

***Carex sorianoi*** Barros

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 100-800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex stuessyi*** G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 900-1400 m.

***Carex subantarctica*** Speg.

Sinónimos: *Carex chubutensis* C.B. Clarke  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Carex toroensis*** G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Carex trachycystis*** Griseb.

Sinónimos: *Carex sororia* auct. non Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex transandina*** G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 300-600 m.

***Carex trichodes*** Steud. ex Boott

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

***Carex trifida*** Cav.

Sinónimos: *Carex aristata* auct. non R. Br.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex vallis-pulchrae*** Phil. var. *barrosiana* G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex vallis-pulchrae*** Phil. var. *vallis-pulchrae*

Sinónimos: *Carex castellanosii* Barros

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, MAG.

Rango altitudinal: 2000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Carex werdermannii*** Gross

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI.

Rango altitudinal: 1000 m.

***Carpha***

***Carpha schoenoides*** Banks & Sol. ex Hook. f.

Sinónimos: *Carpha alpina* R. Br. var. *schoenoides* (Banks & Sol. ex Hook. f.) Kük., *Carpha viridis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cyperus***

***Cyperus aggregatus*** (Willd.) Endl.

Sinónimos: *Cyperus flavomarisus* Griseb., *Didymia cyperomorpha* Phil., *Mariscus aggregatus* Willd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Cyperus brevifolius*** (Rottb.) Endl. ex Hassk.

Sinónimos: *Kyllinga brevifolia* Rottb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hikukio'e (Rapa Nui).

***Cyperus cyperoides*** (L.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Hikukio'e (Rapa Nui).

***Cyperus difformis*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

***Cyperus eragrostis*** Lam. var. *compactus* (E. Desv.) Kük.

Sinónimos: *Cyperus lutescens* Phil., hom. illeg., *Cyperus vegetus* Willd. var. *compactus* E. Desv., *Cyperus vegetus* Willd. var. *trigonus* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hikukio'e (Rapa Nui).

***Cyperus eragrostis*** Lam. var. *eragrostis*

Sinónimos: *Cyperus declinatus* Moench, *Cyperus vegetus* Willd., *Cyperus eragrostis* Lam. fma. *latifrons* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Cyperus fraternus*** Kunth

Sinónimos: *Cyperus reflexus* Vahl var. *fraternus* (Kunth) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Países limítrofes: Argentina.

***Cyperus grammicus*** Kunze ex Kunth

Sinónimos: *Pycneus grammicus* (Kunze ex Kunth) C.B. Clarke, *Cyperus parvulus* Steud.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Cyperus involucratus*** Rott.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ANT, RME, MAU, LLA.

***Cyperus laevigatus*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, MAU.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Cyperus lanceolatus*** Poir.  
Sinónimos: *Cyperus lepidus* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Cyperus megapotamicus*** Kunth var. *jaeggii* (Boeck.) Kük.  
ex Barros  
Sinónimos: *Pycneus megapotamicus* (Kunth) Nees var.  
*jaeggii* (Boeck.) Guagl., *Cyperus jaeggii* Boeck.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-300 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Cyperus odoratus*** L.  
Sinónimos: *Cyperus flexuosus* Vahl, *Torulinium odoratum*  
(L.) Hooper  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: LBO, MAU, LRI.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Cyperus poeppigii*** Kunth  
Sinónimos: *Torulinium poeppigii* (Kunth) C.B. Clarke  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Cyperus polystachyos*** Rottb.  
Hierba. Anual o perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.  
Nombre vulgar: Hikukio'e (Rapa Nui).

***Cyperus reflexus*** Vahl  
Sinónimos: *Cyperus haematostachys* Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LRI, LLA, JFE.  
Rango altitudinal: 0-2200 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Morcacho, ñocha.

***Cyperus rigens*** J. Presl & C. Presl  
Sinónimos: *Cyperus chilensis* Boeck., *Cyperus conceptionis*  
Steud., *Cyperus lacustris* Phil., *Cyperus laetus* auct. non J.  
Presl & C. Presl, *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var.  
*conceptionis* (Steud.) Kük., *Mariscus conceptionis* (Steud.)  
C.B. Clarke, *Cyperus paposanus* Phil., *Cyperus nocha*  
Phil., *Cyperus rancoanus* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, ANT, RME, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LLA.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Ñocha, lleivún.

***Cyperus rotundus*** L.  
Sinónimos: *Chlorocyperus rotundus* (L.) Palla  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Coquillo.

***Cyperus squarrosus*** L.  
Sinónimos: *Cyperus aristatus* Rottb., nom. illeg.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, BIO, LRI.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.

***Cyperus tweediei*** C.B. Clarke  
Hierba. Anual o perenne. Nativa.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 200-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cyperus virens*** Michx. var. *montanus* (Boeck.) Denton  
Sinónimos: *Cyperus montanus* Boeck., *Cyperus uleanus*  
Boeck.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cyperus virens*** Michx. var. *virens*  
Sinónimos: *Cyperus acutangulus* Boeck., *Cyperus vegetus*  
Willd. var. *acutangulus* (Boeck.) Kuntze, *Cyperus virens*  
Michx. var. *acutangulus* (Boeck.) Kük.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, ARA.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Cortadera, lleivún.

***Cyperus volckmannii*** Phil.  
Sinónimos: *Cyperus araeus* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, MAU.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Cyperus xanthostachyus*** Steud.  
Sinónimos: *Cyperus lechlerii* Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-800 m.  
Países limítrofes: Bolivia.  
Nombre vulgar: Cortadera, ñocha.

### **Eleocharis**

***Eleocharis atacamensis*** Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, NUB, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 500-3600 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Eleocharis bonariensis*** Nees  
Sinónimos: *Eleocharis striatula* E. Desv., *Scirpus striatulus* (E. Desv.) Griseb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Eleocharis cordillerana*** S. González, Guagl. & Ruthsatz  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 500-900 m.

***Eleocharis dombeyana*** Kunth  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, RME.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Eleocharis flavescens*** (Poir.) Urb.  
Sinónimos: *Scirpus flavescens* Poir.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-400 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Eleocharis fuscopurpurea*** (Steud.) H. Pfeiff.  
Sinónimos: *Eleocharis melanocarpa* Phil., *Eleocharis vincentina* Phil., *Eleocharis vincentina* Phil. var. *arcuata* (Kuntze) C.B. Clarke, *Isolepis fuscopurpurea* Steud., *Scirpus desvauxii* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, BIO, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 0-2300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Eleocharis lechleri*** Boeck.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 400-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Eleocharis macrostachya*** Britton  
Sinónimos: *Eleocharis palustris* auct. non (L.) R. Br., *Scirpus palustris* auct. non L.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Eleocharis maculosa*** (Vahl) Roem. & Schult.  
Sinónimos: *Scirpus maculosus* Vahl  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, MAU, NUB, LLA, JFE.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Eleocharis melanocephala*** E. Desv.  
Sinónimos: *Scirpus melanocephalus* (E. Desv.) Griseb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Eleocharis melanomphala*** C.B. Clarke  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 1000-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Eleocharis melanostachys*** (d'Urv.) C.B. Clarke  
Sinónimos: *Eleocharis litoralis* Phil., *Eleocharis valdiviana* Phil., *Scirpus melanostachys* d'Urv.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2200 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Eleocharis montana*** (Kunth) Roem. & Schult.  
Sinónimos: *Scirpus montanus* Kunth  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 100-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.



***Eleocharis pachycarpa*** E. Desv.

Sinónimos: *Eleocharis dubia* Phil., *Eleocharis fuscanguinea* Boeck., *Eleocharis lepida* Phil., *Eleocharis leptocaulis* Steud., *Eleocharis liocarpa* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Eleocharis pseudoalbibracteata*** S. González & Guagl.

Sinónimos: *Eleocharis albibracteata* auct. non Nees & Meyen ex Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, IPA.

Rango altitudinal: 400-4400 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Eleocharis quinqueflora*** (Hartmann) O. Schwarz

Sinónimos: *Scirpus quinqueflorus* Hartmann, *Isolepis andina* Phil., *Scirpus andinus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2200-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Eleocharis radicans*** (Poir.) Kunth

Sinónimos: *Eleocharis costulata* Nees & Meyen ex Kunth, *Eleocharis rivularis* Phil., *Scirpus radicans* Poir.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Eleocharis tucumanensis*** Barros

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, RME.

Rango altitudinal: 3900-4600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Eleocharis uniflora*** Seberg

Sinónimos: *Chillania pusilla* Roiv.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB.

**Ficinia**

***Ficinia nodosa*** (Rottb.) Goetgh., Muasya & D.A. Simpson

Sinónimos: *Scirpus molinianus* Beetle, *Isolepis nodosa* (Rottb.) R. Br., *Scirpus nodosus* Rottb., *Isolepis monocephala* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.

**Isolepis**

***Isolepis cernua*** (Vahl) Roem. & Schult.

Sinónimos: *Cyperus pumilio* Steud., *Isolepis erubescens* Steud., *Isolepis heterophylla* Steud., *Isolepis modesta* Phil., *Isolepis monostachya* Phil., *Isolepis purpurascens* Steud., *Schoenoplectus cernuus* (Vahl) Hayek, *Scirpus cernuus* Vahl, *Scirpus chloroticus* Phil., *Scirpus modestus* (Phil.) F. Phil., *Scirpus terminalis* Phil., *Scirpus aegialitis* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Isolepis nigricans*** Kunth

Sinónimos: *Cyperus urvilleanus* Steud., *Isolepis albescens* E. Desv., *Isolepis angachillensis* Steud., *Isolepis phaecocarpa* Phil., hom. illeg., *Isolepis ramulosa* Steud., *Isolepis vivipara* Schrad. ex E. Desv., *Scirpus angachillensis* (Steud.) Boeck., *Scirpus bridgesii* Boeck., *Scirpus constitutionis* Phil., *Scirpus didymostachyus* Phil., *Scirpus phaecarpus* Phil., *Scirpus albescens* (E. Desv.) Phil., *Isolepis nana* Phil., *Isolepis tristachya* Phil., *Scirpus trichocaulos* Phil., *Scirpus philippii* C.B. Clarke

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Isolepis ranko*** (Steud.) Vegetti

Sinónimos: *Cyperus ranko* Steud., *Isolepis perpusilla* Phil., hom. illeg., *Scirpus philippii* auct. non C.B. Clarke, *Scirpus ranko* (Steud.) Gunckel, *Scirpus ranko* (Steud.) Beetle, comb. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LRI.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Isolepis varians*** Steud.

Sinónimos: *Isolepis valdiviae* Steud., *Scirpus varians* (Steud.) Boeck., *Isolepis valdiviae* F. Phil. ex Boeck., nom. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 700-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

## **Machaerina**

***Machaerina scirpoidea*** (Steud.) T. Koyama  
Sinónimos: *Terobera scirpoidea* Steud., *Vincentia scirpoidea* (Steud.) Boeck., *Cladium scirpoideum* (Steud.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl., *Mariscus scirpoideus* (Steud.) Kuntze, *Agylla ensifolia* Phil., *Cladium ensifolium* (F. Phil.) H. Pfeiff.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 100-700 m.

## **Oreobolus**

***Oreobolus obtusangulus*** Gaudich.  
Sinónimos: *Gaimardia australis* auct. non Gaudich., *Oreobolus clandestinus* Phil., *Oreobolus obtusangulus* Gaudich. fma. *borealis* Skottsbo.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## **Phylloscirpus**

***Phylloscirpus acaulis*** (Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson  
Sinónimos: *Scirpus macrolepis* Phil., *Scirpus acaulis* Phil., *Scirpus atacamensis* auct. non Phil., *Scirpus nubigenus* Phil., *Scirpus sessiliflorus* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 2000-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Phylloscirpus boliviensis*** (Barros) Dhooge & Goetgh.  
Sinónimos: *Scirpus boliviensis* Barros  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 4100-4800 m.  
Países limítrofes: Bolivia.

***Phylloscirpus deserticola*** (Phil.) Dhooge & Goetgh.  
Sinónimos: *Scirpus deserticola* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.  
Rango altitudinal: 2000-4800 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

## **Rhodoscirpus**

***Rhodoscirpus asper*** (J. Presl & C. Presl) Léveillé-Bourret, Donadío & J.R. Starr  
Sinónimos: *Scirpus asper* J. Presl & C. Presl, *Scirpus*

*brachycaulos* Phil., *Scirpus trachycaulos* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 700-3200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## **Rhynchospora**

***Rhynchospora brownii*** Roem. & Schult. subsp. *americana* Guagl.  
Sinónimos: *Rhynchospora rugosa* auct. non (Vahl) Gale  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA.  
Rango altitudinal: 0-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## **Schoenoplectus**

***Schoenoplectus americanus*** (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller  
Sinónimos: *Scirpus chilensis* auct. non Nees & Meyen, *Scirpus americanus* Pers.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA.  
Rango altitudinal: 0-2600 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Schoenoplectus californicus*** (C.A. Mey.) Soják var. *californicus*  
Sinónimos: *Elytrospermum californicus* C.A. Mey., *Malacochaete chilense* Nees & Meyen ex Boeck., *Malacochaete oligostachya* Phil. ex Boeck., *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, IPA.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Totora, ngaatu (Rapa Nui).

***Schoenoplectus californicus*** (C.A. Mey.) Soják var. *spoliatus* (Barros) Vegetti  
Sinónimos: *Dichromena atrosanguinea* E. Desv.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Totora.

***Schoenoplectus californicus*** (C.A. Mey.) Soják var. *tereticulmis* (Steud.) Vegetti  
Sinónimos: *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud. var.

*tereticulmis* (Steud.) Beetle, *Scirpus pseudotriqueteter* Steud.,  
*Scirpus riparius* J. Presl & C. Presl var. *tereticulmis* (Steud.)  
C.B. Clarke, *Scirpus tereticulmis* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Totora.

***Schoenoplectus mucronatus*** (L.) Palla

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO.

***Schoenoplectus pungens*** (Vahl) Palla var. *badius* (J. Presl  
& C. Presl) S.G. Sm.

Sinónimos: *Scirpus badius* J. Presl & C. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, MAU, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Schoenoplectus pungens*** (Vahl) Palla var. *longispicatus*  
(Britton) S.G. Sm.

Sinónimos: *Schoenoplectus americanus* (Pers.) Volkart ex  
Schinz & R. Keller subsp. *longispicatus* (Britton) Soják

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Schoenoplectus pungens*** (Vahl) Palla var. *pungens*

Sinónimos: *Scirpus americanus* Pers. var. *pungens* (Vahl)  
Barros & Osten, *Scirpus pungens* Vahl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO,  
MAU, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

## **Schoenus**

***Schoenus andinus*** (Phil.) H. Pfeiff.

Sinónimos: *Carpha andina* Phil., *Schoenus sodalium*  
(Franch.) Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-1900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Schoenus antarcticus*** (Hook. f.) Dusén

Sinónimos: *Carpha antarctica* (Hook. f.) C.B. Clarke,  
*Chaetospora antarctica* Hook. f., *Elynanthus antarcticus*  
(Hook. f.) Franch.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Schoenus nitens*** (R. Br.) Poir. subsp. *krausei* (Phil.) Kük.

Sinónimos: *Schoenus krausei* (Phil.) Gunckel, *Isolepis*  
*krausei* Phil., *Scirpus spadiceus* Phil., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Schoenus rhynchosporoides*** (Steud.) Kük.

Sinónimos: *Carpha laxa* (Hook. f.) Macloskie, *Carpha*  
*paniculata* Phil., *Chaetospora laxa* Hook.f., *Elynanthus*  
*laxus* (Hook.f.) Macloskie

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

## **Scirpus**

***Scirpus angustisquamis*** Beetle

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LLA.

***Scirpus melanocaulos*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Scirpus spegazzinianus*** Barros

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

## **Uncinia**

***Uncinia andina*** G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 700-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Uncinia araucana*** G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA.

Rango altitudinal: 1400-1700 m.

***Uncinia aspericaulis*** G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 900 m.

***Uncinia austroamericana*** G.A. Wheeler  
Sinónimos: *Uncinia lechleriana* auct. non Steud., *Uncinia macrolepis* auct. non Decne.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Uncinia chilensis*** G.A. Wheeler  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1000-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Uncinia costata*** Kük.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Uncinia douglasii*** Boott  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 200-600 m.

***Uncinia erinacea*** (Cav.) Pers.  
Sinónimos: *Carex erinacea* Cav., *Uncinia longearistata* Steud., *Uncinia macrotricha* Franch., *Uncinia erinacea* (Cav.) Pers. var. *angustata* Kük., *Uncinia erinacea* (Cav.) Pers. var. *longifolia* (Kük.) C.B. Clarke, *Uncinia longifolia* Kunth, *Uncinia philippii* Steud.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Uncinia lechleriana*** Steud.  
Sinónimos: *Uncinia brevicaulis* auct. non (Thouars) Kunth, *Uncinia macloviana* auct. non Gaudich.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 100-800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Uncinia macloviana*** Gaudich.  
Sinónimos: *Carex delacosta* Kuntze, *Uncinia brevicaulis* (Thouars) Kunth var. *macloviana* (Gaudich.) C.B. Clarke, *Uncinia brevicaulis* (Thouars) Kunth fma. *montana* (Phil.) Kük., *Uncinia montana* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-900 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Uncinia macloviformis*** G.A. Wheeler  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 1100-1400 m.

***Uncinia macrolepis*** Decne.  
Sinónimos: *Uncinia sinclairii* auct. non Boott  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Uncinia macrophylla*** Steud.  
Sinónimos: *Uncinia bella* Phil., *Uncinia bracteosa* Phil., *Uncinia phalaroides* auct. non (Kunth) Nees  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, LRI.  
Rango altitudinal: 100-1100 m.

***Uncinia multifaria*** Nees ex Boott  
Sinónimos: *Uncinia multifaria* Nees ex Boott var. *macrostachya* (E. Desv.) C.B. Clarke  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.  
Rango altitudinal: 0-700 m.  
Nombre vulgar: Quinquina.

***Uncinia negerii*** Kük.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 500-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Uncinia phleoides*** (Cav.) Pers.  
Sinónimos: *Carex phleoides* Cav., *Uncinia lasiocarpa* Steud. ex Boeck., *Uncinia longifolia* E. Desv., hom. illeg., *Uncinia montteana* Phil., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *krausei* Kük.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.  
Rango altitudinal: 0-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Quinquín.

***Uncinia scabriuscula*** G.A. Wheeler  
Sinónimos: *Uncinia brevicaulis* (Thouars) Kunth var. *laticarpa* Kük.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LLA, AIS, JFE.  
Rango altitudinal: 200-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Uncinia setifolia*** Kunze

Sinónimos: *Carex pissisii* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

***Uncinia tenuis*** Poepp. ex Kunth

Sinónimos: *Uncinia gracillis* d'Urv., hom. illeg., *Uncinia tenuis* Poepp. ex Kunth fma. *firmula* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Uncinia trichocarpa*** C.A. Mey.

Sinónimos: *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *trichocarpa* (C.A. Mey.) C.B. Clarke, *Uncinia longispica* Boeck., *Uncinia urvillei* Steud., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *longispica* (Boeck.) C.B. Clarke, *Uncinia chlorostachya* Phil., *Uncinia loliacea* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Uncinia triquetra*** Kük.

Sinónimos: *Uncinia lechleriana* Steud. var. *triquetra* (Kük.) Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Zameioscirpus***

***Zameioscirpus atacamensis*** (Phil.) Dhooge & Goetgh.

Sinónimos: *Scirpus atacamensis* (Phil.) Boeck., *Isolepis atacamensis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3200-4800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Zameioscirpus gaimardioides*** (E. Desv.) Dhooge & Goetgh.

Sinónimos: *Carex gaimardioides* E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, LBO.

Rango altitudinal: 3100-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Zameioscirpus muticus*** Dhooge & Goetgh.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4100-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

**DIOSCOREACEAE**

***Dioscorea***

***Dioscorea acerifolia*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

***Dioscorea andina*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Papa cimarrona.

***Dioscorea antucoana*** Uline ex R. Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO.

***Dioscorea araucana*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1500 m.

***Dioscorea aristolochiifolia*** Poepp.

Sinónimos: *Dioscorea trichoneura* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Dioscorea auriculata*** Poepp.

Sinónimos: *Dioscorea acutifolia* Phil., *Dioscorea helicifolia* Kunth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Nombre vulgar: Ñame.

***Dioscorea axilliflora*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

***Dioscorea besseriana*** Kunth var. *berteroi* Uline ex R. Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

***Dioscorea besseriana*** Kunth var. *besseriana*

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.



***Dioscorea biloba*** (Phil.) Caddick & Wilkin subsp. *biloba*

Sinónimos: *Epipetrum bilobum* Phil.  
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, COQ.  
Rango altitudinal: 400-500 m.

***Dioscorea biloba*** (Phil.) Caddick & Wilkin subsp.

***coquimbana*** Viruel, Segarra & L. Villar  
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.

***Dioscorea brachybotrya*** Poepp. var. *brachybotrya*

Sinónimos: *Dioscorea novemloba* Steud. ex F. Phil.,  
*Dioscorea scandens* Kunze ex Kunth, *Dioscorea buchtienii*  
R. Knuth  
Hierba trepadora. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 1500-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Poñi.

***Dioscorea brachybotrya*** Poepp. var. *germainii* Uline ex R.  
Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Dioscorea brachystachya*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO.

***Dioscorea bridgesii*** Griseb. ex Kunth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-900 m.  
Nombre vulgar: Papa cimarrona.

***Dioscorea bryoniifolia*** Poepp.

Sinónimos: *Dioscorea hederacea* Miens ex Bertero  
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Camisilla.

***Dioscorea cissophylla*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-400 m.

***Dioscorea fastigiata*** Gay

Sinónimos: *Dioscorea cylindrostachya* I.M. Johnst.,  
*Dioscorea thinophila* Phil.  
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Dioscorea gayi*** Phil.

Sinónimos: *Dioscorea arenaria* auct. non Kunth  
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA.

***Dioscorea geissei*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA.

***Dioscorea gracilis*** Hook. ex Poepp.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Dioscorea humifusa*** Poepp. var. *gracilis* (Hook. & Arn.)

L.E. Navas  
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, NUB.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Dioscorea humifusa*** Poepp. var. *humifusa*

Sinónimos: *Dioscorea nigrescens* Phil.  
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Nombre vulgar: Huanqui.

***Dioscorea humilis*** Bertero ex Colla subsp. *humilis*

Sinónimos: *Dioscorea pusilla* Hook., *Epipetrum humile*  
(Bertero ex Colla) Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Dioscorea humilis*** Bertero ex Colla subsp. *polyanthes* (F.

Phil.) Viruel, Segarra & L. Villar  
Sinónimos: *Epipetrum polyanthes* F. Phil., *Dioscorea*  
*polyanthes* (F. Phil.) Caddick & Wilkin  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.

***Dioscorea litoralis*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, BIO.  
Rango altitudinal: 0-400 m.

***Dioscorea longipes*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, ARA.  
Rango altitudinal: 100-200 m.

***Dioscorea modesta*** Phil.

Sinónimos: *Dioscorea parvifolia* Phil., *Dioscorea aristolochiifolia* Poepp. var. *parvifolia* (Phil.) L.E. Navas & Erba

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, MAU.

***Dioscorea nana*** Poepp.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 100-1300 m.

***Dioscorea obtusifolia*** Hook. & Arn. var. *obtusifolia*

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

***Dioscorea obtusifolia*** Hook. & Arn. var. *philippii* Uline ex R. Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

***Dioscorea oligophylla*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

***Dioscorea paupera*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

***Dioscorea pedicellata*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Papa cimarrona.

***Dioscorea pencana*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 200-300 m.

***Dioscorea reticulata*** Gay

Sinónimos: *Dioscorea brachybotrya* Poepp. var. *reticulata* (Gay) Uline ex R. Knuth, *Dioscorea helicifolia* auct. non Kunth, *Dioscorea reticulata* Gay var. *nervosa* (Phil.) L.E. Navas & Erba, *Dioscorea thermarum* Phil., *Dioscorea nervosa* Phil., *Dioscorea pedatifida* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 200-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Jabón del monte.

***Dioscorea saxatilis*** Poepp.

Sinónimos: *Dioscorea heterophylla* Poepp., *Dioscorea*

*parviflora* Phil., *Dioscorea longifolia* Phil., *Dioscorea heterophylla* Poepp. var. *longifolia* (Phil.) L.E. Navas & Erba, *Dioscorea linearis* Bertero ex Colla, *Dioscorea arenaria* Kunth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Papa cimarrona.

***Dioscorea stenocolpus*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

***Dioscorea tenella*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, COQ.

Rango altitudinal: 400-700 m.

Nombre vulgar: Papa cimarrona.

***Dioscorea tenuis*** R. Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

***Dioscorea uliginosa*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

***Dioscorea valdiviensis*** R. Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LLA.

***Dioscorea variifolia*** Bertero ex Colla

Sinónimos: *Dioscorea acuminata* Steud., *Dioscorea microphylla* Steud.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Dioscorea volckmannii*** Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2300-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

## HYDROCHARITACEAE

### Egeria

***Egeria densa*** Planch.

Hierba acuática. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, NUB, BIO, LRI, LLA.

## Elodea

***Elodea potamogeton*** (Bertero) Espinosa  
Sinónimos: *Diplandra potamogeton* Bertero, *Anacharis potamogeton* (Bertero) Vict., *Anacharis chilensis* Planch., *Egeria chilensis* (Planch.) Benth. & Hook., *Elodea chilensis* (Planch.) Casp.  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, VAL, RME, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 20-4450 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

## Limnobium

***Limnobium laevigatum*** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine  
Hierba acuática. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, BIO.

## IRIDACEAE

### Calydorea

***Calydorea xiphioides*** (Poepp.) Espinosa  
Sinónimos: *Sisyrinchium xiphioides* Poepp., *Sisyrinchium grandiflorum* Poepp., *Sisyrinchium speciosum* Hook., *Calydorea speciosa* (Hook.) Herb.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-400 m.  
Nombre vulgar: Lahue.

### Crocsmia

***Crocsmia crocosmiiflora*** (Lemoine ex Burbidge & Dean) N.E. Br.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, ARA, LLA, JFE.

### Herbertia

***Herbertia lahue*** (Molina) Goldblatt  
Sinónimos: *Trifurcia lahue* (Molina) Goldblatt subsp. *lahue*, *Alophia lahue* (Molina) Espinosa, *Ferraria lahue* Molina  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.  
Rango altitudinal: 0-400 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Lahue.

### Iris

***Iris germanica*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: JFE.

### *Iris pseudacorus* L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: LLA.

## Libertia

***Libertia chilensis*** (Molina) Gunckel  
Sinónimos: *Libertia elegans* Poepp., *Libertia formosa* Graham, *Libertia ixioides* auct. non (G. Forst.) Spreng., *Strumaria chilensis* Molina, *Libertia crassa* Graham, *Choeradodia chilensis* Herb., *Sisyrinchium fernandezianum* Steud. & Hochst., nom. nud., *Libertia grandiflora* Phil., *Libertia formosa* Graham var. *crassa* (Graham) Baker, *Roterbe elegans* Steud. ex Baker, nom. nud., *Libertia chilensis* Klotzsch ex Baker, nom. nud., *Libertia formosa* Graham var. *grandiflora* (Phil.) Johow, *Libertia insignis* Ravenna, *Libertia umbellata* Ravenna  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Calle-calle, tek-el-tek-el.

***Libertia sessiliflora*** (Poepp.) Skottsbo.  
Sinónimos: *Sisyrinchium sessiliflorum* Poepp., *Libertia caerulescens* Kunth & Bouché, *Sisyrinchium huismo* Dombey ex Baker, nom. nud., *Sisyrinchium caerulescens* F. Muell.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Nombre vulgar: Trique.

### *Libertia tricocca* Phil.

Sinónimos: *Libertia falcata* Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.  
Nombre vulgar: Trique.

## Mastigostyla

***Mastigostyla cyrtophylla*** I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Cypella cyrtophylla* (I.M. Johnst.) Diels  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2000-3800 m.  
Países limítrofes: Perú.

## Olsynium

### ***Olsynium biflorum*** (Thunb.) Goldblatt

Sinónimos: *Galaxia narcissoides* (Cav.) Willd., *Phaiophleps biflora* (Thunb.) R.C. Foster, *Phaiophleps odoratissimum* (Lindl.) Raf., *Sisyrinchium odoratissimum* Lindl., *Solenomelus biflorus* (Thunb.) Baker, *Symphystemon biflorus* (Thunb.) Dusén, *Symphystemon narcissoides* (Cav.) Miers ex Klatt, *Symphystemon odoratissimum* (Lindl.) Miers, *Symphystemon patagonicum* Speg., *Gladiolus biflorus* Thunb., *Sisyrinchium narcissoides* Cav., *Phaiophleps patagonica* (Speg.) R.C. Foster

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Olsynium chrysochromum*** J.M. Watson & A.R. Flores

Sinónimos: *Olsynium luteum* (Phil.) Goldblatt, comb. illeg., *Chamelum luteum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 2000-3500 m.

### ***Olsynium frigidum*** (Poepp.) Goldblatt

Sinónimos: *Chamelum andinum* (Phil.) Benth. & Hook., *Chamelum frigidum* (Poepp.) Ravenna, *Sisyrinchium andinum* Phil., *Sisyrinchium frigidum* Poepp., *Solenomelus andinus* (Phil.) Baker, *Solenomelus frigidus* (Poepp.) Klatt, *Susarium andinum* (Phil.) Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1100-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Olsynium junceum*** (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp.

***colchaguense*** (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores

Sinónimos: *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl subsp. *colchaguense* (Phil.) R.A. Rodr., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *colchaguense* (Phil.) Baker, *Sisyrinchium colchaguense* Phil., *Sisyrinchium eleutherostemon* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-2600 m.

### ***Olsynium junceum*** (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp.

***depauperatum*** (Phil.) R.A. Rodr. & Martic.

Sinónimos: *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl subsp. *depauperatum* (Phil.) R.A. Rodr., *Sisyrinchium depauperatum* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

### ***Olsynium junceum*** (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. ***junceum***

Sinónimos: *Sisyrinchium argentinense* Hauman, *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex J. Presl, *Sisyrinchium middletoni* Baker, *Sisyrinchium pauciflorum* Phil., *Sisyrinchium junciforme* Poepp., *Olsynium argentinense* (Hauman) Ravenna, *Sisyrinchium roseum* Herb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 200-3500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Huilmo.

### ***Olsynium lyckholmi*** (Dusén) Goldblatt

Sinónimos: *Phaiophleps biflora* (Thunb.) R.C. Foster subsp. *lyckholmi* (Dusén) Goldblatt, *Symphystemon lyckholmi* Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Olsynium nigricans*** (Phil.) R.A. Rodr. & Martic.

Sinónimos: *Phaiophleps nigricans* (Phil.) R.C. Foster, *Susarium nigricans* Phil., *Sisyrinchium maulense* Ravenna, *Solenomelus nigricans* (Phil.) Baker, *Symphystemon nigricans* (Phil.) Benth. ex Baker

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

### ***Olsynium obscurum*** (Cav.) Goldblatt

Sinónimos: *Galaxia obscura* Cav., *Ona obscura* (Cav.) Ravenna, *Tapeinia obscura* (Cav.) D.M. Moore

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 900 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Olsynium philippii*** (Klatt) Goldblatt subsp. ***illapelinum***

(Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores

Sinónimos: *Sisyrinchium illapelinum* Phil., *Sisyrinchium roseum* Phil., hom. illeg., *Sisyrinchium philippii* Klatt subsp. *illapelinum* (Phil.) Rodr.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1000-3200 m.

### ***Olsynium philippii*** (Klatt) Goldblatt subsp. ***philippii***

Sinónimos: *Sisyrinchium philippii* Klatt, *Sisyrinchium scabrum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 2000-3000 m.

***Olsynium scirpoideum*** (Poepp.) Goldblatt subsp. ***leucanthum*** (Colla) R.A. Rodr. & Martic.

Sinónimos: *Sisyrinchium leucanthum* Colla, *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *leucanthum* (Colla) R.A. Rodr., *Sisyrinchium bifolium* Phil., *Sisyrinchium stenophyllum* Phil., *Sisyrinchium nuno* Colla var. *leucanthum* (Colla) Baker, *Sisyrinchium filiforme* Steud., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, BIO.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Olsynium scirpoideum*** (Poepp.) Goldblatt subsp. ***luridum*** (Ravenna) R.A. Rodr. & Martic.

Sinónimos: *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *luridum* (Ravenna) R.A. Rodr., *Sisyrinchium luridum* Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Olsynium scirpoideum*** (Poepp.) Goldblatt subsp. ***scirpeum*** (Phil.) R.A. Rodr. & Martic.

Sinónimos: *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *scirpeum* (Phil.) R.A. Rodr., *Sisyrinchium scirpeum* Phil., *Sisyrinchium stenopetalum* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: NUB.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.

***Olsynium scirpoideum*** (Poepp.) Goldblatt subsp. ***scirpoideum***

Sinónimos: *Sisyrinchium scirpiforme* Poepp., *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp., *Sisyrinchium asperulum* Phil., *Sisyrinchium berterioanum* Phil., *Sisyrinchium floribundum* Phil., *Sisyrinchium gracile* Phil., *Sisyrinchium junciforme* Poepp. var. *nivale* Phil., *Sisyrinchium strictum* Phil., nom. nud., *Sisyrinchium nivale* Phil., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *scirpiforme* (Poepp.) Baker, *Sisyrinchium nuno* Colla, *Sisyrinchium nunna* Steud., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *gracile* (Phil.) Baker, *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *asperulum* (Phil.) Baker

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-2300 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Huilmo.

***Olsynium trinerve*** (Baker) R.A. Rodr. & Martic.

Sinónimos: *Sisyrinchium trinerve* Baker

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 2500-4100 m.

Países limítrofes: Perú.

## **Romulea**

***Romulea rosea*** (L.) Eckl.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, MAU, BIO.

## **Sisyrinchium**

***Sisyrinchium arenarium*** Poepp. subsp. ***adenostemon*** (Phil.) Ravenna

Sinónimos: *Sisyrinchium adenostemon* Phil., *Sisyrinchium pauperculum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Sisyrinchium arenarium*** Poepp. subsp. ***arenarium***

Sinónimos: *Sisyrinchium adenostemon* Phil. subsp. *microspathum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium arenarium* Poepp. subsp. *microspathum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium flexuosum* Lindl., *Sisyrinchium microspathum* Phil., *Sisyrinchium multiflorum* Phil., *Sisyrinchium nervosum* Phil., *Sisyrinchium oligostachyum* Phil., *Sisyrinchium striatum* Sm. var. *microspathum* (Phil.) Speg., *Sisyrinchium angustifolium* Phil., *Sisyrinchium antucense* Ravenna, *Sisyrinchium breviarmium* Ravenna, *Sisyrinchium limarinum* Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Sisyrinchium azureum*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Sisyrinchium chilense*** Hook.

Sinónimos: *Sisyrinchium iridifolium* auct. non Kunth, *Sisyrinchium iridifolium* Kunth subsp. *valdivianum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium scabrum* Cham. & Schltld. var. *exaltatum* Klatt, *Sisyrinchium uniflorum* Gay ex Phil., *Sisyrinchium ramosum* Herb. var. *chilense* (Hook.) Herb., *Sisyrinchium graminifolium* auct. non Lindl., *Sisyrinchium graminifolium* Bertero ex Steud., *Sisyrinchium arrayanicum*



Ravenna, *Sisyrinchium micranthum* Cav. subsp. *valdivianum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium valdivianum* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3700 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Clavelillo.

***Sisyrinchium cuspidatum* Poepp.**

Sinónimos: *Sisyrinchium convallium* Ravenna, *Sisyrinchium longifolium* Phil., *Sisyrinchium adenocarpum* Steud., *Sisyrinchium flexuosum* Phil., p.p.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Sisyrinchium graminifolium* Lindl.**

Sinónimos: *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *maculatum* (Hook.) Klatt, *Sisyrinchium maculatum* Hook., *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. subsp. *luteum* (Bertero ex Steud.) R.A. Rodr., comb. illeg., *Sisyrinchium luteum* Bertero ex Steud., nom. nud., *Sisyrinchium dasycarpum* Phil., *Sisyrinchium piligerum* Phil., *Sisyrinchium volckmanni* Phil., *Echthronema graminifolium* (Lindl.) Herb., *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *pumilum* Lindl., *Echthronema pumilum* (Lindl.) Herb., *Sisyrinchium tenuifolium* Willd., *Echthronema maculatum* (Hook.) Herb., *Sisyrinchium ascendens* Poepp., *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *ascendens* (Poepp.) Baker, *Sisyrinchium guttatum* Moris, *Sisyrinchium majale* Link, *Sisyrinchium pymaeum* Klotzsch ex Klatt, nom. nud., *Sisyrinchium tingens* Steud., *Sisyrinchium maipoanum* Ravenna, *Sisyrinchium orbiculatum* Ravenna, *Sisyrinchium valparadiseum* Ravenna, *Sisyrinchium gratissimum* Ravenna, *Sisyrinchium tofoense* Ravenna, *Sisyrinchium vestitum* Ravenna  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Ñuño.

***Sisyrinchium micranthum* Cav.**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.

***Sisyrinchium nanum* Phil.**

Sinónimos: *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. subsp. *nanum* (Phil.) Ravenna  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 700-2300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Sisyrinchium patagonicum* Phil. ex Baker**

Sinónimos: *Sisyrinchium lechleri* Phil., *Sisyrinchium nudicaule* Phil., *Sisyrinchium palenae* Phil., *Sisyrinchium rahmeri* Phil., *Sisyrinchium inclinatum* Ravenna  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Sisyrinchium pearcei* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 500-2000 m.

***Sisyrinchium striatum* Sm.**

Sinónimos: *Sisyrinchium bracteosum* Phil., *Bermudiana striata* (Sm.) Moench, *Marica striata* (Sm.) Ker Gawl., *Paneguia striata* (Sm.) Raf., *Spathirachis striata* (Sm.) Klotzsch ex Klatt, *Sisyrinchium spicatum* Cav., *Moraea sertata* Jacq., *Sisyrinchium lutescens* Lodd., *Sisyrinchium libertoides* Steud., *Sisyrinchium nigricans* Gay, *Sisyrinchium laevigatum* Ravenna  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Maicillo.

***Solenomelus***

***Solenomelus pedunculatus* (Gillies ex Hook.) Hochr.**

Sinónimos: *Sisyrinchium pedunculatum* Gillies ex Hook., *Sisyrinchium longistylum* Lem., *Sisyrinchium scabriusculum* Steud., *Solenomelus chilensis* Miers  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 0-1900 m.  
Nombre vulgar: Maicillo.

***Solenomelus segethii* (Phil.) Kuntze**

Sinónimos: *Lechera sisyrinchium* Griseb. ex Lechl., nom. nud., *Susarium segethii* (Phil.) Phil., *Symphostemon segethii* (Phil.) Macloskie, *Solenomelus sisyrinchium* (Griseb.) Pax ex Diels, nom. illeg., *Sisyrinchium segethii* Phil., *Solenomelus lechleri* Baker  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Tapeinia**

***Tapeinia pumila*** (G. Forst.) Baill.  
Sinónimos: *Ixia magellanica* Lam., *Ixia pumila* G. Forst., *Moraea magellanica* (Lam.) Willd., *Sisyrinchium pumilum* (G. Forst.) Hook., *Tapeinia magellanica* (Lam.) Ker Gawl., *Witsenia magellanica* (Lam.) Pers., *Witsenia pumila* (G. Forst.) Vahl  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Tigridia**

***Tigridia philippiana*** I.M. Johnst.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-900 m.

## **JUNCAEAE**

### **Distichia**

***Distichia filamentosa*** Buchenau  
Sinónimos: *Agapatea filamentosa* Buchenau, nom. nud., *Distichia filamentosa* (Buchenau) Griseb., nom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 3500-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Distichia muscoides*** Nees & Meyen  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3600-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### **Juncus**

***Juncus acuminatus*** Michx. var. *multiceps* (Kunze ex Kunth) Barros  
Sinónimos: *Juncus multiceps* Kuntze ex Kunth  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

***Juncus acutus*** L. subsp. *acutus* var. *decompositus* Guss.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, COQ.  
Rango altitudinal: 600 m.

***Juncus acutus*** L. subsp. *leopoldii* (Parl.) Snogerup  
Sinónimos: *Juncus acutus* L. var. *leopoldii* (Parl.) Buchenau, *Juncus leopoldii* Parl.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LLA.  
Rango altitudinal: 900-2400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Juncus balticus*** Willd. subsp. *andicola* (Hook.) Snogerup  
Sinónimos: *Juncus pictus* Phil., *Juncus andicola* Hook., *Juncus balticus* Willd. var. *pictus* (Phil.) Griseb., *Juncus conceptionis* Steud., *Juncus deserticola* Phil., *Juncus arcticus* Willd. var. *andicola* (Hook.) Balslev  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, MAU, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-4100 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Hunquillo.

***Juncus balticus*** Willd. subsp. *mexicanus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Kirschner  
Sinónimos: *Juncus balticus* Willd. var. *crassiculmis* Buchenau ex Griseb., *Juncus balticus* Willd. var. *mexicanus* (Willd.) Kuntze, *Juncus mexicanus* Willd. ex Schult. & Schult. f., *Juncus crassiculmis* (Buchenau) Herter, *Juncus balticus* Willd. var. *columnaris* Buchenau, *Juncus arcticus* Willd. var. *mexicanus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Balslev  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3900 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Juncus bufonius*** L.  
Sinónimos: *Juncus bufonius* L. var. *genuinus* Cout., nom. illeg., *Juncus bufonius* L. var. *pumilio* Griseb.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-4100 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Juncus bulbosus*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: LLA.

***Juncus capillaceus*** Lam.  
Sinónimos: *Juncus capillaceus* Lam. var. *montevidensis* Buchenau, *Juncus tenuifolius* Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Juncus capitatus*** Weigel

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

***Juncus cyperoides*** Laharpe

Sinónimos: *Juncus graminifolius* E. Mey., *Juncus rivularis* Poepp. ex Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Juncus dichotomus*** Elliot

Sinónimos: *Juncus cognatus* Kunth, *Juncus tenuis* A. Gray, hom. illeg., *Juncus tenuis* Willd. var. *dichotomus* (Elliott) Wood

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Juncus diemii*** Barros

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Países limítrofes: Argentina.

***Juncus effusus*** L. var. *effusus*

Sinónimos: *Juncus bogotensis* Kunth, *Juncus leersii* auct. non T. Marsson

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Juncus effusus*** L. var. *subglomeratus* DC.

Sinónimos: *Juncus effusus* L. var. *compactus* Lej. & Courtois

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Juncus ernesti-barrosii*** Barros

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Juncus filiformis*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 90-900 m.

***Juncus homalocaulis*** F. Muell. ex Benth.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

***Juncus imbricatus*** Laharpe

Sinónimos: *Juncus capillaceus* Lam. var. *chilensis* Buchenau, *Juncus chamissonis* Kunth, *Juncus imbricatus* Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau, *Juncus imbricatus* Laharpe var. *lechleri* (Steud.) Buchenau, *Juncus lechleri* Steud., *Juncus spanianthus* Steud., *Juncus collinus* Steud., *Juncus multiflorus* Bertero ex Steud., *Juncus urvillei* Steud., *Juncus chamissonis* Kunth fma. *pusillus* Buchenau

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Juncus involucratus*** Steud. ex Buchenau

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, BIO, LLA, AIS.

Países limítrofes: Argentina.

***Juncus kraussii*** Hochst. subsp. *austerus* (Buchenau)

Snogerup

Sinónimos: *Juncus austerus* Buchenau

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Juncus llanquihuensis*** Barros

Sinónimos: *Juncus mendocinus* Barros

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Juncus microcephalus*** Kunth

Sinónimos: *Juncus floribundus* Kunth, *Juncus luzuloxiphium* Griseb., *Juncus microcephalus* Kunth var. *floribundus* (Kunth) Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth var. *intermedius* Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth var. *typicus* Buchenau, nom. illeg., *Juncus microcephalus* Kunth var. *virens* Griseb., *Juncus sellowianus* Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth fma. *conglobatus* Barros, *Juncus timotensis* Barros, *Juncus floribundus* Phil., nom. illeg., *Juncus rudis* Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Juncus palleescens*** Lam.

Sinónimos: *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *elatus* Buchenau, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *pycnanthus* Buchenau, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *typicus* Buchenau, nom. illeg., *Juncus commixtus* Steud., *Juncus proximus* Steud., *Juncus fernandezianus* Steud., *Juncus longifolius* Steud., *Juncus megakoleos* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Hierba de la vaca.

***Juncus planifolius*** R. Br.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

***Juncus procerus*** E. Mey.

Sinónimos: *Juncus valdiviae* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Junquillo.

***Juncus scheuchzerioides*** Gaudich.

Sinónimos: *Juncus capillaceus* Hook., hom. illeg., *Juncus exiguus* Gaudich. ex Hook. f., *Juncus inconspicuus* d'Urv., *Juncus pusillus* auct. non Buchenau, *Juncus scheuchzerioides* Gaudich. var. *inconspicuus* (d'Urv.) Hook.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Juncus stipulatus*** Nees & Meyen

Sinónimos: *Juncus chilensis* Gay, *Juncus corralensis* Phil., *Juncus depauperatus* Phil., *Juncus gayanus* Steud., *Juncus mandonii* Buchenau, *Juncus microcephalus* Kunth var. *pusillus* E. Mey., *Juncus oliganthus* Phil., *Juncus stipulatus* Nees & Meyen var. *corralensis* (Phil.) Buchenau, *Juncus biflorus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 2000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Juncus tenuis*** Willd. var. *congestus* Engelm. ex Buchenau

Sinónimos: *Juncus occidentalis* Wiegand, *Juncus tenuis*

Willd. var. *occidentalis* (Wiegand) Coville

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU.

Países limítrofes: Argentina.

***Juncus tenuis*** Willd. var. *tenuis*

Sinónimos: *Juncus smithii* Kunth, *Juncus subtenuis* Herter, *Juncus tenuis* Willd. var. *multicornis* E. Mey., *Juncus tenuis*

Willd. var. *williamsii* Fernald

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

**Luzula**

***Luzula alopecurus*** Desv.

Sinónimos: *Juncodes alopecurus* (Desv.) Kuntze, *Juncoides alopecurus* (Desv.) Macloskie, *Luzula villosa* Wikstr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Luzula antarctica*** Hook. f.

Sinónimos: *Juncodes antarcticus* (Hook. f.) Kuntze, *Juncoides antarcticum* (Hook. f.) Macloskie

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 300-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Luzula brachyphylla*** Phil.

Sinónimos: *Luzula racemosa* Desv. fma. *brachyphylla* (Phil.) Fuentes

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

***Luzula campestris*** (L.) DC.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAU, BIO, LLA, MAG.

***Luzula chilensis*** Nees & Meyen ex Kunth

Sinónimos: *Luzula rigida* Phil., *Juncodes chilense* (Nees & Meyen ex Kunth) Kuntze, *Luzula chilensis* Nees & Meyen ex Kunth fma. *rigida* (Phil.) Fuentes

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 400-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Luzula excelsa*** Buchenau

Sinónimos: *Juncodes excelsum* (Buchenau) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 1000-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Luzula leiboldii*** Buchenau

Sinónimos: *Juncodes leiboldii* (Buchenau) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 100-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Luzula masafuerana*** Skottsbo.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 900-1400 m.

***Luzula parvula*** Barros

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 3300-3400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Luzula racemosa*** Desv.

Sinónimos: *Juncodes racemosum* (Desv.) Kuntze, *Luzula racemosa* Desv. var. *typica* Buchenau  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 1500-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Luzula tristachya*** Desv.

Sinónimos: *Luzula campestris* (L.) DC. var. *tristachya* (Desv.) Buchenau, *Luzula pauciflora* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 100-600 m.

**Marsippospermum**

***Marsippospermum grandiflorum*** (L. f.) Hook. f.

Sinónimos: *Juncus grandiflorus* L. f., *Marsippospermum calyculatum* Desv., hom. illeg., *Rostkovia grandiflora* (L. f.) Hook. f.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Marsippospermum philippii*** (Buchenau) Hauman

Sinónimos: *Marsippospermum grandiflorum* (L. f.) Hook. f. var. *philippii* Buchenau, *Rostkovia gracilis* Phil., hom. illeg., *Rostkovia grandiflora* (L. f.) Hook. f. var. *philippii* (Buchenau) Hosseus  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Marsippospermum reichei*** Buchenau

Sinónimos: *Rostkovia reichei* (Buchenau) Hosseus  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 500-1100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Oxychloë**

***Oxychloë andina*** Phil.

Sinónimos: *Distichia andina* (Phil.) Benth. & Hook.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.  
Rango altitudinal: 3200-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Oxychloë bisexualis*** Kuntze

Sinónimos: *Andesia bisexualis* (Kuntze) Hauman  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2800-4400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oxychloë haumaniana*** (Barros) Barros

Sinónimos: *Andesia haumaniana* Barros  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 3500-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Patosia**

***Patosia clandestina*** (Phil.) Buchenau

Sinónimos: *Oxychloë clandestina* (Phil.) Hauman, *Rostkovia clandestina* Phil., *Rostkovia brevifolia* Phil., *Oxychloë brevifolia* (Phil.) Buchenau, *Distichia clandestina* (Phil.) Buchenau  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 2700-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.



## Rostkovia

*Rostkovia magellanica* (Lam.) Hook. f.

Sinónimos: *Juncus magellanicus* Lam., *Rostkovia sphaerocarpa* Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

## JUNCAGINACEAE

### Lilaea

*Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman

Sinónimos: *Lilaea subulata* Humb. & Bonpl., *Phalangium scilloides* Poir.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, MAU, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4100 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

### Tetroncium

*Tetroncium magellanicum* Willd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

### Triglochin

*Triglochin concinna* Burt Davy

Sinónimos: *Triglochin maritima* L. var. *altoandina* Cabrera, *Triglochin maritima* L. var. *deserticola* Phil., *Triglochin monanthos* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, VAL, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

*Triglochin palustris* L.

Sinónimos: *Triglochin fonticola* Phil., *Triglochin andinum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, MAU, LLA, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

*Triglochin striata* Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Triglochin montevidensis* Spreng, *Triglochin striata* Ruiz & Pav. var. *filifolia* Buchenau, *Triglochin striata* Ruiz & Pav. var. *montevidensis* (Spreng.) Buchenau, *Triglochin lechleri* Steud., *Triglochin litoreum* Phil., *Triglochin volckmanni* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS.

Países limítrofes: Argentina.

## LUZURIAGACEAE

### Luzuriaga

*Luzuriaga marginata* (Gaertn.) Benth.

Sinónimos: *Callixene marginata* (Gaertn.) Lam., *Enargea marginata* Gaertn., *Callixene magellanicum* Raeusch.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Países limítrofes: Argentina.

*Luzuriaga polyphylla* (Hook.) J.F. Macbr.

Sinónimos: *Callixene polyphylla* Hook., *Luzuriaga erecta* Kunth, *Enargea polyphylla* (Hook.) F. Muell.

Subarbusto trepador. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Quilineja.

*Luzuriaga radicans* Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Callixene radicans* (Ruiz & Pav.) Macloskie, *Enargea radicans* (Ruiz & Pav.) F. Muell.

Subarbusto trepador. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Quilineja.

## ORCHIDACEAE

### Bipinnula

*Bipinnula fimbriata* (Poepp.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Chloraea fimbriata* Poepp., *Bipinnula mystacina* Lindl., *Jouyella fimbriata* (Poepp.) Szlach. & Marg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

*Bipinnula gabriel* P.A. Bravo & G.M. Baeza

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

*Bipinnula plumosa* Lindl.

Sinónimos: *Bipinnula philipporum* Kraenzl., *Bipinnula*

*plumosa* Lindl. var. *philipporum* (Krzl) Reiche, *Jouyella philipporum* (Kraenzl.) Szlach. & Marg., *Jouyella plumosa* (Lindl.) Szlach. & Marg.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

***Bipinnula taltalensis*** I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Jouyella taltalensis* (I.M.Johnst.) Szlach. & Marg.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT.

***Bipinnula volkmannii*** Kraenzl.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: NUB, BIO, ARA.

### **Brachystele**

***Brachystele unilateralis*** (Poir.) Schltr.  
Sinónimos: *Ophrys unilateralis* Poir., *Gyrostachys chilensis* (A. Rich.) Kuntze, *Gyrostachys unilateralis* (Poir.) Kuntze, *Spiranthes chilensis* A. Rich., *Spiranthes diuretica* Lindl., *Neottia diuretica* Willd., *Sarcoglottis diuretica* (Willd.) W.H. Baxter, *Epipactis diuretica* (Willd.) Stokes, *Spiranthes nuil* A. Rich., *Odontorrhynchus chilensis* (A. Rich.) Garay, *Odontorrhynchus domeykoanus* Szlach., *Odontorrhynchus erosus* Szlach., *Odontorrhynchus variabilis* Garay  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Nuil.

### **Chloraea**

***Chloraea alpina*** Poepp.  
Sinónimos: *Asarca alpina* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea hookeriana* Speg. & Kraenzl., *Chloraea ferruginea* Speg. & Kraenzl., *Chloraea xerophila* Kraenzl., *Chloraea perez-moreaui* Garay, *Chloraea cholilensis* Speg. & Kraenzl.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Tulipán del monte.

***Chloraea barbata*** Lindl.  
Sinónimos: *Asarca barbata* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea aurea* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Países limítrofes: Argentina.

***Chloraea bidentata*** (Poepp. & Endl.) M.N. Correa  
Sinónimos: *Asarca bidentata* Poepp. & Endl., *Chloraea*

*bicallosa* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Países limítrofes: Argentina.

***Chloraea bletioides*** Lindl.  
Sinónimos: *Chloraea ulanthoides* Lindl., *Asarca bletioides* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea grandis* Kraenzl., *Chloraea affinis* Lindl., *Asarca affinis* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea ulanthoides* Lindl. var. *affinis* (Lindl.) Reiche, *Chloraea ulanthoides* Lindl. var. *grandis* (Kraenzl.) Reiche, *Chloraea lindleyi* Poepp.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB.  
Nombre vulgar: Lengua de loro.

***Chloraea chrysantha*** Poepp.  
Sinónimos: *Asarca chrysantha* (Poepp.) Kuntze, *Asarca aurantiaca* Lindl., *Chloraea crocata* Phil., *Chloraea aurantiaca* Lindl., *Asarca speciosa* Lindl.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Nombre vulgar: Pico de loro.

***Chloraea chrysochlora*** Phil.  
Sinónimos: *Asarca chrysochlora* (Phil.) Kuntze, *Chloraea collicensis* Kraenzl., *Chloraea hemichloris* Kraenzl., *Asarca lechleri* (Lindl. ex Kraenzl.) Kunze, *Chloraea lechleri* Lindl. ex Kraenzl.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS.  
Países limítrofes: Argentina.

***Chloraea crispa*** Lindl.  
Sinónimos: *Asarca crispa* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea cygnea* Phil., *Asarca cygnea* (Phil.) Kuntze, *Chloraea spectabilis* Phil., *Asarca conspicua* Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Nombre vulgar: Gavilú, pico de loro.

***Chloraea cristata*** Lindl.  
Sinónimos: *Chloraea pogonata* Phil., *Asarca pogonata* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.

***Chloraea cuneata*** Lindl.  
Sinónimos: *Asarca cuneata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca obovata* (Phil.) Kuntze, *Chloraea obovata* Phil., *Chloraea nervosa* Phil. ex Kraenzl.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA, LRI.

***Chloraea disoides* Lindl.**

Sinónimos: *Chileorchis disoides* (Lindl.) Szlach., *Asarca disodes* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea picta* Phil. ex Kraenzl., *Chloraea disoides* Lindl. var. *picta* (Phil. ex Kraenzl.) M.N. Correa

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA.

***Chloraea galeata* Lindl.**

Sinónimos: *Asarca galeata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca maculosa* Poepp., *Chloraea alaris* Lindl., *Chloraea secunda* Phil., *Chloraea suaveolens* Phil., *Asarca maculata* Steud., *Chloraea besserii* Rchb.f., *Chloraea berteriana* Kraenzl., *Asarca besserii* (Rchb.f.) Kuntze, *Chloraea rypaloglossa* A. Rich., *Asarca rypaloglossa* (A. Rich.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

***Chloraea gaudichaudii* Brongn.**

Sinónimos: *Asarca gaudichaudii* (Brongn.) Kuntze, *Arethusa lutea* Gaud., *Epipactis lutea* (Gaudich.) Steud., *Chloraea fonki* Phil. orth. mut., *Asarca fonckii* (Phil.) Kuntze orth. mut., *Chloraea inconspicua* Phil., *Asarca inconspicua* (Phil.) Kuntze, *Chloraea falklandica* Kraenzl., *Chloraea gymnoglossa* Phil., *Asarca gymnoglossa* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

***Chloraea gavilu* Lindl.**

Sinónimos: *Limodorum luteum* Lam., *Chloraea sceptrum* Rchb.f., *Epidendrum luteum* (Lam.) Poir., *Chloraea lutea* (Wild.) Schltr., nom. illeg., *Chloraea lindleyi* Poepp., *Chloraea semitensis* Phil. ex Kraenzl., *Chloraea lotensis* Rolfe, *Cymbidium luteum* (Lam.) Willd.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

***Chloraea heteroglossa* Rchb.f.**

Sinónimos: *Asarca heteroglossa* (Rchb.f.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

***Chloraea lamellata* Lindl.**

Sinónimos: *Asarca lamellata* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea decipiens* Poepp., *Chloraea semibarbata* Lindl., *Asarca semibarbata* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea semibarbata* Lindl. ssp. *pearcei* Kraenzl., *Chloraea pearcei* Phil., *Asarca pearcei* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.

***Chloraea longipetala* Lindl.**

Sinónimos: *Asarca longipetala* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea*

*panduraeformis* Phil., *Chloraea multilamellata* Phil. ex Kraenzl., *Chloraea liliaceae* Kraenzl., *Chloraea reicheana* Kraenzl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

***Chloraea magellanica* Hook. f.**

Sinónimos: *Asarca magellanica* (Hook.f.) Kuntze, *Chloraea bouganvilleana* Franch., *Chloraea spegazziniana* Kraenzl., *Chloraea hystrix* Speg. & Kraenzl., *Chloraea leontoglossa* Kraenzl. & Speg., *Chloraea kraenzliniana* Hoehne

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

***Chloraea multiflora* Lindl.**

Sinónimos: *Asarca multiflora* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea densa* Rich., *Chloraea campestris* Poepp., *Chloraea stenantha* Kraenzl., *Asarca densa* (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea poeppigiana* A. Rich., *Asarca poeppigiana* (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea pseudo-campestris* Kraenzl., *Chloraea decipiens* Poepp.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Nombre vulgar: Gavilú.

***Chloraea nudilabia* Poepp.**

Sinónimos: *Asarca nudilabia* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea leucojiflora* Kraenzl., *Chloraea heteroglossa* Rchb.f., *Chloraea homopetala* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

***Chloraea parviflora* (Poepp.) Mourgues & Novoa**

Sinónimos: *Asarca parviflora* Poepp. *Chloraea reflexa* Phil., *Chloraea reflexa* Phil. var. *latifolia* Phil., *Asarca reflexa* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, BIO.

***Chloraea philippii* Rchb.f.**

Sinónimos: *Asarca philippii* (Rchb.f.) Kuntze, *Chloraea lagunae-pacis* Kraenzl., *Chloraea lineata* Phil. ex Kraenzl., *Chloraea modesta* Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS.

Países limítrofes: Argentina.

***Chloraea prodigiosa* Rchb.f.**

Sinónimos: *Asarca prodigiosa* (Rchb.f.) Kuntze, *Chloraea calopogon* Phil., *Asarca calopogon* (Phil.) Kuntze, *Chloraea dasypogon* Phil., *Asarca dasypogon* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LBO, MAU.

***Chloraea speciosa*** Poepp.

Sinónimos: *Chloraea gayana* Rich., *Asarca gayana* (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea elwelsii* Rolfe, *Chloraea speciosa* Poepp. fma. *sterilis* Kraenzl., *Asarca insignis* Kuntze, comb. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

Países limítrofes: Argentina.

***Chloraea virescens*** (Willd.) Lindl.

Sinónimos: *Asarca patagonica* (Phil.) Kuntze, *Chloraea patagonica* Phil., *Chloraea pigichen* Kuntze, *Chloraea piquichen* Lindl., *Chloraea pleistodactyla* Kraenzl. & Speg., *Cymbidium virescens* Willd., *Chloraea incisa* Poepp., *Chloraea odontoglossa* A. Rich., *Chloraea unguis-cati* Rchb.f., *Chloraea chlorosticta* Phil., *Asarca chlorosticta* (Phil.) Kuntze, *Asarca odontoglossa* (A. Rich.) Kuntze, *Asarca unguis-cati* (Rchb.f.) Kuntze, *Asarca incisa* (Poepp.) Kuntze, *Asarca fimbriata* (Phil.) Kuntze, *Chloraea fimbriata* Phil., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Piquichén, pichiquén.

***Chloraea viridiflora*** Poepp.

Sinónimos: *Asarca viridiflora* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea verrucosa* Phil., *Chloraea piquichen* (Lam.) Lindl., *Chloraea viridiflora* Poepp. var. *reticulata* Reiche, *Chloraea robusta* Rolfe, *Chloraea leontoglossa* Kraenzl., nom. illeg., *Asarca tuberculata* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Países limítrofes: Argentina.

***Chloraea volkmannii*** Phil. ex Kraenzl.

Sinónimos: *Chloraea lineata* Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

**Codonorchis**

***Codonorchis lessonii*** (Brongn.) Lindl.

Sinónimos: *Epipactis lessonii* d'Urv., *Calopogon lessonii* (d'Urv.) Brong., *Pogonia lessonii* (D'Urv.) Rchb.f., *Pogonia tetraphylla* Poepp. & Endl., *Codonorchis tetraphylla* (Poepp. & Endl.) L.O. Williams, *Codonorchis poeppigii* Lindl., *Pogonia lessonii* (D'Urv.) Rchb.f. var. *poeppigii* Reiche, *Codonorchis lessonii* (Brong.) Lindl. var. *poeppigii* (Lindl.) Reiche, *Codonorchis skottsbergii* Kraenzl., *Pogonia lessonii* (D'Urv.) Rchb.f. var. *skottsbergii* Reiche, *Codonorchis lessonii* (Brong.) Lindl. var. *skottsbergii* (Kraenzl.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Palomita, azucena.

**Correorchis**

***Correorchis cylindrostachya*** (Poepp.) Szlach.

Sinónimos: *Chloraea cylindrostachya* Poepp., *Asarca cylindrostachya* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea papillosa* Phil., *Chloraea major* Ravenna, *Chloraea leptopetala* Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Países limítrofes: Argentina.

**Gavilea**

***Gavilea araucana*** (Phil.) M.N. Correa

Sinónimos: *Asarca araucana* Phil., *Asarca araucana* Phil. var. *incisa* Hauman, *Gavilea araucana* (Phil.) M.N. Correa var. *incisa* Hauman

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

***Gavilea australis*** (Skotts.) M.N. Correa

Sinónimos: *Asarca australis* Skotts., *Asarca enigmatica* Hauman

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

***Gavilea cardioglossa*** (Reiche) Martic.

Sinónimos: *Gavilea cardioglossa* (Reiche) M.N. Correa, comb. illeg., *Asarca cardioglossa* Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LRI, LLA.

***Gavilea chica*** (Speg. & Kraenzl.) Chemisquy

Sinónimos: *Chloraea chica* Speg. & Kraenzl., *Chloraea kruegeri* F. Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

***Gavilea gladysiae*** Chemisquy

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Países limítrofes: Argentina.



***Gavilea glandulifera*** (Poepp.) M.N. Correa  
Sinónimos: *Asarca appendiculata* Phil. ex Kraenzl., *Asarca glandulifera* Poepp., *Chloraea albo-rosea* Kraenzl. & Speg., *Chloraea volucris* Lindl., *Gavilea auriculata* Ravenna  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gavilea insularis*** M.N. Correa  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.

***Gavilea kingii*** (Hook. f.) M.N. Correa  
Sinónimos: *Asarca kingii* Hook.f., *Chloraea kingii* Macloskie  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAG.

***Gavilea litoralis*** (Phil.) M.N. Correa  
Sinónimos: *Chloraea litoralis* Phil., *Asarca litoralis* (Phil.) Kunze, *Asarca litoralis* (Phil.) Reiche, *Asarca macroptera* Kraenzl., *Gavilea macroptera* (Kraenzl.) M. N. Correa  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gavilea longibracteata*** (Lindl.) Sparre ex L.E. Navas  
Sinónimos: *Chloraea longibracteata* Lindl., *Asarca longibracteata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca sinuata* Lindl., *Asarca longibracteata* (Lindl.) Skotts., comb. illeg., *Asarca berterii* Rchb.f., *Asarca verrucosa* A. Rich. ex Gay, *Asarca spectabilis* Phil., *Chloraea semibarbata* Lindl. ssp. *spectabilis*  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

***Gavilea lutea*** (Pers.) M.N. Correa  
Sinónimos: *Serapias lutea* Comm. ex Pers., *Asarca lutea* (Comm. ex Pers.) Kuntze, *Asarca lutea* (Comm. ex Pers.) Skotts., comb. illeg., *Chloraea lutea* (Comm. ex Pers.) Skotts., *Chloraea commersonii* Brongn., nom. illeg., *Asarca commersonii* (Brongn.) Hook. f., comb. illeg., *Asarca commersonii* (Brongn.) Kuntze, comb. illeg., *Gavilea acutiflora* Poepp., *Asarca acutiflora* (Poepp.) Poepp. & Endl., *Asarca brachychila* Phil., *Asarca thermarum* Phil. ex Kraenzl., *Asarca tenuiflora* Rolfe, *Asarca acutifolia* Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gavilea odoratissima*** Poepp.  
Sinónimos: *Asarca odoratissima* Poepp. & Endl., *Chloraea*

*odoratissima* (Poepp. & Endl.) Macloskie, *Asarca chrysostachya* Phil., *Asarca platyantha* Kraenzl. auct. non Rchb.f., *Asarca sulphurea* Phil., *Asarca ventanai* Hauman  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gavilea platyantha*** (Rchb.f.) Ormd.  
Sinónimos: *Asarca platyantha* Rchb.f., *Asarca glandulifera* Poepp. var. *illapelina* Reiche, *Gavilea glandulifera* (Poepp.) M.N. Correa var. *illapelina* (Reiche) Novoa, J. Espejo, Cisternas, M. Rubio y Domínguez, comb. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gavilea supralabellata*** M.N. Correa  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gavilea trullata*** Ormd.  
Sinónimos: *Asarca cardioglossa* Reiche var. *patagonica* Garay, *Gavilea cardioglossa* (Reiche) Martic. var. *patagonica* (Garay) M.N. Correa  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gavilea venosa*** (Lam.) Garay & Ormd.  
Sinónimos: *Limodorum venosum* Lam., *Gavilea leucantha* Poepp. & Endl., nom. illeg., *Asarca leucantha* Poepp. & Endl., comb. illeg., *Gavilea feuilleana* (Kraenzl.) Lehnebach, *Asarca feuilleana* Kraenzl.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

***Gavilea wittei*** (Hicken) Ormd.  
Sinónimos: *Asarca patagonica* Skotts., hom. illeg., *Chloraea wittei* Hicken, *Gavilea patagonica* (Skotts.) M.N. Correa  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

## **Habenaria**

***Habenaria pumila*** Poepp.  
Sinónimos: *Habenaria paucifolia* Lindl., *Habenaria germainii* Phil., *Habenaria uliginosa* Phil., hom. illeg., *Habenaria brachyceros* Phil., nom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Países limítrofes: Argentina.



## Myrosmodes

*Myrosmodes nervosa* (Kraenzl.) Novoa, C. Vargas & Cisternas  
Sinónimos: *Aa nervosa* (Kraenzl.) Schltr., *Altensteinia nervosa* Kraenzl.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.

## Ulantha

*Ulantha apinnula* (Gosewijn) Szlach.  
Sinónimos: *Chloraea apinnula* (Gosewijn) Szlach., *Bipinnula apinnula* Gosewijn  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.

*Ulantha grandiflora* (Poepp.) Szlach.  
Sinónimos: *Asarca grandiflora* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea grandiflora* Poepp.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

## PHILESIACEAE

### Lapageria

*Lapageria rosea* Ruiz & Pav.  
Arbusto trepador. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-400 m.  
Nombre vulgar: Copihue.

### Philesia

*Philesia magellanica* J.F. Gmel.  
Sinónimos: *Philesia buxifolia* Lam.  
Arbusto trepador. Nativo.  
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-100 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Coicopihue.

## POACEAE

### Agropyron

*Agropyron cristatum* (L.) Gaertn.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAG.

## Agrostis

*Agrostis arvensis* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, LLA.  
Rango altitudinal: 10-420 m.

*Agrostis brachyathera* Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 300-2200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Agrostis breviculmis* Hitchc.  
Sinónimos: *Agrostis nana* (J. Presl) Kunth, *Trichodium nanum* J. Presl  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 820-2800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

*Agrostis capillaris* L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

*Agrostis castellana* Boiss. & Reut.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

*Agrostis gigantea* Roth  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

*Agrostis glabra* (J. Presl) Kunth var. *glabra*  
Sinónimos: *Trichodium glabrum* J. Presl, *Agrostis gayana* E. Desv., *Agrostis andina* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 170-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Agrostis glabra* (J. Presl) Kunth var. *melanthes* (Phil.) Rúgolo & De Paula  
Sinónimos: *Agrostis melanthes* Pilg., *Calamagrostis laxiflora* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 45-2070 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Agrostis idahoensis*** Nash

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 10-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Especie de distribución disyunta en Norte y Sudamérica.

***Agrostis imberbis*** Phil.

Sinónimos: *Agrostis stenophylla* Phil., *Agrostis scotantha* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 175-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Agrostis inconspicua*** Kunze ex E. Desv.

Sinónimos: *Agrostis airiformis* Steud. ( *A. airaeformis*), *Agrostis airoides* Franch.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-2250 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Agrostis insularis*** Rúgolo & A.M. Molina

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 25-30 m.

***Agrostis leptotricha*** E. Desv.

Sinónimos: *Agrostis lechleri* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Agrostis masafuerana*** Pilg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 880-1350 m.

***Agrostis mertensii*** Trin.

Sinónimos: *Agrostis williamsii* Phil., *Agrostis poeppigiana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 15-2200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Agrostis meyenii*** Trin.

Sinónimos: *Agrostis conferta* Nees & Meyen

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 15-3200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Agrostis perennans*** (Walter) Tuck.

Sinónimos: *Agrostis tenuifolia* M. Bieb. var. *fretensis* Hook.f., *Agrostis flavidula* Steud., *Agrostis aberrans* Steud., *Agrostis violacea* Phil., *Agrostis exarata* Trin. var. *angustifolia* Hack., *Agrostis canina* L. var. *grandiflora* Hack. hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 10-2200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Agrostis philippiana*** Rúgolo & De Paula

Sinónimos: *Agrostis clausa* Phil. hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-2070 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Agrostis scabra*** Willd.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Agrostis serranoi*** Phil.

Sinónimos: *Agrostis vaginata* Phil., *Agrostis delfini* Phil., *Agrostis oligoclada* Phil., *Agrostis fuegiana* Hack., *Agrostis aristata* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 25-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ilusión.

***Agrostis stolonifera*** L. var. *palustris* (Huds.) Farw.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Agrostis stolonifera*** L. var. *stolonifera*

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Agrostis tolucensis*** Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3930-4750 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Agrostis uliginosa*** Phil.

Sinónimos: *Agrostis paucinodis* Hack.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 10-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Agrostis umbellata*** Colla

Sinónimos: *Agrostis chilensis* Trin., *Agrostis canina* var. *umbellata* (Colla) Kuntze, *Agrostis glabra* Hochst. ex E. Desv., *Agrostis paradisiaca* Steud., *Agrostis patens* Trin., *Agrostis stricta* Trin.  
Hierba. Anual o perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, AIS.  
Rango altitudinal: 70-2000 m.

***Agrostis vidalii*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA.  
Rango altitudinal: 15-1250 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Agrostis vinealis*** Schreb.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: COQ.

**Aira**

***Aira caryophyllea*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Aira elegantissima*** Schur

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, ARA.

***Aira praecox*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, LLA, AIS, MAG, JFE.

**Alopecurus**

***Alopecurus aequalis*** Sobol.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: MAG.

***Alopecurus geniculatus*** L. var. *geniculatus*

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAG.

***Alopecurus geniculatus*** L. var. *patagonicus* Parodi

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 300-550 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Alopecurus heleochloides*** Hack.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, RME, MAG.  
Rango altitudinal: 25-3000 m.

***Alopecurus lechleri*** Steud.

Sinónimos: *Alopecurus antarcticus* Lechler ex Steud., nom. illeg. como sin. de *Alopecurus lechleri* Steud., *Alopecurus antarcticus* Vahl var. *lechleri* (Steud.) Parodi  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LRI.  
Rango altitudinal: 10-10 m.

***Alopecurus magellanicus*** Lam. var. *bracteatus* (Phil.)

Mariano  
Sinónimos: *Alopecurus bracteatus* Phil., *Alopecurus antarcticus* Vahl var. *bracteatus* (Phil.) Parodi  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Alopecurus magellanicus*** Lam. var. *magellanicus*

Sinónimos: *Alopecurus antarcticus* Vahl, *Alopecurus alpinus* Sm. var. *antarcticus* (Vahl) Macloskie & Dusén, *Alopecurus alpinus* Sm. fma. *antarctica* (Vahl) Hack., *Alopecurus alpinus* Sm. var. *aristatus* Hook fma., nom. nud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-1750 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Alopecurus myosuroides*** Huds.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: MAG.

***Alopecurus pratensis*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

**Amelichloa**

***Amelichloa brachychaeta*** (Godr.) Arriaga & Barkworth

Sinónimos: *Stipa brachychaeta* Godr., *Nassella brachychaeta* (Godr.) Barkworth, *Achnatherum brachychaetum* (Godr.) Barkworth, *Jarava brachychaeta* (Godr.) Peñail.  
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 120-120 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Amelichloa brevipes*** (E. Desv.) Arriaga & Barkworth  
Sinónimos: *Stipa brevipes* E. Desv., *Jarava brevipes* (E. Desv.) Peñail.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 100-3325 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Amelichloa caudata*** (Trin.) Arriaga & Barkworth  
Sinónimos: *Stipa caudata* Trin., *Achnatherum caudatum* (Trin.) S.W.L. Jacobs & J. Everett, *Jarava caudata* (Trin.) Peñail., *Stipa bertrandii* Phil., *Stipa amphicarpa* Phil., *Stipa litoralis* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 20-950 m.  
Países limítrofes: Argentina.

#### **Ammophila**

***Ammophila arenaria*** (L.) Link  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, MAU, ARA, LLA, MAG.

#### **Amphibromus**

***Amphibromus scabrivalvis*** (Trin.) Swallen  
Sinónimos: *Avena scabrivalvis* Trin., *Bromus holciformis* Steud. & Hochst., *Helictotrichon scabrivalvis* (Trin.) Renvoize  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 10-450 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

#### **Anatherostipa**

***Anatherostipa bomanii*** (Hauman) Peñail.  
Sinónimos: *Nicoraella bomanii* (Hauman) Torres, *Stipa bomanii* Hauman  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3750-4550 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Anatherostipa hans-meyeri*** (Pilg.) Peñail.  
Sinónimos: *Stipa hans-meyeri* Pilg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4000-4200 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Anatherostipa mucronata*** (Griseb.) F. Rojas  
Sinónimos: *Piptochaetium mucronatum* Griseb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3500-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Anatherostipa rigidiseta*** (Pilg.) Peñail.  
Sinónimos: *Oryzopsis rigidiseta* Pilg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3890-4100 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Anatherostipa venusta*** (Phil.) Peñail.  
Sinónimos: *Stipa venusta* Phil., *Nicoraella venusta* (Phil.) Torres  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3400-4600 m.  
Nombre vulgar: Vizcachera.

#### **Anthoxanthum**

***Anthoxanthum altissimum*** (Steud.) Veldkamp  
Sinónimos: *Hierochloe altissima* Steud.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 5-780 m.  
Nombre vulgar: Paja ratonera.

***Anthoxanthum guncelii*** (Parodi) Veldkamp  
Sinónimos: *Hierochloe guncelii* Parodi  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 5-280 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Paja ratonera.

***Anthoxanthum juncifolium*** (Hack.) Veldkamp  
Sinónimos: *Hierochloe juncifolia* (Hack.) Parodi, *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *juncifolia* Hack.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 20-1900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Anthoxanthum odoratum*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Anthoxanthum pusillum*** (Hack. ex Dusén) Veldkamp

Sinónimos: *Hierochloe pusilla* Hack. ex Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 100-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Anthoxanthum redolens*** (Vahl) P. Royen

Sinónimos: *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. et Schult.,

*Holcus redolens* Vahl, *Avena redolens* (Vahl) Pers., *Melica*

*magellanica* Desr., *Hierochloe antarctica* (Labill.) R. Brown

var. *redolens* (Vahl) Brongn., *Hierochloe redolens* (Vahl)

Roem. & Schult. var. *magellanica* (Hook.f.) Macloskie,

*Hierochloe magellanica* Hook.f., *Hierochloe sorianoi* De

Paula

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-1320 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Paja ratonera.

***Anthoxanthum spicatum*** (Parodi) Veldkamp

Sinónimos: *Hierochloe spicata* Parodi

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, MAG.

Rango altitudinal: 950-950 m.

Nombre vulgar: Paja ratonera.

***Anthoxanthum utriculatum*** (Ruiz & Pav.) Y. Schouten & Veldkamp

Sinónimos: *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth,

*Torresia utriculata* Ruiz & Pav., *Hierochloe utriculata* (Ruiz

& Pav.) Kunth var. *minor* Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 2-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Paja ratonera.

**Apera**

***Apera interrupta*** (L.) P. Beauv.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, ARA.

**Aristida**

***Aristida adscensionis*** L.

Sinónimos: *Aristida bromoides* Kunth., *Aristida dispersa*

var. *nana* Trin. & Rupr., *Aristida festucoides* Steud. &

Hoscht., *Aristida nana* Steud., *Chaetaria bromoides* Roem.

& Schult., *Chaetaria nana* Nees ex Steud., *Aristida humilis*

Kunth, *Aristida adscensionis* L. var. *bromoides* (Kunth)

Henrard

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 25-3660 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Aristida pallens*** Cav. var. *intermedia* Trin. & Rupr.

Sinónimos: *Aristida pallens* var. *geminata* Caro

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coirón.

***Aristida pallens*** Cav. var. *pallens*

Sinónimos: *Aristida glaberrima* Steud., *Aristida pallens* var.

*genuina* Trin. & Rupr., *Chetaria pallens* (Cav.) P. Beauv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coirón.

***Aristida spegazzinii*** Arechav.

Sinónimos: *Aristida pampeana* Speg., *Aristida spegazzinii*

var. *abbreviata* Hack., *Aristida spegazzinii* fma. *colorata*

Hack., *Aristida spegazzinii* var. *genuina* Hack., *Aristida*

*spegazzinii* var. *pallescens* Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 65-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

**Arrhenatherum**

***Arrhenatherum elatius*** (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl

var. *bulbosum* (Willd.) Spenn.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,

MAG.

***Arrhenatherum elatius*** (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl

var. *elatius*

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, BIO, ARA, LRI, LLA.

**Arundo**

***Arundo donax*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO,

MAU, NUB, BIO, ARA.



### **Austrostipa**

*Austrostipa scabra* (Lindl.) S.W.L. Jacobs & J. Everett  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.

### **Avena**

*Avena barbata* Pott ex Link  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA, LLA, JFE.

*Avena fatua* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LRI, LLA, IPA.

*Avena sativa* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

*Avena sterilis* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: RME.

*Avena strigosa* Schreb.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: BIO, LLA.

### **Avenella**

*Avenella flexuosa* (L.) Drejer  
Sinónimos: *Aira flexuosa* L., *Deschampsia flexuosa* (L.)  
Nees, *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin., *Deschampsia*  
*tenella* Phil. hom. illeg., *Deschampsia philippii* Macloskie,  
*Aira vestita* Steud., *Deschampsia vestita* (Steud.) Hauman,  
*Deschampsia martinii* Phil., *Avenella flexuosa* (L.) Parl.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Axonopus**

*Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv.  
Sinónimos: *Axonopus paschalis* (Stapf) Pilg., *Paspalum*  
*paschale* Stapf, *Paspalum scoparium* Flügge var.  
*oligostachyum* Hack. ex Fuentes, *Milium compressum* Sw.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: IPA.  
Rango altitudinal: 5-400 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Heriki hare (Rapa Nui).

### **Bothriochloa**

*Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Herter  
Sinónimos: *Andropogon barbinodis* Lag.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 400-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

*Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.

*Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter  
Sinónimos: *Andropogon laguroides* DC.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 10-1000 m.  
Nombre vulgar: Cola de zorro.

*Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. subsp. *australis*  
Scrivanti  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 120-2600 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Coirón.

*Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. subsp.  
*parvispiculus* (Hitchc.) Davidse  
Sinónimos: *Andropogon saccharoides* Sw. subsp.  
*parvispiculus* Hitchc., *Andropogon cacharoides* Sw. var.  
*parvispiculus* (Hitchc.) Standl., *Bothriochloa saccharoides*  
var. *parvispiculus* (Hitchc.) Tovar  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

*Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb. subsp. *saccharoides*  
Sinónimos: *Andropogon saccharoides* Sw., *Andropogon*  
*berteronianus* Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 10-740 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

### **Bouteloua**

*Bouteloua simplex* Lag.  
Sinónimos: *Chondrosium tenue* P. Beauv. ex Kunth,  
*Bouteloua tenuis* (P. Beauv. ex Kunth) Griseb., *Chondrosium*  
*humile* P. Beauv. ex Kunth, *Bouteloua tenuis* var. *humilis* (P.  
Beauv. ex Kunth) Griseb., *Bouteloua brachyanthera* Phil.,  
*Bouteloua rahmeri* Phil., *Bouteloua simplex* var. *rahmeri*

(Phil.) Henrard  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2700-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### **Brachypodium**

*Brachypodium distachyon* (L.) P. Beauv.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, JFE.

### **Briza**

*Briza maxima* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

*Briza minor* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

### **Bromelica**

*Bromelica cepacea* (Phil.) Nicora  
Sinónimos: *Festuca cepacea* Phil., *Melica cepacea* (Phil.)  
Scribn.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, ARA.  
Rango altitudinal: 1000-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Bromidium**

*Bromidium anomalum* (Trin.) Döll.  
Sinónimos: *Aira anomala* Trin., *Agrostis koelerioides*  
E. Desv., *Deyeuxia anomala* (Trin.) Benth. & Hook.f.,  
*Bromidium hygrometricum* (Nees) Nees & Meyen var.  
*anomalum* (Trin.) Kuntze, *Agrostis anomala* (Trin.) Herter,  
*Koeleria chilensis* Steud., nom. nud., *Didymochaeta*  
*chilensis* Steud.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 10-900 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

*Bromidium trisetoides* (Steud.) Rúgolo  
Sinónimos: *Agrostis trisetoides* Steud.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 25-300 m.

### **Bromus**

*Bromus araucanus* Phil.  
Sinónimos: *Bromus alpestris* Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, MAG.  
Rango altitudinal: 600-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Bromus berteroi* Colla  
Sinónimos: *Trisetum hirtum* Trin., *Avena villosula* Kunze  
ex E. Desv., *Trisetum barbartum* Steud., *Bromus trinii* E.  
Desv. var. *micranthera* E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var.  
*pallidiflora* E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var. *manicata* E.  
Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var. *stricta* E. Desv., *Bromus*  
*bicuspidis* Nees ex Steud., *Danthonia pseudo-spicata* Muell.,  
*Trisetum litorale* Phil., *Trisetum trinii* (E. Desv.) Louis-  
Marie var. *pallidiflorus* (E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum*  
*trinii* (E. Desv.) var. *manicatum* (E. Desv.) Louis-Marie,  
*Trisetum trinii* (E. Desv.) Louis-Marie var. *micrantherum*  
(E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii* (E. Desv.) Louis-  
Marie var. *strictum* (E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii*  
(E. Desv.) Louis-Marie var. *litorale* (Phil.) Louis-Marie,  
*Trisetobromus hirtus* (Trin.) Nevski  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO,  
MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, JFE.  
Rango altitudinal: 5-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

*Bromus burkartii* Muñoz  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ARA.  
Rango altitudinal: 1080-1490 m.

*Bromus catharticus* Vahl var. *catharticus*  
Sinónimos: *Bromus haenkeanus* (J. Presl) Kunth,  
*Ceratochloa haenkeana* J. Presl, *Bromus willdenowii* Kunth  
var. *haenkeanus*, *Bromus uniolooides* Kunth var. *haenkeanus*  
(J. Presl) Shear  
Hierba. Anual, bienal o perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,  
LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE,  
IPA.  
Rango altitudinal: 5-4550 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

*Bromus catharticus* Vahl var. *elatus* (E. Desv.) Planchuelo  
Sinónimos: *Bromus cebadilla* Steud., *Bromus stamineus* E.  
Desv., *Bromus valdivianus* Phil., *Bromus uniolooides* fma.  
*elatus* (E. Desv.) Allen & Thell. ex Kloos, *Ceratochloa*  
*valdiviana* (Phil.) Holub, *Ceratochloa staminea* (E. Desv.)  
Stace, *Bromus catharticus* subsp. *stamineus* (E. Desv.)  
Massa

Hierba. Anual, bienal o perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,  
NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 2-4680 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Lanco, cebadilla, pasto del perro.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Bromus coloratus*** Steud.

Sinónimos: *Bromus patagonicus* Phil., *Bromus uniolooides*  
Kunth var. *coloratus* (Steud.) Pilg., *Ceratochloa colorata*  
(Steud.) Holub  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 25-1490 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Bromus erectus*** Huds.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: BIO, MAG.

***Bromus guncckelii*** Matthei

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 3100-3740 m.

***Bromus hordeaceus*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Bromus lanatus*** Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 4100-4720 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Bromus lanceolatus*** Roth

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAU.

***Bromus lithobius*** Trin.

Sinónimos: *Bromus uniolooides* var. *humilis* E. Desv., *Bromus*  
*chilensis* Trin., *Bromus fonckii* Phil., *Bromus scaber* Phil.,  
*Bromus andinus* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LRI, LLA, AIS, JFE.  
Rango altitudinal: 2-1900 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Bromus madritensis*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, MAU, ARA.

***Bromus mango*** E. Desv.

Sinónimos: *Ceratochloa mango* (E. Desv.) Holub  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, ARA.  
Rango altitudinal: 349-1490 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Mango.

***Bromus pellitus*** Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 800-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Bromus racemosus*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: LLA, MAG.

***Bromus rigidus*** Roth

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

***Bromus scoparius*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, BIO.

***Bromus secalinus*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Bromus setifolius*** J. Presl var. *brevifolius* Nees

Sinónimos: *Bromus macranthos* Meyen, *Bromus*  
*macranthos* Meyen ex E. Desv. var. *macrantha*  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO,  
ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 15-3950 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Bromus setifolius*** J. Presl var. *pictus* (Hook.) Skottsb.

Sinónimos: *Bromus pictus* Hook.f., *Bromus macranthos* E.  
Desv. var. *minor* E. Desv., *Bromus setifolius* J. Presl var.  
*pictus* (Hook.f.) J.A. Cámara  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAG.  
Rango altitudinal: 15-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Bromus setifolius*** J. Presl var. *setifolius*

Sinónimos: *Bromus macranthos* Meyen var. *setifolius* (J.  
Presl) E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 80-3600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Bromus squarrosus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: RME, BIO, LLA.

***Bromus stamineus* E.Desv.**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LLA, MAG, JFE.

***Bromus sterilis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG.

***Bromus tectorum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: LBO, MAU, ARA, LLA.

***Bromus tunicatus* Phil.**

Sinónimos: *Bromus culmineus* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS,  
MAG.  
Rango altitudinal: 5-3600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Calotheca**

***Calotheca brizoides* (Lam.) Desv.**

Sinónimos: *Bromus brizoides* Lam., *Briza patula* Phil.,  
*Chascolytrum brizoides* (Lam.) Essi, Longhi-Wagner &  
Souza-Chies  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 10-350 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Catabrosa**

***Catabrosa aquatica* (L.) P. Beauv.**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAG.

***Catabrosa werdermannii* (Pilg.) Nicora & Rúgolo**

Sinónimos: *Phippsia werdermannii* Pilg., *Phippsia*  
*werdermannii* Pilg. fma. *minor* Pilg., *Phippsia werdermannii*  
Pilg. fma. *major* Pilg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1900-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

**Catapodium**

***Catapodium rigidum* (L.) C.E. Hubb.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI, LLA,  
MAG.

**Cenchrus**

***Cenchrus chilensis* (E. Desv.) Morrone**

Sinónimos: *Gymnotrix chilensis* E. Desv., *Pennisetum*  
*chilense* (E. Desv.) B.D. Jacks. ex R.R. Fr.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 430-3300 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Cenchrus clandestinus* (Hochst. ex Chiov.) Morrone**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, IPA.

***Cenchrus echinatus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, MAU, LRI, LLA, IPA.

***Cenchrus longisetus* M.C. Johnst.**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: RME.

***Cenchrus myosuroides* Kunth**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ATA, MAU.

***Cenchrus spinifex* Cav.**

Hierba. Anual o bienal. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA, MAU.  
Rango altitudinal: 50-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**Chascolytrum**

***Chascolytrum koelerioides* (Trin.) Essi, Longhi-Wagner &  
Souza-Chies**

Sinónimos: *Gymnachne koelerioides* (Trin.) Parodi,  
*Rhombolytrum berterioanum* E. Desv., *Poa tenuiculmis*  
Steud., *Gymnachne jaffuelii* Parodi, *Poa philippii* Steud.,  
*Poa koelerioides* Trin.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 5-1300 m.

***Chascolytrum rhomboideum*** (Link) L. Essi, Longhi-Wagner Souza Chies

Sinónimos: *Rhombolytrum rhomboideum* Link, *Poa tumidula* Steud., *Rhombolytrum quinquenervium* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 80-900 m.

***Chascolytrum subaristatum*** (Lam.) Desv.

Sinónimos: *Briza subaristata* Lam., *Calotheca stricta* Hook. & Arn., *Briza stricta* (Hook. & Arn.) Steud., *Briza violascens* Steud., *Briza berteroniana* Steud., *Festuca commersonii* Spreng., nom. illeg. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

### **Chloris**

***Chloris gayana*** Kunth

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

***Chloris radiata*** (L.) Sw.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP.

***Chloris virgata*** Sw.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 50-840 m.

### **Chusquea**

***Chusquea argentina*** Parodi

Sinónimos: *Chusquea culeou* E. Desv. fma. *longiramea* Parodi

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 440-440 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coligüe, Colihue.

***Chusquea ciliata*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 400-400 m.

***Chusquea culeou*** E. Desv.

Sinónimos: *Chusquea andina* Phil., *Chusquea breviglumis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2060 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coligüe, colihue.

***Chusquea cumingii*** Nees

Sinónimos: *Chusquea parvifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 5-1600 m.

Nombre vulgar: Coligüe, Colihue, quila, quila chica, colihue de la zona central.

***Chusquea fernandeziana*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 412-830 m.

Nombre vulgar: Colihue.

***Chusquea macrostachya*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 70-885 m.

Nombre vulgar: Quila, itihue, taihuén.

***Chusquea montana*** Phil. fma. *montana*

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 60-2280 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Quila enana, tihuén.

***Chusquea montana*** Phil. fma. *nigricans* (Phil.) Matthei

Sinónimos: *Chusquea nigricans* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI, LLA, AIS.

Nombre vulgar: Quila enana.

***Chusquea quila*** Kunth

Sinónimos: *Nastus prolifer* Desv., *Chusquea quila* var. *laxiflora* E. Desv., *C. parvifolia* Phil., *C. parviflora* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 5-1600 m.

Nombre vulgar: Quila.

***Chusquea uliginosa*** Phil.

Sinónimos: *Chusquea tenuiflora* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 5-1500 m.

Nombre vulgar: Quila chica, quila de los ñadis.



***Chusquea valdiviensis*** E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 10-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Quila, quila del sur, quila vutre.

**Coix**

***Coix lacryma-jobi*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: IPA.

**Cortaderia**

***Cortaderia araucana*** Stapf emend. Testoni & Villamil

Sinónimos: *Cortaderia araucana* Stapf, *Cortaderia araucana* Stapf var. *fuenzalidae* Acevedo, *Cortaderia araucana* Stapf var. *skottsbergii* Acevedo, *Cortaderia longicauda* Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 5-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cola de zorro.

***Cortaderia egmontiana*** (Roem. & Schult.) M. Lyle ex Connor

Sinónimos: *Arundo egmontiana* Roem. & Schult., *Calamagrostis patula* Steud., *Calamagrostis scirpiformis* Phil., *Cortaderia minima* Conert, *Cortaderia pilosa* (d'Urv.) Hack., *Cortaderia pilosa* (d'Urv.) Hack. var. *minima* (Conert) Nicora, *Poa phragmites* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cola de zorro.

***Cortaderia selloana*** (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. emend. Testoni & Villamil subsp. *jubata* (Lemoine) Testoni & Villamil

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cortadera.

***Cortaderia selloana*** (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. emend. Testoni & Villamil subsp. *selloana*

Sinónimos: *Arundo selloana* Schult. & Schult.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,

NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, IPA.

Rango altitudinal: 10-3550 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Cortadera.

Nota: Introducida en la Isla de Pascua.

***Cortaderia speciosa*** (Nees & Meyen) Stapf

Sinónimos: *Gynerium speciosum* Nees & Meyen, *Arundo quila* Mol., *Gynerium quila* (Mol.) Nees & Meyen, *Gynerium argenteum* Nees var. *parviflorum* E. Desv., *Gynerium argenteum* Nees var. *strictum* E. Desv., *Gynerium atacamense* Phil., *Cortaderia rudiuscula* Stapf, *Moorea speciosa* (Nees & Meyen) Stapf, *Cortaderia atacamensis* (Phil.) Pilg., *Cortaderia rudiuscula* Stapfma. emend. Acevedo

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, IPA.

Rango altitudinal: 3450 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Espural, espuro.

**Corynephorus**

***Corynephorus divaricatus*** (Pourr.) Breistr.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO.

**Cymbopogon**

***Cymbopogon citratus*** (DC.) Stapf

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR.

**Cynodon**

***Cynodon affinis*** Caro & E.A. Sánchez

Sinónimos: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *affinis* (Caro & E.A. Sánchez) Romero Zarco

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, RME, NUB.

Rango altitudinal: 10-900 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Cynodon dactylon*** (L.) Pers.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, IPA.

Nombre vulgar: Mati (Rapa Nui).

***Cynodon nitidus*** Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR.

## Cynosurus

### *Cynosurus cristatus* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, BIO, AIS, MAG.

### *Cynosurus echinatus* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

## Dactylis

### *Dactylis glomerata* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

## Danthonia

### *Danthonia araucana* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 10-930 m.

### *Danthonia californica* Boland. var. *americana* (Scribn.)

Hitchc.

Sinónimos: *Danthonia grandiflora* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 60-450 m.

### *Danthonia chilensis* E. Desv. var. *aureofulva* (E. Desv.)

C.M. Baeza

Sinónimos: *Danthonia aureofulva* E. Desv.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 5-630 m.

### *Danthonia chilensis* E. Desv. var. *chilensis*

Sinónimos: *Avena ariguensis* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 10-820 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Danthonia chilensis* E. Desv. var. *glabriflora* Nicora

Sinónimos: *Danthonia calva* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 25-480 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Danthonia decumbens* (L.) DC.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA.

### *Danthonia malacantha* (Steud.) Pilg.

Sinónimos: *Trisetum malacanthum* Steud., *Danthonia collina* Phil., *Danthonia octoflora* Phil., *Danthonia oresigena* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 5-1700 m.

## Deschampsia

### *Deschampsia airiformis* (Steud.) Benth. & Hook.f.

Sinónimos: *Trisetum airiforme* Steud., *Agrostis desvauxii* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, NUB, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 60-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Deschampsia antarctica* E. Desv.

Sinónimos: *Aira antarctica* Hook. fma. *hom. illeg.*, *Airidium elegantulum* Steud., *Deschampsia elegantula* (Steud.)

Parodi, *Deschampsia fueguina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, MAG.

Rango altitudinal: 10-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Deschampsia berteriana* (Kunth) Trin.

Sinónimos: *Trisetum berterianum* Kunth, *Aira berteriana* (Kunth) Steudel, *Monandrya berteriana* (Kunth) E. Desv., *Deschampsia berteriana* (Kunth) fma. *Meigen*, *Deschampsia berteriana* (Kunth) Trin. var. *parvispicula* Parodi

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 10-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Deschampsia caespitosa* (L.) P. Beauv. var. *caespitosa*

Sinónimos: *Aira caespitosa* L., *Deschampsia andina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-4200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

### *Deschampsia caespitosa* (L.) P. Beauv. var. *pulchra* (Nees & Meyen) Nicora

Sinónimos: *Deschampsia pulchra* Nees & Meyen, *Aira pulchra* (Nees & Meyen) Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 1600-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Deschampsia cordilleranum*** Hauman  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 3200-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Deschampsia danthonioides*** (Trin.) Munro  
Sinónimos: *Aira danthonioides* Trin.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, LBO.  
Rango altitudinal: 40-700 m.

***Deschampsia elongata*** (Hook.) Munro  
Sinónimos: *Aira elongata* Hook., *Aira aciphylla* Franch.,  
*Aira aciphylla* Franch. var. *pumila* Franch., *Deschampsia*  
*aciphylla* (Franch.) Speg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 10-2800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Deschampsia kingii*** (Hook.f.) E. Desv.  
Sinónimos: *Aira kingii* Hook.f., *Deschampsia kingii*  
(Hook.f.) Macloskie, *Aira elatior* Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Deschampsia laxa*** Phil.  
Sinónimos: *Calamagrostis hirthii* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 10-485 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Deschampsia looseriana*** Parodi var. *looseriana*  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 10-2475 m.

***Deschampsia looseriana*** Parodi var. *triandra* Parodi  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 500-500 m.

***Deschampsia micrantha*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.

Rango altitudinal: m.

***Deschampsia monandra*** Parodi  
Sinónimos: *Deschampsia glauca* (E. Desv.) Parodi, hom.  
illeg., *Monandriaria glauca* E. Desv.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, NUB, ARA.  
Rango altitudinal: 45-3500 m.

***Deschampsia parvula*** (Hook.f.) E. Desv.  
Sinónimos: *Aira parvula* Hook.f., *Trisetum parvulum*  
(Hook.f.) Speg., *Deschampsia parvula* (Hook.f.) Macloskie  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 20-1100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Deschampsia patula*** (Phil.) Pilg. ex Skottsbo.  
Sinónimos: *Monandriaria patula* Phil., *Deschampsia*  
*elegantula* (Steud.) Parodi var. *patula* (Phil.) Parodi  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 10-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Deschampsia setacea*** (Huds.) Hack.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME.

***Deschampsia venustula*** Parodi  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAU, MAG.  
Rango altitudinal: 900-3400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## **Deyeuxia**

***Deyeuxia breviaristata*** Wedd.  
Sinónimos: *Deyeuxia variegata* Phil., *Calamagrostis*  
*variegata* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, RME.  
Rango altitudinal: 3700-4810 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Pasto vicuña.

***Deyeuxia brevifolia*** J. Presl var. *brevifolia*  
Sinónimos: *Calamagrostis brevifolia* (J. Presl) Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3000-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Deyeuxia brevifolia*** J. Presl var. ***expansa*** Rúgolo & Villav.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 3200-3900 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Deyeuxia cabreræ*** (Parodi) Parodi var. ***aristulata*** Rúgolo & Villav.  
Sinónimos: *Calamagrostis cabreræ* Parodi var. *aristulata* (Rúgolo & Villav.) Soreng  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3200-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Deyeuxia cabreræ*** (Parodi) Parodi var. ***cabreræ***  
Sinónimos: *Calamagrostis cabreræ* Parodi  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 3600-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Deyeuxia cabreræ*** (Parodi) Parodi var. ***trichopoda*** Parodi ex Rúgolo  
Sinónimos: *Calamagrostis cabreræ* Parodi var. *trichopoda* (Rúgolo) Soreng  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3700-4570 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Deyeuxia chrysantha*** J. Presl var. ***chrysantha***  
Sinónimos: *Calamagrostis nitida* Hack.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.  
Rango altitudinal: 3500-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Sora.

***Deyeuxia chrysantha*** J. Presl var. ***phalaroides*** (Wedd.) Villav.  
Sinónimos: *Deyeuxia phalaroides* Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4100-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Deyeuxia chrysophylla*** Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3800-5300 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Deyeuxia chrysostachya*** E. Desv.  
Sinónimos: *Deyeuxia chrysostachya* E. Desv. var. *B* E. Desv., *Calamagrostis chrysostachya* (E. Desv.) Kuntze, *Calamagrostis chrysostachya* (E. Desv.) Hack., *Calamagrostis chrysostachya* (E. Desv.) V.N. Vassil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 3000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Deyeuxia crispa*** Rúgolo & Villav.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4400-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Paja viscachera.

***Deyeuxia curvula*** Wedd.  
Sinónimos: *Deyeuxia tenuifolia* Phil., *Calamagrostis tenuifolia* (Phil.) R.E. Fr., *Calamagrostis curvula* (Wedd.) Pilg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2600-4900 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Pasto vicuña.

***Deyeuxia deserticola*** Phil. var. ***breviaristata*** Rúgolo & Villav.  
Sinónimos: *Calamagrostis deserticola* (Phil.) Phil. var. *breviaristata* (Rúgolo & Villav.) Soreng  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 4300-4950 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Deyeuxia deserticola*** Phil. var. ***deserticola***  
Sinónimos: *Calamagrostis deserticola* (Phil.) Phil., *Agrostis canescens* Griseb., *Deyeuxia trisetoides* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 2800-4900 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Deyeuxia diemii*** Rúgolo  
Sinónimos: *Calamagrostis diemii* (Rúgolo) Soreng  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 1250-1950 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Deyeuxia eminens*** J. Presl var. ***discreta*** Rúgolo & Villav.  
Sinónimos: *Deyeuxia leiopoda* Wedd. var. *discreta* Wedd., *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *discreta*

(Rúgolo & Villav.) Soreng  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 3680-4000 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Deyeuxia eminens*** J. Presl var. ***eminens***

Sinónimos: *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud.,  
*Deyeuxia robusta* Phil., *Agrostis eminens* (J. Presl) Griseb.,  
*Deyeuxia elegans* Wedd., *Deyeuxia polystachya* Wedd.,  
*Deyeuxia arundinacea* Phil., *Calamagrostis robusta* (Phil.)  
Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 3000-4730 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Pasto huaila, huaya, chillagua, chillagua  
blanda, iru, guaia, sora-sora.

***Deyeuxia eminens*** J. Presl var. ***fulva*** (Griseb.) Rúgolo  
Sinónimos: *Deyeuxia laxiflora* Phil., *Calamagrostis*  
*eminens* (J. Presl) Steud. var. *fulva* (Griseb.) Soreng  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.  
Rango altitudinal: 3200-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Pasto de vega, cebadilla de vicuña.

***Deyeuxia erythrostachya*** E. Desv. var. ***erythrostachya***  
Sinónimos: *Aira gayana* Steud., *Calamagrostis*  
*erythrostachya* (E. Desv.) Hack., *Stylagrostis*  
*erythrostachya* (E. Desv.) Mez, *Calamagrostis stipitata*  
Hitc., *Calamagrostis gayana* (Steud.) Soreng  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 550-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Deyeuxia erythrostachya*** E. Desv. var. ***neuquenensis***  
Rúgolo  
Sinónimos: *Calamagrostis gayana* (Steud.) Soreng var.  
*neuquenensis* (Rúgolo) Soreng  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 2200-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Deyeuxia filifolia*** Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 2500-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Deyeuxia hackelii*** (Lillo) Parodi  
Sinónimos: *Calamagrostis hackelii* Lillo  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 3900-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Deyeuxia heterophylla*** Wedd.  
Sinónimos: *Calamagrostis heterophylla* (Wedd.) Pilg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 3520-4150 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Cebadilla.

***Deyeuxia patagonica*** Speg.  
Sinónimos: *Calamagrostis patagonica* (Speg.) Macloskie  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA.  
Rango altitudinal: 1500-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Deyeuxia poaeoides*** (Steud.) Rúgolo  
Sinónimos: *Calamagrostis poaeoides* (Steud.) Hack.,  
*Calamagrostis fuegiana* Speg., *Calamagrostis magellanica*  
Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Deyeuxia rigescens*** (J. Presl) Túrpe  
Sinónimos: *Agrostis rigescens* J. Presl  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA.  
Rango altitudinal: 3500-4340 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Deyeuxia rigida*** Kunth  
Sinónimos: *Calamagrostis gusindei* Pilg. ex Skottsbo.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 15-4680 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Deyeuxia spicigera*** J. Presl var. ***cephalotes*** (Wedd.) Rúgolo  
& Villav.  
Sinónimos: *Deyeuxia cephalotes* Wedd., *Calamagrostis*  
*spicigera* (J. Presl) Steud. var. *cephalotes* (Wedd.) Soreng  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 3750-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.



***Deyeuxia spicigera*** J. Presl var. *spicigera*

Sinónimos: *Calamagrostis spicigera* (J. Presl.) Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 3600-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Deyeuxia suka*** (Speg.) Parodi

Sinónimos: *Calamagrostis suka* Speg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-785 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Deyeuxia velutina*** Nees & Meyen var. *nardifolia* (Griseb.)

Rúgolo  
Sinónimos: *Agrostis nardifolia* Griseb., *Deyeuxia nardifolia* (Griseb.) Phil., *Calamagrostis nardifolia* (Griseb.) Hack.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 3800-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Deyeuxia velutina*** Nees & Meyen var. *velutina*

Sinónimos: *Calamagrostis velutina* (Nees & Meyen) Steud., *Deyeuxia chilensis* E. Desv., *Deyeuxia agrostidea* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, LLA.  
Rango altitudinal: 2300-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Deyeuxia vicunarum*** Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 3500-4860 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Deyeuxia viridiflavescens*** (Poir.) Kunth var. *montevidensis*

(Nees) Cabrera & Rúgolo  
Sinónimos: *Calamagrostis montevidensis* Nees  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, LRI.  
Rango altitudinal: 5-2300 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Deyeuxia viridiflavescens*** (Poir.) Kunth var. *viridiflavescens*

Sinónimos: *Arundo viridiflavescens* Poir.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, LRI.  
Rango altitudinal: 10-200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Deyeuxia viridis*** Phil.

Sinónimos: *Calamagrostis nemoralis* Phil., *Calamagrostis*

*nemoralis* Phil. ex Kuntze, *Deyeuxia nemoralis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, LRI, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 10-820 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Dichanthelium**

***Dichanthelium sabulorum*** (Lam.) Gould & Clark var. *polycladum* (E. Ekman) Zuloaga

Sinónimos: *Panicum polycladum* E. Ekman, *Panicum pencanum* Phil., *Panicum sabulorum* var. *polycladum* (E. Ekman) Palacios ex Burkart  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO.  
Rango altitudinal: 10-10 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Dichanthelium sabulorum*** (Lam.) Gould & Clark var. *sabulorum*

Sinónimos: *Panicum sabulorum* Lam., *Panicum acutatum* Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 10-1460 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Dichelachne**

***Dichelachne crinita*** (L.f.) Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: IPA.

***Dichelachne micrantha*** (Cav.) Domin

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: IPA.

**Dielsiochloa**

***Dielsiochloa floribunda*** (Pilg.) Pilg.

Sinónimos: *Trisetum floribundum* Pilg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4240-5250 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**Digitaria**

***Digitaria aequiglumis*** (Hack. & Arechav.) Parodi

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

***Digitaria ciliaris*** (Retz.) Koeler

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: IPA.  
Países limítrofes: Argentina.

***Digitaria ischaemum*** (Schreb.) Muhl.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: BIO, LLA.

***Digitaria sanguinalis*** (L.) Scop.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Digitaria setigera*** Roth ex Roemer et Schultes  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: IPA.

***Digitaria violascens*** Link  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, IPA.

### **Diplachne**

***Diplachne fusca*** (L.) Kunth subsp. *uninervia* (J. Presl) P.M.  
Peterson & N. Snow  
Sinónimos: *Megastachya uninervia* J. Presl, *Poa uninervia*  
(J. Presl) Kunth, *Diplachne verticillata* Nees & Meyen,  
*Uralepis verticillata* (Nees & Meyen) Steud, *Eragrostis*  
*uninervia* (J. Presl) Steud., *Brizopyrum uninervium* (J.  
Presl) E. Fourn., *Diplachne tarapacana* Phil., *Leptochloa*  
*uninervia* (J. Presl.) Hitchc. & Chase, *Diplachne uninervia*  
(J. Presl.) Parodi, *Diplachne fusca* var. *uninervia* (J. Presl.)  
P.M. Peterson & N. Snow., *Leptochloa fusca* (L.) Kunth  
subsp. *uninervia* (J. Presl.) N.W. Snow  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 20-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### **Distichlis**

***Distichlis humilis*** Phil.  
Sinónimos: *Distichlis misera* Phil., *Distichlis spicata* (L.)  
Greene var. *humilis* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 2310-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Distichlis scoparia*** (Nees ex Kunth) Arechav.  
Sinónimos: *Poa scoparia* Nees ex Kunth, *Uniola scoparia*  
(Nees ex Kunth) Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,  
BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 5-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Distichlis spicata*** (L.) Greene  
Sinónimos: *Distichlis maritima* Rafma., *Distichlis*  
*deserticola* Phil., *Distichlis hirsuta* Phil., *Distichlis*  
*mendocina* Phil., *Distichlis hirta* Phil., *Distichlis spicata* var.  
*andina* Beetle, *Distichlis spicata* var. *stricta* (Torr.) Scribn.,  
*Uniola stricta* Torr.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,  
MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 5-3800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### **Echinochloa**

***Echinochloa colona*** (L.) Link  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, JFE.

***Echinochloa crusgalli*** (L.) P.Beauv. var. *crusgalli*  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LRI.

***Echinochloa crusgalli*** (L.) P.Beauv. var. *mitis* (Pursh)  
Petersen.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LRI, LLA.

***Echinochloa crusgalli*** (L.) P.Beauv. var. *zelayensis* (Kunt)  
Hitchc.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: MAU.

***Echinochloa crus-pavonis*** (Kunth) Schult.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, RME, MAU, NUB,  
BIO, ARA.

### **Ehrharta**

***Ehrharta longiflora*** Sm.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 50-100 m.

***Ehrharta stipoides*** Labill.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.

## Eleusine

*Eleusine indica* (L.) Gaertn.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: IPA.

*Eleusine tristachya* (Lam.) Lam.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, MAU, BIO, ARA,  
LRI, LLA, JFE.

## Elymus

*Elymus angulatus* J. Presl  
Sinónimos: *Elymus agropyroides* J. Presl, *Elymus andinus* Poepp. ex Trin., *Elymus antarcticus* Hook.f. var. *fulvescens* Kurtz, *Elymus valdiviae* Steud., *Elymus asper* Nees ex Steud., *Elymus chonoticus* Phil., *Elymus corralensis* Phil., *Elymus gayanus* E. Desv., *Elymus gracilis* Phil., *Elymus latiglumis* Phil., *Elymus muticus* Phil., *Elymus oreophilus* Phil., *Elymus palenae* Phil., *Elymus paposanus* Phil., *Elymus pratensis* Phil., *Elymus rigescens* Poepp. ex Trin., *Elymus uniflorus* Phil., *Elymus vaginatus* Phil., *Hordeum valdiviae* (Steud.) Schenck  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,  
NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-2800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

*Elymus magellanicus* (E. Desv.) A. Löve  
Sinónimos: *Triticum repens* L. var. *magellanicum* E. Desv., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack., *Triticum pubiflorum* Steud., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *pubiflorum* (Steud.) Speg., *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *pubiflorum* (Steud.) Hauman & Vanderv., *Agropyron pubiflorum* (Steud.) Parodi, *Elytrigia pubiflora* (Steud.) Tzvelev, *Elymus glaucescens* Seberg, *Agropyron antarcticum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *brachyatherum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *polystachyum* Parodi, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) Parodi var. *fragile* Parodi  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 10-1400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Elymus patagonicus* Speg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS.  
Países limítrofes: Argentina.

*Elymus repens* (L.) Gould  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: RME, ARA, LLA, MAG.

*Elymus scabriglumis* (Hack.) A. Löve  
Sinónimos: *Agropyron repens* P. Beauv. var. *scabriglume* Hack.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 100-3300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## Elytrigia

*Elytrigia repens* (L.) Nevski  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: RME, ARA, LRI, MAG.

## Enneapogon

*Enneapogon desvauxii* P. Beauv.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2000-2580 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## Eragrostis

*Eragrostis atrovirens* (Desf.) Trin. ex Steud.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.

*Eragrostis attenuata* Hitchc.  
Sinónimos: *Sporobolus scaber* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 610-610 m.  
Países limítrofes: Perú.

*Eragrostis curvula* (Schrad.) Nees  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: BIO, MAG.

*Eragrostis kuschelii* Skottsbo.  
Sinónimos: *Eragrostis peruviana* var. *macranthera* Skottsbo.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: IDE.  
Rango altitudinal: 5-100 m.

*Eragrostis mexicana* (Hornem.) Link subsp. *virescens* (J. Presl) S.D. Koch & Sánchez Vega  
Sinónimos: *Eragrostis virescens* J. Presl, *Poa virescens* (Presl) Kunth, *Eragrostis chilensis* (Moris) Nees, *Poa*

*chilensis* Moris, *Eragrostis scabra* Phil., *Eragrostis rahmeri* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 20-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Eragrostis nigricans*** (Kunth) Steud. var. *nigricans*

Sinónimos: *Poa nigricans* Kunth, *Eragrostis subatra* Jedwabn., *Eragrostis tristis* Jebwabn., *Eragrostis nigricans* Jebwabn. var. *tristis*

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2600-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Eragrostis nigricans*** (Kunth) Steud. var. *punensis* Nicora

Sinónimos: *Eragrostis mexicana* (Hornem.) Link subsp. *mexicana*

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, ANT, VAL.

Rango altitudinal: 2950-3800 m.

***Eragrostis peruviana*** (Jacq.) Trin.

Sinónimos: *Eragrostis deserticola* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, ANT, IDE.

Rango altitudinal: 500-3460 m.

Países limítrofes: Perú.

***Eragrostis pilosa*** (L.) P. Beauv.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, RME, MAU, MAG.

***Eragrostis polytricha*** Nees

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 10-1000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Eragrostis pycnantha*** (Phil.) Nicora

Sinónimos: *Poa pycnantha* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 140-140 m.

***Eragrostis tenuifolia*** (A. Rich.) Hochst. ex Steud.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: IPA.

***Eragrostis weberbaueri*** Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2100-3700 m.

Países limítrofes: Perú.

## **Eremium**

***Eremium erianthum*** (Phil.) Seberg & Linde-Laursen

Sinónimos: *Elymus erianthus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1800-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

## **Eriochloa**

***Eriochloa montevidensis*** Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 50-840 m.

Países limítrofes: Argentina.

## **Festuca**

***Festuca acanthophylla*** E. Desv. var. *acanthophylla*

Sinónimos: *Festuca tunicata* E. Desv., *Festuca coiron* Steud., *Festuca berteroniana* Steud., *Festuca robusta* Phil., *Festuca thermarum* Phil., *Festuca desvauxii* Phil., *Festuca acuta* Phil., *Festuca desvauxii* Phil. var. *ampla* St.-Yves, *Festuca barrazae* Muñoz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: (50)900-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Festuca acanthophylla*** E. Desv. var. *scabriuscula* (Phil.)

J.C. Ospina, Aliscioni & S. Denham

Sinónimos: *Festuca scabriuscula* Phil., *Festuca robusta* Phil. var. *scabriuscula* (Phil.) St.-Yves, *Festuca asperata* Phil., *Festuca pascua* Phil., *Festuca steudelii* Phil., *Festuca morenensis* Matthei

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, RME, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 700-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Festuca argentina*** (Speg.) Parodi

Sinónimos: *Poa argentina* Speg., *Festuca cavallieri* St.-Yves

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 50-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Festuca arundinacea*** Schreb.

Sinónimos: *Festuca orthophylla* Pilg.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,  
MAU, NUB, BIO, LLA, JFE.

***Festuca chrysophylla*** Phil.

Sinónimos: *Festuca deserticola* Phil. var. *chrysophylla*  
(Phil.) St.-Yves, *Festuca deserticola* Phil. var. *juncea* St.-  
Yves, *Festuca juncea* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3200-4860 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Festuca cirrosa*** (Speg.) Parodi

Sinónimos: *Festuca erecta* d'Urv. var. *cirrosa* Speg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 5-175 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Festuca contracta*** Kirk

Sinónimos: *Festuca erecta* d'Urv., hom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 200-1050 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Festuca gracillima*** Hook.f. var. *glacialis* Rúgolo & Nicora

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 5-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Festuca gracillima*** Hook.f. var. *gracillima*

Sinónimos: *Festuca gracillima* Hook. var. *brevifolia* Speg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Festuca hypsophylla*** Phil.

Sinónimos: *Festuca deserticola* Phil. var. *hypsophylla*  
(Phil.) St.-Yves  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3200-4800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Festuca juncifolia*** St.-Amans

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAG.

***Festuca kurtziana*** St.-Yves

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, RME, MAU.

Rango altitudinal: 1630-2740 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Festuca magellanica*** Lam.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, LLA,  
AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-3300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Festuca monticola*** Phil.

Sinónimos: *Festuca gracillima* Hook. var. *monticola* (Phil.)  
St.-Yves, *Festuca subandina* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 5-1550 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Festuca ovina*** L. subsp. *tenuifolia* (Sibth.) Celak.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAG.

***Festuca pallescens*** (St.-Yves) Parodi

Sinónimos: *Festuca gracillima* Hook. var. *pallescens* St.-  
Yves  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 15-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Festuca panda*** Sw.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, COQ.  
Rango altitudinal: 2900-3400 m.

***Festuca purpurascens*** Banks & Sol. ex Hook.f.

Sinónimos: *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook.  
var. *submutica* E. Desv., *Festuca purpurascens* Banks  
& Sol. ex Hook. var. *aristata* E. Desv., *Festuca insularis*  
Steud., *Festuca lechleriana* Steud., *Festuca platyphylla*  
Steud., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook.  
var. *platyphylla* (Steud.) St.-Yves, *Festuca laxiflora* Phil.,  
hom. illeg., *Festuca dumetorum* Phil., hom. illeg., *Festuca*  
*trachylepis* Hack. ex Druce, *Festuca philippii* Becherer,  
nom. illeg., *Festuca davilae* Phil., *Festuca glaucophylla*  
Phil., *Festuca serranoi* Phil., *Festuca purpurascens*  
Banks & Sol. ex Hook.f. fma. *aristata* St.-Yves, *Festuca*  
*purpurascens* Banks & Sol. ex Hook.f. fma. *scabriuscula*  
St.-Yves  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,  
AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.



***Festuca pyrogea* Speg.**

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 100-1100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Festuca rigescens* (J. Presl) Kunth**

Sinónimos: *Diplachne rigescens* Presl, *Festuca deserticola* Phil., *Festuca paupera* Phil., *Festuca deserticola* Phil. var. *paupera* (Phil.) St.-Yves  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.  
Rango altitudinal: 2500-4800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Festuca rubra* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, AIS, MAG.

***Festuca subantarctica* Parodi**

Sinónimos: *Festuca commersonii* Franch., hom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 5-175 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Festuca werdermannii* St.-Yves**

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2800-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Gastridium**

***Gastridium phleoides* (Nees & Meyen) C.E. Hubb.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

***Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz & Thell.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: IPA, JFE.

**Glyceria**

***Glyceria fluitans* (L.) R. Br.**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI, MAG.

***Glyceria multiflora* Steud.**

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-760 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

**Gynerium**

***Gynerium sagittatum* (Aubl.) P. Beauv.**

Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.  
Distribución: TAR.

**Hainardia**

***Hainardia cylindrica* (Willd.) Greuter**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, NUB, BIO.

**Helictotrichon**

***Helictotrichon bulbosum* (Hitchc.) Parodi**

Sinónimos: *Trisetum bulbosum* Hitchc.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO.  
Países limítrofes: Argentina.

**Holcus**

***Holcus lanatus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

**Hordeum**

***Hordeum brachyatherum* Phil.**

Sinónimos: *Critesion brachyatherum* (Phil.) A. Löve  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, MAU, MAG.  
Rango altitudinal: 2-50 m.

***Hordeum chilense* Roem. & Schult.**

Sinónimos: *Critesion chilense* (Roem. & Schult.) A. Löve, *Hordeum chilense* Brongn., nom. illeg., *Hordeum secalinum* Schreb. var. *chilense* (Brongn.) E. Desv., *Hordeum pratense* Huds. var. *chilense* (Brongn.) Macloskie, *Hordeum pratense* Huds. var. *brongniartii* Macloskie, *Hordeum cylindricum* Steud., *Hordeum depauperatum* Steud., *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var. *pseudosecalinum* Hauman, *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var. *pilosum* Nevski  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 5-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Hordeum comosum*** J. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Hordeum fuegianum*** Bothmer, N. Jacobsen & R.R. Jorg.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 10-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hordeum hystrix*** Roth

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB.

***Hordeum jubatum*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAG.

***Hordeum lechleri*** (Steud.) Schenck

Sinónimos: *Critesion lechleri* (Steud.) A. Löve, *Elymus lechleri* Steud  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 10-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hordeum marinum*** Huds. subsp. *gussoneanum* (Parl.)

Thell.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

***Hordeum marinum*** Huds. subsp. *marinum*

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Hordeum murinum*** L. subsp. *leporinum* (Link.) Arcang.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, BIO.

***Hordeum murinum*** L. subsp. *murinum*

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Hordeum muticum*** J. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, RME, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 460-4040 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Hordeum parodii*** Covas

Sinónimos: *Critesion parodii* (Covas) A. Löve  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 10-200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hordeum patagonicum*** (Hauman) Covas subsp.

***magellanicum*** (Parodi & Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen  
Sinónimos: *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var. *magellanicum* Parodi & Nicora, *Critesion magellanicum* (Parodi & Nicora) A. Löve  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, RME, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 150-700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hordeum patagonicum*** (Hauman) Covas subsp.

***santacrucense*** (Parodi & Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen  
Sinónimos: *Hordeum santacrucense* (Parodi & Nicora), *Critesion santacrucense* (Parodi & Nicora) Á. Löve  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hordeum pubiflorum*** Hook.f. subsp. *halophilum* (Griseb.)

Baden & Bothmer  
Sinónimos: *Hordeum halophilum* Griseb., *Hordeum jubatum* L. fma. *versicolor* Kuntze, *Hordeum jubatum* L. fma. *violaceum* Kuntze, *Hordeum jubatum* fma. *viride* Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, LBO, BIO, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 20-4170 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Hordeum pubiflorum*** Hook.f. subsp. *pubiflorum*

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAU, BIO, MAG.  
Rango altitudinal: 15-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hordeum vulgare*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, RME, BIO, ARA.

**Imperata**

***Imperata brasiliensis*** Trin.

Sinónimos: *Imperata arundinacea* Cirillo var. *americana*

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Paja colorada.

***Imperata condensata*** Steud.  
Sinónimos: *Imperata arundinacea* Cirillo var. *condensata* (Steud.) Hack., *Imperata cylindrica* (L.) Raeusch. var. *condensata* (Steud.) Hack.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 10-2233 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: maicillo.

***Imperata parodii*** Acevedo  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ARA.

### Jarava

***Jarava annua*** (Mez) Peñail.  
Sinónimos: *Stipa annua* Mez  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 100-3700 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Jarava ichu*** Ruiz & Pav. var. *pungens* (Nees & Meyen) Ciald.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4040-4040 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Jarava leptostachya*** (Griseb.) F. Rojas  
Sinónimos: *Stipa leptostachya* Griseb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3300-4040 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Paja amarilla.

***Jarava neaei*** (Nees ex Steud.) Peñail.  
Sinónimos: *Stipa neaei* Nees ex Steud., *Stipa bella* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, RME, MAU, AIS.  
Rango altitudinal: 1000-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Jarava plumosa*** (Spreng.) S.W.L. Jacobs & Everett  
Sinónimos: *Calamagrostis plumosa* Spreng., *Stipa tenuiflora* Phil., *Stipa papposa* Nees, nom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 5-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Jarava plumosula*** (Nees ex Steud.) F. Rojas  
Sinónimos: *Stipa plumosula* Nees ex Steud., *Stipa plumosa* Trin.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 10-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Jarava pogonathera*** (E. Desv.) Peñail.  
Sinónimos: *Stipa pogonathera* E. Desv., *Stipa buchtienii* Hack.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.  
Rango altitudinal: 720-3700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Jarava psylantha*** (Speg.) Peñail.  
Sinónimos: *Stipa psylantha* Speg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 150-300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Jarava pungionata*** (Caro & E.A. Sánchez) Matthei  
Sinónimos: *Stipa pungionata* Caro & E.A. Sánchez  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3725-4150 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Jarava scabrifolia*** (Torres) Peñail.  
Sinónimos: *Stipa scabrifolia* Torres, *Jarava mattheii* F. Rojas  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 4000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Jarava subaristata*** (Matthei) Matthei  
Sinónimos: *Stipa leptostachya* Griseb. var. *subaristata* Matthei, *Stipa subaristata* (Matthei) Caro & E.A. Sánchez  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 1870-4040 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Jarava tortuosa*** (E. Desv.) Peñail.  
Sinónimos: *Stipa tortuosa* E. Desv.  
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 10-900 m.

### **Koeleria**

*Koeleria fueguina* Calderón ex Nicora  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 400-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Koeleria kurtzii* Hack. emend. A.M. Molina  
Sinónimos: *Trisetum subaristatum* E. Desv.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, RME, MAU, MAG.  
Rango altitudinal: 3400-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### **Lachnagrostis**

*Lachnagrostis filiformis* (G. Forst.) Trin.  
Sinónimos: *Agrostis avenacea* J.F. Gmel.  
Hierba. Anual o perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, MAU, LLA, IPA.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Tuere heu (Rapa Nui).  
Nota: Introducida en el continente: regiones de Valparaíso, Maule y Los Lagos.

### **Lagurus**

*Lagurus ovatus* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG.

### **Lamarckia**

*Lamarckia aurea* (L.) Moench  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

### **Leptophyllochloa**

*Leptophyllochloa micrathera* (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora  
Sinónimos: *Trisetum micratherum* E. Desv., *Koeleria micrathera* (E. Desv.) Griseb., *Koeleria philippiana* E. Desv., *Trisetum depauperatum* Phil., *Trisetum brachyatherum* Phil., *Trisetum laxiflorum* Phil., *Trisetum laxum* Phil., *Trisetum nemorosum* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.  
Rango altitudinal: 25-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

### **Lepturus**

*Lepturus repens* (G. Forst.) R. Br.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: IPA.

### **Leymus**

*Leymus arenarius* (L.) Hochst.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, MAG.

### **Lolium**

*Lolium multiflorum* Lam.  
Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

### *Lolium perenne* L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

### *Lolium rigidum* Gaudin

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LRI, MAG.

### *Lolium temulentum* L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI, LLA.

### **Megalachne**

### *Megalachne berteroniana* Steud.

Sinónimos: *Bromus megalachne* Pilg., *Pantathera fernandeziana* Phil., *Bromus fernandezianus* Phil., *Pantathera avenacea* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 180-670 m.

### *Megalachne masafuerana* (Skotts. & Pilg.) Matthei

Sinónimos: *Bromus masafueranus* Skotts. & Pilg.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 320-1100 m.

***Megalachne robinsoniana*** C. Peña

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 300-400 m.

**Megathyrsus**

***Megathyrsus maximus*** (Jacq.) B. K. Simon & S. W. L.

Jacobs var. *pubiglumis* (K. Schum.) B. K. Simon & S. W. L. Jacobs

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

**Melica**

***Melica argentata*** E. Desv.

Sinónimos: *Melica glabra* Steud., *Melica ampla* Phil., *Melica nitida* Phil., *Melica tortuosa* Phil., *Melica argentata* var. *breviglumis* Papp, *Melica violacea* var. *argentata* Papp

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 15-2200 m.

***Melica commersonii*** Nees ex Steud.

Sinónimos: *Melica commutata* Steud., *Melica violacea* Cav. var. *pallida* E. Desv., *Melica violacea* Cav. var. *commersonii* (Nees ex Steud.) Papp, *Melica violacea* Cav.

var. *commutata* (Steud.) Papp

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 15-1900 m.

***Melica longiflora*** Steud.

Sinónimos: *Melica flava* Nees ex Steud., *Melica laxiflora* E. Desv., *Melica laxiflora* E. Desv. var. *hirsuta* E. Desv., *Melica hirta* Phil., *Melica exaltata* Phil., *Melica berteriana* Phil., *Melica berteriana* fma. *violacea* Papp,

*Melica berteriana* Phil. var. *exaltata* (Phil.) Papp, *Melica berteriana* Phil. var. *pilosula* Papp, *Melica flava* Nees ex Steud. var. *violacea* Papp, *Melica laxiflora* E. Desv. var.

*glabra* Papp, *Melica laxiflora* E. Desv. var. *hirta* Papp, *Melica laxiflora* E. Desv. var. *pilosula* Papp, *Melica laxiflora* fma. *hirta* (Phil.) Hempel

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 20-1300 m.

***Melica mollis*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 340 m.

***Melica paulsenii*** Phil.

Sinónimos: *Melica littoralis* Phil. var. *paulsenii* (Phil.)

Papp, *Melica littoralis* Phil. var. *werdermannii* Papp

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 50-700 m.

***Melica poecilantha*** E. Desv.

Sinónimos: *Melica poecilantha* E. Desv. var. *umbrosa* E. Desv.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 500-1200 m.

***Melica violacea*** Cav.

Sinónimos: *Melica alata* Nees ex Steud., *Melica filiculmis* E. Desv., *Melica valdiviana* Phil., *Melica alata* Nees ex Steud. var. *filiculmis* (E. Desv.) Papp, *Melica alata* Nees ex Steud. var. *mollis* Papp, *Melica violacea* Cav. fma. *mollis*

(Papp) Hempel

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 5-2000 m.

**Melinis**

***Melinis minutiflora*** P. Beauv.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

***Melinis repens*** (Willd.) Zizka

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

**Microchloa**

***Microchloa indica*** (L. f.) P. Beauv.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP.

***Microchloa kunthii*** Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3220-3220 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**Miscanthus**

***Miscanthus sinensis*** Andersson

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAU.



## Muhlenbergia

***Muhlenbergia asperifolia*** (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi  
Sinónimos: *Vilfa asperifolia* Nees & Meyen ex Trin.,  
*Sporobolus copiapius* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 100-4700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Muhlenbergia fastigiata*** (J. Presl) Henrard

Sinónimos: *Sporobolus fastigiatus* J. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3300-4300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Muhlenbergia peruviana*** (P. Beauv.) Steud.

Sinónimos: *Clomena peruviana* P. Beauv.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, MAU.

Rango altitudinal: 2250-4040 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## Munroa

***Munroa andina*** Phil.

Sinónimos: *Hemimunroa andina* (Phil.) Parodi, *Munroa multiflora* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2700-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Munroa argentina*** Griseb.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 2820-3800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Munroa decumbens*** Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, ANT.

Rango altitudinal: 2850-3660 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## Nassella

***Nassella arcuata*** (R.E. Fr.) Torres

Sinónimos: *Stipa arcuata* R.E. Fr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 400-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Nassella asplundii*** Hitchc.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3600-4000 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Nassella barbinodis*** (Phil.) Muñoz-Schick, Ciald. & Morrone

Sinónimos: *Stipa barbinodis* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 60-280 m.

***Nassella caespitosa*** Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 4120-4120 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Nassella chilensis*** (Trin.) E. Desv. var. *chilensis*

Sinónimos: *Urachne chilensis* Trin., *Piptatherum ligleyanum* Nees, *Urachne major* Trin. & Rupr., *Nassella major* (Trin. & Rupr.) E. Desv., *Nassella ramosa* E. Desv., *Nassella sadae* Phil., *Nassella landbeckii* Phil., *Nassella landbackii* Phil. var. *eremophila* Phil., *Nassella laxiflora* Phil., *Nassella planifolia* Phil., *Nassella floribunda* Phil., *Nassella obscura* fma. Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 2700-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coirón, Coironcillo, Nudillo.

***Nassella chilensis*** (Trin.) E. Desv. var. *juncea* (Phil.)

Muñoz-Schick

Sinónimos: *Nassella juncea* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME, LBO, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 20-925 m.

***Nassella coquimbensis*** (Matthei) Peñail.

Sinónimos: *Stipa coquimbensis* Matthei

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 60-350 m.

***Nassella duriuscula*** (Phil.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa duriuscula* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 15-1000 m.

***Nassella elata*** (Speg.) Torres

Sinónimos: *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg. var. *elata* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2200-3000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Nassella filiculmis*** (Delile) Barkworth

Sinónimos: *Stipa filiculmis* Delile, *Stipa leucogluma* Steud.,

*Stipa trichocaulos* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 5-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Nassella gibba*** (Phil.) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Piptochaetium gibbum* Phil., *Nassella exserta*

Phil. var. *asperata* Parodi

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 15-1000 m.

***Nassella gigantea*** (Steud.) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Urachne gigantea* Steud., *Nassella exserta*

Phil., *Nassella fuscescens* Phil., *Nassella melanocarpa* Phil.,

*Nassella pugae* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 5-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Nassella hirtifolia*** (Hitche.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa hirtifolia* Hitche.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 20-1650 m.

***Nassella lachnophylla*** (Trin.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa lachnophylla* Trin., *Stipa cumingiana* var.

*lachnophylla* (Trin.) Trin. & Rupr., *Stipa cumingiana* Trin.,

*Stipa laxa* E. Desv., *Stipa leiocarpa* Nees ex Steud., *Stipa*

*hirta* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA.

Rango altitudinal: 10-1000 m.

***Nassella laevissima*** (Phil.) Barkworth

Sinónimos: *Piptochaetium laevissimum* Phil., *Stipa*

*laevissima* (Phil.) Speg., *Nassella longearistata* Phil.,

*Piptochaetium collinum* Phil., *Stipa breviculmis* Hitche.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 5-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Nassella longiglumis*** (Phil.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa longiglumis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 60-700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Nassella macrathera*** (Phil.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa macrathera* Phil., *Stipa fernandeziana*

Phil., hom. illeg. non Steud. 1854, *Stipa rudolphii* Speg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,

JFE.

Rango altitudinal: 2-2000 m.

***Nassella manicata*** (E. Desv.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa manicata* E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,

BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 10-2800 m.

***Nassella meyeniana*** (Trin. & Rupr.) Parodi

Sinónimos: *Urachne meyeniana* Trin. & Rupr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Nassella nardoides*** (Phil.) Barkworth

Sinónimos: *Danthonia nardoides* Phil., *Stipa nardoides*

(Phil.) Hack. ex Hitche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3000-4900 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Nassella neesiana*** (Trin. & Rupr.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa neesiana* Trin. & Rupr., *Stipa neesiana*

Trin. & Rupr. var. *chilensis* Trin. & Rupr., *Stipa neesiana*

Trin. & Rupr. var. *fernandeziana* Trin. & Rupr., *Stipa*

*fernandeziana* (Trin. & Rupr.) Steud., *Stipa longiflora*

Steud., *Stipa trachysperma* Phil., *Stipa contracta* Phil., *Stipa*

*hispida* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,

BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 5-1100 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: flechilla.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Nassella parodii*** (Matthei) Barkworth

Sinónimos: *Stipa parodii* Matthei  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 5-370 m.

***Nassella pfisteri*** (Matthei) Barkworth

Sinónimos: *Stipa pfisteri* Matthei  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 60-350 m.

***Nassella philippii*** (Steud.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa philippii* Steud., *Stipa lenta* Hitchc.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 65-450 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Nassella poeppigiana*** (Trin. & Rupr.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa poeppigiana* Trin. & Rupr., *Stipa amethystina* Steud., *Nassella amethystina* (Steud.) Barkworth, *Stipa pratensis* Phil., *Stipa collina* Phil., *Stipa curicoana* Phil., *Stipa julietii* Phil., *Stipa montana* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 10-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Quilmén, fechilla.

***Nassella pubiflora*** (Trin. & Rupr.) E. Desv.

Sinónimos: *Urachne pubiflora* Trin. & Rupr.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2950-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Taj-taja.

***Nassella pungens*** E. Desv.

Sinónimos: *Nassella humilis* Phil., *Nassella johnstonii* Parodi  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.  
Rango altitudinal: 5-1000 m.

***Nassella rupestris*** (Phil.) Torres

Sinónimos: *Stipa rupestris* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3200-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Nassella tenuis*** (Phil.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa tenuis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, BIO, ARA.  
Países limítrofes: Argentina.

***Nicoraepoa***

***Nicoraepoa andina*** (Trin.) Soreng & L.J. Gillespie

Sinónimos: *Poa andina* Trin., *Deschampsia latifolia* Phil., *Poa aristata* Phil., *Poa acrochaeta* Hack.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 935-2600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Nicoraepoa chonotica*** (Phil.) Soreng & L.J. Gillespie

Sinónimos: *Poa chonotica* Phil., *Poa latifolia* Phil., *Poa robusta* Phil., *Poa borchersii* Phil., *Poa chubutensis* Speg., *Poa berningeri* Pilg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 10-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Nicoraepoa pugionifolia*** (Speg.) Soreng & L.J. Gillespie

Sinónimos: *Poa pugionifolia* Speg., *Poa acutissima* Pilg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 600-850 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Nicoraepoa robusta*** (Steud.) Soreng & L.J. Gillespie

Sinónimos: *Poa robusta* Steud., *Festuca arenaria* Lam., *Poa arenicola* St.-Ives  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-95 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Nicoraepoa subenervis*** (Hack.) Soreng & L.J. Gillespie

subsp. *spgazziniana* (Nicora) Soreng & L.J. Gillespie  
Sinónimos: *Poa spgazziniana* Parodi, *Poa subenervis* Hack. var. *spgazziniana* Nicora  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO.  
Rango altitudinal: 2390-2600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Nicoraepoa subenervis*** (Hack.) Soreng & L.J. Gillespie

subsp. *subenervis*  
Sinónimos: *Poa subenervis* Hack.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAG.  
Rango altitudinal: 720-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## Ortachne

### *Ortachne breviseta* Hitchc.

Sinónimos: *Stipa breviseta* (Hitchc.) Martic. & Quezada, nom. illeg., *Stipa yatesensis* Martic. & Quezada

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1200-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Ortachne rariflora* (Hook.f.) Hughes

Sinónimos: *Muhlenbergia rariflora* Hook.f., *Ortachne retorta* Nees ex Steud., *Stipa rariflora* (Hook.f.) Benth., *Stipa retorta* (Nees ex Steud.) Mez

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 15-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

## Oryza

### *Oryza sativa* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.

## Panicum

### *Panicum capillare* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

### *Panicum dichotomiflorum* Michx.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.

### *Panicum miliaceum* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: NUB, BIO.

### *Panicum racemosum* (P. Beauv.) Spreng.

Sinónimos: *Monachne racemosa* P. Beauv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI.

Países limítrofes: Argentina.

### *Panicum urvilleanum* Kunth

Sinónimos: *Monachne urvilleana* (Kunth) Herter, *Panicum reversipilum* Steud., *Panicum urvillianum* Brongn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 5-140 m.

Países limítrofes: Argentina.

## Pappostipa

### *Pappostipa atacamensis* (Parodi) Romasch.

Sinónimos: *Stipa atacamensis* Parodi, *Jarava atacamensis* (Parodi) Peñail.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 1900-4380 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Pappostipa chrysophylla* (E. Desv.) Romasch.

Sinónimos: *Stipa chrysophylla* E. Desv., *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *major* E. Desv., *Stipa humilis* Cav. fma. *chrysophylla* (E. Desv.) Kuntze, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. subsp. *chrysophylla* (E. Desv.) Dusén, *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñail., *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *minor* E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 470-4290 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Pappostipa frigida* (Phil.) Romasch.

Sinónimos: *Stipa frigida* Phil., *Jarava frigida* (Phil.) F. Rojas

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, MAU.

Rango altitudinal: 50-5000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: pasto vicuña.

### *Pappostipa humilis* (Cav.) Romasch.

Sinónimos: *Stipa humilis* Cav., *Jarava humilis* (Cav.) Peñail.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 15-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coirón, coirón amargo.

### *Pappostipa ibarii* (Phil.) Romasch.

Sinónimos: *Stipa ibarii* Phil., *Jarava ibarii* (Phil.) Peñail.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 100-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coirón enano.

### *Pappostipa nana* (Speg.) Romasch.

Sinónimos: *Stipa nana* Speg., *Jarava nana* (Speg.) Peñail.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 400-400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Pappostipa speciosa*** (Trin. & Rupr.) Romasch.  
Sinónimos: *Stipa speciosa* Trin. & Rupr., *Stipa humilis* Cav. var. *speciosa* (Trin. & Rupr.) Kuntze, *Achnatherum speciosum* (Trin. & Rupr.) Barkworth  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-4120 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Pajonal.

***Pappostipa vaginata*** (Phil.) Romasch.  
Sinónimos: *Stipa vaginata* Phil., *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1100-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

### **Parapholis**

***Parapholis incurva*** (L.) C.E. Hubb.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO.

***Parapholis strigosa*** (Dumort.) C.E. Hubb.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: BIO, ARA, LLA.

### **Paspalum**

***Paspalum chilense*** Catanzaro & G.H. Rua  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA, LRI.

***Paspalum conjugatum*** P. J. Berg.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.

***Paspalum dasypleurum*** Kuntze ex E. Desv.  
Sinónimos: *Paspalum cumingii* Nees ex Steud., *Paspalum pachyrrhizum* Steud., *Paspalum paradisiacum* Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.  
Rango altitudinal: 5-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Chépica.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Paspalum dilatatum*** Poir. ex Lam.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, IPA.

Rango altitudinal: 30-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Chépica gigante.  
Nota: Introducida en la Isla de Pascua.

***Paspalum distichum*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: AYP, ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

***Paspalum forsterianum*** Flügge  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: IPA.  
Nombre vulgar: Herike hare (Rapa Nui).

***Paspalum minus*** E. Fourn.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 160-220 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Paspalum notatum*** Flügge var. *saurae* Parodi  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: IPA.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Paspalum orbiculare*** G. Forst.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.  
Rango altitudinal: 25-100 m.

***Paspalum plicatulum*** Michx.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 1000-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Paspalum urvillei*** Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 10-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Paspalum vaginatum*** Sw.  
Sinónimos: *Paspalum gayanum* E. Desv.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 20-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Chépica.



## Phalaris

### *Phalaris amethystina* Trin.

Sinónimos: *Phalaris berteroniana* Steud., *Phalaris robinsoniana* Nees ex Steud., *Phalaris colchaguensis* Phil., *Phalaridanta robinsoniana* (Steud.) St.-Lég.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 40-1000 m.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

### *Phalaris angusta* Nees ex Trin.

Sinónimos: *Phalaris chilensis* J. Presl.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 10-175 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

### *Phalaris aquatica* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

### *Phalaris arundinacea* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LLA, MAG.

### *Phalaris canariensis* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG.

### *Phalaris caroliniana* Walter

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

### *Phalaris coerulescens* Desf.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: BIO.

### *Phalaris minor* Retz.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, BIO.

### *Phalaris paradoxa* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO.

## Phleum

### *Phleum alpinum* L.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

### *Phleum pratense* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

## Phragmites

### *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

Sinónimos: *Arundo australis* Cav., *Phragmites communis* Trin., *Phragmites phragmites* (L.) H. Karst., *Phragmites phragmites* (L.) Speg., *Phragmites dioicus* Hack. ex Hicken, *Phragmites dioica* Hack. ex Conert

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 5-2390 m.

Nombre vulgar: Carrizo.

## Piptatherum

### *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAG.

## Piptochaetium

### *Piptochaetium angolense* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 10-740 m.

### *Piptochaetium bicolor* (Vahl) E. Desv.

Sinónimos: *Stipa bicolor* Vahl, *Stipa megalantha* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 10-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Piptochaetium depressum* (Steud.) C. Peña

Sinónimos: *Urachne depressa* Steud., *Piptochaetium verrucosum* Phil., *Piptochaetium humile* Phil., *Piptochaetium granulatum* Phil., *Piptochaetium moelleri* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Piptochaetium fuscum*** (Nees ex Steud.) Barkworth, Cialdella & Gandhi

Sinónimos: *Urachne fusca* Steud., *Piptochaetium purpuratum* Phil., *Piptochaetium pallidum* Phil. ex Griseb., *Piptochaetium macrocarpum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 10-1100 m.

***Piptochaetium hirtum*** Phil.

Sinónimos: *Piptochaetium brevifolium* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME.

Países limítrofes: Argentina.

***Piptochaetium montevidense*** (Spreng.) Parodi

Sinónimos: *Caryochloa montevidensis* Spreng., *Piptochaetium tuberculatum* E. Desv., *Oryzopsis tuberculata* (E. Desv.) Speg., *Urachne depressa* Steud., *Piptochaetium verrucosum* Phil., *Oryzopsis verruculosa* (Phil.) Speg., *Oryzopsis verrucosa* (Phil.) Speg., *Piptochaetium humile* Phil., *Piptochetium moelleri* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 5-1500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Piptochaetium panicoides*** (Lam.) E. Desv.

Sinónimos: *Stipa panicoides* Lam., *Piptochaetium subnudum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 15-1400 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Piptochaetium stipoides*** (Trin. & Rupr.) Hack.

Sinónimos: *Urachne stipoides* Trin. & Rupr., *Piptochaetium cuspidatum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 10-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

## **Poa**

***Poa acinaciphylla*** E. Desv.

Sinónimos: *Poa villaroellii* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2500-3700 m.

***Poa alopecurus*** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. ***alopecurus***

Sinónimos: *Arundo alopecurus* Gaudich.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 20-1080 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Poa alopecurus*** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. ***fuegiana*** (Hook.f.) D.M. Moore & Dagg.

Sinónimos: *Festuca fuegiana* Hook.f., *Poa fuegiana* (Hook.f.) Hack., *Festuca fuegiana* Hook.f. var. *vivipara* Hook., *Aira superbiens* Steud., *Poa superbiens* (Steud.) Hauman & Parodi, *Deyeuxia vivipara* Phil., *Festuca pogonantha* Franch., *Poa pogonantha* (Franch.) Parodi, *Poa fuegiana* (Hook.f.) Hack. var. *involucrata* Hack., *Poa commersonii* Franch.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 3-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Poa alopecurus*** (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. ***shuka*** (Speg.) Giussani & Soreng

Sinónimos: *Festuca shuka* Speg., *Poa shuka* (Speg.) Parodi

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Países limítrofes: Argentina.

***Poa androgyna*** Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3400-4156 m.

Países limítrofes: Bolivia.

***Poa annua*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Poa atropidiformis*** Hack.

Sinónimos: *Dissanthelium atropidiforme* (Hack.) Soreng

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 3-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Poa bonariensis*** (Lam.) Kunth

Sinónimos: *Festuca bonariensis* Lam., *Schenodorus bonariensis* (Lam.) Roem. & Schult.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 10-1400 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Poa bulbosa*** L. subsp. *bulbosa*

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAG.

***Poa bulbosa*** L. subsp. *vivipara* (Koeler) Arcang.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAG.

***Poa compressa*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ARA, LLA, MAG.

***Poa cumingii*** Trin.

Sinónimos: *Distichlis ammobia* Phil., *Distichlis volkmannii* Phil., *Poa conformis* Nees ex Steud., *Poa curva* Nees ex Steud., *Poa dialystostachya* Phil., *Poa phalaroides* Nees ex Steud., *Poa stachyodes* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 3-350 m.

***Poa darwiniana*** Parodi

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa denudata*** Steud.

Sinónimos: *Koeleria rigidula* Steud., *Trisetum rigidulum* (Steud.) Domin, *Poa vaginiflora* Steud., *Poa vaginifolia* Steud. ex Lechler, *Poa vaginiformis* Steud. ex fma. Phil., *Poa chiloensis* Phil., *Poa fonckii* Phil., *Poa araucana* Phil., *Poa eligulata* Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 1-2750 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa flabellata*** (Lam.) Raspail

Sinónimos: *Festuca flabellata* Lam., *Poa flabellata* Hook.f., *Parodiochloa flabellata* (Lam.) C.E. Hubb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa gayana*** E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 470-3400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa glauca*** Vahl

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AIS, MAG.

***Poa gymnantha*** Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 4250-4720 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Poa hachadoensis*** Nicora var. *hachadoensis*

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1284-1430 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa hachadoensis*** Nicora var. *pilosa* Nicora

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa holciformis*** J. Presl

Sinónimos: *Koeleria poaeoides* Nees ex Steud., *Festuca elliotii* Hack., *Poa chilensis* Trin., *Poa chilensis* Trin. var. *robustior* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1200-3800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa humillima*** Pilg.

Sinónimos: *Poa humillima* Pilg. var. *exserta* Hack. ex Buchtien  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, ANT.  
Rango altitudinal: 4500-4925 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Poa infirma*** Kunth

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, RME.

***Poa kurtzii*** R.E. Fr.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 4000-4680 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Poa laetevirens*** R.E. Fr.

Sinónimos: *Poa nana* Phil., *Poa atacamensis* Parodi, *Puccinellia atacamensis* (Parodi) Soreng  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 4078-4550 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Poa lanuginosa*** Poir. var. *lanuginosa*

Sinónimos: *Poa magellanica* Phil. ex Macloskie  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 10-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa lanuginosa*** Poir. var. *patagonica* (Phil.) Giussani & Soreng

Sinónimos: *Poa patagonica* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 110-110 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa lepidula*** (Nees & Meyen) Soreng & L.J. Gillespie

Sinónimos: *Anthochloa lepidula* Nees & Meyen  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4000-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Poa ligularis*** Nees ex Steud.

Sinónimos: *Poa denudata* Steud. var. *minor* Ball  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, AIS.  
Rango altitudinal: 230-930 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa lilloi*** Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4250-4250 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa mendocina*** Nicora & F.A. Roig

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 3325-3325 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa nemoralis*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: RME, ARA, AIS, MAG.

***Poa obvallata*** Steud.

Sinónimos: *Deyeuxia vulcanica* Phil., *Poa julietii* Phil., *Poa pachypogon* Nees, *Poa subaristata* Phil., *Poa tristigmatica* E. Desv.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 210-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Poa palustris*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, MAG.

***Poa paposana*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 30-820 m.

***Poa parviceps*** Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 4395-4395 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa pearsonii*** Reeder

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Poa perligulata*** Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 4340-4460 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Poa pfisteri*** Soreng

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO.  
Rango altitudinal: 200-300 m.

***Poa planifolia*** Kuntze

Sinónimos: *Colpodium planifolium* (Kuntze) K. Schum., *Poa chilensis* Trin. var. *planifolia* (Kuntze) Haumann  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2750-3230 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa pratensis*** L. subsp. *alpigena* (Lindm.) Hiitonen

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAG.

***Poa pratensis*** L. subsp. *pratensis*

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Poa scaberula*** Hook.f.

Sinónimos: *Poa dactyliformis* Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 95-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Poa schoenoides*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LRI.

***Poa secunda*** J. Presl  
Sinónimos: *Poa fulvescens* Trin., *Festuca patagonica* Phil.,  
*Festuca spianantha* Phil., *Poa fallens* Pilg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 200-2600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa serpaiana*** Refulio  
Sinónimos: *Dissanthelium peruvianum* (Nees & Meyen)  
Pilg., *Phalaridium peruvianum* Nees & Meyen  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4450-4450 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Poa spiciformis*** (Steud.) Hauman & Parodi var. *ibarii*  
(Phil.) Giussani  
Sinónimos: *Poa ibari* var. *ibari* Phil., *Poa rigidifolia* Steud.  
var. *ibarii* (Phil.) Giussani  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 5-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa spiciformis*** (Steud.) Hauman & Parodi var. *spiciformis*  
Sinónimos: *Aira spiciformis* Steud., *Koeleria sterilis* Steud.,  
*Poa poecila* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-1400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Poa stenantha*** Trin.  
Sinónimos: *Poa chorizantha* E. Desv.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 670-2200 m.

***Poa trachyantha*** Hack.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AIS.

***Poa tricolor*** Nees ex Steud.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.

***Poa trivialis*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA,  
MAG.

***Poa yaganica*** Speg.  
Sinónimos: *Poa breviculmis* Pilg., *Poa chrysantha* Lindm.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 50-170 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Podagrostis**

***Podagrostis sesquiflora*** (E. Desv.) Nicora  
Sinónimos: *Agrostis sesquiflora* E. Desv., *Deyeuxia*  
*sesquiflora* (E. Desv.) Benth. & Hook.f. ex W.D. Jacks.,  
*Briza sesquiflora* (E. Desv.) Pilg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 1000-2400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Podophorus**

***Podophorus bromoides*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nota: Extinta.

### **Polypogon**

***Polypogon australis*** Brongn.  
Sinónimos: *Polypogon chonoticus* Hook.f., *Polypogon*  
*crinitus* Trin., hom. illeg. non (Schreb.) Nutt. 1818, *Polypogon*  
*littoralis* var. *crinitus* Kuntze, *Polypogon interruptus* var.  
*crinitus* (Kuntze) Hack., *Polypogon radicans* Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,  
LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.  
Rango altitudinal: 10-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Polypogon cachinalensis*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, COQ.  
Rango altitudinal: 2600-3000 m.

***Polypogon chilensis*** (Kunth) Pilg.  
Sinónimos: *Chaetotropis chilensis* Kunth, *Chaetotropis*  
*latifolia* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA, VAL, NUB, BIO, LRI, LLA, JFE.



Rango altitudinal: 5-700 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Polypogon elongatus* Kunth var. *elongatus***

Sinónimos: *Polypogon affinis* Brongn.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, VAL, RME, NUB, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 400-850 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Polypogon elongatus* Kunth var. *strictus* E. Desv.**

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 5-200 m.

***Polypogon exasperatus* (Trin.) Renvoize var. *exasperatus***

Sinónimos: *Agrostis exasperata* Trin., *Chaetotropis exasperata* (Trin.) Björkman, *Agrostis asperigluma* Steud., *Chaetotropis asperigluma* (Steud.) Nicora, *Chaetotropis araucana* Phil., *Agrostis exasperata* Trin. var. *viridis* Kuntze, *Agrostis speeiana* Mez  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 5-2250 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Polypogon exasperatus* (Trin.) Renvoize var. *kuntzei* (Mez) Finot**

Sinónimos: *Agrostis kuntze* Mez, *Agrostis exasperata* Trin. var. *purpurascens* Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 2000-2800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Polypogon imberbis* (Phil.) Johow**

Sinónimos: *Nowodworskya imberbis* Phil., *Chaetotropis imberbis* (Phil.) Björkman, *Polypogon imberbis* (Phil.) Johow fma. *aristata* Skottsb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, ARA, LRI, LLA, JFE.  
Rango altitudinal: 5-100 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Polypogon interruptus* Kunth**

Sinónimos: *Polypogon interruptus* Kunth var. *breviaristatus* E. Desv., *Polypogon interruptus* Kunth var. *longearistata* E. Desv., *Polypogon microstachys* Phil., *Polypogon tarapacanus* Phil., *Polypogon brachyatherus* Phil., *Polypogon breviaristatus* Phil., *Polypogon purpurascens* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA.  
Rango altitudinal: 10-3850 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Polypogon linearis* Trin.**

Sinónimos: *Polypogon longiflorus* Nees ex Steud., nom. nud., *Polypogon longiflorus* Nees ex Steud., *Polypogon longiflorus* Nees ex Trin.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 20-740 m.

***Polypogon magellanicus* (Lam.) Finot**

Sinónimos: *Agrostis magellanica* Lam., *Agrostis antarctica* Hook.f., *Agrostis magellanica* Lam. var. *antarctica* (Hook.f.) Franch., *Agrostis magellanica* Lam. var. *antarctica* (Hook.f.) Pilg., *Agrostis cognata* Steud., *Agrostis magellanica* Lam. var. *cognata* (Steud.) Macloskie & Dusén, *Agrostis chonotica* Phil., *Agrostis araucana* Phil., *Agrostis macrathera* Phil., *Agrostis rinihuensis* Phil., *Vilfa magellanica* (Lam.) P. Beauv.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 10-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Polypogon maritimus* Willd.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, BIO.

***Polypogon monspeliensis* (L.) Desf.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

***Polypogon viridis* (Gouan) Breistr.**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA.

**Puccinellia**

***Puccinellia argentinensis* (Hack.) Parodi**

Sinónimos: *Atropis argentinensis* Hack.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 2000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Puccinellia biflora* (Steud.) Parodi**

Sinónimos: *Festuca biflora* Steud., *Atropis biflora* (Steud.) St.-Yves & Camus  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-15 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Puccinellia frigida*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Catabrosa frigida* Phil., *Poa eremophila* Phil., *Poa oresigena* Phil., *Puccinellia oresigena* (Phil.) Hitchc., *Poa hypsophila* Phil., *Puccinellia hypsophila* (Phil.) Parodi ex Espinosa, *Puccinellia hypsophila* (Phil.) Parodi ex Nicora, *Poa pumila* Phil., *Poa taltalensis* Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2300-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Puccinellia glaucescens*** (Phil.) Parodi

Sinónimos: *Catabrosa glaucescens* Phil., *Puccinellia johnstonii* Muñoz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Puccinellia magellanica*** (Hook.f.) Parodi

Sinónimos: *Catabrosa magellanica* Hook.f., *Atropis magellanica* (Hook.f.) E. Desv., *Glyceria magellanica* (Hook.f.) Benth., *Glyceria fuegiana* Speg., *Atropis laxa* Pilg., *Puccinellia laxa* (Pilg.) Parodi

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-90 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Puccinellia preslii*** (Hack.) Ponert

Sinónimos: *Catabrosa tenuifolia* J. Presl, *Aira tenuifolia* (J. Presl) Steud., *Glyceria tenuifolia* (J. Presl) Steud. nom. illeg., *Atropis preslii* (J. Presl) Hauman, *Atropis tenuifolia* (J. Presl) Hauman nom. illeg., *Atropis tenuifolia* (J. Presl) Speg. nom. illeg., *Puccinellia tenuifolia* (J. Presl) Parodi, nom. illeg., *Puccinellia parodi* Nicora nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 4000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Puccinellia pusilla*** (Hack.) Parodi

Sinónimos: *Atropis preslii* Hack. subsp. *pusilla* Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 5-130 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Puccinellia skottsbergii*** (Pilg.) Parodi

Sinónimos: *Atropis skottsbergii* Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Países limítrofes: Argentina.

**Relchela**

***Relchela panicoides*** Steud.

Sinónimos: *Panicum oligostachyum* Steud., *Agrostis asperula* Phil., *Agrostis corralensis* Phil., *Agrostis limonias* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 10-1460 m.

Países limítrofes: Argentina.

**Rostraria**

***Rostraria cristata*** (L.) Tzvelev

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, MAG, IPA.

***Rostraria trachyantha*** (Phil.) Tzvelev ex Soreng

Sinónimos: *Koeleria trachyantha* Phil., *Raimundochloa trachyantha* (Phil.) A.M. Molina, *Parodiochloa trachyantha* (Phil.) A.M. Molina

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 25-550 m.

Países limítrofes: Perú.

**Rytidosperma**

***Rytidosperma lechleri*** Steud.

Sinónimos: *Danthonia glabra* Phil., *Rytidosperma glabrum* (Phil.) Nicora, *Notodanthonia lechleri* (Steud.) Veldkamp

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 800-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Rytidosperma paschale*** (Pilg.) C.M. Baeza

Sinónimos: *Danthonia paschalis* Pilg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 10-10 m.

***Rytidosperma pictum*** (Nees & Meyen) Nicora var. ***bimucronata*** Nicora

Sinónimos: *Notodanthonia picta* (Nees & Meyen) Veldkamp var. *bimucronata* (Nicora) Veldkamp

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, AIS.

Países limítrofes: Argentina.

***Rytidosperma pictum*** (Nees & Meyen) Nicora var. *pictum*  
Sinónimos: *Danthonia picta* Nees & Meyen, *Notodanthonia picta* (Nees & Meyen) Veldkamp  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 170-3020 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Rytidosperma quirihuense*** C.M. Baeza  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, NUB.  
Rango altitudinal: 355-390 m.

***Rytidosperma violaceum*** (E. Desv.) Nicora  
Sinónimos: *Danthonia violacea* E. Desv., *Notodanthonia violacea* (E. Desv.) Veldkamp  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 150-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Rytidosperma virescens*** (E. Desv.) Nicora  
Sinónimos: *Danthonia virescens* E. Desv., *Danthonia andina* Phil., *Danthonia werdermanni* Pilg., *Notodanthonia virescens* (E. Desv.) Veldkamp var. *virescens*  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 20-2900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### Saccharum

***Saccharum officinarum*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.

### Schismus

***Schismus arabicus*** Nees  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL.

***Schismus barbatus*** (L.) Thell.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

### Schizachyrium

***Schizachyrium sanguineum*** (Retz.) Alston  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, BIO.

### Schyzachyrium

***Schyzachyrium spicatum*** (Spreng.) Herter  
Sinónimos: *Deyeuxia spicata* Spreng.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO.  
Rango altitudinal: 750-750 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Pasto escoba.

### Setaria

***Setaria palmifolia*** (Koenig) Stapf  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.

***Setaria parviflora*** (Poir.) Kerguélen var. *brachytricha*  
Pensiero  
Sinónimos: *Panicum brachytrichum* Steud. ex Lechler, *Setaria brachytricha* (Steud. ex Lechler) Mez  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 10-130 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Setaria parviflora*** (Poir.) Kerguélen var. *parviflora*  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA.

***Setaria pumila*** (Poir.) Roem. & Schult.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: TAR, ATA, VAL, RME, MAU, BIO.

***Setaria sphacelata*** (Schumach.) Stapf & C. E. Hubb. ex M. B. Moss  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.

***Setaria verticillata*** (L.) P. Beauv.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA.

***Setaria viridis*** (L.) P. Beauv.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, BIO.

### Sorghum

***Sorghum bicolor*** (L.) Moench.  
Hierba. Anual o perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.

***Sorghum halepense* (L.) Pers.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, MAG, IPA.

Nombre vulgar: Toroko (Rapa Nui).

**Sporobolus**

***Sporobolus densiflorus* (Brongn.) P.M. Peterson & Saarela**  
Sinónimos: *Chauvinia chilensis* Steud., *Spartina densiflora* Brongn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 5-150 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Sporobolus indicus* (L.) R. Br.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Here hoi (Rapa Nui).

***Sporobolus virginicus* (L.) Kunth**

Sinónimos: *Agrostis virginica* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 50-340 m.

**Stenotaphrum**

***Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, BIO, LRI, LLA.

**Taeniatherum**

***Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, MAU.

**Trichoneura**

***Trichoneura weberbaueri* Pilg.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 2100-2276 m.

Países limítrofes: Perú.

**Tripogon**

***Tripogon nicorae* Rúgolo & A.S. Vega**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2950-3200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Tripogon spicatus* (Nees) Ekman**

Sinónimos: *Bromus spicatus* Nees

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2900-3100 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**Trisetum**

***Trisetum ambiguum* Rúgolo & Nicora**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 350-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum barbinode* Trin.**

Sinónimos: *Trisetum hirtiflorum* Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 550-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum caudulatum* Trin.**

Sinónimos: *Trisetum chromostachyum* E. Desv., *Trisetum heteronymum* Steud., *Trisetum variabile* E. Desv., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *flavescens* E. Desv., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *virescens* E. Desv., *Trisetum malacophyllum* Steud., *Trisetum splendidulum* Steud., *Trisetum chiloense* Phil., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *chiloense* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum monticola* Phil., *Trisetum ochrostachyum* Phil., *Trisetum vidalii* Phil., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *vidalii* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum lechleri* (Steud.) Nicora, *Koeleria lechleri* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 1170-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Trisetum cernuum* Trin.**

Sinónimos: *Avena leptostachys* Hook.f., *Trisetum fraudulentum* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 150-1550 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

***Trisetum johnstonii*** (Louis-Marie) Finot subsp. ***johnstonii***  
Sinónimos: *Trisetum oreophilum* Louis-Marie var. *johnstonii* Louis-Marie  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, RME.  
Rango altitudinal: 3000-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum johnstonii*** (Louis-Marie) Finot subsp. ***mattheii***  
(Finot) Finot  
Sinónimos: *Trisetum mattheii* Finot  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4100-4100 m.

***Trisetum longiglume*** Hack.  
Sinónimos: *Trisetum andicola* Louis-Marie, *Deschampsia andicola* (Louis-Marie) Valencia  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum nancaguense*** Finot  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 45-2450 m.

***Trisetum preslei*** (Kunth) E. Desv.  
Sinónimos: *Avena preslei* Kunth  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.  
Rango altitudinal: 1300-3800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum pyramidatum*** Louis-Marie ex Finot  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-540 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum spicatum*** (L.) K. Richt. subsp. ***cumingii*** (Nees ex Steud.) Finot  
Sinónimos: *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var. *cumingii* (Nees ex Steud.) Finot, *Koeleria cumingii* Nees ex Steud., *Trisetum cumingii* (Nees ex Steud.) Nicora, *Trisetum malacophyllum* Phil., *Trisetum mollifolium* Louis-Marie  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 150-1460 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum spicatum*** (L.) K. Richt. subsp. ***dianthemum***  
(Louis-Marie) Finot

Sinónimos: *Trisetum dianthemum* (Louis-Marie) Finot, *Trisetum spicatum* var. *dianthemum* Louis-Marie, *Trisetum biflorum* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, LRI, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 3-200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum spicatum*** (L.) K. Richt. subsp. ***phleoides*** (d'Urv.) Macloskie  
Sinónimos: *Avena phleoides* d'Urv., *Trisetum hirsutum* Phil., *Trisetum spicatum* var. *hirsutum* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum phleoides*  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 80-1460 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum spicatum*** (L.) K. Richt. subsp. ***spicatum***  
Sinónimos: *Aira spicata* L., *Trisetum andinum* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 5-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## **Triticum**

***Triticum aestivum*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: IPA.

## **Vahlodea**

***Vahlodea atropurpurea*** (Wahlenb.) Fr. ex Hartm.  
Sinónimos: *Aira atropurpurea* Wahlenb., *Deschampsia atropurpurea* (Wahlenb.) Schleele, *Aira magellanica* Hook.f., *Aira atropurpurea* Wahlenb. var. *magellanica* (Hook.f.) Skotts., *Vahlodea atropurpurea* (Wahlenb.) Fr. ex Hartm. subsp. *magellanica* (Hook.f.) Hyl., *Vahlodea magellanica* (Hook.f.) Tzvelev, *Deschampsia brachyphylla* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 150-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## **Vulpia**

***Vulpia antucensis*** Trin.  
Sinónimos: *Festuca antucensis* (Trin.) Steud., *Festuca eriolepis* E. Desv., *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) C.H. Blom  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,



BIO, ARA, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 15-2800 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: pasto sedilla.

***Vulpia bromoides*** (L.) Gray  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Vulpia muralis*** (Kunth) Nees  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, ARA, JFE.

***Vulpia myuros*** (L.) C.C.Gmel. fma. ***megalura*** (Nutt.) Stace  
& R. Cotton  
Sinónimos: *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. var. *hirsuta*  
Hack.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA, LRI, JFE, IPA.

***Vulpia myuros*** (L.) C.C.Gmel. fma. ***myuros***  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,  
NUB, BIO, ARA, LLA, MAG, IPA.

***Vulpia octoflora*** (Walter) Rydb.  
Sinónimos: *Festuca octoflora* Walter, *Vulpia antofagastensis*  
Parodi  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, ANT, COQ.  
Rango altitudinal: 30-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: pasto sedilla.

## **Zea**

***Zea mays*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: IPA.

## **PONTEDERIACEAE**

### **Eichhornia**

***Eichhornia crassipes*** (Mart.) Solms  
Hierba acuática. Perenne. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, BIO.

## **POTAMOGETONACEAE**

### **Potamogeton**

***Potamogeton ferrugineus*** Hagstr.  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 100-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Potamogeton gayi*** A. Benn.  
Sinónimos: *Potamogeton burkartii* Horn ex Tur  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Potamogeton illinoensis*** Morong  
Sinónimos: *Potamogeton dunicola* Tur, *Potamogeton*  
*pedersenii* Tur  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, ARA, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Potamogeton linguatus*** Hagstr.  
Sinónimos: *Potamogeton badiovirens* Hagstr., *Potamogeton*  
*natans* auct. non L., *Potamogeton montanus* C. Presl  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Potamogeton montevidensis*** A. Benn.  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Potamogeton pusillus*** L.  
Sinónimos: *Potamogeton berterioanus* Phil., *Potamogeton*  
*aschersonii* A. Benn., *Potamogeton pusillus* L. var.  
*longepedunculatus* Hicken, *Potamogeton tenuifolius* F.  
Phil., *Potamogeton uruguayensis* A. Benn. & Graebn.,  
*Potamogeton pusillus* L. var. *argentinus* A. Benn.  
Hierba acuática. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Nombre vulgar: Espiga de agua.

***Potamogeton spirilliformis*** Hagstr.  
Sinónimos: *Potamogeton reniacoensis* Sparre  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### Stuckenia

*Stuckenia filiformis* (Pers.) Boehm. subsp. *alpina* (Blytt) R.R. Haynes, Les & M. Král  
Sinónimos: *Potamogeton strictus* Phil., *Potamogeton aulacophyllum* K. Schum., *Potamogeton strictus* Phil. var. *magellanicus* Hagstr., *Potamogeton juncifolius* A. Kern. ex C. Fritsch, *Potamogeton marinus* L. fma. *alpinus* Blytt  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, BIO, MAG.  
Rango altitudinal: 200-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

*Stuckenia pectinata* (L.) Börner  
Sinónimos: *Potamogeton diffusus* (Hagstr.) Herter, *Potamogeton pectinatus* L. var. *diffusus* Hagstr., *Potamogeton pectinatus* L., *Coleogeton pectinatus* (L.) Les & R.R. Haynes  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

*Stuckenia striata* (Ruiz & Pav.) Holub  
Sinónimos: *Potamogeton australis* F. Phil., *Potamogeton dissimilis* A. Benn., *Potamogeton pectinatus* L. var. *striatus* (Ruiz & Pav.) Hagstr., *Potamogeton pectinatus* L. var. *ungulatus* Hagstr., *Coleogeton striatus* (Ruiz & Pav.) Les & R.R. Haynes, *Potamogeton striatus* Ruiz & Pav.  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LLA.  
Rango altitudinal: 0-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.  
Nombre vulgar: Nori.

### Zannichellia

*Zannichellia palustris* L.  
Hierba acuática. Perenne. Introducida.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, MAG.  
Rango altitudinal: 0-4400 m.

### RESTIONACEAE

#### Apodasmia

*Apodasmia chilensis* (Gay) B.G. Briggs & L.A.S. Johnson  
Sinónimos: *Leptocarpus chilensis* (Gay) Mast., *Schoenodum*

*chilense* Gay, *Calopsis chilensis* (Gay) Steud.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Nombre vulgar: Canutillo.

### Gaimardia

*Gaimardia australis* Gaudich.  
Sinónimos: *Gaimardia pusilla* Gaudich.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-300 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Pasto de turbal.

### RUPPIACEAE

#### Ruppia

*Ruppia filifolia* (Phil.) Skottsbo.  
Sinónimos: *Potamogeton filifolius* Phil., *Ruppia obtusa* Hagstr., *Ruppia obtusa* Hagstr. var. *repens* Hagstr., *Ruppia andina* Phil.  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, MAG.  
Rango altitudinal: 0-4400 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Pelo de marisma.

#### *Ruppia maritima* L.

Sinónimos: *Ruppia maritima* L. var. *rostrata* C. Agardh, *Ruppia maritima* L. subsp. *rostellata* (Koch ex Rchb.) Asch. & Graebn., *Ruppia rostellata* Koch ex Rchb.  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, ARA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### TECOPHILAEACEAE

#### Conanthera

*Conanthera bifolia* Ruiz & Pav.  
Sinónimos: *Conanthera passeriflora* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna fma. *lilacina* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna fma. *nocticolor* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna fma. *coelestis* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna fma. *melanathera* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna fma. *immaculata* Ravenna, *Sisyrrinchium illmu* Molina  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.  
Nombre vulgar: Flor de la viuda.

***Conanthera campanulata*** Lindl.

Sinónimos: *Cummingia campanulata* D. Don, *Conanthera bifolia* auct. non Ruiz & Pav., *Conanthera simsii* Sweet, *Cummingia tenella* D. Don, *Conanthera variegata* Fenzl ex Reichardt, *Conanthera tenella* (Kunth) Ravenna, *Conanthera alba* Grau, *Conanthera sabulosa* Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-3200 m.

***Conanthera parvula*** (Phil.) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Conanthera johowii* Espinosa, *Conanthera minima* Grau, *Cummingia parvula* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 100-500 m.

***Conanthera trimaculata*** (D. Don) F. Meigen

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, NUB.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Conanthera urceolata*** Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

**Tecophilaea**

***Tecophilaea cyanocrocus*** Leyb.

Sinónimos: *Zephyra cyanocrocus* (Leyb.) Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 700-900 m.

***Tecophilaea violiflora*** Bertero ex Colla fma. *polyantha*

Skottsbo.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Nota: Citada para Chile (Marticorena & Quezada, 1985) sin mencionar ejemplar de referencia.

***Tecophilaea violiflora*** Bertero ex Colla fma. *violiflora*

Sinónimos: *Zephyra violiflora* (Bertero ex Colla) Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-800 m.  
Nombre vulgar: Violeta de la cordillera.

**Zephyra**

***Zephyra compacta*** C. Ehrh.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Zephyra elegans*** D. Don

Sinónimos: *Zephyra amoena* D. Don, *Dicolus caerulescens* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-800 m.  
Nombre vulgar: Argentina.

**TYPHACEAE**

**Typha**

***Typha angustifolia*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

***Typha domingensis*** Pers.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: TAR, ANT, VAL, NUB, BIO, ARA.

**ZOSTERACEAE**

**Zostera**

***Zostera chilensis*** (J. Kuo) S.W.L. Jacobs & D.H. Les

Sinónimos: *Heterozostera chilensis* J. Kuo  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Nombre vulgar: Seba de mar.

**MAGNOLIOPSIDA**

**ACANTHACEAE**

**Dicliptera**

***Dicliptera paposana*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT.

## Stenandrium

*Stenandrium dulce* (Cav.) Nees

Sinónimos: *Gerardia dulcis* (Cav.) S.F. Blake, *Ruellia dulcis* Cav., *Nierembergia prunellifolia* Dunal

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## AEXTOXICACEAE

### Aextoxicon

*Aextoxicon punctatum* Ruiz & Pav.

Árbol. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Olivillo, palo muerto, tique, teque, aceitunillo.

## AIZOACEAE

### Carpobrotus

*Carpobrotus chilensis* (Molina) N.E. Br.

Sinónimos: *Mesembryanthemum chilense* Molina, *Carpobrotus aequilaterus* auct. non (Haw.) N.E. Br.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Doca.

*Carpobrotus edulis* (L.) N.E. Br.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, MAU, BIO, LRI.

### Galenia

*Galenia pubescens* (Eckl. & Zeyh.) Druce

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL.

### Mesembryanthemum

*Mesembryanthemum crystallinum* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

*Mesembryanthemum nodiflorum* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ.

### Sesuvium

*Sesuvium portulacastrum* (L.) L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP.

### Tetragonia

*Tetragonia angustifolia* Barnéoud

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

*Tetragonia copiapina* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-900 m.

*Tetragonia espinosae* Muñoz

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

*Tetragonia macrocarpa* Phil.

Sinónimos: *Tetragonia pusilla* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, IDE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

*Tetragonia maritima* Barnéoud

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

*Tetragonia microcarpa* Phil.

Sinónimos: *Tetragonia macrocarpa* Phil. var. *microcarpa* (Phil.) Reiche, *Tetragonia tenella* I.M. Johnst., *Tetragonia trigona* Phil., *Tetragonia kuntzei* J. Buchw. ex Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Perú.

*Tetragonia ovata* Phil.

Sinónimos: *Tetragonia robusta* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Tetragonia pedunculata*** Phil.

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Tetragonia tetragonoides*** (Pall.) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LRI, LLA, JFE, IPA, IDE.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nota: Taylor (1996) señala que es nativa en Australia, Nueva Zelanda, Japón, Argentina y Chile dispersada por corrientes oceánicas, mientras que Prescott (1984) señala que es nativa sólo de Australia y Nueva Zelanda.

**Trianthema**

***Trianthema portulacastrum*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: IPA.

**AMARANTHACEAE**

**Alternanthera**

***Alternanthera halimifolia*** (Lam.) Standl. ex Pittier

Sinónimos: *Achyranthes halimifolia* Lam.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Alternanthera philoxeroides*** (Mart.) Griseb.

Hierba acuática. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL.

***Alternanthera porrigens*** (Jacq.) Kuntze

Sinónimos: *Alternanthera junciflora* (J. Remy) I.M. Johnst., *Achyranthes porringens* Jacq.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, VAL.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

**Amaranthus**

***Amaranthus albus*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, RME.

***Amaranthus asplundii*** Thell.

Sinónimos: *Amaranthus affinis* Thell., *Amaranthus*

*buchtienianus* Thell.

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: LLA.  
Rango altitudinal: 2400-3600 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Amaranthus blitum*** L. subsp. *emarginatus* (Moq. ex Uline

et W.L. Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: TAR, ANT.

***Amaranthus deflexus*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

***Amaranthus hybridus*** L. subsp. *cruentus* (L.) Thell.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: RME, MAU, BIO.

***Amaranthus hybridus*** L. subsp. *hybridus*

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Amaranthus looseri*** Suss.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 500 m.

***Amaranthus retroflexus*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

***Amaranthus viridis*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, ARA.

**Gomphrena**

***Gomphrena meyeniana*** Walp.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2000-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Gomphrena umbellata*** J. Remy

Sinónimos: *Xeraea umbellata* (J. Remy) Kuntze  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 3000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.



## ANACARDIACEAE

### Haplorhus

#### *Haplorhus peruviana* Engl.

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Carza.

### Lithrea

#### *Lithrea caustica* (Molina) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Lithraea caustica* (Molina) Hook. & Arn. var. *pilosa* Engl., *Laurus caustica* Molina, *Lithraea caustica* (Molina) Hook. & Arn. fma. *pilosa* (Engl.) Cabrera, *Persea caustica* (Molina) Spreng., *Lithrea venenosa* Miers, nom. nud., *Rhus caustica* Hook. & Arn., *Lithrea caustica* (Molina) Hook. & Arn. var. *glabra* Engler

Árbol. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

Nombre vulgar: Litre.

### Schinus

#### *Schinus areira* L.

Sinónimos: *Schinus molle* L. var. *areira* (L.) DC., *Schinus huingan* Molina, *Schinus bituminoides* Salisb., *Schinus molle* L. var. *huingan* (Molina) Marchand

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Molle, pimienta, pimentero.

#### *Schinus kauselii* F.A. Barkley

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 1400-1800 m.

#### *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engl.

Sinónimos: *Litrea molle* auct. non L., *Duvaua latifolia* Gillies ex Lindl., *Schinus dependens* Ortega var. *latifolia* Marchand, *Schinus chilensis* Marchand var. *glabra* Marchand, *Duvaua dependens* (Ortega) DC. var. *gamma* Hook., *Duvaua velutina* Turcz., *Schinus chilensis* Marchand, *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engler var. *tomentosus* Fenzl ex Engler, *Schinus velutinus* (Turcz.) I.M. Johnst.

Árbol. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Molle.

#### *Schinus marchandii* F.A. Barkley

Arbusto. Nativo.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Schinus montanus* (Phil.) Engl.

Sinónimos: *Lithraea montana* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

#### *Schinus patagonicus* (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera var.

*crenuloides* (F.A. Barkley) F.A. Barkley

Sinónimos: *Schinus montanus* (Phil.) Engl. var. *crenuloides* F.A. Barkley

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Litrecillo.

#### *Schinus patagonicus* (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera var. *patagonicus*

Sinónimos: *Litrea patagonica* Phil., *Schinus crenatus* Engl., *Lithraea montana* Phil. var. *patagonica* Phil., *Duvaua patagonica* Phil., *Schinus montana* (Phil.) Engl. var. *patagonica* Reiche, *Duvaua dependens* (Ortega) DC. var. *patagonica* Phil.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Laura, litrecillo.

#### *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera

Sinónimos: *Amyris polygama* Cav., *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera var. *chilensis* F.A. Barkley, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera fma. *ovatus* (Lindl.) Cabrera, *Schinus dependens* Ortega var. *brevifolia* Fenzl ex Engl., *Schinus huingan* Kuntze, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera var. *parviflorus* (Marchand) F.A. Barkley, *Duvaua crenata* Phil., *Litrea crenata* Phil., *Schinus dependens* Ortega var. *parviflorus* Marchand

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Huingán.

Nota: Especie muy polimorfa, con variaciones especialmente en las hojas, lo que ha motivado la creación de variedades, subespecies y formas. Han sido reunidas en una sola especie.

## APIACEAE

### Ammi

#### *Ammi majus* L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: RME, LRI, LLA.

#### *Ammi visnaga* (L.) Lam.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, JFE.

### Anethum

#### *Anethum graveolens* L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: JFE.

### Anthriscus

#### *Anthriscus caucalis* M. Bieb.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

#### *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.

Hierba. Bienal. Introducida.  
Distribución: MAG.

### Apium

#### *Apium chilense* Hook. & Arn.

Sinónimos: *Apium flexuosum* Phil., *Ligusticum dumetorum* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, JFE.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.

#### *Apium fernandezianum* Johow

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.

#### *Apium graveolens* L.

Hierba. Bienal. Introducida.  
Distribución: ANT, LRI, LLA.

#### *Apium humile* (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Ligusticum humile* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.

#### *Apium nodiflorum* (L.) Lag.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA.

#### *Apium panul* (Bertero ex DC.) Reiche

Sinónimos: *Ligusticum pansil* Bertero ex DC., *Ligusticum nemorosum* Phil., *Ligusticum landbeckii* Phil., *Ligusticum apioides* Phil., *Carum panul* (Bertero ex DC.) Griseb., *Apium andinum* Phil., *Apium apioides* (Phil.) Reiche, *Apium philippii* H. Wolff, *Apium angustilobum* (Phil.) Reiche, *Apium panul* (Bertero ex DC.) Reiche var. *araucanum* (Phil.) Reiche, *Apium peucedanoides* (C. Presl ex DC.) Reiche, *Apium peucedanoides* (C. Presl ex DC.) Reiche var. *tenuifolium* (C. Presl ex DC.) H. Wolff, *Pimpinella araucana* Phil., *Ligusticum peucedanoides* C. Presl ex DC., *Pimpinella andina* Phil., *Ligusticum angustilobum* Phil., *Ligusticum cahuilense* Phil. ex sched., *Pimpinella macrophylla* Phil., *Pimpinella molleri* Phil., *Pimpinella navarri* Phil., *Pimpinella petersiana* Phil., *Pimpinella vidali* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Panul.

#### *Apium pimpinellifolium* (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Ligusticum pimpinellifolium* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO.

#### *Apium prostratum* Labill.

Sinónimos: *Apium maclovianum* Gand., *Apium dunicola* Pontiroli, *Apium australe* Thouars var. *latisectum* H. Wolff, *Wydleria humilis* Phil., *Apium australe* Thouars  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, RME, MAU, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.  
Rango altitudinal: 0-100 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Rapa.

### Asteriscium

#### *Asteriscium aemocarpon* Clos

Sinónimos: *Asteriscium ramosissimum* Phil., *Asteriscium verrucosum* Meyen, *Asteriscium haemocarpon* Clos var. *chlorocarpon* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2100-3500 m.

#### *Asteriscium chilense* Cham. & Schltdl.

Sinónimos: *Eryngium tricuspdatum* Dombey, *Asteriscium poeppigii* DC., *Asteriscium chilense* Cham. & Schltdl. var. *haenkei* DC., *Asteriscium pozoides* Clos

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,

NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 100-2500 m.  
Nombre vulgar: Anicillo, huaralao, mucho, colecilla.

***Asteriscium closii*** (Kuntze) Mathias & Constance  
Sinónimos: *Dipterygia closii* Kuntze, *Bustillosia chilensis* Clos, *Asteriscium pungens* Drude, *Bustillosia chilensis* Clos var. *setacea* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Asteriscium vidali*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-400 m.

### **Azorella**

***Azorella acaulis*** (Cav.) Drude  
Sinónimos: *Huanaca acaulis* Cav., *Lechleria palmata* Phil., *Huanaca bergii* Hieron., *Huanaca geraniifolia* DC., *Huanaca cavanillesii* DC., *Spananthe huanaca* (Spreng.) Lag., *Oenanthe huanaca* Spreng.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Azorella albovaginata*** (Gillies & Hook.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas var. ***pauciflorum*** (Reiche) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas  
Sinónimos: *Mulinum albovaginatum* Gillies & Hook. var. *pauciflorum* (Reiche) J.C. Zech, *Mulinum pauciflorum* Reiche, *Azorellopsis trisecta* H. Wolff, *Mulinum reichei* H. Wolff  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Azorella ameghinoi*** Speg.  
Sinónimos: *Azorella transverse-striata* Hauman  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 200-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Llaretta.

***Azorella andina*** (Phil.) Drude  
Sinónimos: *Trisciadium andinum* Phil., *Huanaca andina* (Phil.) Phil., *Azorella trilobata* Dusén, *Schizeilema trilobatum* (Dusén) Domin  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 600-2800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Azorella atacamensis*** G.M. Plunkett & A.N. Nicolas  
Sinónimos: *Mulinum crassifolium* Phil. non *Azorella* Pers.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3700-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Azorella biloba*** (Schltdl.) Wedd.  
Sinónimos: *Fragosa biloba* Schltdl., *Azorella lehmannii* Hieron.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 2500-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Llaretta.

***Azorella boelckei*** (Mathias & Constance) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas  
Sinónimos: *Huanaca boelckei* Mathias & Constance  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 1000-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Azorella burkartii*** (Mathias & Constance) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas  
Sinónimos: *Huanaca burkartii* Mathias & Constance  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, MAG.  
Rango altitudinal: 800-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Azorella compacta*** Phil.  
Sinónimos: *Azorella columnaris* H. Wolff, *Azorella yareta* Hauman, *Azorella prismatoclada* Domin, *Laretia compacta* (Phil.) Reiche  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3500-5200 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Llaretta, yareta.

***Azorella concolor*** Rendle  
Sinónimos: *Mulinum valentini* Speg., *Mulinum lycopodiopsis* Speg.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 300-1400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Azorella crassipes*** Phil.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: BIO.  
Rango altitudinal: 1700-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Llaretá.

***Azorella cryptantha*** (Clos) Reiche

Sinónimos: *Mulinum integrifolium* Hieron., *Mulinum cryptanthum* Clos  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2500-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Llaretá.

***Azorella diversifolia*** Clos

Sinónimos: *Pozoa incisa* Griseb., *Azorella incisa* (Griseb.) Wedd. *Azorella diversifolia* Clos var. *antillanca* J.C. Zech  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 1000-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Azorella filamentosa*** Lam.

Sinónimos: *Chamitis integrifolia* Gaertn., *Azorella chamitis* Pers.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Azorella fuegiana*** Speg.

Sinónimos: *Azorella mesetae* Skotts., *Azorella dusenii* H. Wolff  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Azorella lycopodioides*** Gaudich.

Sinónimos: *Azorella nervosa* Phil., *Azorella laevigata* Phil., *Azorella clandestina* Phil., *Azorella vaginata* Phil., *Azorella lycopodioides* Gaudich. var. *compacta* Phil., *Azorella philippi* Gand., *Azorella concolor* auct. non Rendle  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Llaretá.

***Azorella madreporica*** Clos

Sinónimos: *Azorella bolacina* Clos, *Azorella piligera* Phil.,

*Azorella muscoides* Phil., *Azorella obtusiloba* Phil.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, ARA.  
Rango altitudinal: 1800-3600 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Llaretá.

***Azorella monantha*** Clos

Sinónimos: *Azorella cespitosa* auct. non Cav., *Azorella hookeriana* Clos, *Azorella apoda* A. Gray, *Azorella sessiliflora* Phil., *Azorella bryoides* Phil., *Azorella nucamentacea* (Phil.) Hauman, *Apleura nucamentacea* Phil., *Azorella glacialis* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Llaretá.

***Azorella monteroi*** S. Martínez & Constance

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1800 m.

***Azorella nivalis*** Phil.

Sinónimos: *Mulinum leptacanthum* Phil., *Mulinum patagonicum* Speg.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 1400-2600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Azorella patagonica*** Speg.

Sinónimos: *Azorella patagonica* Speg. var. *compacta* Speg., *Azorella plantaginea* Speg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Azorella prolifera*** (Cav.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas

Sinónimos: *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers., *Selinum spinosum* Cav., *Selinum proliferum* Cav., *Mulinum proliferum* (Cav.) Pers., *Mulinum laxum* Phil., *Mulinum leoninum* Lorentz, *Mulinum chillanense* Phil., *Mulinum ovalleanum* Phil., *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *leoninum* Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *quinquepartitum* Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *trispinescens* Kuntze, *Mulinum gandogeri* M. Hiroe, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *longeinvolucrata* Hicken, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *proliferum* (Cav.) Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *chillanense* (Phil.) Reiche, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers.

var. *laxum* (Phil.) Reiche, *Mulinum hirsutum* Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Neneo, mata barrosa, dichillo, hierba de la  
culebra, hierba negra, chila, espinillo, churquecillo.

***Azorella ranunculus*** d'Urv.  
Sinónimos: *Schizeilema ranunculus* (d'Urv.) Domin, *Pozoa*  
*ranunculus* (d'Urv.) Hook.f.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Azorella ruizii*** G.M. Plunkett & A.N. Nicolas  
Sinónimos: *Selinum acaule* Cav., *Mulinum acaule* (Cav.)  
Pers., *Laretia acaulis* (Cav.) Gillies & Hook.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 2000-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Llaretá.

***Azorella selago*** Hook.f.  
Sinónimos: *Azorella selago* Hook.f. var. *compacta* Albov,  
*Azorella selago* Hook.f. var. *pulvinaris* Albov, *Azorella*  
*antipoda* Gand., *Azorella maquariensis* Orchard  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Llaretá.

***Azorella spinosa*** (Ruiz & Pav.) Pers.  
Sinónimos: *Fragosa spinosa* Ruiz & Pav., *Mulinum*  
*cuneatum* Hook. & Arn., *Azorella pectinata* Phil., *Mulinum*  
*clandestinum* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Azorella trifoliolata*** Clos  
Sinónimos: *Azorella gayana* Phil., *Azorella depauperata*  
Phil., *Azorella pinnatiloba* Gand.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, BIO, ARA, LRI,  
LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 500-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Azorella trifurcata*** (Gaertn.) Pers.  
Sinónimos: *Chamitis trifurcata* Gaertn., *Azorella cespitosa*  
Cav., *Bolax gilliesii* Hook., *Azorella gilliesii* (Hook.) Hook.  
& Arn., *Azorella utriculata* Griseb., *Azorella rahmeri* Phil.,  
*Azorella albida* Phil., *Azorella crassifolia* Pers., *Chamitis*  
*tricuspidata* Gaertn.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,  
AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Llaretá.

***Azorella ulicina*** (Gillies & Hook.) G.M. Plunkett & A.N.  
Nicolas  
Sinónimos: *Mulinum ulicinum* Gillies & Hook.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 4100-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

## **Bolax**

***Bolax caespitosa*** Hombr. & Jacq. ex Decne.  
Sinónimos: *Azorella bovei* Speg., *Azorella gummifera* Poir.,  
*Bolax bovei* (Speg.) Dusén  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Bolax gummifera*** (Lam.) Spreng.  
Sinónimos: *Hydrocotyle gummifera* Lam., *Bolax columnifer*  
Gand., *Bolax glebaria* Comm. ex Gaudich., *Azorella*  
*glebaria* (Comm. ex Gaudich.) A. Gray, *Bolax complicatus*  
Spreng.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## **Bowlesia**

***Bowlesia incana*** Ruiz & Pav.  
Sinónimos: *Bowlesia geraniifolia* Cham. & Schtdl.,  
*Bowlesia nodiflora* DC., *Bowlesia rotundifolia* Phil.,  
*Bowlesia tenera* Spreng., *Bowlesia incana* Ruiz & Pav. fma.  
*tenera* Urb.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.



***Bowlesia lobata*** Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Bowlesia acutiloba* H. Wolff, *Bowlesia acutangula* Benth., *Drusa acutangula* (Benth.) Drude  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 1300-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Bowlesia macrophysa*** Zoellner

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 2900 m.

***Bowlesia paposana*** I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3000-3500 m.

***Bowlesia sodiroana*** H. Wolff

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 200-500 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Bowlesia tropaeolifolia*** Gillies & Hook.

Sinónimos: *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *gayana* Domin, *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *heterophylla* Speg., *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *patagonica* Speg., *Bowlesia cirrosa* Phil., *Bowlesia pulchella* Wedd., *Bowlesia flexilis* Meyen, *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *cirrosa* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 100-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Barba de gato.

***Bowlesia uncinata*** Colla

Sinónimos: *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *tripartita* Hook. & Arn., *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos, *Bowlesia reichei* Phil., *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *reichei* (Phil.) Reiche, *Bowlesia axilliflora* Phil., *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *axilliflora* (Phil.) Reiche, *Bowlesia dumetorum* Phil., *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *dumetorum* (Phil.) Reiche, *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *triloba* Reiche, *Bowlesia macrosperma* H. Wolff  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 700-2000 m.

**Centella**

***Centella asiatica*** (L.) Urb.

Sinónimos: *Hydrocotyle asiatica* L., *Hydrocotyle triflora* Ruiz & Pav., *Centella triflora* (Ruiz & Pav.) Nannf.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 10-600 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**Conium**

***Conium maculatum*** L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

**Coriandrum**

***Coriandrum sativum*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: LLA, JFE.

**Cyclospermum**

***Cyclospermum laciniatum*** (DC.) Constance

Sinónimos: *Helosciadium laciniatum* DC., *Helosciadium laciniatum* DC. var. *humile* Hook. & Arn., *Helosciadium gracile* Clos, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. var. *gracile* (Clos) Reiche, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. var. *hispidulum* H. Wolff, *Helosciadium deserticum* Phil., *Apium laciniatum* (DC.) Urb. fma. *deserticum* H. Wolff, *Helosciadium biternatum* Phil., *Apium biternatum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1600 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Cyclospermum leptophyllum*** (Pers.) Sprague

Sinónimos: *Apium leptophyllum* (Pers.) F. Muell., *Pimpinella leptophylla* Pers., *Helosciadium leptophyllum* (Pers.) DC., *Apium ammi* Urb., *Apium ranunculifolium* auct. non Kunth, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. fma. *elatius* (Hook. & Arn.) H. Wolff, *Apium ranunculifolium* (DC.) Reiche, comb. illeg., *Helosciadium ranunculifolium* DC., *Helosciadium laciniatum* DC. var. *elatius* Hook. & Arn., *Apium ammi* Urb. var. *genuinum* H. Wolff, *Apium ammi* Urb. fma. *filamentosum* (Kuntze) H. Wolff, *Apium ammi* Urb. var. *filamentosum* Kuntze, *Apium ammi* Urb. fma. *nanum* Kuntze, *Apium ammi* Urb. fma. *pedunculata* Chodat, *Apium ammi* Urb. var. *leptophyllum* (Pers.) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA.  
Rango altitudinal: 0-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

### **Daucus**

*Daucus carota* L.  
Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, IPA.

*Daucus montanus* Humb. & Bonpl. ex Spreng.  
Sinónimos: *Daucus toriloides* DC., *Daucus australis* Poepp.  
Hierba. Anual o bienal. Nativa.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, MAU, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

*Daucus pusillus* Michx.  
Sinónimos: *Daucus scaber* Larrañaga, *Daucus montevidensis* Link ex Spreng., *Daucus hispidifolius* Clos  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-2300 m.

### **Diposis**

*Diposis bulbocastanum* DC.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 500-2500 m.

### **Domeykoa**

*Domeykoa andina* Saldivia & Faúndez  
Hierba. Anual o perenne. Endémica.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 2650-3120 m.

*Domeykoa oppositifolia* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 100-1000 m.

*Domeykoa perennis* I.M. Johnst.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

### **Eremocharis**

*Eremocharis confinis* I.M. Johnst.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 3100-3200 m.  
Países limítrofes: Perú.

*Eremocharis fruticosa* Phil.  
Sinónimos: *Eremocharis flexuosa* Phil., *Dipterygia philippiana* Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 100-1800 m.

### **Eryngium**

*Eryngium anomalum* Hook. & Arn.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 100 m.

*Eryngium bupleuroides* Hook. & Arn.  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 400-900 m.

*Eryngium cardosii* Clos  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO.  
Rango altitudinal: 100-200 m.

*Eryngium coquimbantum* Phil. ex Urb.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

*Eryngium depressum* Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Eryngium arvense* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 100-1000 m.  
Nombre vulgar: Caucha.

*Eryngium fernandezianum* Skottsbo.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 300-500 m.  
Nota: Probable híbrido entre *E. bupleuroides* y *E. inaccessum*.

*Eryngium humifusum* Clos  
Sinónimos: *Eryngium pratense* Phil. var. *depressum* Phil., *Eryngium pratense* Phil., *Eryngium humifusum* Clos var.

*pratense* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 0-1400 m.

*Eryngium inaccessum* Skottsbo.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

*Eryngium macracanthum* Phil.  
Hierba. Añual. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

*Eryngium paniculatum* Cav. & Dombey ex F. Delaroché  
Sinónimos: *Eryngium paniculatum* Cav. & Dombey ex F. Delaroché var. *chilensis* DC.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 100-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Cardoncillo, chupalla, quisco, pitillo.

*Eryngium polyrhizum* Clos  
Hierba. Añual. Endémica.  
Distribución: NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 200-300 m.

*Eryngium pseudojunceum* Clos  
Sinónimos: *Eryngium fistulosum* Phil., *Eryngium crantzoides* Griseb., *Eryngium pseudojunceum* Clos var. *crantzoides* (Griseb.) Reiche, *Eryngium pseudojunceum* Clos var. *fistulosum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Eryngium pulchellum* Phil.  
Hierba. Añual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-600 m.

*Eryngium rostratum* Cav.  
Sinónimos: *Eryngium rostratum* Cav. var. *diversifolium*  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-700 m.  
Nombre vulgar: Caucha, cardilla.

*Eryngium sarcophyllum* Hook. & Arn.  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nota: Extinta.

### Foeniculum

*Foeniculum vulgare* Mill.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

### Gymnophyton

*Gymnophyton flexuosum* Clos  
Sinónimos: *Dipterygia flexuosa* Kuntze, *Asteriscium flexuosum* Drude, *Gymnophyton kingii* Phil., *Dipterygia kingii* Kuntze, *Gymnophyton robustum* Clos var. *kingii* Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 800-2600 m.

*Gymnophyton foliosum* Phil.  
Sinónimos: *Dipterygia foliosa* Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-400 m.

*Gymnophyton isatidicarpum* (C. Presl ex DC.) Mathias & Constance  
Sinónimos: *Mulinum isatidicarpum* C. Presl ex DC., *Dipterygia isatidicarpa* C. Presl ex DC., *Asteriscium isatidicarpum* Hook. & Arn., *Gymnophyton spinescens* Phil., *Dipterygia spinescens* Kuntze, *Asteriscium spinescens* Drude  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 800-3500 m.

*Gymnophyton robustum* Clos  
Sinónimos: *Asteriscium robustum* Baill.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: TAR, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 400-2500 m.  
Nombre vulgar: Bíobio.

*Gymnophyton spinosissimum* Phil.  
Sinónimos: *Dipterygia spinosissima* Kuntze, *Asteriscium spinosissimum* Drude  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2800-4500 m.

## Homalocarpus

### *Homalocarpus bowlesiioides* Hook. & Arn.

Sinónimos: *Bowlesia elegans* Clos, *Bowlesia elata* Clos, *Bowlesia cana* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 900-1900 m.

### *Homalocarpus dichotomus* (Poepp. ex DC.) Mathias & Constance

Sinónimos: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC., *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *albo-squamata* Phil., *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *chrysoarpa* Phil., *Bowlesia multiradiata* Colla

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 400-3000 m.

### *Homalocarpus digitatus* (Phil.) Mathias & Constance

Sinónimos: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *digitata* (Phil.) Domin, *Bowlesia digitata* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 800-1100 m.

### *Homalocarpus dissectus* Mathias & Constance

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 100-1400 m.

### *Homalocarpus integerrimus* (Turcz.) Mathias & Constance

Sinónimos: *Bowlesia integerrima* Turcz., *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *integerrima* Domin

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, LBO.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

### *Homalocarpus nigripetalus* (Clos) Mathias & Constance

Sinónimos: *Bowlesia nigripetala* Clos

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 200-2000 m.

## Hydrocotyle

### *Hydrocotyle bonariensis* Lam.

Sinónimos: *Hydrocotyle umbellata* L. var. *bonariensis* (Lam.) Roem. & Schult., *Hydrocotyle multiflora* Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, BIO.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

### *Hydrocotyle chamaemorus* Cham. & Schldtl.

Sinónimos: *Hydrocotyle araucana* Phil., *Hydrocotyle araucana* Phil. var. *patagonica* Speg., *Hydrocotyle carrerae* Phil., *Hydrocotyle rahmeri* Phil., *Hydrocotyle valdiviana* Phil., *Hydrocotyle chamaemorus* Cham. & Schldtl. var. *valdiviana* Reiche, *Hydrocotyle skottsbergii* Gand.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Malva del monte.

### *Hydrocotyle cryptocarpa* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, LBO, NUB, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Hydrocotyle indecora* DC.

Sinónimos: *Hydrocotyle bonplandii* A. Rich. var. *chilensis* DC., *Hydrocotyle marchantioides* Clos

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Hydrocotyle modesta* Cham. & Schldtl.

Sinónimos: *Hydrocotyle modesta* Cham. & Schldtl. var. *repens* Clos

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Hydrocotyle poeppigii* DC.

Sinónimos: *Hydrocotyle lechleri* Phil., *Hydrocotyle uliginosa* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

### *Hydrocotyle ranunculoides* L.f.

Sinónimos: *Hydrocotyle batrachoides* DC., *Hydrocotyle ranunculoides* L. var. *lobata* Urb., *Hydrocotyle ranunculoides* L. var. *inciso-crenata* Urb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Hierba de la plata, tangué.

***Hydrocotyle umbellata* L.**

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, VAL, BIO.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Hydrocotyle verticillata* Thunb.**

Sinónimos: *Hydrocotyle volckmanni* Phil., *Hydrocotyle verticillata* Thunb. var. *pluriradiata* Urb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-800 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

**Levisticum**

***Levisticum officinale* W.D.J. Koch**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: LLA, MAG.

**Lilaeopsis**

***Lilaeopsis macloviana* (Gand.) A.W. Hill**

Sinónimos: *Crantzia macloviana* Gand., *Lilaeopsis andina* A.W. Hill, *Lilaeopsis andina* A.W. Hill var. *multivittata* A.W. Hill, *Lilaeopsis sinuata* A.W. Hill, *Crantzia lineata* (Michx.) Nutt. var. *subulata* Wedd., *Lilaeopsis lineata* Green  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Isru.

**Oreomyrrhis**

***Oreomyrrhis hookeri* Mathias & Constance**

Sinónimos: *Azorella daucooides* d'Urv., *Oreomyrrhis daucooides* auct. non Urb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

**Osmorhiza**

***Osmorhiza chilensis* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Osmorhiza berteroi* DC., *Osmorhiza berteroi* DC. var. *gracilior* Phil., *Schudia chilensis* Molina ex Clos  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Asta de cabra.

***Osmorhiza depauperata* Phil.**

Sinónimos: *Osmorhiza obtusa* (J.M. Coult. & Rose) Fernald, *Washingtonia obtusa* J.M. Coult. & Rose  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Osmorhiza glabrata* Phil.**

Sinónimos: *Myrrhis renjifoana* Phil., *Uraspermum glabratum* (Phil.) Kuntze, *Elleimataenia renjifoana* (Phil.) Koso-Poliansky  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1500-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Pastinaca**

***Pastinaca sativa* L.**

Hierba. Bienal. Introducida.  
Distribución: RME, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS.

**Petroselinum**

***Petroselinum crispum* (Mill.) A.W.Hill.**

Hierba. Bienal. Introducida.  
Distribución: VAL, JFE.

**Pozoa**

***Pozoa coriacea* Lag.**

Sinónimos: *Pozoa hydrocotylifolia* Bridges, *Azorella coriacea* (Lag.) Kuntze, *Azorella hydrocotylifolia* (Bridges) Macloskie, *Pozoa denticulata* Meyen  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Anislao.

***Pozoa volcanica* Mathias & Constance**

Sinónimos: *Azorella volcanica* M. Hiroe  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 1200-2400 m.  
Países limítrofes: Argentina.



## Sanicula

*Sanicula crassicaulis* Poepp. ex DC.

Sinónimos: *Sanicula liberta* auct. non Cham. & Schltldl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pata de león.

*Sanicula graveolens* Poepp. ex DC.

Sinónimos: *Sanicula macrorhiza* Bertero ex Colla, *Sanicula macrorhiza* Bertero ex Colla var. *andina* Meigen

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 1500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pata de león.

## Scandix

*Scandix pecten-veneris* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

## Seseli

*Seseli libanotis* (L.) Koch

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: BIO.

## Sium

*Sium latifolium* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

## Torilis

*Torilis arvensis* (Huds.) Link

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

*Torilis nodosa* (L.) Gaertn.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, JFE.

## APOCYNACEAE

### Asclepias

*Asclepias curassavica* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, IPA.

### Catharanthus

*Catharanthus roseus* (L.) G. Don

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

### Diplolepis

*Diplolepis biflora* (Phil.) Hechem & C. Ezcurra

Sinónimos: *Diplolepis nummulariifolia* (Hook. & Arn.)

Liede & Rapini var. *biflora* (Phil.) Hechem & C. Ezcurra,

*Cynoctonum biflorum* Phil., *Cynanchum nummulariifolium*

Hook. & Arn. var. *biflorum* (Phil.) Reiche, *Vincetoxicum*

*biflorum* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

*Diplolepis boerhaviifolia* (Hook. & Arn.) Liede & Rapini

Sinónimos: *Cynanchum boerhaviifolium* Hook. & Arn.,

*Cynoctonum boerhaviifolium* (Hook. & Arn.) Decne.,

*Oxypetalum parvifolium* Phil., hom. illeg., *Schizostemma*

*kingii* Phil., *Vincetoxicum biflorum* (Phil.) Kuntze

Subarbusto trepador. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Pehuendum, pahueldum.

*Diplolepis geminiflora* (Decne.) Liede & Rapini

Sinónimos: *Astephanus geminiflorus* Decne.

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Nombre vulgar: Azahar de quissco, azahar, cuerdecilla,

cordelillo, lichilahuén, voquicillo.

*Diplolepis hieronymi* (Lorentz) Liede & Rapini

Sinónimos: *Astephanus hieronymi* (Lorentz) Malme,

*Cynanchum fallax* Hicken, *Cynanchum hieronymi* (Lorentz)

Hicken, *Astephanus fallax* (Hicken) T. Mey., *Grisebachiella*

*hieronymi* Lorentz

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 600-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Diplolepis menziesii*** Schult.f.

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 300-900 m.

Nombre vulgar: Voquicillo, voqui amarillo.

***Diplolepis mucronata*** (Decne.) Hechem & C. Ezcurra

Sinónimos: *Cynanchum chilense* (Phil.) Malme,

*Holostemma chilense* Phil., *Cynoctonum mucronatum*

Decne., *Cynanchum mucronatum* (Decne.) Reiche, comb.

illeg., *Vincetoxicum mucronatum* (Decne.) Kuntze

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB.

Rango altitudinal: 800-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Voqui.

***Diplolepis myrtifolia*** (Hook. & Arn.) Hechem & C. Ezcurra

Sinónimos: *Cynanchum myrtifolium* Hook. & Arn.,

*Cynoctonum myrtifolium* (Hook. & Arn.) Decne., *Cynoctonum*

*nemorosum* Phil., *Vincetoxicum nemorosum* (Phil.) Kuntze

Subarbusto trepador. Endémico.

Distribución: ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Nombre vulgar: Hierba del tricao.

***Diplolepis nummulariifolia*** (Hook. & Arn.) Liede & Rapini

Sinónimos: *Cynanchum patagonicum* (Phil.) Malme,

*Cynoctonum nummulariifolium* (Hook. & Arn.) Decne.,

*Cynoctonum undulatum* Decne., *Cynanchum nanum* Skottsb.,

hom. illeg., *Cynoctonum patagonicum* Phil., *Vincetoxicum*

*patagonicum* (Phil.) Kuntze, *Cynanchum undulatum*

(Decne.) K. Schum., *Cynanchum nummulariifolium*

Hook. & Arn., *Vincetoxicum nummularifolium* (Hook. &

Arn.) Kuntze, *Vincetoxicum undulatum* (Decne.) Kuntze,

*Cynanchum andinum* Liede, *Cynanchum nanissimum* Liede,

nom. illeg., *Cynanchum nanellum* P.T. Li

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LRI.

Rango altitudinal: 700-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Diplolepis pachyphylla*** (Decne.) Hechem & C. Ezcurra

Sinónimos: *Cynanchum acutifolium* (Phil.) Reiche,

*Cynanchum pachyphyllum* (Decne.) K. Schum., *Cynoctonum*

*acutifolium* Phil., *Cynoctonum pachyphyllum* Decne.,

*Cynoctonum chiloense* Decne., *Cynanchum lancifolium*

Hook. & Arn., hom. illeg., *Vincetoxicum chiloense* (Decne.)

Kuntze, *Vincetoxicum pachyphyllum* (Decne.) Kuntze,

*Cynanchum chiloense* (Decne.) Malme

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 100-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pahueldin, pahueldum, pahueldun.

***Diplolepis viridis*** (Phil.) Hechem & C. Ezcurra

Sinónimos: *Cynanchum deserticola* A.R. Flores & J.M.

Watson, *Cynoctonum viride* Phil., *Cynanchum viride* (Phil.)

Reiche, nom. illeg., *Cynanchum atacamense* Liede

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

**Elytropus**

***Elytropus chilensis*** (A. DC.) Müll. Arg.

Sinónimos: *Echites chilensis* A. DC., *Echites ptarmicus*

Poepp., *Echites heterophyllum* Miq., *Elytropus ptarmica*

(Poepp.) Miers, *Vinca sternutetoria* Poepp. ex Reiche.,

*Elytropus heterophyllum* Miers, *Elytropus pubescens* Miers

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,

AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Poroto del campo, quilmay, voqui.

**Philibertia**

***Philibertia candolleana*** (Hook. & Arn.) Goyder

Sinónimos: *Brachylepis candolleana* Hook. & Arn.,

*Astephanus cordifolius* Phil., *Mitostigma cordifolium* (Phil.)

E. Fourn., *Aphanostelma candolleianum* (Hook. & Arn.)

Malme, *Melinia candolleana* (Hook. & Arn.) Decne.

Subarbusto trepador. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Philibertia solanoides*** Kunth

Sinónimos: *Blepharodon rahmeri* Phil., *Philibertia rahmeri*

(Phil.) Malme

Subarbusto trepador. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2000-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

**Skytanthus**

***Skytanthus acutus*** Meyen

Sinónimos: *Scytanthus acutus* Walp., *Neriandra*

*angustifolia* DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Cuerno, cuerno de cabra, monte de burro,

cuernecillo.

## **Tweedia**

### ***Tweedia andina*** (Phil.) G.H. Rua

Sinónimos: *Tweedia hookeri* (Decne.) Malme, *Oxypetalum andinum* Phil., *Oxypetalum hookeri* Decne., *Oxypetalum mölleri* Phil.

Subarbusto trepador. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Voquicillo.

### ***Tweedia birostrata*** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Tweedia confertiflora* (Decne.) Malme, *Tweedia obliquifolia* (Colla) Malme, *Cynanchum birostratum* Hook. & Arn., *Gonolobus obliquifolius* Colla, *Gonolobus voquicillo* Colla, *Oxypetalum saxatile* Decne., *Oxypetalum confertiflorum* Decne., *Oxypetalum brevipes* Phil., *Gothofreda birostrata* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Gothofreda obliquifolia* (Colla) Kuntze, *Gothofreda confertiflora* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda brevipes* (Phil.) Kuntze, *Oxypetalum angustifolium* Phil., *Tweedia brevipes* (Phil.) Malme

Subarbusto trepador. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Nombre vulgar: Voquicillo.

### ***Tweedia stipitata*** G.H. Rua & Liede

Subarbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-800 m.

## **Vinca**

### ***Vinca major*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

## **ARALIACEAE**

### **Hedera**

#### ***Hedera helix*** L.

Arbusto trepador. Introducido.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

Nombre vulgar: Hiedra.

### **Raukua**

#### ***Raukua laetevirens*** (Gay) Frodin

Sinónimos: *Aralia laetevirens* Gay, *Aralia paniculata* Phil.,

*Cheirodendron laetevirens* (Gay) Seem., *Pseudopanax laetevirens* (Gay) Dusén, comb. illeg., *Pseudopanax laetevirens* (Gay) Franchet

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Sauco cimarrón, sauco del diablo.

#### ***Raukua valdiviensis*** (Gay) Frodin

Sinónimos: *Aralia valdiviensis* Gay, *Aralia valdiviensis* Gay, *Pseudopanax valdiviensis* (Gay) Seem. ex Harms, *Pseudopanax valdiviensis* (Gay) Seem. ex Harms

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Curaco, traumén, voquinaranjillo, hueldahuca.

## **ARISTOLOCHIACEAE**

### **Aristolochia**

#### ***Aristolochia bridgesii*** (Klotzsch) Duch.

Sinónimos: *Aristolochia pearcei* Phil., *Howardia bridgesii* Klotzsch

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 900-1300 m.

Nombre vulgar: Oreja de zorro amarilla.

#### ***Aristolochia chilensis*** Bridges ex Lindl.

Sinónimos: *Aristolochia setigera* Klotzsch

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Oreja de zorro, hierba de la Virgen María, clon.

### **Lactoris**

#### ***Lactoris fernandeziana*** Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 500 m.

## **ASTERACEAE**

### **Abrotanella**

#### ***Abrotanella emarginata*** (Gaudich.) Cass.

Sinónimos: *Oligosporus emarginatus* Gaudich.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Abrotanella linearifolia*** A. Gray

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

***Abrotanella purpurea*** Swenson

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Abrotanella submarginata*** A. Gray

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Abrotanella trichoachaenia*** Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 800-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Abrotanella trilobata*** Swenson

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 400-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

## **Achillea**

***Achillea millefolium*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,

LRI, LLA, AIS, MAG.

***Achillea ptarmica*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA.

## **Achyrocline**

***Achyrocline tomentosa*** Rusby

Sinónimos: *Achyrocline polycephala* Rusby

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 700-3600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

## **Acmella**

***Acmella glaberrima*** (Hassl.) R.K. Jansen

Sinónimos: *Spilanthes glaberrima* Hassl.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 0-500 m.

## **Acrisione**

***Acrisione cymosa*** (J. Remy) B. Nord.

Sinónimos: *Senecio cymosus* J. Remy, *Senecio lechleri* Sch.

Bip. nom. Nud.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Nombre vulgar: Matico, para ná.

***Acrisione denticulata*** (Hook. & Arn.) B. Nord. var. ***denticulata***

Sinónimos: *Senecio yegua* (Colla) Cabrera var. *yegua*,

*Cacalia denticulata* Hook. & Arn., *Danaa yegua* Colla,

*Senecio denticulatus* (Hook. & Arn.) DC., hom. illeg.,

*Senecio ovalifolius* Turcz., *Senecio rancaguensis* J. Remy,

*Senecio yegua* (Colla) Cabrera var. *depilis* (Phil.) Cabrera

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 700-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Palpalen, palo de yegua.

***Acrisione denticulata*** (Hook. & Arn.) B. Nord. var. ***pilota***  
(Phil.) B. Nord.

Sinónimos: *Senecio denticulatus* (Hook. & Arn.) DC. var.

*pilotus* Phil., *Senecio yegua* (Colla) Cabrera var. *pilotus*

(Phil.) Cabrera

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

## **Adenocaulon**

***Adenocaulon chilense*** Less.

Sinónimos: *Adenocaulon lechleri* Sch. Bip., *Boerhavia*

*nudicaulis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,

AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

## **Ageratum**

### ***Ageratum conyzoides* L.**

Hierba. Anual o perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.

## **Agoseris**

### ***Agoseris chilensis* (Less.) Greene**

Sinónimos: *Macrorhynchus chilensis* Less., *Troximon chilense* (Less.) A. Gray  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-1100 m.  
Nombre vulgar: Yesquilla.

### ***Agoseris coronopifolia* (d'Urv.) K.L. Chambers ex D.M. Moore**

Sinónimos: *Agoseris australis* (Phil.) Macloskie, *Agoseris pumila* (Gaudich.) Macloskie, *Macrorhynchus australis* Phil., *Macrorhynchus elatus* Phil., *Macrorhynchus poeppigii* DC., *Macrorhynchus pumilum* (Gaudich.) DC., *Taraxacum coronopifolium* d'Urv., *Taraxacum pumilum* Gaudich., *Agoseris poeppigii* (DC.) Greene, *Troximon coronopifolius* (d'Urv.) Cabrera, *Troximon poeppigii* (DC.) De Wild., *Troximon pumilum* (Gaudich.) De Wild.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, NUB, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## **Aldama**

### ***Aldama adenotricha* (S.F. Blake) E.E. Schill. & Panero**

Sinónimos: *Viguiera adenotricha* S.F. Blake  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ.

### ***Aldama atacamensis* (Phil.) E.E. Schill. & Panero**

Sinónimos: *Viguiera atacamensis* Phil., *Viguiera linearis* Reiche, *Rhysolepis atacamensis* (Phil.) H. Rob. & A.J. Moore  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2800-2900 m.

### ***Aldama helianthoides* (Rich.) E.E. Schill. & Panero**

Sinónimos: *Viguiera pazensis* Rusby, *Flourensia atacamensis* (Phil.) Reiche, *Helianthus atacamensis* Phil., *Sanvitalia helianthoides* Rich., *Rhysolepis helianthoides* (Rich.) H. Rob. & A.J. Moore  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Sorona.

### ***Aldama revoluta* (Meyen) E.E. Schill. & Panero**

Sinónimos: *Viguiera revoluta* (Meyen) S.F. Blake, *Flourensia corymbosa* DC., *Flourensia corymbosa* DC. var. *araucana* (Phil.) Reiche, *Helianthus araucanus* Phil., *Helianthus revolutus* Meyen, *Viguiera corymbosa* (DC.) Blake, *Viguiera poeppigii* A. Gray, nom. illeg., *Viguiera gayana* (Phil.) Cabrera ex Espinosa, nom. illeg., *Flourensia gayana* (Phil.) Reiche, *Helianthus gayanus* Phil.  
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Botón de oro del monte, china del campo, maravilla.

## **Amblyopappus**

### ***Amblyopappus pusillus* Hook. & Arn. var. *pauciflorus* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Amblyopappus pauciflorus* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Nombre vulgar: Manzanilla.

### ***Amblyopappus pusillus* Hook. & Arn. var. *pusillus***

Sinónimos: *Aroma tenuifolia* Nutt., *Infantea chilensis* J. Remy  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, JFE.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Nombre vulgar: Manzanilla.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

## **Ambrosia**

### ***Ambrosia arborescens* Mill.**

Arbusto. Introducido.  
Distribución: COQ.

### ***Ambrosia artemisioides* Meyen & Walp. ex Meyen**

Sinónimos: *Franseria fruticosa* Phil., *Franseria meyeniana* Sch. Bip.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 1700-4600 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Tikara, pikara, cadillo, monte verde, tola negra, pegapega, lipelipe.



***Ambrosia chamissonis*** (Less.) Greene

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

***Ambrosia elatior*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

***Ambrosia peruviana*** Willd.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR.

***Ambrosia tenuifolia*** Spreng.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: BIO.

**Anaphalis**

***Anaphalis chilensis*** Reiche

Sinónimos: *Helichrysum chilense* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-800 m.

**Antennaria**

***Antennaria chilensis*** J. Remy var. *chilensis*

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1600-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Antennaria chilensis*** J. Remy var. *magellanica* (Sch. Bip.)

Reiche

Sinónimos: *Antennaria magellanica* Sch. Bip.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

**Anthemis**

***Anthemis arvensis*** L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LLA.

***Anthemis cotula*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

**Aphyllocladus**

***Aphyllocladus denticulatus*** (J. Remy) Cabrera var. *calvus* (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Jobaphes virgatus* Phil. var. *calvus* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2500-2800 m.

***Aphyllocladus denticulatus*** (J. Remy) Cabrera var. *denticulatus*

Sinónimos: *Cyclolepis denticulata* J. Remy, *Jobaphes virgatus* Phil., *Plazia virgata* (Phil.) O. Hoffm.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 700-2700 m.

Nombre vulgar: Piyaya sureña, monte blanco.

**Arctium**

***Arctium minus*** (Hill) Bernh.

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA.

**Arctotheca**

***Arctotheca calendula*** (L.) Levyns

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

**Argyranthemum**

***Argyranthemum frutescens*** (L.) Sch. Bip.

Subarbusto. Introducido.

Distribución: COQ, RME.

**Arnica**

***Arnica angustifolia*** Vahl

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA.

**Artemisia**

***Artemisia absinthium*** L.

Subarbusto. Introducido.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

***Artemisia copa*** Phil. var. *copa*

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, VAL.

Rango altitudinal: 3000-4700 m.

Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Copa, kopa, salvia blanca.

**Artemisia copa** Phil. var. *trifida* Acevedo  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 2400 m.

**Artemisia magellanica** Sch. Bip.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Artemisia verlotorum** Lamotte  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAU.

### Baccharis

**Baccharis acaulis** (Wedd. ex R.E. Fr.) Cabrera  
Sinónimos: *Heterothalamus acaulis* Wedd. ex R.E. Fr.,  
*Pseudobaccharis acaulis* (Wedd. ex R.E. Fr.) Cabrera,  
*Psila caespitosa* Phil., *Baccharis acaulis* (Wedd. ex R.E.  
Fr.) Malag., nom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3300-3700 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Mamañika, qatari, anojarpsike, psike de  
perro.

**Baccharis alnifolia** Meyen & Walp.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3000-3800 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Chilca blanca, pichana, monte.

**Baccharis boliviensis** (Wedd.) Cabrera  
Sinónimos: *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cuatrec., comb.  
illeg., *Heterothalamus boliviensis* Wedd., *Pseudobaccharis*  
*boliviensis* (Wedd.) Cabrera, *Psila boliviensis* (Wedd.)  
Cabrera, *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Malag., comb. illeg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 1500-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Tolilla, tolita, tola chica, monte de paloma,  
tola amarilla, tola hembra.

**Baccharis caespitosa** (Ruiz & Pav.) Pers.  
Sinónimos: *Molina caespitosa* Ruiz & Pav.  
Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, LBO.  
Rango altitudinal: 3500-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**Baccharis calliprinos** Griseb.  
Sinónimos: *Pingraea scandens* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig,  
*Baccharis petiolata* DC., *Baccharis petiolata* DC. var.  
*rotundifolia* Phil., *Baccharis scandens* auct. non (Ruiz  
& Pav.) Pers., *Molina scandens* Ruiz & Pav., *Baccharis*  
*salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. *calliprinos* (Griseb.)  
Joch.Müll., *Baccharis scandens* (Ruiz & Pav.) Pers.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 1400-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.  
Nombre vulgar: Chilca, chillka, suncho, pichana, sangayo.

**Baccharis concava** (Ruiz & Pav.) Pers.  
Sinónimos: *Baccharis macraei* Hook. & Arn. var. *intermedia*  
Heering, *Molina concava* Ruiz & Pav.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: BIO.  
Rango altitudinal: 0-300 m.  
Nombre vulgar: Vautro, gaultro, guauchu.

**Baccharis cymosa** Phil.  
Sinónimos: *Pingraea cymosa* (Phil.) F.H. Hellwig  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: LRI.  
Rango altitudinal: 1000-1300 m.

**Baccharis darwinii** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Neomolina darwinii* (Hook. & Arn.) F.H.  
Hellwig, nom. illeg., *Baccharis angulata* Griseb. var.  
*gracilis* Heering  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Baccharis elaeoides** J. Remy  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Baccharis genistelloides** (Lam.) Pers.  
Sinónimos: *Molina venosa* Ruiz & Pav., *Baccharis venosa*  
(Ruiz & Pav.) Pers.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 3900 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Baccharis glutinosa*** Pers.

Sinónimos: *Baccharis angustifolia* (Cass.) Desf., nom. illeg., *Baccharis pingraea* DC. var. *angustissima* DC., *Baccharis pingraea* DC. var. *pingraea*, *Baccharis pingraea* DC. fma. *latifolia* DC., *Baccharis serrulata* (Lam.) Pers. var. *pingraea* (DC.) Baker, *Baccharis viscosa* (Ruiz & Pav.) Kuntze, comb. illeg., *Molina viscosa* Ruiz & Pav., *Pingraea viscosa* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig, *Baccharis huydobriana* J. Remy p.p., *Baccharis litoralis* Phil., *Baccharis longipes* Kunze ex DC. var. *angustissima* Phil., *Baccharis glutinosa* Pers. var. *angustissima* (DC.) Giuliano, *Baccharis pingraea* DC. var. *latifolia* DC., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chilca, chilquilla.

***Baccharis intermedia*** DC.

Sinónimos: *Baccharis gayana* Phil., *Baccharis volckmannii* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

***Baccharis juncea*** (Cass.) Desf.

Sinónimos: *Arrhenachne juncea* Cass.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Suncho, pasto loco, totora, chukchuka, mutumutu.

***Baccharis linearis*** (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. *linearis*

Sinónimos: *Baccharis lingulata* Kunze ex Less., *Baccharis linifolia* Meyen, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn., *Molina linearis* Ruiz & Pav., *Baccharis montteana* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Romerillo, romero, romero de la tierra.

***Baccharis linearis*** (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. *pycnocephala* F.H. Hellwig

Sinónimos: *Baccharis callistemoides* Walp., *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *callistemoides* (Walp.) Heering ex Reiche, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *subsiniuata* DC., *Baccharis subandina* Phil., *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *subandina* (Phil.) Heering

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Baccharis lycioides*** J. Remy

Sinónimos: *Baccharis negerii* Heering, *Baccharis valdiviana* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Romerillo.

***Baccharis macraei*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Baccharis macraei* Hook. & Arn. var. *lucida* Heering

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Baccharis magellanica*** (Lam.) Pers.

Sinónimos: *Baccharis tricuneata* (L.f.) Pers. var. *magellanica* (Lam.) Cuatrec., *Conyza magellanica* Lam.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Baccharis mylodontis*** F.H. Hellwig

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Baccharis neaei*** DC.

Sinónimos: *Baccharis bezanilleana* J. Remy, *Baccharis bezanilleana* J. Remy var. *solisii* (Phil.) Reiche, *Baccharis rhetinodes* Meyen & Walp., *Baccharis solieri* J. Remy, *Baccharis solisii* Phil., *Baccharis talcareguensis* Heering ex Reiche, *Baccharis solieri* J. Remy var. *williamsii* (Phil.) Heering, *Baccharis williamsii* F. Phil. ex Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Romerillo del monte.

***Baccharis nivalis*** (Wedd.) Sch. Bip. ex Phil.

Sinónimos: *Palenia delphinii* Phil., *Heterothalamus nivalis* Wedd., *Lucilia dioica* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Baccharis obovata* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Baccharis umbelliformis* DC., *Baccharis foliosa* Hook. & Arn., *Baccharis obovata* Hook. & Arn. subsp. *umbelliformis* (DC.) F.H. Hellwig, *Baccharis umbelliformis* DC. fma. *frigida* Heering, nom. illeg., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *typica* Heering, nom. illeg., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *vulgaris* Heering, *Baccharis umbelliformis* DC. var.  $\beta$

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chilca, vautre.

***Baccharis paniculata* DC.**

Sinónimos: *Baccharis philippii* Heering, *Neomolina paniculata* (DC.) F.H. Hellwig, nom. illeg., *Baccharis floribunda* Phil., hom. illeg., *Baccharis leptcephala* Phil., hom. illeg., *Nardophyllum paniculatum* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Baccharis patagonica* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Baccharis cuneifolia* (Lam.) DC., hom. illeg., *Conyza cuneifolia* Lam.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Baccharis pilcensis* F.H. Hellwig**

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1600-2200 m.

***Baccharis poeppigiana* DC. subsp. *austropedicellata* F.H. Hellwig**

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Baccharis poeppigiana* DC. subsp. *ocellata* (Phil.) F.H. Hellwig**

Sinónimos: *Baccharis ocellata* Phil., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *ocellata* (Phil.) Heering ex Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Baccharis poeppigiana* DC. subsp. *poeppigiana***

Sinónimos: *Baccharis obovata* Hook. & Arn. var. *poeppigiana* (DC.) Cabrera, *Baccharis umbelliformis* DC. var. *poeppigiana* (DC.) Heering ex Reiche, *Baccharis pedicellata* DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Nombre vulgar: Chilca cordillerana.

***Baccharis pycnantha* Phil.**

Sinónimos: *Pingraea pycnantha* (Phil.) F.H. Hellwig

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

***Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC.**

Sinónimos: *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn., *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *eupatorioides* (Hook. & Arn.) Heering ex Reiche, comb. illeg., *Molina racemosa* Ruiz & Pav., *Neomolina racemosa* (Ruiz & Pav.) Hellwig, *Baccharis fastigiata* Phil. ex Reiche, *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *angolensis* Kuntze, *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *eupatorioides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Baccharis rigida* Hook. & Arn., *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *typica* Heering, nom. illeg., *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn. var.  $\beta$ , *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn. var. *gama*, *Baccharis ovata* Hook. & Arn.

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chilca.

***Baccharis rhomboidalis* J. Remy**

Sinónimos: *Baccharis rhomboidalis* J. Remy subsp. *truncata* (Phil.) F.H. Hellwig, *Baccharis involucrata* Phil., *Baccharis nemorosa* Phil., *Baccharis rhomboidalis* J. Remy var. *nemorosa* (Phil.) Heering ex Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

***Baccharis sagittalis* (Less.) DC.**

Sinónimos: *Molina sagittalis* Less., *Pingraea sagittalis* (Less.) F.H. Hellwig

Subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2400 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Verbena de tres esquinas.

***Baccharis salicifolia*** (Ruiz & Pav.) Pers.

Sinónimos: *Baccharis longipes* Kunze ex DC., *Baccharis marginalis* DC. var. *longipes* (Kunze ex DC.) Heering, *Baccharis viscosa* (Ruiz & Pav.) Kuntze var. *nigricans* Kuntze, *Molina salicifolia* Ruiz & Pav., *Baccharis confertifolia* Bertero ex Colla, *Baccharis krausei* Heering ex Reiche, *Baccharis marginalis* DC., *Baccharis pallida* Heering ex Reiche, *Pingraea marginalis* (DC.) F.H. Hellwig, *Pingraea salicifolia* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig, *Baccharis chilquilla* DC., nom. illeg., *Baccharis araucana* Phil., *Baccharis cuervii* Phil., *Baccharis glutinosa* Pers. var. *incisa* Heering, *Baccharis huydobriana* J. Remy, *Baccharis linifolia* Phil., hom. illeg., *Baccharis marginalis* DC. var. *araucana* (Phil.) Heering, *Baccharis marginalis* DC. var. *linifolia* (Phil.) Heering, *Baccharis sphaerocephala* Hook. & Arn. var. *krausei* (Heering) Malag., comb. illeg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Chilca, chilquilla, chilquilla del río, suncho, culpío, radín.

***Baccharis sessilifolia*** DC.

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Baccharis spartioides*** (Hook. & Arn. ex DC.) J. Remy

Sinónimos: *Baccharis sarophora* Phil., *Heterothalamus spartioides* Hook. & Arn. ex DC., *Pseudobaccharis spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera, *Psila spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Escoba, hierba de la escoba, pichana.

***Baccharis sphaerocephala*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Pingraea sphaerocephala* (Hook. & Arn.) F.H. Hellwig, *Baccharis radin* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-700 m.  
Nombre vulgar: Rari.

***Baccharis taltalensis*** I.M. Johnst.

Sinónimos: *Neomolina taltalensis* (I.M. Johnst.) F.H.

Hellwig, nom. illeg.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 300-900 m.

***Baccharis tola*** Phil. subsp. *santelicis* (Phil.) Joch. Müller var. *chrysophylla* (F.H. Hellwig) Joch. Müller

Sinónimos: *Baccharis santelicis* Phil. subsp. *chrysophylla* F.H. Hellwig  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 3000-4600 m.  
Países limítrofes: Bolivia.

***Baccharis tola*** Phil. subsp. *santelicis* (Phil.) Joch. Müller var. *incarum* (Wedd.) Joch. Müller

Sinónimos: *Baccharis santelicis* Phil., *Baccharis microphylla* Kunth var. *incarum* Wedd., *Baccharis incarum* Wedd.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 1900-4800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Ñaka, lejía, tola lejía, ñakat'ula.

***Baccharis tola*** Phil. subsp. *tola* var. *tola*

Sinónimos: *Baccharis incarum* (Wedd.) Perkins var. *lejia* (Phil.) Cabrera, *Baccharis tola* Phil. var. *lejia* (Phil.) Reiche, *Baccharis lejia* Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 2200-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Lejia, tola, leña lejía, loire, ñaka.

***Baccharis tola*** Phil. subsp. *tola* var. *viscosissima* (Kuntze) Joch. Müller

Sinónimos: *Baccharis magellanica* (Lam.) Pers. var. *viscosissima* Kuntze, *Baccharis tola* Phil. subsp. *altiplanicola* F.H. Hellwig, *Baccharis tola* Phil. var. *viscosissima* (Kuntze) Joch. Müll.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3100-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Tolita, chachakoma de burro.

***Baccharis vernalis*** F.H. Hellwig

Sinónimos: *Baccharis concava* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *floribunda* Heering  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-700 m.



**Baccharis zoellneri** F.H. Hellwig subsp. *minor* F.H. Hellwig  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 800-1400 m.

**Baccharis zoellneri** F.H. Hellwig subsp. *zoellneri*  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### Bahia

**Bahia ambrosioides** Lag.  
Sinónimos: *Achyropappus maritimus* Poepp. ex DC., nom. nud., *Stylesia ambrosioides* (Lag.) Nutt., *Stylesia puberula* Nutt., *Eriophyllum ambrosioides* (Lag.) Kuntze  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Nombre vulgar: Chamicilla, manzanilla cimarrona, chamiza blanca.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

### Bellis

**Bellis perennis** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

### Belloa

**Belloa chilensis** (Hook. & Arn.) J. Remy  
Sinónimos: *Chevreulia nivea* Phil., *Gnaphalium andicola* Kuntze, hom. illeg., *Lucilia araucana* Phil., *Lucilia chilensis* Hook. & Arn., *Lucilia chilensis* Poepp. & Endl., hom. illeg., *Lucilia frigida* Reiche, nom. illeg., *Lucilia nivea* (Phil.) Cabrera  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 900-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### Bidens

**Bidens aurea** (Aiton) Sherff  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, IPA.

**Bidens laevis** (L.) Britton, Sterns & Poggenb.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

**Bidens pilosa** L. var. *alausensis* (Kunth) Sherff  
Sinónimos: *Bidens alausensis* Kunth, *Bidens valparadisiaca* Colla, *Bidens chilensis* DC.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, JFE.  
Rango altitudinal: 0-2800 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

**Bidens pilosa** L. var. *apiifolia* (DC.) Sherff  
Sinónimos: *Bidens chilensis* DC. var. *apiifolia* DC.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.

**Bidens pilosa** L. var. *pilosa*  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE, IPA.

**Bidens pseudocosmos** Sherff  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, COQ.  
Rango altitudinal: 2900-3400 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Amor seco.

**Bidens subalternans** DC.  
Sinónimos: *Bidens quadrangularis* DC.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

**Bidens triplinervia** Kunth var. *macrantha* (Wedd.) Sherff  
Sinónimos: *Bidens macrantha* Griseb., *Bidens humilis* Wedd. var. *macrantha* Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 1000-3300 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Flor amarilla.

**Bidens triplinervia** Kunth var. *triplinervia*  
Sinónimos: *Bidens pedunculata* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 2000-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## Blennosperma

### *Blennosperma chilense* Less.

Sinónimos: *Soliva radiata* Poepp. ex Less., *Unxia anthemidifolia* Bertero ex Colla, *Unxia anthemidifolia* Bertero ex Less., *Apalus anthemifolius* (Bertero ex Colla) DC.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

## Brachyclados

### *Brachyclados caespitosus* (Phil.) Speg.

Sinónimos: *Brachyclados obtusifolius* Kuntze, *Brachyclados pygmaeus* Kuntze, *Lavidia caespitosa* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Brachyclados lycioides* D. Don

Sinónimos: *Baucis lavandulifolia* Phil., *Brachyclados involutus* Kuntze, *Brachyclados macrocephalus* Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

## Calendula

### *Calendula arvensis* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO.

### *Calendula officinalis* L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, JFE.

### *Calendula tripterocarpa* Rupr.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ.

## Calopappus

### *Calopappus acerosus* Meyen

Sinónimos: *Nassauvia remyana* Wedd., *Calopappus acanthifolius* J. Remy, *Nassauvia acanthifolia* (J. Remy)

G.F. Grandjot, *Nassauvia acerosa* (Meyen) Wedd.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2300-3200 m.

## Calyptocarpus

### *Calyptocarpus vialis* Less.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

## Carduus

### *Carduus nutans* L.

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, ARA.

### *Carduus pycnocephalus* L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

### *Carduus tenuiflorus* Curtis

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: VAL.

### *Carduus thoermeri* Weinm.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, ARA, AIS, MAG.

## Carthamus

### *Carthamus lanatus* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

### *Carthamus tinctorius* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, RME, BIO.

## Centaurea

### *Centaurea atacamensis* (Reiche) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Centaurea floccosa* Hook. & Arn. var. *atacamensis* Reiche, *Centaurea atacamensis* (Reiche)

Ravenna, comb. illeg.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

### *Centaurea benedicta* (L.) L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAU.

### *Centaurea bulbosa* Hook. & Arn.

Sinónimos: *Centaurea dianthoides* J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

***Centaurea cachinalensis*** Phil.

Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-2800 m.

***Centaurea calcitrapa*** L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LRI, LLA.

***Centaurea chilensis*** Hook. & Arn. var. *breviloba* DC.

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.

***Centaurea chilensis*** Hook. & Arn. var. *chilensis*

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 1500-3500 m.  
Nombre vulgar: Hierba o flor del minero.

***Centaurea chilensis*** Hook. & Arn. var. *stenolepis* Phil.

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Centaurea cyanus*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: RME, AIS.

***Centaurea floccosa*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Centaurea illapelina* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-2900 m.

***Centaurea gayana*** J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.

***Centaurea jacea*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ARA.

***Centaurea melitensis*** L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,  
LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA.

***Centaurea monocephala*** J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO.

***Centaurea nigra*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ARA.

***Centaurea solstitialis*** L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

**Centaurodendron**

***Centaurodendron dracaenoides*** Johow

Sinónimos: *Plectocephalus dracaenoides* (Johow) F.H.  
Hellwig  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Centaurodendron palmiforme*** Skottsb.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

**Centipeda**

***Centipeda elatinoides*** (Less.) Benth. & Hook.f. ex O. Hoffm.

Sinónimos: *Myriogyne elatinoides* Less.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,  
LLA.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Pedorilla, peorrilla.

**Chaetanthera**

***Chaetanthera albiflora*** (Phil.) A.M.R. Davies

Sinónimos: *Chaetanthera linearis* Poepp. ex Less. var. *albiflora* Phil., *Chaetanthera linearis* Poepp. ex Less. var. *taltalensis* I.M. Johnst., *Chaetanthera microphylla* (Cass.) Hook. & Arn. var. *albiflora* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less. var. *albiflora* Phil., *Chaetanthera albiflora* Phil., nom. illeg.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 1600-1800 m.

***Chaetanthera chilensis*** (Willd.) DC. var. *chilensis*

Sinónimos: *Chaetanthera chilensis* (Willd.) DC. var. *argentea* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera chilensis* (Willd.) DC. var. *involuta* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera argentea* D. Don, p.p. *Chaetanthera argentea* Phil., hom. illeg., *Chaetanthera collina* Phil., *Chaetanthera eryngioides* D. Don, *Chaetanthera grandiflora* Steud., *Chaetanthera nana* Phil., *Chaetanthera sericea* Lag., *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *argentea* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera*

*serrata* Ruiz & Pav. var. *nana* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera sublignosa* Kuntze, *Perdicium chilense* Willd., *Chaetanthera involucrata* Phil., *Chaetanthera tenuifolia* D. Don var. *eryngioides* (D. Don) Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

*Chaetanthera chilensis* (Willd.) DC. var. *tenuifolia* (D. Don) Cabrera

Sinónimos: *Chaetanthera argentea* D. Don, p.p., *Chaetanthera tenuifolia* D. Don

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO.

Países limítrofes: Argentina.

*Chaetanthera ciliata* Ruiz & Pav.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

*Chaetanthera depauperata* (Hook. & Arn.) A.M.R. Davies

Sinónimos: *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less. var. *depauperata* (Hook. & Arn.) DC., *Chaetanthera leptcephala* Cabrera, *Chaetanthera microphylla* (Cass.) Hook. & Arn. var. *depauperata* Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 700-2900 m.

*Chaetanthera elegans* Phil. var. *elegans*

Sinónimos: *Chaetanthera elata* Phil., *Chaetanthera brachylepis* Phil., *Chaetanthera valdiviana* Phil., *Chaetanthera humilis* Phil., *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera volckmanni* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: China.

*Chaetanthera elegans* Phil. var. *pratensis* (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Chaetanthera andina* Phil., *Chaetanthera andina* Phil. var. *pratensis* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera araucana* Phil., *Chaetanthera comata* Phil., *Chaetanthera elegans* Phil. var. *andina* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera foliosa* Phil., *Chaetanthera montana* Phil., *Chaetanthera pratensis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

*Chaetanthera elegans* Phil. var. *pulchra* Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

*Chaetanthera euphrasioides* (DC.) F. Meigen

Sinónimos: *Chaetanthera debilis* Meyen & Walp., *Elachia euphrasioides* DC., *Chaetanthera euphrasioides* Reiche var. *spinulosa* (Phil.) Reiche, *Elachia spinulosa* Phil., *Chaetanthera euphrasioides* Reiche, hom. illeg., *Tylloma euphrasioides* (DC.) Wedd.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1200-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

*Chaetanthera flabellata* D. Don

Sinónimos: *Chaetanthera multicaulis* DC. var. *prostata* DC., *Chaetanthera prostrata* D. Don, *Elachia euphrasioides* Deless. non DC., hom. illeg., *Chaetanthera flabellata* D. Don var. *prostrata* (D. Don) Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 1600-2600 m.

*Chaetanthera flabellifolia* Cabrera

Sinónimos: *Pachylaena elegans* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

*Chaetanthera frayjorgensis* A.M.R. Davies

Sinónimos: *Tylloma brachylepis* Phil., *Tylloma glabratum* DC. var. *brachylepis* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *microphyllum* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

*Chaetanthera glabrata* (DC.) F. Meigen

Sinónimos: *Tylloma glabratum* DC., *Tylloma glabratum* DC. var. *rotundifolium* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *stolpi* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *strictum* (Phil.) Reiche, *Tylloma rotundifolium* Phil., *Tylloma stolpi* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

*Chaetanthera glandulosa* J. Remy var. *glandulosa*

Sinónimos: *Tiltilia pungens* Phil. ex Reiche, nom. nud.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

***Chaetanthera glandulosa*** J. Remy var. *gracilis* A.M.R. Davies  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 1000-2000 m.

***Chaetanthera incana*** Poepp. ex Less.  
Sinónimos: *Chaetanthera incana* Poepp. ex Less. var. *spathulata* DC., *Chaetanthera obtusata* Phil., *Chaetanthera scariosa* D. Don, *Chaetanthera spathulata* Poepp. ex Less., *Chaetanthera chilensis* Hook. & Arn., hom. illeg.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Chaetanthera kalinae*** A.M.R. Davies  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2300-3100 m.

***Chaetanthera lanata*** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Chaetanthera philippii* B.L. Rob., *Chondrochilus grandiflorus* Phil., *Chondrochilus involucratum* Phil., *Chondrochilus lanatus* Phil., *Tylloma lanatum* Phil., *Tylloma involucratum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2600-3900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Chaetanthera limbata*** (D. Don) Less.  
Sinónimos: *Chaetanthera schroederi* G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Tylloma ciliatum* Phil., *Tylloma eurylepis* Phil., *Tylloma glabratum* DC. var. *eurylepis* (Phil.) Reiche, *Tylloma limbatum* D. Don, *Tylloma strictum* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Chaetanthera linearis*** Poepp. ex Less.  
Sinónimos: *Chaetanthera kunthiana* Less. p.p., *Chaetanthera linearifolia* Poepp. ex Steud., nom. nud.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Chaetanthera microphylla*** (Cass.) Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less., *Chaetanthera salsoloides* (D. Don) Kuntze, *Cherina microphylla* Cass., *Onoseris linifolia* Bertero, nom. nud., *Euthrixia salsoloides* D. Don, *Chaetanthera delicatula* Phil., *Chaetanthera pentapetala* Phil., *Euthrixia affinis* D. Don

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Chaetanthera moenchioides*** Less.  
Sinónimos: *Chaetanthera moenchioides* Less. var. *pauciflora* F. Meigen, *Chaetanthera moenchioides* Less. var. *sulphurea* F. Meigen, *Chaetanthera tenuifolia* Deless., hom. illeg., *Chaetanthera albicans* Bertero, nom. nud.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-2300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Chaetanthera multicaulis*** DC.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Chaetanthera perpuzilla*** (Wedd.) Anderb. & S.E. Freire  
Sinónimos: *Chaetanthera aymarae* Martic. & Quezada, *Luciliopsis perpuzilla* Wedd.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2200-3300 m.  
Países limítrofes: Bolivia.  
Nombre vulgar: Pasto de lluvia.

***Chaetanthera peruviana*** A. Gray  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 2700-3900 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Chaetanthera pubescens*** A.M.R. Davies  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 600-3500 m.

***Chaetanthera ramosissima*** D. Don  
Sinónimos: *Chaetanthera tenella* Less. var. *tenella*, *Chaetanthera berteriana* Colla, hom. illeg., *Minythodes umbellata* Phil., *Chaetanthera kunthiana* Less. p.p.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Chaetanthera renifolia*** (J. Remy) Cabrera  
Sinónimos: *Chaetanthera crenata* (Phil.) F. Meigen, comb. illeg., *Chondrochilus crenatus* Phil., *Elachia renifolia* J. Remy, *Tylloma renifolium* (J. Remy) Wedd.



Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2000-4000 m.

***Chaetanthera serrata*** Ruiz & Pav.  
Sinónimos: *Chaetanthera spinulosa* Cass., *Proselia serrata* (Ruiz & Pav.) D. Don  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Chaetanthera spathulifolia*** Cabrera  
Sinónimos: *Carmelita spathulata* Phil., *Chaetanthera spathulata* (Phil.) Hauman, comb. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 2700-4100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Chaetanthera splendens*** (J. Remy) B.L. Rob.  
Sinónimos: *Elachia splendens* J. Remy, *Tylloma splendens* (J. Remy) Wedd.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 2500-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Chaetanthera taltalensis*** (Cabrera) A.M.R. Davies  
Sinónimos: *Chaetanthera tenella* Less. var. *taltalensis* Cabrera  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Chaetanthera villosa*** D. Don  
Sinónimos: *Carmelita formosa* Gay ex DC.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1000-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## Chaptalia

***Chaptalia exscapa*** (Pers.) Baker var. *chilensis* (DC.) Burkart  
Sinónimos: *Gerbera chilensis* (DC.) Sch. Bip., *Thyrsanthema chilensis* (DC.) Kuntze, *Loxodon chilensis* DC.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

## Chersodoma

***Chersodoma arequipensis*** (Cuatrec.) Cuatrec.  
Sinónimos: *Senecio arequipensis* Cuatrec., *Chersodoma longipedicellata* Ricardi & Martic.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3200-3700 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Chachakoma blanca, coquilla.

***Chersodoma candida*** Phil.  
Sinónimos: *Senecio chersodomus* Reiche, nom. nud., *Senecio oxyodon* Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3600-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Chersodoma jodopappa*** (Sch. Bip.) Cabrera  
Sinónimos: *Senecio jodopappus* Sch. Bip. ex Wedd., nom. illeg., *Senecio jodopappus* Sch. Bip.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3000-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Chachakoma blanca, poq'ot'ula, coquilla.

## Chevreulia

***Chevreulia diemii*** Cabrera  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Chevreulia lycopodioides*** (d'Urv.) DC.  
Sinónimos: *Gnaphalium lycopodioides* d'Urv.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Chevreulia pusilla*** DC.  
Sinónimos: *Chevreulia lanceolata* J. Remy  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Chevreulia sarmentosa*** (Pers.) S.F. Blake  
Sinónimos: *Chevreulia stolonifera* Cass., nom. illeg., *Chevreulia thouarsii* J. Remy, nom. illeg., *Tussilago sarmentosa* Pers., *Chaptalia sarmentosa* (Pers.) S.F. Blake

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Pasto dulce.

### **Chiliotrichum**

***Chiliotrichum diffusum*** (G. Forst.) Kuntze  
Sinónimos: *Amellus diffusus* G. Forst., *Aster magellanicus* Spreng., hom. illeg., *Chiliotrichum rosmarinifolium* Less., *Chiliotrichum amelloideum* Cass., nom. illeg., *Chiliotrichum amelloideum* Cass., nom. illeg. var. *lanceolatum* Nees, *Chiliotrichum amelloideum* Cass., nom. illeg. var. *rosmarinifolium* (Less.) Nees, *Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze var. *angustifolium* Speg., *Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze var. *media* Speg., *Chiliotrichum longifolium* Phil., *Chiliotrichum virgatum* Phil., *Chiliotrichum feliciae* Hombr. & Jacq., *Chiliotrichum angustifolium* Phil., *Chiliotrichum tenue* Phil., *Tropidolepis diffusa* (G. Forst.) Tausch, *Chiliotrichum amelloideum* Cass., nom. illeg. var. *diffusum* (G. Forst.) Nees, *Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze fma. *typica* Speg., nom. illeg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Fascine, romerillo.

***Chiliotrichum fuegianum*** (O. Hoffm.) Bonifacino  
Sinónimos: *Chiliophyllum fuegianum* O. Hoffm.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Chrysanthemoides**

***Chrysanthemoides monilifera*** (L.) Norl.  
Arbusto. Introducido.  
Distribución: VAL, RME.

### **Chrysanthemum**

***Chrysanthemum coronarium*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, JFE.

***Chrysanthemum segetum*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: LLA.

### **Chuquiraga**

***Chuquiraga atacamensis*** Kuntze  
Sinónimos: *Chuquiraga glabra* Phil., nom. illeg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3000-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Tajtará, quebraolla, azafrán, lengua de gallo, rezongón.

***Chuquiraga kuschelii*** Acevedo  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 2900-3900 m.

***Chuquiraga oppositifolia*** D. Don  
Sinónimos: *Barnadesia flavescens* Meyen, *Chuquiraga alpina* Poepp. ex Less., *Chuquiraga chrysantha* Field & Gardner, *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *angustifolia* Ces., *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *macrantha* J. Remy  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Hierba blanca.

***Chuquiraga spinosa*** Less. subsp. *australis* C. Ezcurra  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3500-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Ch'ana, chinchillawa macho.

***Chuquiraga spinosa*** Less. subsp. *rotundifolia* (Wedd.) C. Ezcurra  
Sinónimos: *Chuquiraga rotundifolia* Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3500-4500 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Chuquiraga ulicina*** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. subsp. *acicularis* (D. Don) C. Ezcurra  
Sinónimos: *Chuquiraga acicularis* D. Don, *Chuquiraga revoluta* Fielding & Gardner  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.

***Chuquiraga ulicina*** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. subsp. *ulicina*  
Sinónimos: *Chuquiraga incana* D. Don, *Chuquiraga*

*ulicina* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. var. *incana* (Phil.) I.M. Johnst., *Barnadesia ulicina* Hook. & Arn., *Chuquiraga incana* Phil., nom. illeg.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1700 m.  
Nombre vulgar: Hierba de la yesca, araña de la ballena.

### Cichorium

*Cichorium intybus* L.  
Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA.

### Cirsium

*Cirsium arvense* (L.) Scop.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

*Cirsium vulgare* (Savi) Ten.  
Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

### Cladanthus

*Cladanthus mixtus* (L.) Chevall.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, BIO.

### Coleostephus

*Coleostephus myconis* (L.) Cass.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: MAU, ARA, AIS.

### Conyza

*Conyza andina* J. Remy  
Sinónimos: *Conyza dumetorum* Phil., *Conyza hirtella* (DC.) Martic., nom. illeg., *Conyza arvensis* Phil., *Erigeron hirtellus* DC.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

*Conyza arabidifolia* J. Remy  
Sinónimos: *Conyza paulsenii* Phil., *Conyza asperula* Phil., *Conyza coxi* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

*Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. *angustifolia* (Cabrera) Cabrera  
Sinónimos: *Conyza linearis* DC., *Erigeron bonariensis* L. var. *angustifolius* Cabrera  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. *bonariensis*  
Sinónimos: *Conyza hispida* Kunth, *Conyza plebeja* Phil., *Erigeron bonariensis* L., *Erigeron bonariensis* L. fma. *grisea* Chodat, *Marsea bonariensis* (L.) V.M. Badillo  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Puringa hiva (Rapa Nui).  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández y en la Isla de Pascua.

*Conyza bustillosiana* J. Remy  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: VAL, RME.

*Conyza copiapina* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 200-1500 m.

*Conyza depilis* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

*Conyza deserticola* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2000-4400 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Maransela, anojatjinchu, oreja de perro.

*Conyza foliosa* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ARA.

*Conyza gayana* Phil.  
Sinónimos: *Conyza consanguinea* Phil., *Erigeron consanguineus* (Phil.) Cabrera, *Conyza araucana* Phil., *Conyza canescens* Phil., *Conyza monticola* Phil., *Conyza vulgaris* Phil., hom. illeg., *Erigeron stenophyllus* Hook. & Arn.  
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Conyza glabrata*** Phil.

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1000 m.

***Conyza larrainiana*** J. Remy

Sinónimos: *Conyza conglomerata* Phil., *Conyza pratensis* Phil., *Erigeron larrainianus* (J. Remy) Cabrera

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Conyza lateralis*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 500-600 m.

***Conyza lechleri*** (Sch. Bip.) Cabrera

Sinónimos: *Erigeron lechleri* Sch. Bip.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LLA, MAG.

Rango altitudinal: 500-2100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Conyza pencana*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO.

***Conyza primulifolia*** (Lam.) Cuatrec. & Lourteig

Sinónimos: *Conyza chilensis* Spreng., *Conyza scabiosaefolia* J. Remy, *Conyza yungasensis* Rusby, *Erigeron chilensis* (Spreng.) D. Don ex G. Don, *Conyza myosotifolia* Kunth, *Inula primulifolia* Lam., *Marsea chilensis* (Spreng.) Kuntze, *Marsea chilensis* (Spreng.) V.M. Badillo, nom. illeg., *Conyza chilensis* Spreng. var. *integrifolia* Phil.

Hierba. Bienal. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Conyza spiculosa*** (Hook. & Arn.) Zardini

Sinónimos: *Conyza colinensis* Phil., *Conyza patens* Phil., *Erigeron colinensis* Phil., *Erigeron spiculosus* Hook. & Arn., *Erigeron spinulosum* Hook. & Arn. var. *umbrosa* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Nombre vulgar: Huilmo.

***Conyza stenophylla*** Phil.

Sinónimos: *Conyza armerifolia* Phil., *Conyza linifolia* Phil., hom. illeg., *Erigeron flagellifolius* Cabrera

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

***Conyza suffruticosa*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME.

Países limítrofes: Bolivia.

***Conyza sumatrensis*** (Retz.) E. Walker var. ***leiotheca*** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho

Sinónimos: *Conyza bilbaoana* J. Remy, *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. *leiotheca* (S.F. Blake) Cuatrec., *Conyza elata* Kunth & Bouché, *Conyza myriocephala* J. Remy, *Erigeron bilbaoanus* (J. Remy) Cabrera, *Erigeron bonariensis* L. var. *floribundum* (Kunth) Cuatrec., *Erigeron bonariensis* L. var. *leiothecus* S.F. Blake, *Erigeron floribundus* (Kunth) Sch. Bip., *Marsea bonariensis* (L.) V.M. Badillo var. *leiotheca* (S.F. Blake) V.M. Badillo, *Conyza floribunda* Kunth, *Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker var. *floribunda* (Kunth) J.B. Marshall

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Conyza tenera*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

***Conyza thermarum*** Phil.

Sinónimos: *Erigeron thermarum* (Phil.) Cabrera

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

***Conyza valdiviana*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

**Coreopsis**

***Coreopsis suaveolens*** Sherff

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3400-3800 m.

Nombre vulgar: Flor amarilla, chirichiri, chilile.

## Cotula

*Cotula australis* (Sieber ex Spreng.) Hook. f.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, JFE, IPA, IDE.

*Cotula coronopifolia* L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,  
NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

*Cotula mexicana* (DC.) Cabrera  
Sinónimos: *Cotula minuta* (L.f.) Schinz, nom. illeg., *Hippia  
minuta* L.f., *Lancisia minuta* (L.f.) Rydb., *Soliva mexicana*  
DC., *Soliva minuta* (L.f.) Sweet  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.  
Rango altitudinal: 3500-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Pichipichi, champa, t'champa.

## Crepis

*Crepis capillaris* (L.) Wallr.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

*Crepis pulchra* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

*Crepis setosa* Haller f.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ARA.

*Crepis vesicaria* L. subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell. ex  
Schinz & R. Keller  
Hierba. Anual o perenne. Introducida.  
Distribución: BIO, ARA.

## Cuatrecasasiella

*Cuatrecasasiella argentina* (Cabrera) H. Rob.  
Sinónimos: *Luciliopsis argentina* Cabrera  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2500-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

## Cynara

*Cynara cardunculus* L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
JFE, IPA.

## Dasyphyllum

*Dasyphyllum diacanthoides* (Less.) Cabrera  
Sinónimos: *Chuquiraga leucoxylon* Poepp. ex Less.,  
*Flotovia diacanthoides* Less., *Piptocarpha diacanthoides*  
Hook. & Arn.  
Árbol. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 500-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Palo blanco, palo santo, tayu, trevo, tallu.

*Dasyphyllum excelsum* (D. Don) Cabrera  
Sinónimos: *Chuquiraga excelsa* D. Don, *Flotovia excelsa*  
(D. Don) DC., *Piptocarpha excelsa* (D. Don) Hook. & Arn.  
Árbol. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Nombre vulgar: Palo santo.

## Delairea

*Delairea odorata* Lem.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, NUB, BIO, LRI, JFE.

## Dendroseris

*Dendroseris berteriana* (Decne.) Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Dendroseris pinnata* (Bertero ex Decne.)  
Hook. & Arn. var. *insignis* (Bertero) Johow, *Phoenicoseris  
berteriana* (Decne.) Skotts., *Rea berteriana* Decne., *Rea  
pinnata* Bertero ex Decne. var. *insignis* Bertero  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Colecillo, col.

*Dendroseris gigantea* Johow  
Árbol. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Colecillo, col.

*Dendroseris litoralis* Skotts.  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Colecillo, col.



***Dendroseris macrantha*** (Bertero ex Decne.) Skotts.

Sinónimos: *Rea macrantha* Bertero ex Decne.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

***Dendroseris macrophylla*** D. Don

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

***Dendroseris marginata*** (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Dendroseris macrophylla* D. Don var. *marginata* (Bertero ex Decne.) Johow, *Rea marginata* Bertero ex Decne.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

***Dendroseris micrantha*** (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Rea micrantha* Bertero ex Decne., *Rea longifolia* Phil. ex Reiche

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

***Dendroseris neriifolia*** (Decne.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Rea leucantha* Bertero, *Rea neriifolia* Decne.

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

***Dendroseris pinnata*** (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Phoenicoseris pinnata* (Bertero ex Decne.)

Skotts., *Rea pinnata* Bertero ex Decne.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

***Dendroseris pruinata*** (Johow) Skotts.

Sinónimos: *Dendroseris micrantha* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn. var. *pruinata* Johow, *Rea pruinata* (Johow) Skotts.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

***Dendroseris regia*** Skotts.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

***Diplostephium***

***Diplostephium cinereum*** Cuatrec.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3800-4400 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Koa, koba, koya, hembra.

***Diplostephium meyenii*** Wedd.

Sinónimos: *Aster trachyticus* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-3900 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Tola, tola del alma, leña quebrolla, manzanillón.

***Diplostephium tacorense*** Hieron.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3000-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

***Dittrichia***

***Dittrichia viscosa*** (L.) Greuter

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL.

***Doniophyton***

***Doniophyton anomalum*** (D. Don) Kurtz

Sinónimos: *Chuquiraga anomala* D. Don, *Chuquiraga patagonica* Phil., *Doniophyton andicolum* Wedd., *Doniophyton patagonicum* (Phil.) Hieron.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, ARA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Doniophyton weddellii*** Katinas & Stuessy

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 1900-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

## Eclipta

*Eclipta prostrata* (L.) L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, MAU.

## Encelia

*Encelia canescens* Lam. var. *canescens*  
Arbusto o subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

*Encelia canescens* Lam. var. *oblongifolia* (DC.) S.F. Blake  
Sinónimos: *Encelia oblongifolia* DC.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-2700 m.  
Nombre vulgar: Coronilla del fraile, incienso.

*Encelia canescens* Lam. var. *parvifolia* (Kunth) Ball  
Sinónimos: *Encelia canescens* Lam. var. *lanuginosa* I.M. Johnst., *Encelia canescens* Lam. var. *tomentosa* (Walp.) Ball, *Encelia parvifolia* Kunth, *Encelia tomentosa* Walp.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Coronilla del fraile, incienso, hormiguero.

## Erechtites

*Erechtites leptanthus* (Phil.) Cabrera  
Sinónimos: *Senecio leptanthus* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

## Eriachaenium

*Eriachaenium magellanicum* Sch. Bip.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## Erigeron

*Erigeron andicola* DC.  
Sinónimos: *Erigeron araucanus* Phil., *Erigeron ciliaris* Phil., *Erigeron andinus* Phil., *Erigeron biflorus* Phil., *Aster bellidiastrum* Nees ex Walp., hom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 500-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Erigeron campanensis* Valdeb., Lowrey & Stuessy  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

*Erigeron cinereus* Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Erigeron poeppigii* DC.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 500-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Erigeron fasciculatus* Colla  
Sinónimos: *Haplopappus hispidulus* DC., *Aster breviflorus* Phil., *Aster litoralis* Phil., *Erigeron berterianus* DC., *Erigeron subandinus* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Nombre vulgar: Escabiosa.

*Erigeron fernandezius* (Colla) Harling  
Sinónimos: *Erigeron fernandezianus* (Colla) Solbrig, nom. illeg., *Erigeron fruticosum* DC., *Terranea fernandezia* Colla  
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

*Erigeron gilliesii* (Hook. & Arn.) Cabrera  
Sinónimos: *Aster albertii* Phil., *Aster gayanus* DC., *Aster gilliesii* Hook. & Arn., *Astradelphus chilensis* J. Remy, *Erigeron pratensis* Phil., *Erigeron remyanus* Wedd., *Gusmania chilensis* J. Remy  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 800-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Erigeron illapelinus* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 2400-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Erigeron ingae* Skotts. b.  
Sinónimos: *Erigeron ingae* Skotts. b. var. *innocentium* Skotts. b., *Erigeron turricola* Skotts. b.

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.

***Erigeron karvinskianus*** DC.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, BIO, LRI.

***Erigeron leptopetalus*** Phil.  
Sinónimos: *Erigeron brevicaulis* Phil., *Erigeron nubigenus* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ, RME, MAU, NUB, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Erigeron luteoviridis*** Skotts. b.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Erigeron luxurians*** (Skotts. b.) Solbrig  
Sinónimos: *Erigeron litoralis* (Phil.) Skotts. b. var. *luxurians* Skotts. b.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

***Erigeron myosotis*** Pers.  
Sinónimos: *Erigeron fernandezii* Phil., *Erigeron ibari* Phil., *Erigeron lacarensis* Phil., *Erigeron myosotis* Pers. var. *elongatum* Sch. Bip., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *polymorphoides* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *pseudomagellanicus* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. fma. *spithameus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. fma. *densehirsutus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. fma. *sparsehirsutus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. fma. *tragopogonoides* Skotts. b. ex Vierh., *Erigeron platylepis* Vierh., *Erigeron sullivanii* Hook. f. var. *magellanicum* Sch. Bip., *Erigeron angustifolius* Phil., *Erigeron polyphyllum* Phil., *Erigeron glabratus* Reiche, hom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Erigeron othonnifolius*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Aster prostratus* Phil., *Erigeron vidali* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Erigeron patagonicus*** Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Erigeron pulcher*** Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2700-3200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Erigeron rosulatus*** Wedd.  
Sinónimos: *Erigeron brittonianus* Rusby, *Erigeron pulvinatus* Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4000-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Erigeron rupicola*** Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Erigeron stuessyi*** Valdeb.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 900-950 m.

## **Eupatorium**

***Eupatorium glechonophyllum*** Less.  
Sinónimos: *Ageratina glechonophylla* (Less.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium remyanum* Phil., *Ageratina remyana* (Phil.) R.M. King & H. Rob.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Barba de viejo, barbón.

***Eupatorium salvium*** Colla  
Sinónimos: *Aristeguietia salvia* (Colla) R.M. King & H. Rob.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Nombre vulgar: Pegajosa, salvia macho, pega.

## Facelis

### *Facelis plumosa* (Wedd.) Sch. Bip.

Sinónimos: *Lucilia plumosa* Wedd.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 2800-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip.

Sinónimos: *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *patula* Beauverd, *Facelis apiculata* Cass., nom. illeg., *Gnaphalium retusum* Lam., *Leptalea apiculata* (Cass.)

D. Don ex Hook. & Arn., *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *andicola* (Nees) Beauverd, *Helichrysum retusum*

Spreng., *Pteropogon chilense* Fisch. & Meyer, nom. nud., *Pteropogon andicola* Ness, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip.

fma. *gigantea* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip.

var. *candelabrum* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch.

Bip. fma. *laxa* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip.

fma. *congesta* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip.

fma. *planifolia* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip.

fma. *nana* Beauverd

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

## Flaveria

### *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze

Sinónimos: *Ethulia bidentis* L., *Eupatorium chilense* Molina, *Flaveria capitata* Juss. ex Sm., *Flaveria chilensis* (Molina) J.F. Gmel., *Flaveria contrayerba* (Cav.) Pers., *Milleria chiloensis* Juss., nom. nud., *Milleria contrayerba* Cav., *Flaveria bidentis* (L.) B.L. Rob., comb. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Contrahierba, dasdaqui, daudá, mata gusanos, sinapaya, monte colorado.

### *Flaveria haumanii* Dimitri & Orfila

Sinónimos: *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze var. *angustifolia* Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

## Flourensia

### *Flourensia thurifera* (Molina) DC.

Sinónimos: *Helianthus thurifera* Molina, *Diomedea thurifera* (Molina) Bertero ex Colla, *Helianthus glutinosus* Hook. & Arn., *Flourensia besseriana* Hook. & Arn., *Helianthus besserianus* (Meyen & Walp.) Benth. & Hook., *Flourensia thurifera* (Molina) DC. var. *lanceolata* J. Remy

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 400-1000 m.

Nombre vulgar: Incienso, maravilla del campo.

## Gaillardia

### *Gaillardia aristata* Pursh

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR.

## Galinsoga

### *Galinsoga parviflora* Cav.

Sinónimos: *Galinsoga quinqueradiata* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Wiborgia parviflora* (Cav.) Kunth

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Pacoyuyo, miri vaihi (Rapa Nui).

Nota: Introducida en la Isla de Pascua.

## Gamochaeta

### *Gamochaeta aliena* (Hook. & Arn.) Cabrera

Sinónimos: *Gnaphalium alienum* Hook. & Arn., *Gnaphalium stachydidifolium* Lam. var. *alienum* (Hook. & Arn.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

### *Gamochaeta alpina* (Poepp. & Endl.) S.E. Freire & Anderb.

Sinónimos: *Gamochaetopsis alpina* (Poepp. & Endl.) Anderb. & S.E. Freire, *Laennecia alpina* Poepp., *Lucilia alpina* (Poepp.) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1200-1900 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Gamochaeta americana* (Mill.) Wedd.

Sinónimos: *Gnaphalium americanum* Mill., *Gnaphalium purpureum* L. var. *americanum* (Mill.) Klatt, *Gnaphalium spicatum* Mill. var. *chonticum* Hook.f.

Hierba. Bienal o perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.  
Rango altitudinal: 0-3200 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández y en  
la Isla de Pascua.

***Gamochaeta andina*** (Phil.) Cabrera  
Sinónimos: *Gnaphalium andinum* Phil., *Gnaphalium  
petraeum* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 2400-2700 m.

***Gamochaeta axillaris*** (J. Remy) Cabrera  
Sinónimos: *Gnaphalium axillare* J. Remy, *Gnaphalium  
stachydifolium* Lam. var. *axillare* (J. Remy) Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 1700-2000 m.

***Gamochaeta chamissonis*** (DC.) Cabrera  
Sinónimos: *Gamochaeta polybotrya* (Phil.) Cabrera,  
*Gamochaeta julietii* (Phil.) Anderb., *Gamochaeta serranoi*  
(Phil.) Cabrera, *Gnaphalium chamissonis* DC., *Gnaphalium  
fernandezianum* Phil., *Gnaphalium julietii* Phil.,  
*Gnaphalium polybotryum* Phil., *Gnaphalium purpureum*  
L. var. *chamissonis* (DC.) Klatt, *Gnaphalium purpureum*  
L. var. *julietii* (Phil.) Reiche, *Gnaphalium serranoi* Phil.,  
*Gamochaeta fernandeziana* (Phil.) Anderb., *Gnaphalium  
suffruticosum* Phil., *Gamochaeta suffruticosa* (Phil.) Anderb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 1000-1800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta depilata*** (Phil.) Cabrera  
Sinónimos: *Gnaphalium depilatum* Phil., *Gnaphalium  
obscurum* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta deserticola*** Cabrera  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, BIO, ARA,  
MAG.  
Rango altitudinal: 3000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Gamochaeta falcata*** (Lam.) Cabrera  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 950-1940 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta filaginea*** (DC.) Cabrera  
Sinónimos: *Gnaphalium filaginea* DC., *Gamochaeta  
berteriana* (DC.) Cabrera, *Gnaphalium berterianum* DC.,  
*Gnaphalium stachydifolium* Lam. var. *berterianum* (DC.)  
Klatt, *Gnaphalium bellidifolium* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Gamochaeta humilis*** Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Gamochaeta neuquensis*** Cabrera  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, ARA, MAG.  
Rango altitudinal: 500-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta nivalis*** Cabrera  
Sinónimos: *Gnaphalium nivale* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA,  
AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 800-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta oligantha*** (Phil.) L.E. Navas  
Sinónimos: *Gnaphalium oliganthum* Phil., *Gamochaeta  
monticola* (Phil. ex Reiche) Cabrera, *Gnaphalium monticola*  
Phil. ex Reiche  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.  
Rango altitudinal: 500-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta procumbens*** (Phil.) Cabrera  
Sinónimos: *Gnaphalium procumbens* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, MAG.  
Rango altitudinal: 900-1500 m.

***Gamochaeta purpurea*** (L.) Cabrera  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: IPA.



***Gamochaeta ramosa*** S.E. Freire, N. Bayón & C.M. Baeza  
Sinónimos: *Gnaphalium ramosum* Phil., nom. illeg.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.

***Gamochaeta serpyllifolia*** Wedd.  
Sinónimos: *Gamochaeta munnozii* Cabrera, nom. illeg.,  
*Gnaphalium serpyllifolium* J. Remy, hom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.  
Rango altitudinal: 1000-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta simplicicaulis*** (Willd. ex Spreng.) Cabrera  
Sinónimos: *Gnaphalium purpureum* L. var. *simplicicaule*  
(Willd. ex Spreng.) Klatt, *Gnaphalium simplicicaule* Willd.  
ex Spreng.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,  
LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-3700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta spiciformis*** (Sch. Bip.) Cabrera  
Sinónimos: *Gamochaeta foliosa* (Phil.) Anderb.,  
*Gnaphalium foliosum* Phil., *Gamochaeta peteroana* (Phil.)  
Anderb., *Gnaphalium mucronatum* Phil., nom. illeg.,  
*Gnaphalium peteroanum* Phil., *Gnaphalium purpureum* L.  
var. *mucronatum* (Phil.) Skottsbo., *Gnaphalium spiciforme*  
Sch. Bip., *Gamochaeta chilensis* Deble  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 200-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta stachydifolia*** (Lam.) Cabrera  
Sinónimos: *Gnaphalium purpureum* L. var. *stachydifolium*  
(Lam.) Baker, *Gnaphalium stachydifolium* Lam.,  
*Gnaphalium agreste* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, BIO, LRI, JFE.  
Rango altitudinal: 400-1800 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Gamochaeta subfalcata*** (Cabrera) Cabrera  
Sinónimos: *Gnaphalium subfalcatum* Cabrera  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-4100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gamochaeta valparadisea*** (Phil.) Anderb.  
Sinónimos: *Gnaphalium valparadiseum* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, MAU.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Gamochaeta villaroelii*** (Phil.) Cabrera  
Sinónimos: *Gnaphalium villaroelii* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, NUB.

## **Gochnatia**

***Gochnatia foliolosa*** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var.  
***fascicularis*** (D. Don) Cabrera  
Sinónimos: *Gochnatia fascicularis* (D. Don) D. Don ex  
Hook. & Arn., *Gochnatia multiflora* F. Phil., *Pentaphragus*  
*fascicularis* D. Don  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Nombre vulgar: Mira.

***Gochnatia foliolosa*** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var.  
***foliolosa***  
Sinónimos: *Gochnatia australis* Phil., *Gochnatia*  
*berteroana* Phil., *Gochnatia cuspidata* Phil., *Gochnatia*  
*integerrima* Phil., *Gochnatia laxiflora* Phil., *Gochnatia*  
*litoralis* Phil., *Gochnatia pyrifolia* (D. Don) D. Don ex  
Hook. & Arn., *Gochnatia racemosa* Phil., *Gochnatia rigida*  
D. Don ex Hook. & Arn., *Pentaphragus foliolosus* D. Don,  
*Pentaphragus pyrifolius* D. Don  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Nombre vulgar: Mira, mira-mira.

## **Grindelia**

***Grindelia chiloensis*** (Cornel.) Cabrera  
Sinónimos: *Grindelia foliosa* D. Don ex Hook. & Arn.,  
*Haplopappus hoorebekia* DC., nom. illeg., *Hoorebekia*  
*chiloense* Cornel.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LLA.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Grindelia glutinosa*** (Cav.) Mart.  
Sinónimos: *Aster glutinosus* Cav., *Grindelia glutinosa*  
(Cav.) Dunal, nom. illeg., *Grindelia montana* Phil.  
Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 500 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Grindelia tarapacana*** Phil.

Sinónimos: *Grindelia obovata* Rusby  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2500 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Chiñechinchillawa, keñakeña, bailahuén.

**Gutierrezia**

***Gutierrezia baccharoides*** Sch. Bip.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gutierrezia espinosae*** Acevedo

Arbusto. Endémico.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Gutierrezia gayana*** (J. Remy) Reiche

Sinónimos: *Brachyris gayana* (J. Remy) J. Remy,  
*Odontocarpa gayana* J. Remy  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1400 m.  
Nombre vulgar: Monte amarillo.

***Gutierrezia neaeana*** (DC.) Sch. Bip. ex S.F. Blake

Sinónimos: *Brachyris neaeana* DC.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 2500-4000 m.

***Gutierrezia resinosa*** (Hook. & Arn.) S.F. Blake

Sinónimos: *Brachyris floribunda* Phil., *Brachyris paniculata* DC., *Galinsoga resinosa* Hook. & Arn.,  
*Gutierrezia compacta* Phil., *Gutierrezia laricifolia* D. Don,  
*Odontocarpa poeppigii* DC.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Nombre vulgar: Delgadilla, monte amarillo, pichanilla, pichana.

***Gutierrezia taltalensis*** Phil.

Sinónimos: *Gutierrezia copiapina* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

**Guynesomia**

***Guynesomia scoparia*** (Phil.) Bonifacino & Sancho

Sinónimos: *Hinterhubera scoparia* (Phil.) Cabrera,  
*Nardophyllum scoparium* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 1400-3000 m.

**Gypothamnium**

***Gypothamnium pinifolium*** Phil.

Sinónimos: *Plazia pinnifolia* (Phil.) O. Hoffm.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Palo de yote.

**Haplopappus**

***Haplopappus angustifolius*** (DC.) Reiche subsp. *angustifolius*

Sinónimos: *Haplopappus durus* Reiche, *Pyrrocoma angustifolia* DC., *Pyrrocoma rigida* Phil., *Aster atenes* Kuntze, *Aster sternbergii* Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Nombre vulgar: Bailahuen.

***Haplopappus angustifolius*** (DC.) Reiche subsp. *saxatilis*

(J. Remy) Klingeb.  
Sinónimos: *Haplopappus saxatilis* (Remy) Reiche,  
*Haplopappus sphacelatus* (Phil.) Reiche, *Pyrrocoma saxatilis* J. Remy, *Aster saxatilis* (J. Remy) Kuntze,  
*Haplodiscus sphacelatus* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, RME, MAU.  
Rango altitudinal: 400-1700 m.

***Haplopappus anthylloides*** Meyen & Walp.

Sinónimos: *Haplopappus radicans* J. Remy, *Aster anthylloides* (Meyen & Walp.) Kuntze, *Aster radicans* (J. Remy) Kuntze  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 700-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus arbutoides*** J. Remy

Sinónimos: *Aster arbutoides* (J. Remy) Kuntze,  
*Haplopappus obovatus* Phil., *Haplopappus baccharidifolius* Phil., *Haplopappus zanartui* (Phil.) Reiche, *Haplodiscus zanartui* Phil.  
Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 700-2400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus baylahuen*** J. Remy subsp. *baylahuen*

Sinónimos: *Haplopappus lastarrianus* J. Remy, *Haplopappus medicinalis* Phil., *Aster baylahuen* (J. Remy) Kuntze, *Aster lastarrianus* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus domeykoi* Phil., *Haplopappus fluehmannii* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2700-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Bailahuen.

***Haplopappus baylahuen*** J. Remy subsp. *fluehmannii* (Phil.) Klingenb.

Sinónimos: *Haplopappus fluehmannii* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2400-3700 m.

Nombre vulgar: Bailahuen.

***Haplopappus bezanillanus*** (J. Remy) Reiche

Sinónimos: *Pyrrocoma bezanillana* J. Remy, *Aster bezanillanus* Kuntze

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 300-2800 m.

***Haplopappus bustillosianus*** J. Remy

Sinónimos: *Aster bustillosianus* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus australis* Phil., *Haplopappus patagonicus* Phil., *Haplopappus subandinus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus cerberoanus*** (J. Remy) Reiche subsp. *cerberoanus*

Sinónimos: *Pyrrocoma cerberoana* J. Remy, *Aster cerberoanus* (J. Remy) Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Perú.

***Haplopappus cerberoanus*** (J. Remy) Reiche subsp. *elquianus* Klingenb.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 800-2000 m.

***Haplopappus chrysanthemifolius*** (Less.) DC.

Sinónimos: *Haplopappus berteri* DC., *Haplopappus leucanthemifolius* Phil., *Grindelia glutinosa* Bertero, *Andromachia alternifolia* Kuntze, *Diplopappus chrysanthemifolius* Less.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Haplopappus coquimbensis*** (Hook. & Arn.) Klingenb.

Sinónimos: *Haplopappus acanthodon* Phil., *Haplopappus hirsutus* Phil., *Haplopappus hirtellus* Phil. var. *hirsutus* (Phil.) Reiche, *Diplopappus coquimbensis* Hook. & Arn., *Haplopappus hirtellus* Phil., *Aster hirtellus* (Phil.) Kuntze, *Haplopappus limarensis* Phil., *Haplopappus hirtellus* Phil. var. *limarensis* Reiche, *Haplopappus vidalii* Phil., *Haplodiscus elatus* Phil., *Haplopappus elatus* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 10-1000 m.

***Haplopappus decurrens*** J. Remy

Sinónimos: *Aster remyanus* Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Haplopappus deserticolus*** Phil.

Sinónimos: *Haplopappus involucratus* Phil., *Haplopappus rengifoanus* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Haplopappus diplopappus*** J. Remy subsp. *diplopappus*

Sinónimos: *Aster diplopappus* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus pallidus* Phil., *Haplopappus heterophysus* Phil., *Haplopappus marginalis* Phil. var. *heterophysus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus peteroanus* Phil., *Haplopappus reticulatus* Phil., *Aster venosus* Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 800-3540 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Blanquillo.

***Haplopappus diplopappus*** J. Remy subsp. *villosus* (Phil.) Klingenb.

Sinónimos: *Haplopappus villosus* Phil., *Aster villiger* Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus donianus*** (Hook. & Arn.) Reiche  
Sinónimos: *Diplopappus donianus* Hook. & Arn.,  
*Haplodiscus tenuifolius* Phil., *Haplodiscus exserens* Phil.,  
*Haplopappus canescens* (Phil.) Reiche var. *exserens* Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-600 m.

***Haplopappus foliosus*** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Aster polyphyllus* (Phil.) Kuntze, *Aster foliosus* (DC.) Kuntze, *Diplopappus foliosus* Hook. & Arn., *Haplopappus foliosus* DC., *Haplodiscus polyphyllus* Phil., *Haplopappus phyllophorus* Reiche, *Haplodiscus densifolius* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-750 m.  
Nombre vulgar: Cuerno de cabra, palo negro.

***Haplopappus glabratus*** Phil.  
Sinónimos: *Haplopappus arbutoides* J. Remy var. *glabratus* (Phil.) Reiche, *Aster glabratus* (Phil.) Kuntze  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1600-3300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus glutinosus*** Cass.  
Sinónimos: *Aster senebierifolius* Kuntze, nom. illeg.,  
*Diplopappus coronopifolius* Less., nom. illeg., *Haplopappus coronopifolius* (Less.) DC., nom. illeg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 10-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Buchú.

***Haplopappus grindelioides*** (Less.) DC.  
Sinónimos: *Aster marginalis* (Phil.) Kuntze, *Haplopappus marginalis* Phil., *Haplopappus corniculatus* Phil., *Haplopappus heterocomus* Phil., *Haplopappus reflexus* Phil., *Diplopappus grindelioides* Less., *Aster reversus* Kuntze, *Aster grindelioides* (Less.) Kuntze  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 600-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus humilis*** (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Haplodiscus humilis* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 160-1100 m.

***Haplopappus integerrimus*** (Hook. & Arn.) H.M. Hall  
Sinónimos: *Haplopappus acerosus* (Bertero) Phil.,  
*Haplopappus pulchellus* DC. var. *elongatus* J. Remy,  
*Grindelia acerosa* Bertero ex Phil., nom. nud., *Diplopappus integerrimus* Hook. & Arn., *Steriphe acerosa* (Bertero ex Phil.) Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 500-2000 m.

***Haplopappus linifolius*** (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Pyrrhocoma linifolia* Phil., *Aster linoides* Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 1800-2200 m.

***Haplopappus litoralis*** Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

***Haplopappus macrocephalus*** (Poepp. ex Less.) DC.  
Sinónimos: *Haplopappus caespitosus* Nutt., *Diplopappus macrocephalus* Poepp. ex Less., *Aster macrocephalus* (Poepp. ex Less.) Kuntze, *Haplopappus scaposus* J. Remy, *Haplopappus spinulosus* Phil., *Haplopappus serrulatus* Reiche, *Aster spinuliger* Kuntze  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 100-2000 m.

***Haplopappus maulinus*** Klingenb.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 400-2300 m.

***Haplopappus meyenii*** Walp.  
Sinónimos: *Haplopappus foliosus* DC. subsp. *meyenii* (Walp.) Klingenb., *Aster meyenii* (Walp.) Kuntze  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 0-400 m.

***Haplopappus mucronatus*** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. ex B.D. Jacks.  
Sinónimos: *Baccharis mucronata* Hook. & Arn., hom. illeg.,  
*Haplopappus fonckii* Phil., *Haplopappus hookerianus* DC.,  
*Haplopappus ilicifolius* J. Remy, *Diplopappus mucronatus* Hook. & Arn., *Baccharis hookeriana* DC., *Aster ilicifolius* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus axilliflorus* Phil., *Haplopappus ilicifolius* J. Remy var. *platylepis* (Phil.) Reiche, *Haplopappus platylepis* Phil., *Haplopappus macraenus* (Remy) Reiche, *Pyrrhocoma macraena* Remy,



*Aster macraenus* (Remy) Kuntze, *Aplopappus macraenus* Gray, comb. inval.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-900 m.

*Haplopappus multifolius* Phil. ex Reiche subsp. *baccharidiformis* Klingeb.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 1800 m.

*Haplopappus multifolius* Phil. ex Reiche subsp. *multifolius*  
Sinónimos: *Haplopappus rotundifolius* H.M. Hall, *Pyrrocoma foliosa* Phil., *Aster multifolius* (Phil. ex Reiche) Kuntze, *Diplopappus foliolosus* Hook. & Arn., *Diplopappus ilicifolius* Hook. & Arn.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 700-3200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Haplopappus multifolius* Phil. ex Reiche subsp. *ovalifolius* Klingeb.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1300-3200 m.

*Haplopappus nahuelbutae* Klingeb.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 100-1460 m.

*Haplopappus ochagavianus* Phil.  
Sinónimos: *Haplopappus tiltiensis* (Phil.) Reiche, *Aster ochayaviensis* Kuntze, *Haplopappus reicheanus* H.M. Hall, *Haplopappus vernicosus* Phil. ex Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 100-2200 m.

*Haplopappus parvifolius* (DC.) Gay  
Sinónimos: *Pyrrocoma parvifolia* DC., *Aster parvifolius* (DC.) Kuntze  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.  
Nombre vulgar: Crespilla.

*Haplopappus paucidentatus* Phil.  
Sinónimos: *Aster oligodontus* Kuntze, *Haplopappus glutinosus* (Less.) DC., hom. illeg., *Diplopappus glutinosus* Less., *Aster glutinosus* (Less.) Kuntze, *Haplopappus prostratus* Phil.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 950-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Haplopappus philippii* (Kuntze) H.M. Hall  
Sinónimos: *Haplopappus paniculatus* Phil., *Aster philippii* Kuntze, *Haplopappus breviradiatus* Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

*Haplopappus pinea* (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Pyrrocoma pinea* Phil., *Aster pineus* (Phil.) Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 2000-2400 m.

*Haplopappus pinnatifidus* Nutt.  
Sinónimos: *Haplopappus setigerus* (Phil.) Meigen, *Pyrrocoma nuttalli* J. Remy, nom. illeg., *Aster andinus* Kuntze, *Diplopappus setiger* Hook. & Arn., *Pyrrocoma setigera* Phil., *Aster setiger* (Phil.) Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 550-1200 m.

*Haplopappus poeppigianus* (Hook. & Arn.) A. Gray  
Sinónimos: *Diplopappus poeppigianus* Hook. & Arn., *Haplodiscus polycladus* Phil., *Haplopappus argenteus* Steud., *Haplodiscus polycladus* Phil., *Haplopappus canescens* (Phil.) Reiche, *Grindelia canescens* Bertero, *Pyrrocoma canescens* Phil., *Aster griseus* Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

*Haplopappus pulchellus* DC.  
Sinónimos: *Aster valparaisanus* Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 300-1600 m.

*Haplopappus punctatus* (Willd.) H.M. Hall  
Sinónimos: *Haplopappus chamissonis* (Less.) DC., *Conyza punctata* Willd., *Diplopappus chamissonis* Less., *Diplopappus punctatus* Less. ex DC., *Aster adalbertii* Kuntze, *Haplopappus corymbosus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus rosmarinifolius* Reiche, *Steriphe corymbosa* Phil., *Aster pedunculatus* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus pedunculatus* J. Remy, *Haplopappus integerrimus* (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. *punctatus* (Willd.) G.K. Br. & W.D. Clark



Arbusto. Endémico.  
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 100-1600 m.

***Haplopappus pusillus*** Klingenb.  
Sinónimos: *Diplopappus bellidifolius* Hook. & Arn.,  
*Haplopappus cuneifolius* Nutt., *Aster cuneifolius* (Nutt.)  
Kuntze  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 3300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus racemiger*** Klingenb.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 30-560 m.

***Haplopappus remyanus*** Wedd.  
Sinónimos: *Haplopappus prinophyllus* Phil., *Pyrocoma*  
*ilicifolia* J. Remy, *Aster remyanus* (Wedd.) Kuntze,  
*Haplodiscus vernicosus* Phil., *Haplopappus latifolius*  
(Phil.) Reiche, *Haplodiscus latifolius* Phil., *Haplodiscus*  
*vernicosus* Phil., *Haplodiscus vernicosus* Phil. var. *geissei*  
Phil., *Haplodiscus kingii* Phil., *Haplopappus kingii* (Phil.)  
Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 300-2500 m.  
Nombre vulgar: Bailahuen.

***Haplopappus rengifoanus*** J. Remy  
Sinónimos: *Aster rengifoanus* (J. Remy) Kuntze,  
*Haplodiscus pachyphyllus* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 100-700 m.

***Haplopappus retinervius*** (Kuntze) Klingenb.  
Sinónimos: *Aster retinervius* Kuntze, *Pyrrhocomma*  
*reticulata* Phil., *Haplopappus reticulatus* (Phil.) Reiche nom. illeg.,  
*Haplopappus ischnos* (Phil.) Reiche, *Haplodiscus ischnos*  
Phil., *Haplodiscus landbecki* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 500-1800 m.

***Haplopappus rigidus*** Phil.  
Sinónimos: *Haplopappus villanuevae* Phil., *Aster*  
*atacamensis* Kuntze, nom. illeg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2500-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Bailahuen, gualavina, chajchajra.

***Haplopappus rosulatus*** H.M. Hall  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.

***Haplopappus schumannii*** (Kuntze) G.K. Br. & W.D. Clark  
Sinónimos: *Haplopappus armerioides* Phil., *Haplopappus*  
*poeppigianus* (Hook. & Arn.) A. Gray var. *radiatus* A. Gray,  
*Haplopappus sericeus* Phil., *Aster schumannii* Kuntze,  
*Steriphe navarri* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1400-3000 m.

***Haplopappus scrobiculatus*** (Nees) DC.  
Sinónimos: *Aster densifolius* (J. Remy) Kuntze, *Aster*  
*scrobiculatus* (Nees) Kuntze, *Diplopappus cuneatus* Hook.  
& Arn., *Diplopappus scrobiculatus* Nees, *Haplopappus*  
*densifolius* J. Remy, *Perezia spathulata* Phil., hom. illeg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA.  
Rango altitudinal: 2600-3700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus setulosus*** Klingenb.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 250 m.

***Haplopappus stelliger*** J. Remy  
Sinónimos: *Aster stelliger* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus*  
*denticulatus* (Phil.) Reiche, *Pyrocoma denticulata* Phil.,  
*Aster denticulatus* (Phil.) Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ.

***Haplopappus stolpii*** Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 50-700 m.

***Haplopappus taeda*** Reiche  
Sinónimos: *Haplodiscus peteroanus* Phil., *Haplopappus*  
*graveolens* (Phil.) Reiche, *Haplodiscus graveolens* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 300-2000 m.

***Haplopappus uncinatus*** Phil.  
Sinónimos: *Haplopappus candolei* Phil., *Haplopappus*  
*uncinatus* Phil. var. *candolei* (Phil.) Reiche, *Diplopappus*  
*canescens* Hook. & Arn., *Aster uncinatus* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.

***Haplopappus undulatus*** Klingenb.

Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2000-3500 m.

***Haplopappus valparadisiacus*** Klingenb.

Sinónimos: *Diplopappus inuloides* Hook. & Arn., *Haplopappus berteroi* var. *lanceolatus* DC., *Haplopappus formosus* Phil.

Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 10-60 m.

***Haplopappus velutinus*** J. Remy subsp. *illinitus* (Phil.) Klingenb.

Sinónimos: *Haplopappus illinitus* Phil., *Aster illinitus* (Phil.) Kuntze, *Haplopappus glutinosus* Cass. var. *illinitus* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 800 m.

***Haplopappus velutinus*** J. Remy subsp. *longipes* (Phil.) Klingenb.

Sinónimos: *Haplodiscus longiscapus* Phil., *Haplopappus longipes* (Phil.) Reiche, *Pyrrocoma longipes* Phil., *Aster longipes* (Phil.) Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 800-2300 m.

***Haplopappus velutinus*** J. Remy subsp. *velutinus*

Sinónimos: *Haplopappus virgatus* Phil., *Haplopappus longiscapus* Phil., *Haplopappus stenophyllus* Phil., *Haplopappus fallax* (Phil.) Reiche, *Haplodiscus fallax* Phil., *Aster gayanus* Kuntze, *Aster scopiformis* Phil., *Diplopappus glutinosus* Hook. & Arn., nom. illeg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1300-2100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Haplopappus vicuniensis*** Klingenb.

Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ.

**Hedypnois**

***Hedypnois cretica*** (L.) Dum. Cours.  
Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

***Hedypnois rhagadioloides*** (L.) F.W. Schmidt

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, MAU, BIO, ARA.

**Helenium**

***Helenium aromaticum*** (Hook.) L.H. Bailey

Sinónimos: *Cephalophora aromatica* (Hook.) Schrad., *Cephalophora collina* Phil., *Cephalophora lanceolata* Phil., *Cephalophora tenera* Cass., *Graemia aromatica* Hook., *Helenium collinum* (Phil.) F. Meigen, *Gaillardia aromatica* (Hook.) Baill.

Hierba. Anual o perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Manzanilla del campo.

***Helenium atacamense*** Cabrera

Sinónimos: *Cephalophora litoralis* Phil.  
Hierba. Anual o bienal. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Helenium glaucum*** (Cav.) Stuntz

Sinónimos: *Cephalophora berteriana* Phil., *Cephalophora borchersii* Phil., *Cephalophora foliosa* Phil., *Cephalophora glauca* Cav., *Cephalophora gracilis* Phil., *Cephalophora plantaginea* DC., *Cephalophora plantaginea* DC. var. *spathulata* (F. Phil.) Reiche, *Cephalophora punctata* Klatt, *Cephalophora rigida* Phil., *Cephalophora spathulata* F. Phil., *Cephalophora stolpii* Phil., *Heleniastrum glaucum* (Cav.) Kuntze, *Gaillardia glauca* (Cav.) Baill., *Helenium borchersii* (Phil.) Cabrera, *Helenium foliosum* (Phil.) Cabrera, *Helenium gracile* (Phil.) Cabrera, *Hymenopappus glaucus* (Cav.) Spreng., *Helenium plantagineum* (DC.) J.F. Macbr.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-800 m.  
Nombre vulgar: Poquil.

***Helenium insulare*** (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Actinea insularis* (Phil.) Kuntze, *Cephalophora insularis* Phil.  
Hierba. Bienal o perenne. Endémica.  
Distribución: BIO.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Helenium ovallense*** Bierner  
Hierba. Anual o bienal. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 200-400 m.

***Helenium urmenetae*** (Phil.) Cabrera var. ***leguiffei*** (Phil.)  
Bierner  
Sinónimos: *Cephalophora leguiffei* Phil., *Cephalophora*  
*peraltae* Phil., *Helenium leguiffei* (Phil.) J.F. Macbr.  
Hierba. Anual o bienal. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 300-1300 m.

***Helenium urmenetae*** (Phil.) Cabrera var. ***urmenetae***  
Sinónimos: *Cephalophora setigera* Phil., *Cephalophora*  
*urmenatae* Phil., *Helenium longiaristatum* (Phil.) Cabrera  
Hierba. Anual o bienal. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Helenium vallenariense*** (Phil.) Bierner  
Sinónimos: *Cephalophora vallenariense* Phil.  
Hierba. Anual o bienal. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 400-1200 m.

## **Helianthus**

***Helianthus tuberosus*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LLA.

## **Helminthotheca**

***Helminthotheca echioides*** (L.) Holub  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,  
BIO, ARA, LLA.

## **Helogyne**

***Helogyne apaloidea*** Nutt.  
Sinónimos: *Brachyandra tenuifolia* (Phil.) Reiche, *Leto*  
*tenuifolia* Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 700-3200 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Chilisaya, tola.

***Helogyne macrogyne*** (Phil.) B.L. Rob.  
Sinónimos: *Brachyandra macrogyne* Phil.  
Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2000-3800 m.  
Nombre vulgar: Tíkara.

## **Heterosperma**

***Heterosperma nanum*** (Nutt.) Sherff  
Sinónimos: *Bidens involucrata* Phil., *Heterosperma*  
*involucratum* (Phil.) Reiche, *Microdonta nana* Nutt.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 1000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Heterosperma ovatifolium*** Cav.  
Sinónimos: *Heterosperma pinnatum* Kunth var. *ovatifolium*  
(Cav.) Kuntze  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 500-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## **Hieracium**

***Hieracium antarcticum*** d'Urv.  
Sinónimos: *Hieracium antarcticum* d'Urv. var.  
*myosotidifolium* (Sch. Bip.) Sleumer, *Hieracium andinum*  
Phil., *Hieracium gracile* Hook. subsp. *andinum* (Phil.)  
Zahn, *Hieracium gracile* Hook. subsp. *antarcticum* (d'Urv.)  
Zahn, *Hieracium gracile* Hook. subsp. *myosotidifolium*  
(Sch. Bip.) Zahn, *Hieracium magellanicum* Sch. Bip.,  
*Hieracium myosotidifolium* Sch. Bip., *Hieracium philippii*  
Albov, *Hieracium triste* Macloskie, hom. illeg., *Pilosella*  
*magellanica* (Sch. Bip.) F.W. Schultz & Sch. Bip., *Pilosella*  
*myosotidifolia* (Sch. Bip.) F.W. Schultz & Sch. Bip.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hieracium aurantiacum*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: LLA, MAG.

***Hieracium chilense*** Less.  
Sinónimos: *Hieracium gayanum* Arv.-Touv., *Hieracium*  
*orthotrichum* R.E. Fr., *Pilosella chilensis* (Less.) F.W.  
Schultz & Sch. Bip., *Pilosella orthotricha* (R.E. Fr.) F.W.  
Schultz & Sch. Bip.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA,  
AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 500-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Hieracium glaucifolium*** Poepp. ex Froel.

Sinónimos: *Hieracium chilense* Ball, *Pilosella glaucifolia* (Poepp. ex Froel.) F.W. Schultz & Sch. Bip., *Hieracium chilense* Skottsbl., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hieracium patagonicum*** Hook.f.

Sinónimos: *Hieracium chilense* Less. var. *navarinum* Zahn, *Hieracium poeppigianum* Zahn, *Pilosella patagonica* (Hook.f.) F.W. Schultz & Sch. Bip.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hieracium pilosella*** L. subsp. *euronotum* Nägeli & Peter

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

***Hieracium praealtum*** Vill. ex Gochnat

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

## **Hypochaeris**

***Hypochaeris acaulis*** (J. Remy) Britton

Sinónimos: *Achyrophorus acaulis* J. Remy

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1400-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris apargioides*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Hypochaeris berteri* Colla, *Achyrophorus apargioides* (Hook. & Arn.) DC.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Nombre vulgar: Escorzonera.

***Hypochaeris arenaria*** Gaudich.

Sinónimos: *Achyrophorus andinus* DC., *Achyrophorus arenarius* (Gaudich.) DC., *Achyrophorus humilis* Phil., *Hypochaeris arenaria* Gaudich. var. *andina* (DC.) Cabrera, *Hypochaeris andina* (DC.) Benth. & Hook. ex Griseb., *Hypochaeris humilis* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris pygmaea* Phil., *Leontodon arenarius* (Gaudich.) Albov, *Hypochaeris psychrophila* (Wedd.) Reiche, *Seriola andina* DC., nom. illeg., *Achyrophorus psychrophilus* Wedd., *Hypochaeris andina* (DC.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *laciniata* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris chondrilloides*** (A. Gray) Cabrera

Sinónimos: *Achyrophorus chondrilloides* A. Gray, *Achyrophorus deserticola* Phil., *Achyrophorus glaucus* Phil., *Oreophila chondrilloides* D. Don ex A. Gray, nom. illeg., *Hypochaeris glauca* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Oreophila chondrilloides* Hook. & Arn., nom. nud., *Hypochaeris glabrata* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Lokoche, romaza.

***Hypochaeris clarionoides*** (J. Remy) Reiche

Sinónimos: *Achyrophorus clarionoides* J. Remy, *Achyrophorus microphyllus* J. Remy, *Hypochaeris clarionoides* (J. Remy) Reiche var. *microphylla* (J. Remy) Cabrera, *Hypochaeris tenuifolia* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *clarionoides* (J. Remy) Bortiri, *Hypochaeris microphylla* (J. Remy) Reiche, *Hypochaeris nana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAG.

Rango altitudinal: 2500-3400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris cupressorum*** F. Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

***Hypochaeris deserticola*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

***Hypochaeris eremophila*** Cabrera

Sinónimos: *Distoecha taraxacoides* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2800-4700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Hypochaeris foliosa*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Achyrophorus foliosus* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Hypochaeris gayana*** (DC.) Cabrera

Sinónimos: *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *gayanus* DC.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris glabra* L.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, ARA,  
MAG, JFE, IPA.

***Hypochaeris grandidentata* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Achyrophorus grandidentatus* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 200-2500 m.  
Nombre vulgar: Cerrajilla, renca.

***Hypochaeris hispidula* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LLA.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Hypochaeris incana* (Hook. & Arn.) Macloskie var. *incana***

Sinónimos: *Achyrophorus incanus* (Hook. & Arn.) Sch.  
Bip., *Seriola incana* Hook. & Arn.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris incana* (Hook. & Arn.) Macloskie var. *integrifolia* (Sch. Bip.) Cabrera**

Sinónimos: *Achyrophorus coronopifolius* Sch. Bip.,  
*Hypochaeris arenaria* Gaudich. var. *coronopifolia*  
(Sch. Bip.) Speg., *Hypochaeris ibari* Phil., *Leontodon*  
*coronopifolium* (Sch. Bip.) Comm. ex Albov, *Hypochaeris*  
*coronopifolia* (Sch. Bip.) Franch.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris laciniosa* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Hypochaeris lessingii* (Sch. Bip.) Reiche**

Sinónimos: *Achyrophorus lessingii* Sch. Bip.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 2000-2500 m.

***Hypochaeris melanolepis* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

***Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Benth. & Hook.f. ex Griseb.**

Sinónimos: *Oreophila meyeniana* Walp., *Achyrophorus*  
*meyenianus* (Walp.) Walp.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 3300-3900 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Hypochaeris montana* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Achyrophorus montanus* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 1800-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris nahuelvutae* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ARA.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

***Hypochaeris palustris* (Phil.) De Wild.**

Sinónimos: *Achyrophorus palustris* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,  
MAG.  
Rango altitudinal: 0-2100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris pilosa* Reiche**

Sinónimos: *Hypochaeris hirta* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Hypochaeris radicata* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Hypochaeris scorzonerae* (DC.) F. Muell. var. *glabrata* (DC.) Reiche**

Sinónimos: *Achyrophorus scorzonerae* DC. var. *glabrata*  
DC., *Hypochaeris chrysantha* Poepp. ex DC., *Oreophila*  
*taraxacoides* Don, *Seriola taraxacoides* (Don) Hook. &  
Arn., *Achyrophorus chrysanthus* DC.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-500 m.



***Hypochaeris scorzonerae*** (DC.) F. Muell. var. ***ramosa*** (DC.) Reiche  
Sinónimos: *Achyrophorus scorzonerae* DC. var. *ramosa* DC.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Hypochaeris scorzonerae*** (DC.) F. Muell. var. ***scorzonerae***  
Sinónimos: *Hypochaeris sonchoides* Kunth, *Achyrophorus scorzonerae* DC.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Nombre vulgar: Escorzonera.

***Hypochaeris spathulata*** (J. Remy) Reiche var. ***chiloensis*** (J. Remy) Reiche  
Sinónimos: *Achyrophorus spathulatus* J. Remy var. *chiloensis* J. Remy  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, LLA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Hypochaeris spathulata*** (J. Remy) Reiche var. ***spathulata***  
Sinónimos: *Achyrophorus spathulatus* J. Remy  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Hypochaeris taraxacoides*** Ball  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2600-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Psiñe de burro, jap'epsike, waripsike.

***Hypochaeris tenerifolia*** (J. Remy) Dusén  
Sinónimos: *Achyrophorus tenerifolius* J. Remy  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris tenuifolia*** (Hook. & Arn.) Griseb. var. ***eurylepis*** (Phil.) Cabrera  
Sinónimos: *Achyrophorus araucanus* Phil., *Achyrophorus odoratus* (Poepp. & Endl.) Walp., *Oreophila odorata* Poepp. & Endl., *Hypochaeris eurylepis* Phil., *Hypochaeris odorata* (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook.f. var. *eurylepis* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris odorata* (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook.f.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris tenuifolia*** (Hook. & Arn.) Griseb. var. ***linearifolia*** (DC.) Bortiri  
Sinónimos: *Achyrophorus graminifolius* Phil., nom. nud., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *linearifolius* DC., *Hypochaeris graminifolia* Phil., *Achyrophorus angustissimus* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1500-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris tenuifolia*** (Hook. & Arn.) Griseb. var. ***tenuifolia***  
Sinónimos: *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC., *Seriola tenuifolia* Hook. & Arn., *Hypochaeris spinuligera* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris volckmannii* (Phil.) Phil., *Oreophila tenuifolia* D. Don ex Hook. & Arn., nom. illeg., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *neaeanus* DC., *Achyrophorus spinuliger* Phil., *Achyrophorus volckmannii* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 1300-3200 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Escorzonera.

***Hypochaeris thermarum*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 2500-3400 m.

***Hypochaeris thrincioides*** (J. Remy) Reiche  
Sinónimos: *Achyrophorus brevicaulis* Phil., *Achyrophorus philippi* Sch. Bip. ex Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Hypochaeris toltensis*** Reiche  
Sinónimos: *Hypochaeris grandiflora* F. Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ARA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

## **Jungia**

***Jungia polita*** Griseb.  
Arbusto o subarbusto. Nativo.  
Distribución: TAR.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nota: No hay registros en herbarios nacionales. Duplicados en GH, NY, US, recolectados por Shepard en la Provincia de Tarapacá (TAR). Ver Harling, 1995. Acta Regiae Soc. Litt. Gothob., Bot. 4:5-133.

### **Kieslingia**

*Kieslingia chilensis* Faúndez, Saldivia & A.E. Martic.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 1600-2500 m.

### **Lactuca**

*Lactuca sativa* L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: AYP, RME.

*Lactuca serriola* L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

*Lactuca virosa* L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

### **Laennecia**

*Laennecia artemisioides* (Meyen & Walp.) G.L. Nesom

Sinónimos: *Conyza artemisioides* Meyen & Walp., *Conyza andicola* Phil., *Erigeron artemisioides* (Meyen & Walp.)

Sch. Bip., *Marsea artemisiaefolia* (Meyen & Walp.) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, RME.

Rango altitudinal: 3500-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

### **Lagenophora**

*Lagenophora hariotii* Franch.

Sinónimos: *Lagenifera hariotii* (Franch.) T.R. Dudley, comb. illeg., *Lagenophora hirsuta* auct. non Less.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

*Lagenophora hirsuta* Poepp. ex Less.

Sinónimos: *Lagenophora commersonii* Cass. var. *hirsuta* (Poepp. ex Less.) Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

*Lagenophora nudicaulis* (Comm. ex Lam.) Dusén

Sinónimos: *Aster nudicaulis* Comm. ex Lam., *Bellis magellanica* DC., *Calendula magellanica* Willd., *Lagenifera nudicaulis* (Comm. ex Lam.) T.R. Dudley, *Lagenophora commersonii* Cass., *Lagenophora purpurascens* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

### **Lapsana**

*Lapsana communis* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

### **Lasthenia**

*Lasthenia kunthii* (Less.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Hymenatherum kunthii* Less., *Lasthenia bridgesii* (Poepp. & Endl.) Steud., *Lasthenia chilensis* Steud., nom. nud., *Lasthenia obtusifolia* Cass., *Lasthenia obtusifolia* Cass.

var. *bridgesii* (Poepp. & Endl.) DC., *Rancagua bridgesii* Poepp. & Endl., *Rancagua feuillei* (Bertero ex Colla) Poepp. & Endl., *Tagetes feuillei* Bertero ex Colla

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Rancagua.

### **Leontodon**

*Leontodon autumnalis* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, MAG.

*Leontodon hirtus* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, NUB, BIO, LRI, LLA.

*Leontodon saxatilis* Lam.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

## **Lepidophyllum**

### ***Lepidophyllum cupressiforme*** (Lam.) Cass.

Sinónimos: *Baccharis cupressiformis* (Lam.) Pers., *Conyza cupressiformis* Lam., *Gutierrezia cupressiformis* (Lam.) Sch. Bip., *Athanasia cupressiformis* (Lam.) Comm. ex Cass., *Brachyridium cupressiforme* (Lam.) Meisn., nom. illeg., *Grindelia cupressiformis* (Lam.) Sch. Bip. ex Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

## **Leptinella**

### ***Leptinella scariosa*** Cass.

Sinónimos: *Cotula acaenoides* (Hook. & Arn.) Alb., *Cotula hombronii* Franch., *Cotula scariosa* (Cass.) Franch., *Leptinella acaenoides* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

## **Leptocarpha**

### ***Leptocarpha rivularis*** DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Palo negro.

## **Leucanthemum**

### ***Leucanthemum vulgare*** Lam.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,

LLA, MAG.

## **Leucheria**

### ***Leucheria achillaeifolia*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Chabraea fragans* Phil., *Lasiorrhiza anthemidifolia* (Phil.) Kuntze, *Lasiorrhiza fragans* (Phil.) Kuntze, *Lasiorrhiza achillaeifolia* (Hook. & Arn.) Macloskie, *Lasiorrhiza ibari* (Phil.) Macloskie, *Leuceria anthemidifolia* Phil., *Leuceria ibari* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Leucheria amoena*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Leucheria apiifolia*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 2500 m.

### ***Leucheria bridgesii*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Chabraea pulchella* Phil., *Lasiorrhiza pulchella* (Phil.) Kuntze, comb. illeg., *Leuceria microcephala* Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1000-3300 m.

### ***Leucheria candidissima*** D. Don

Sinónimos: *Chabraea candidissima* (D. Don) DC., *Lasiorrhiza candidissima* (D. Don) Macloskie, *Leuceria candidissima* D. Don fma. *subintegra* Skottsbs., *Leuceria laciniata* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU.

Rango altitudinal: 2000-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Leucheria cerberoana*** J. Remy

Sinónimos: *Leuceria glabrata* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

### ***Leucheria coerulescens*** J. Remy

Sinónimos: *Leucheria aurita* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Leucheria congesta*** D. Don

Sinónimos: *Chabraea canescens* Phil., *Lasiorrhiza glomerulata* Kuntze, *Leuceria canescens* (Phil.) Reiche, *Leuceria glomerulata* (Kuntze) K. Schum., *Leuceria sonchoides* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Leucheria cumingii*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Chabraea modesta* Phil., *Leuceria debilis* Phil., *Leuceria modesta* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Leucheria daucifolia*** (D. Don) Crisci  
Sinónimos: *Ptilurus daucifolius* D. Don, *Chabraea daucifolia* (D. Don) Wedd., *Chabraea laciniata* Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2600-4800 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Leucheria floribunda*** DC.  
Sinónimos: *Eizaguirrea candollei* J. Remy, nom. illeg., *Eizaguirrea cirsioides* Phil., *Eizaguirrea sonchifolia* Turcz., *Lasiorrhiza floribunda* (DC.) Kuntze, *Leuceria racemosa* Phil., *Leuceria sonchifolia* (Turcz.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 2000-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria garciana*** J. Remy  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 2500 m.

***Leucheria gayana*** (J. Remy) Reiche  
Sinónimos: *Chabraea gayana* J. Remy, *Leuceria nudicaulis* Phil., *Leuceria popetana* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1800-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria gilliesii*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Leuceria hieracioides* D. Don, hom. illeg., *Leuceria nivea* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAU, ARA.  
Rango altitudinal: 1900-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria glabriuscula*** (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Chabraea glabriuscula* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 1000 m.

***Leucheria glacialis*** (Poepp. ex Less.) Reiche  
Sinónimos: *Chabraea glacialis* (Poepp. ex Less.) DC., *Lasiorrhiza glacialis* Poepp. ex Less., *Leuceria araucana* Phil., *Leuceria discolor* Phil., *Leuceria glacialis* (Poepp. ex Less.) Reiche var. *longifolia* (Phil.) Cabrera, *Leuceria longifolia* Phil., *Leuceria pauciflora* Phil., *Leuceria thermanum* (Phil.) Reiche var. *araucana* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria glandulosa*** D. Don  
Sinónimos: *Chabraea elongata* Bertero ex Colla, *Chabraea glandulosa* (D. Don) DC., *Lasiorrhiza glandulosa* (D. Don) DC., *Leuceria peduncularis* J. Remy  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO.  
Rango altitudinal: 600-2000 m.

***Leucheria graui*** Katinas, M.C. Tellería & Crisci  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 2200-2400 m.

***Leucheria hahnii*** Franch.  
Sinónimos: *Chabraea integrifolia* Phil., hom. illeg., *Lasiorrhiza hahnii* (Franch.) Macloskie, *Leuceria fuegina* Phil., *Leucheria gossypina* Hook. & Arn. var. *integrifolia* Sch. Bip., *Leucheria gossypina* Hook. & Arn. var. *pinnatifida* Sch. Bip., *Lasiorrhiza fueguiana* (Phil.) Kuntze, *Leucheria integrifolia* (Phil.) Reiche ex B.L. Rob., *Chabraea suaveolens* (d'Urv.) DC. var. *pinnatifida* Sch. Bip., nom. nud., *Chabraea suaveolens* (d'Urv.) DC. var. *integrifolia* Sch. Bip., nom. nud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria hieracioides*** Cass.  
Sinónimos: *Lasiorrhiza acanthoides* (D. Don) Kuntze, *Lasiorrhiza hieracioides* (Cass.) Kuntze, *Leuceria acanthoides* D. Don, *Leuceria divaricata* D. Don, *Chabraea prenanthoides* Bertero  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-2200 m.

***Leucheria leontopodioides*** (Kuntze) K. Schum.  
Sinónimos: *Lasiorrhiza leontopodioides* Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria lithospermifolia*** (Less.) Reiche subsp. *integrifolia* (Phil.) Grau & Zinnecker  
Sinónimos: *Leucheria integrifolia* (Phil.) Crisci, *Chabraea integrifolia* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 1000-1500 m.

***Leucheria lithospermifolia*** (Poepp. ex Less.) Reiche subsp. *lithospermifolia*

Sinónimos: *Chabraea lithospermifolia* (Poepp. ex Less.) DC., *Lasiorrhiza lithospermifolia* Poepp. ex Less., *Leuchaeria volcanica* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1400-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria magna*** Phil.

Sinónimos: *Lasiorrhiza stricta* (Phil.) Macloskie, *Leuceria stricta* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria meladensis*** Katinas, Crisci & A.E. Martic.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 1000-1100 m.

***Leucheria menana*** J. Remy

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Leucheria millefolium*** Dusén & Skottsbo.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria multiflora*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Leucheria nutans*** (J. Remy) Reiche

Sinónimos: *Chabraea nutans* J. Remy, *Chabraea poeppigii* Phil., *Clybatis volkmanii* Phil., *Lasiorrhiza nutans* (J. Remy) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1300-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria oligocephala*** J. Remy

Sinónimos: *Trixis senecioides* Hook.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Leucheria paniculata*** Poepp. ex Less.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria papillosa*** Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria polyclados*** (J. Remy) Reiche

Sinónimos: *Chabraea polyclados* J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3000-3100 m.

***Leucheria pteropogon*** (Griseb.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio pteropogon* Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 3500-0 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria purpurea*** (Vahl) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Chabraea purpurea* (Vahl) DC., *Perdicium purpureum* Vahl, *Lasiorrhiza purpurea* (Vahl) Less., *Leuceria purpurea* (Vahl) S. Moore ex Rendle

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria rosea*** Poepp. ex Less.

Sinónimos: *Lasiorrhiza rosea* Less. var. *albiflora* Kuntze, *Lasiorrhiza rosea* Less. var. *andryaloides* (DC.) Kuntze, comb. illeg., *Leuceria andryaloides* DC., nom. illeg., *Leucheria lepida* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria runcinata*** D. Don

Sinónimos: *Leucheria landbeckii* (Phil.) Reiche, *Chabraea barrasiana* J. Remy, *Chabraea concinna* Phil., *Chabraea coquimbana* Phil., *Chabraea landbeckii* Phil., *Chabraea oligocephala* Phil., *Chabraea runcinata* (D. Don) Hook., *Chabraea tenerifolia* Phil., *Leuceria barrasiana* (J. Remy) Reiche, comb. illeg., *Leuceria barrasiana* (J. Remy) Reiche var. *tenerifolia* (Phil.) Reiche, *Leuceria coquimbana* (Phil.) Reiche, *Leuceria meyeniana* Walp., *Leuceria paucicapitata* Reiche, *Leucheria tenerifolia* (Phil.) Phil., *Leuceria*



*concinna* (Phil.) Reiche, *Leuceria barrasiana* (J. Remy) F. Meigen, comb. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 3000-0 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Blanquillo.

***Leucheria salina*** (J. Remy) Hieron. subsp. *salina*  
Sinónimos: *Chabraea salina* J. Remy, *Chabraea salinasi* Phil. var. *bipinnatifida* Phil., *Lasiorrhiza salina* (J. Remy) Kuntze, *Leuceria salina* (J. Remy) Dusén, comb. illeg., *Leuceria salina* (J. Remy) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2000-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria salina*** (J. Remy) Hieron. subsp. *zöllneri* Crisci  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria scrobiculata*** D. Don  
Sinónimos: *Chabraea glabra* DC., *Chabraea scrobiculata* (D. Don) DC., *Chabraea scrobiculata* (D. Don) DC. var. *pentacephala* Phil., *Lasiorrhiza glabra* (DC.) Kuntze, *Lasiorrhiza scrobiculata* (D. Don) Kuntze, *Leuceria scrobiculata* D. Don var. *glabra* (DC.) Hauman, *Mimela pedicularifolia* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 1900-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria senecioides*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Lasiorrhiza cinerea* (D. Don) Less., *Chabraea abbreviata* Bertero ex Colla, *Chabraea cinerea* (D. Don) DC., *Lasiorrhiza senecioides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Leuceria abbreviata* (Bertero) Steud., *Leuceria cinerea* D. Don, *Leuceria senecioides* Hook. & Arn. var. *purpurescens* DC.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Leucheria tenuis*** Less.  
Sinónimos: *Chabraea berteroniana* Steud., *Chabraea tenuior* Bertero ex Colla  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, ARA.  
Rango altitudinal: 900-2000 m.

***Leucheria thermarum*** (Phil.) Phil.  
Sinónimos: *Chabraea thermarum* Phil., *Leuceria thermarum* (Phil.) Reiche, nom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Leucheria tomentosa*** (Less.) Crisci  
Sinónimos: *Chabraea tomentosa* (Less.) DC., *Lasiorrhiza pulchella* (D. Don) Steud., *Lasiorrhiza tomentosa* Less., *Leuceria eriochlaena* J. Remy, *Leuceria pulchella* D. Don  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Leucheria viscida*** (Bertero ex Colla) Crisci  
Sinónimos: *Chabraea rosea* DC., *Chabraea viscida* Bertero ex Colla, *Chabraea viscosa* Bertero ex DC., nom. nud., *Lasiorrhiza philippiana* Kuntze, *Lasiorrhiza rosea* Less., *Leuceria chillanensis* Reiche, *Leuceria glandulosa* Phil., nom. illeg., *Leuceria leucomalla* Phil., *Leuceria neaei* DC., *Leuceria rosea* (Less.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## **Leunisia**

***Leunisia laeta*** Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 2000-3000 m.

## **Logfia**

***Logfia gallica*** (L.) Coss. & Germ.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

## **Lophopappus**

***Lophopappus cuneatus*** R.E. Fr.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 2800-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Lophopappus foliosus*** Rusby  
Sinónimos: *Proustia foliosa* (Rusby) Ferreyra  
Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 3000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Lophopappus tarapacanus*** (Phil.) Cabrera  
Sinónimos: *Gochnatia tarapacana* Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2200-4700 m.  
Nombre vulgar: Tajana, tagtaga, chari, moñe, leñadura.

### Lucilia

***Lucilia eriophora*** J. Remy  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, ARA.  
Rango altitudinal: 1000-1500 m.

### Lycapsus

***Lycapsus tenuifolius*** Phil.  
Sinónimos: *Alomia tenuifolia* (Phil.) Benth. & Hook.f. ex Reiche  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: IDE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

### Macrachaenium

***Macrachaenium gracile*** Hook.f.  
Sinónimos: *Macrachaenium foliosum* Albov  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### Madia

***Madia chilensis*** (Nutt.) Reiche  
Sinónimos: *Madariopsis chilensis* Nutt.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 10-2500 m.  
Nombre vulgar: Madia, madi, melosa.

***Madia sativa*** Molina  
Sinónimos: *Madia viscosa* Cav.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Madi, melosa.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

### Malacothrix

***Malacothrix clevelandii*** A. Gray  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 10-1000 m.

***Malacothrix coulteri*** A. Gray  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ.

### Marticoenia

***Marticoenia foliosa*** (Phil.) Crisci  
Sinónimos: *Leuceria foliosa* Phil., *Lasiorrhiza foliosa* (Phil.) Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2700-3300 m.

### Matricaria

***Matricaria chamomilla*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

***Matricaria discoidea*** DC.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

### Micropsis

***Micropsis nana*** DC.  
Sinónimos: *Lasiophyton pusillum* Hook. & Arn.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.  
Rango altitudinal: 300-2500 m.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

### Microseris

***Microseris pygmaea*** D. Don  
Hierba. Anual o perenne. Introducida.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA.

## Mikania

### *Mikania mendocina* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## Mniodes

### *Mniodes coarctata* Cuatrec.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4600 m.  
Países limítrofes: Perú.

### *Mniodes piptolepis* (Wedd.) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey

Sinónimos: *Belloa piptolepis* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium piptolepis* (Wedd.) Griseb., *Lucilia piptolepis* Wedd., *Merope piptolepis* Wedd., *Lucilicline piptolepis* (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 3200-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### *Mniodes schultzii* (Wedd.) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey

Sinónimos: *Belloa schultzii* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium schultzii* (Wedd.) Cabrera, *Lucilia schultzii* (Wedd.) A. Gray, *Merope schultzii* Wedd., *Lucilicline schultzii* (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3900-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Yaretilla.

## Moscharia

### *Moscharia pinnatifida* Ruiz & Pav.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Nombre vulgar: Almizcle.

### *Moscharia solbrigii* Crisci

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 300-500 m.

## Mutisia

### *Mutisia acerosa* Less.

Sinónimos: *Mutisia parviflora* J. Remy, *Mutisia ulicina* D. Don  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 1200-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Romerillo de cordillera.

### *Mutisia acuminata* Ruiz & Pav. var. *hirsuta* (Meyen) Cabrera

Sinónimos: *Mutisia viciaefolia* Cav. var. *hirsuta* (Meyen) Wedd., *Mutisia hirsuta* Meyen  
Arbusto trepador. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2500-3500 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

### *Mutisia araucana* Phil.

Subarbusto trepador. Endémico.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 800-1400 m.

### *Mutisia brachyantha* Phil.

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1200 m.

### *Mutisia cana* Poepp.

Sinónimos: *Mutisia glauca* J. Remy, *Mutisia polyphylla* Phil., *Mutisia reticulata* Phil., *Mutisia volckmanni* Phil., *Mutisia glauca* Phil.  
Arbusto trepador. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1000-2000 m.  
Nombre vulgar: Granadilla.

### *Mutisia decurrens* Cav. var. *decurrens*

Sinónimos: *Aplophyllum decurrens* (Cav.) Cass., *Mutisia decurrens* Cav. var. *andina* Phil.  
Subarbusto trepador. Nativo.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### *Mutisia decurrens* Cav. var. *patagonica* (Phil.) S.F. Blake

Sinónimos: *Mutisia patagonica* Phil.  
Subarbusto trepador. Nativo.  
Distribución: NUB.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Mutisia hamata*** Reiche

Sinónimos: *Mutisia microphylla* Phil., hom. illeg.

Subarbusto trepador. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2500-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Mutisia ilicifolia*** Hook. var. ***decandolleana*** (Phil. ex Reiche) Cabrera

Sinónimos: *Mutisia candolleana* Phil., *Mutisia decandolleana* Phil.

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 200-2000 m.

***Mutisia ilicifolia*** Hook. var. ***ilicifolia***

Sinónimos: *Aplophyllum ilicifolium* (Cav.) Cass., *Mutisia breviflora* Phil., *Mutisia consobrina* Phil., *Mutisia eriocephala* Phil., *Mutisia grossedentata* Phil., *Mutisia ilicifolia* Hook., *Mutisia ilicifolia* Hook. var. *cavanillesii* DC., *Mutisia involucrata* Phil. var. *consobrina* Phil.

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 1000-1800 m.

Nombre vulgar: Clavel del campo, grasilla, flor de granada, hierba del jote, flor de la canela.

***Mutisia involucrata*** Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 300-1700 m.

***Mutisia lanigera*** Wedd.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4000 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chirchirkuma, chinkachinka, wichakaña.

***Mutisia latifolia*** D. Don fma. ***bracteata*** (J. Remy) Cabrera

Sinónimos: *Mutisia bracteata* J. Remy

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Mutisia latifolia*** D. Don fma. ***latifolia***

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

***Mutisia ledifolia*** Decne. ex Wedd.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-4200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Quinchamale, chinchirkoma, tola negra, kaputula, tola romero.

***Mutisia linearifolia*** Cav.

Sinónimos: *Aplophyllum linearifolium* (Cav.) Cass.

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mutisia macrophylla*** Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: NUB.

Rango altitudinal: 200-500 m.

***Mutisia oligodon*** Poepp. & Endl.

Sinónimos: *Mutisia gayana* J. Remy, *Mutisia meyeniana* J. Remy ex Phil.

Subarbusto trepador. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mutisia rosea*** Poepp. ex Less.

Sinónimos: *Mutisia alba* Phil., *Mutisia berteriana* Endl. ex Poepp., *Mutisia berterii* DC., *Mutisia landbeckii* Phil., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *rosea* (Less.) Ruiz & Pav.

Subarbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

***Mutisia sinuata*** Cav.

Sinónimos: *Guariruma sinuatum* (Cav.) Cass., *Mutisia dentata* Phil., *Mutisia popetana* Phil., *Mutisia sanguinea* Meyen, *Mutisia sinuata* Cav. var. *brachycephala* Phil., *Mutisia sinuata* Cav. var. *taraxacifolia* (Less.) Kuntze, *Mutisia taraxacifolia* Less., *Mutisia taraxacifolia* Less. var. *integerrima* Phil.

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1700-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mutisia spectabilis*** Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1300-2800 m.

Nombre vulgar: Clavel del aire.

***Mutisia spinosa*** Ruiz & Pav. var. ***pulchella*** (Speg.) Cabrera

Sinónimos: *Mutisia bridgesii* Endl. ex Poepp. & Endl., *Mutisia pulchella* Speg., *Mutisia retusa* J. Remy, *Mutisia retusa* J. Remy var. *pulchella* (Speg.) Skotts.

Subarbusto trepador. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Clavel del campo, flor de la estrella.

***Mutisia spinosa*** Ruiz & Pav. var. *spinosa*  
Sinónimos: *Mutisia auriculata* Poepp. ex Less., *Mutisia hastata* Bertero ex DC., nom. nud., *Mutisia ilicifolia* Hook. var. *truncata* (D. Don) DC., *Mutisia retusa* J. Remy var. *glaberrima* Phil., *Mutisia truncata* D. Don  
Subarbusto trepador. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Clavel del campo, flor de la estrella.

***Mutisia splendens*** Renjifo  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME.

***Mutisia subspinosa*** Cav.  
Sinónimos: *Guariruma subspinosa* (Cav.) Cass.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, NUB.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Mutisia subulata*** Ruiz & Pav. fma. *rosmarinifolia* (Poepp. & Endl.) Cabrera  
Sinónimos: *Mutisia linearifolia* Hook., hom. illeg., *Mutisia gracilis* Meyen, *Mutisia hookeri* Meyen, *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *major* Hook. & Arn., *Mutisia hookeri* Meyen var. *rosmarinifolia* Poepp. & Endl., *Mutisia elegans* Phil., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *gracilis* (Meyen) Walp., *Mutisia linearifolia* Cav. var. *hookeri* (Meyen) Reiche  
Subarbusto trepador. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 1700-3000 m.  
Países limítrofes: Bolivia.

***Mutisia subulata*** Ruiz & Pav. fma. *subulata*  
Sinónimos: *Guariruma inflexum* (Cav.) Cass., *Mutisia hookeri* Meyen var. *scandens* Poepp. & Endl., *Mutisia inflexa* Cav., *Mutisia inflexa* Cav. var. *imberbis* Poepp. & Endl., *Mutisia inflexa* Cav. var. *melanopoga* Poepp. & Endl., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *cavanillesii* Hook. & Arn., *Mutisia versicolor* Phil.  
Subarbusto trepador. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Mutisia tridens*** Poepp. ex Less.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: BIO.

## **Nardophyllum**

***Nardophyllum bryoides*** (Lam.) Cabrera  
Sinónimos: *Anactinia hookeri* J. Remy, nom. illeg., *Nardophyllum obtusifolium* Hook. & Arn., *Baccharis bryoides* (Lam.) Pers., *Chiliotrichum darwinii* Hook.f., *Chiliotrichum humile* Hook.f., *Chiliotrichum kingii* Hook.f., *Conyza bryoides* Lam., *Microchaete humilis* (Hook.f.) Sch. Bip., *Nardophyllum darwinii* (Hook.f.) A. Gray, *Nardophyllum humile* (Hook.f.) A. Gray, *Nardophyllum kingii* (Hook.f.) A. Gray, *Nardophyllum parvifolium* Phil., *Dolichogyne parvifolia* Phil. ex Kuntze  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Nardophyllum chiliotrichioides*** (J. Remy) A. Gray  
Sinónimos: *Dolichogyne chiliotrichioides* J. Remy  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-3800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Nardophyllum genistoides*** (Phil.) A. Gray  
Sinónimos: *Dolichogyne genistoides* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME.

***Nardophyllum lanatum*** (Meyen) Cabrera  
Sinónimos: *Barnadesia lanata* Meyen, *Dolichogyne candollei* J. Remy, nom. illeg., *Dolichogyne gnaphalioides* DC., *Gochnatia revoluta* D. Don ex Hook. & Arn., *Nardophyllum candollei* (J. Remy) F. Meigen, comb. illeg., *Nardophyllum revolutum* (D. Don ex Hook. & Arn.) Hook. & Arn.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 1200-3200 m.  
Nombre vulgar: Macabeo.

## **Nassauvia**

***Nassauvia aculeata*** (Less.) Poepp. & Endl. var. *aculeata*  
Sinónimos: *Nassauvia aculeata* (Less.) Poepp. & Endl. var. *spinosa* (D. Don) Cabrera, *Nassauvia diazii* (Phil.) Reiche, *Nassauvia latifolia* (Phil.) F. Meigen, *Nassauvia spinosa* (D. Don) Reiche, comb. illeg., *Panargyrum diazii* Phil., *Panargyrum latifolium* Phil., *Panargyrum pectinatum* Phil., *Panargyrum spinosum* D. Don, *Penthanthus aculeatus* Less.



Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia aculeata* (Less.) Poepp. & Endl. var. *azorelloides* (Speg.) Cabrera

Sinónimos: *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén, *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *azorelloides* Speg., *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *subspinosa* (Phil.) Macloskie, *Nassauvia subspinosa* (Phil.) Albov, *Panargyrum abbreviatum* Hook. & Arn., *Panargyrum subspinatum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia aculeata* (Less.) Poepp. & Endl. var. *robusta* (Cabrera) Cabrera

Sinónimos: *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *robusta* Cabrera  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia argentea* Phil.

Sinónimos: *Nassauvia revoluta* D. Don var. *argentea* (Phil.) Hosseus  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 1500-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia axillaris* (Lag. ex Lindl.) D. Don

Sinónimos: *Acanthophyllum axillare* (Lag. ex Lindl.) Hook. & Arn., *Strongyloma axillare* (Lag. ex Lindl.) DC., *Triptilion axillare* Lag. ex Lindl.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1000-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

*Nassauvia coronipappa* M.T.K. Arroyo & Martic.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 800-1100 m.

*Nassauvia cumingii* Hook. & Arn.

Sinónimos: *Nassauvia glabrata* Phil., *Nassauvia macracantha* DC., *Nassauvia macracantha* DC. var. *glabrata* (Phil.) Reiche, *Nassauvia macracantha* DC. var.

*spicata* (J. Remy) Hauman, *Nassauvia spicata* J. Remy, *Nassauvia spinosa* Phil., *Nassauvia suaveolens* D. Don, hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 2700-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia darwinii* (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén

Sinónimos: *Nassauvia candollei* Macloskie, *Nassauvia darwinii* (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén var. *laxa* (Phil.) Skotts., *Nassauvia lagascae* (DC.) Reiche, hom. illeg., *Nassauvia laxa* (Phil.) Speg., *Panargyrum darwinii* Hook. & Arn., *Panargyrum lagascae* DC., *Panargyrum laxum* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia dentata* Griseb.

Sinónimos: *Nassauvia cespitosa* Wedd., *Nassauvia patula* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 1200-2100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia digitata* Wedd.

Sinónimos: *Nassauvia lycopodioides* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 2000-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia duseii* O. Hoffm.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia glomerata* (D. Don) Wedd.

Sinónimos: *Panargyrum densifolium* Phil., *Panargyrum glomeratum* D. Don  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 2500-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia glomerulosa* (Lag. ex Lindl.) D. Don

Sinónimos: *Nassauvia glomerulosa* (Lag. ex Lindl.) D. Don fma. *struthionum* (Phil.) Skotts., *Nassauvia struthionum* (Phil.) Speg., *Strongyloma glomerulosum* (Lag. ex Lindl.) DC., *Strongyloma struthionum* Phil., *Triptilion glomerulosum* Lag. ex Lindl., *Nassauvia maeviae* Cabrera

Arbusto. Nativo.  
Distribución: RME, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia lagascae* (D. Don) F. Meigen var. *globosa* Skotts.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia lagascae* (D. Don) F. Meigen var. *lagascae*  
Sinónimos: *Caloptilium lagascae* (D. Don) Hook. & Arn.,  
*Nassauvia lanata* Reiche, *Portalesia procumbens* Meyen,  
*Sphaerocephalus lagascae* D. Don  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, LRI,  
MAG.  
Rango altitudinal: 3000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia lagascae* (D. Don) F. Meigen var. *lanata* (Phil.)  
Skotts.  
Sinónimos: *Caloptilium lagascae* (D. Don) Hook. & Arn.  
var. *lanata* Phil., *Nassauvia humilis* Phil., *Nassauvia lanata*  
Reiche var. *lanigera* (Phil.) Reiche, *Nassauvia lanigera*  
Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,  
MAG.  
Rango altitudinal: 1000-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia latissima* Skotts.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia looseri* Cabrera  
Sinónimos: *Panargyrum heterophyllum* Phil., *Panargyrum*  
*acerosum* Phil., *Nassauvia heterophylla* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2500-3000 m.

*Nassauvia magellanica* J.F. Gmel.  
Sinónimos: *Nassauvia suaveolens* Willd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia pinnigera* D. Don  
Sinónimos: *Nassauvia multiflora* Meyen  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 3000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia pulcherrima* Cabrera  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LRI.  
Rango altitudinal: 1800-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia pygmaea* (Cass.) Hook.f. var. *intermedia* (Phil.)  
Cabrera  
Sinónimos: *Nassauvia intermedia* Phil., *Nassauvia pumila*  
Poepp. & Endl., *Nassauvia pumila* Poepp. & Endl. var.  
*intermedia* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 1500-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia pygmaea* (Cass.) Hook.f. var. *pygmaea*  
Sinónimos: *Nassauvia nordenskjoldii* O. Hoffm. ex Dusén,  
*Nassauvia pumila* Poepp. & Endl. var. *nordenskjoldii* (O.  
Hoffm. ex Dusén) Reiche, *Triachne pygmaea* Cass.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia pyramidalis* Meyen  
Sinónimos: *Nassauvia macracantha* DC. var. *pungens*  
(Phil.) Hauman, *Nassauvia pungens* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 2000-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nassauvia ramosissima* DC.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 600-2000 m.

*Nassauvia revoluta* D. Don  
Sinónimos: *Nassauvia brevifolia* Phil., *Nassauvia nivalis*  
Poepp. ex Less., *Nassauvia nivalis* Poepp. & Endl. var.  
*brevifolia* (Phil.) Reiche, *Nassauvia nivalis* Poepp. & Endl.  
var. *sericea* Phil., *Nassauvia revoluta* D. Don var. *nivalis*  
(Poepp. ex Less.) Hosseus, *Nassauvia sericea* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,  
LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Cadislao, calahuala.

***Nassauvia sprengelioides* DC.**

Sinónimos: *Nassauvia araucana* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 2000-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Hierba de la culebra.

***Nassauvia uniflora* (D. Don) Hauman**

Sinónimos: *Nassauvia oligocephala* (DC.) Wedd.,  
*Panargyrum oligocephalum* DC., *Panargyrum uniflorum*  
D. Don  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2800-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Noticastrum**

***Noticastrum adscendens* DC.**

Sinónimos: *Noticastrum pradense* (Phil.) Phil., *Aster adscendens* (DC.) Reiche, *Aster pradensis* Phil., *Diplopappus sericeus* Less. var. *glandulosa* Hook. & Arn., *Noticastrum glandulosum* Phil., *Noticastrum sanfurgii* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Noticastrum antucense* Phil.**

Sinónimos: *Aster antucensis* (Phil.) Kuntze, *Aster erectus* (J. Remy) Kuntze var. *antucensis* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 100-300 m.

***Noticastrum erectum* J. Remy**

Sinónimos: *Aster erectus* (J. Remy) Kuntze, *Aster erectus* (J. Remy) Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 100-1000 m.

***Noticastrum eriophorum* J. Remy**

Sinónimos: *Aster eriophorus* (J. Remy) Kuntze, *Aster eriophorus* (J. Remy) Reiche, *Aster leucopappus* (Phil.) Reiche, *Leucopsis harveyi* Baker, *Leucopsis sericea* (Less.) Baker var. *eriophora* (J. Remy) Baker, *Noticastrum leucopappum* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Noticastrum sericeum* (Less.) Less. ex Phil.**

Sinónimos: *Aster albus* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Aster albus* (Phil.) Kuntze, *Aster haplopappus* (J. Remy) Kuntze, comb. illeg., *Aster haplopappus* (J. Remy) Reiche, *Aster marginatus* Kunth var. *tomentosus* Wedd., *Aster nitens* Kuntze, *Aster notosericeus* Griseb., *Aster sericeus* (Less.) Nees, *Diplopappus sericeus* Less., *Noticastrum philippii* Sch. Bip., nom. nud., *Haplopappus sericeus* (Less.) DC., *Leucopsis sericea* (Less.) Baker, *Noticastrum album* Phil., *Noticastrum haplopappus* J. Remy, nom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Notopappus**

***Notopappus andinus* (Phil.) Klingenb.**

Sinónimos: *Grindelia andina* (Phil.) Phil., *Chrysophthalmum andinum* Phil., *Helianthus australis* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: MAU.

***Notopappus chryseus* (Kuntze) Klingenb. var. *discooides***

Tortosa & A. Bartoli  
Sinónimos: *Aster chryseus* Kuntze, *Haplopappus chrysocephalus* Reiche, *Haplopappus chryseus* (Kuntze) Cabrera, *Pyrocoma aurea* Phil., *Grindelia prunelloides* (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. *discooides* Tortosa & A. Bartoli  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 2300-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Notopappus pectinatus* (Phil.) Klingenb.**

Sinónimos: *Aster anethifolius* (Phil.) Kuntze, *Grindelia anethifolia* (Phil.) A. Bartoli & Tortosa, *Aster pectinatus* (Phil.) Kuntze, *Diplopappus pinnatifidus* Hook. & Arn., hom. illeg., *Haplopappus anethifolius* Phil., *Haplopappus moyanoi* Speng., *Haplopappus pectinatus* Phil. var. *anethifolius* (Phil.) Reiche, *Haplopappus pectinatus* Phil., *Haplopappus araucanus* Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Notopappus prunelloides*** (Poepp. ex Less.) Klingenb.  
Sinónimos: *Aster prunelloides* (Poepp. ex Less.) Kuntze,  
*Haplopappus prunelloides* (Poepp. ex Less.) DC.,  
*Diplopappus prunelloides* Poepp. ex Less., *Haplopappus*  
*prunelloides* (Poepp. ex Less.) DC. var. *sphaerocephalus*  
Reiche, *Grindelia prunelloides* (Poepp. ex Less.) A. Bartoli  
& Tortosa, *Haplopappus bellidifolius* Phil. var. *brachylepis*  
(Phil.) Reiche, *Haplopappus brachylepis* Phil.  
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 500-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### Ocyroe

***Ocyroe armata*** (Wedd.) Bonifacino  
Sinónimos: *Dolichogyne armata* Wedd., *Ocyroe spinosa*  
Phil., *Nardophyllum armatum* (Wedd.) Reiche  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 2800-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

### Onopordum

***Onopordum acanthium*** L.  
Hierba. Bienal. Introducida.  
Distribución: RME, ARA.

### Ophryosporus

***Ophryosporus anomalus*** R.M. King & H. Rob.  
Sinónimos: *Piqueria cumingii* B.L. Rob., hom. illeg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Ophryosporus floribundus*** (DC.) R.M. King & H. Rob.  
Sinónimos: *Piqueria floribunda* DC.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Países limítrofes: Perú.

***Ophryosporus heptanthus*** (Sch.Bip. ex Wedd.) R.M. King  
& H. Rob.  
Sinónimos: *Eupatorium heptanthus* (Sch. Bip. ex Baker)  
R.M. King & H. Rob., *Ophryosporus organoides* (Meyen  
& Walp.) Hieron., *Eupatorium organoides* Meyen & Walp.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2800-3320 m.  
Países limítrofes: Bolivia, Perú.

***Ophryosporus hoppii*** (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.  
Sinónimos: *Trychionolepis hoppii* B.L. Rob.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 300-3200 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Ophryosporus johnstonii*** B.L. Rob.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 1200-1300 m.

***Ophryosporus paradoxus*** (Hook. & Arn.) Benth. & Hook.  
ex B.D. Jacks.  
Sinónimos: *Eupatorium paradoxus* Hook. & Arn.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Ophryosporus pinifolius*** (Phil.) R.M. King & H. Rob.  
Sinónimos: *Stevia pinifolia* Phil., *Piqueria pinifolia* (Phil.)  
Hieron. ex B.L. Rob.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3000-3500 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Sapama.

***Ophryosporus triangularis*** Meyen  
Sinónimos: *Eupatorium foliolosum* DC., *Ophryosporus*  
*foliolosum* (DC.) Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-3400 m.  
Nombre vulgar: Rabo de zorro.

### Oriastrum

***Oriastrum acerosum*** (J. Remy) Phil. var. ***acerosum***  
Sinónimos: *Chaetanthera acerosa* (J. Remy) Benth. &  
Hook.f. ex Griseb. var. *acerosa*, *Chaetanthera pallida*  
(Phil.) Hauman, *Egania acerosa* J. Remy, *Egania pallida*  
Phil., *Oriastrum incanum* Phil., *Oriastrum parviflorum*  
Phil., *Oriastrum uncinatum* Phil., *Oriastrum pallidum*  
(Phil.) Phil., *Oriastrum pusillum* Poepp. & Endl. var.  
*uncinatum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2800-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oriastrum acerosum*** (J. Remy) Phil. var. ***dasycarpum***  
Cabrera  
Hierba. Anual. Nativa.



Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 3600-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oriastrum achenohirsutum*** (Tombesi) A.M.R. Davies  
Sinónimos: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *acheno-hirsutum* Tombesi, *Chaetanthera acheno-hirsuta* (Tombesi) M.T.K. Arroyo, A.M.R. Davies & Till-Bottraud  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 3900-4100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oriastrum apiculatum*** (J. Remy) A.M.R. Davies  
Sinónimos: *Chaetanthera apiculata* (J. Remy) F. Meigen, *Chaetanthera lanigera* Phil., *Eganía apiculata* J. Remy, *Oriastrum albicaule* Phil. var. *albicaule*, *Oriastrum albicaule* Phil. var. *nivale* (Phil.) Reiche, *Oriastrum nivale* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 3000-3300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oriastrum chilense*** (J. Remy) Wedd.  
Sinónimos: *Aldunantea chilensis* J. Remy, *Chaetanthera pusilla* (D. Don) Hook. & Arn., *Oriastrum pusillum* Reiche, hom. illeg. var. *uncinatum* Reiche, *Tylloma pusillum* D. Don, *Oriastrum pusillum* Reiche, hom. illeg.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 2100-3800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oriastrum dioicum*** (J. Remy) Phil.  
Sinónimos: *Chaetanthera dioica* (J. Remy) B.L. Rob., *Eganía dioica* J. Remy  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, COQ, RME.  
Rango altitudinal: 3000-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oriastrum gnaphalioides*** (J. Remy) Wedd.  
Sinónimos: *Aldunantea gnaphalioides* J. Remy, *Chaetanthera gnaphalioides* (J. Remy) I.M. Johnst., *Chondrochilus parvifolius* Phil., *Oriastrum albiflorum* (Phil.) Reiche, *Oriastrum leucocephalum* Phil., *Tylloma albiflorum* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 3000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oriastrum lycopodioides*** (J. Remy) Wedd.  
Sinónimos: *Aldunantea lycopodioides* J. Remy, *Chaetanthera lycopodioides* (J. Remy) Cabrera, *Oriastrum gayi* Phil., *Oriastrum glabriusculum* Phil., *Oriastrum lycopodioides* (J. Remy) Wedd. var. *glabriusculum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, LBO.  
Rango altitudinal: 3000-3900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oriastrum minutum*** (Phil.) Nicola, S.E. Freire & Ariza  
Sinónimos: *Chaetanthera minuta* (Phil.) Cabrera, *Oriastrum gossypinum* Phil., *Tylloma minutum* Phil., *Tylloma gnaphalioides* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 3000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oriastrum pulvinatum*** Phil. var. ***polymallum*** (Phil.) Hicken  
Sinónimos: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *polymalla* (Phil.) Hicken, *Chaetanthera acerosa* auct. non (J. Remy) Bonpl. & Humb., *Oriastrum polymallum* Phil., *Oriastrum tontalensis* A.M.R. Davies  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, COQ.  
Rango altitudinal: 3000-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oriastrum pulvinatum*** Phil. var. ***pulvinatum***  
Sinónimos: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *pulvinata*  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2800-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oriastrum pusillum*** Poepp. & Endl.  
Sinónimos: *Chaetanthera planiseta* Cabrera  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2300-3400 m.

***Oriastrum revolutum*** (Phil.) A.M.R. Davies  
Sinónimos: *Chaetanthera revoluta* (Phil.) Cabrera, *Eganía appressa* Phil., *Eganía revoluta* Phil., *Oriastrum dioicum* (J. Remy) Phil. var. *revolutum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3500-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Keúche, tieuchi, comida de perdiz.



***Oriastrum sphaeroidale*** Reiche

Sinónimos: *Chaetanthera sphaeroidalis* (Reiche) Hicken, *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *acuminatibracteata* Hauman  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 3200-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Flor de la puna.

***Oriastrum tarapacensis*** A.M.R. Davies

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 4100-4600 m.

***Oriastrum werdermannii*** A.M.R. Davies

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

**Oxyphyllum**

***Oxyphyllum ulicinum*** Phil.

Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.

**Pachylaena**

***Pachylaena atriplicifolia*** D. Don ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Chionopectera gayophyta* DC., *Pachylaena gayophyta* (DC.) Hieron., *Pachylaena rosea* I.M. Johnst.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1400-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Oreja de chancho, hierba santa.

**Parastrephia**

***Parastrephia lepidophylla*** (Wedd.) Cabrera

Sinónimos: *Parastrephia lepidophylla* (Wedd.) Cabrera, *Dolichogyne lepidophylla* Wedd., *Lepidophyllum tola* Cabrera, nom. illeg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3500-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Tola vaca, tola, sipu, chijarwaya, pulika, tola amarga, qiroqiro.

***Parastrephia lucida*** (Meyen) Cabrera

Sinónimos: *Baccharis lucida* Meyen, *Dolichogyne glabra* Phil., *Polycladus abietinus* Phil., *Lepidophyllum abietinum* (Phil.) Reiche, *Lepidophyllum lucidum* (Meyen) Cabrera

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2900-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Tola del río, tola de agua, umatola, tola amarga, unutulola.

***Parastrephia quadrangularis*** (Meyen) Cabrera

Sinónimos: *Baccharis quadrangularis* Meyen, *Polycladus cupressinus* Phil., *Lepidophyllum cupressinum* (Phil.) Kuntze, *Lepidophyllum meyenii* A. Gray, nom. illeg., *Lepidophyllum quadrangulare* (Meyen) Benth. & Hook.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3000-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Chacha, coba, pulika, tola amarilla.

***Parastrephia teretiuscula*** (Kuntze) Cabrera

Sinónimos: *Lepidophyllum teretiusculum* Kuntze  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3200-4200 m.  
Países limítrofes: Bolivia.  
Nombre vulgar: Chacha, coba, pulika, tola amarilla, kobotola.

**Pascalía**

***Pascalía glauca*** Ortega

Sinónimos: *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken, *Helianthus copiapinus* Phil., *Wedelia copiapina* (Phil.) Reiche, *Wedelia glauca* (Ortega) S.F. Blake, comb. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Sunchillo, huilmo, huilmo copiapino.

**Perezia**

***Perezia atacamensis*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Clarionea atacamensis* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 3500-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Marancel, aycha-aycha.

***Perezia calophylla*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Homoeanthus calophyllus* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Perezia capito*** (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Homoeanthus capito* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 1500-2600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Perezia carthamoides*** (D. Don) Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Clarionea carthamoides* D. Don var. *crispa* (Meyen) Phil., *Clarionea multicapitata* J. Remy, *Clarionea spectabilis* Phil., *Clarionea carthamoides* D. Don, *Perezia diversifolia* Meyen, *Perezia diversifolia* Meyen var. *crispa* Meyen, *Perezia multicapitata* (J. Remy) Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1800-3800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Perezia ciliosa*** (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Clarionea ciliosa* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2500-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Maransel hembra.

***Perezia delicata*** Vuilleum.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA.  
Rango altitudinal: 1550 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Perezia fonkii*** (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Clarionea affinis* Phil., *Clarionea fonkii* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 1000-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Perezia lactucoides*** (Vahl) Less.  
Sinónimos: *Perezia lactucoides* (Vahl) Less. subsp. *palustris* (Phil.) Vuilleum., *Aster magellanicus* Lam., *Chaetanthera magellanica* (Lam.) Spreng., *Clarionea lactucoides* (Vahl) D. Don, *Perdicium lactucoides* Vahl, *Homoianthus magellanicus* (Lam.) DC., *Homoianthus palustris* Phil., *Perezia palustris* (Phil.) Reiche, *Homoianthus magellanicus* (Lam.) DC. var. *lactuoides* (Vahl) Hook., *Perdicium laevigatum* Banks & Sol. ex Hook.f., nom. nud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Perezia linearis*** Less.  
Sinónimos: *Homoeanthus rigidus* Phil., *Homoianthus linearis* (Less.) DC.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 600-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Perezia lyrata*** (J. Remy) Wedd.  
Sinónimos: *Clarionea pinnata* Phil., *Homoianthus gayanus* J. Remy, *Homoianthus lyratus* J. Remy, *Perezia pinnata* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

***Perezia magellanica*** (L.f.) Lag.  
Sinónimos: *Clarionea elegans* Phil., *Clarionea magellanica* (L.f.) Lag. ex DC., *Perdicium magellanicum* L.f., *Perezia lagascae* Cass., nom. illeg., *Perezia magellanica* (L.f.) Less., comb. illeg., *Perezia elegans* (Phil.) Albov, *Perdicium sinuatum* Banks & Sol. ex Hook.f., nom. nud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 200-1400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Perezia megalantha*** Speg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 1200-0 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Perezia multiflora*** (Humb. & Bonpl.) Less.  
Sinónimos: *Chaetanthera multiflora* Humb. & Bonpl., *Homanthis multiflorus* (Humb. & Bonpl.) Kunth, *Homoianthus multiflorus* (Humb. & Bonpl.) DC.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 1100-4900 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Perezia nutans*** Less.  
Sinónimos: *Perezia gayana* DC., *Perezia perfoliata* J. Remy, *Calorezia nutans* (Less.) Panero, *Perdicium nutans* Poepp. ex Less., nom. nud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1000-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Perezia pedicularidifolia*** Less.

Sinónimos: *Clarionea comosa* Phil., *Clarionea laciniata* Phil., *Clarionea parvifolia* Phil., *Clarionea variabilis* Phil., *Clarionea volkmanii* Phil., *Clarionea humilis* Phil., *Perezia laciniata* (Phil.) Reiche, *Perezia laciniata* (Phil.) Reiche var. *comosa* (Phil.) Reiche, *Homoeanthus variabilis* Phil., *Perezia pedicularidifolia* Less. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Perezia pedicularidifolia* Less. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Perezia variabilis* (Phil.) Reiche, *Perdicium pedicularidifolium* Poepp. ex Less., nom. nud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Perezia pilifera*** (D. Don) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Clarionea lechleri* Sch. Bip., *Clarionea pilifera* D. Don, *Homoeanthus humilis* Phil., *Perezia linearis* Less. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Perezia lechleri* (Sch. Bip.) De Wild.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1500-4300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Perezia pinnatifida*** (Humb. & Bonpl.) Wedd.

Sinónimos: *Chaetanthera pinnatifida* Humb. & Bonpl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 3300-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Perezia poeppigii*** Less.

Sinónimos: *Clarionea caulescens* Phil., *Clarionea nana* Phil., *Clarionia virens* D. Don, *Clarionema virens* (D. Don) Phil. var. *humilis* Phil., *Homoeanthus remyanus* Phil., *Homoeanthus brevicaulis* Phil., *Homoianthus pristiphyllus* J. Remy, *Perezia pristiphylla* (J. Remy) Wedd., *Perezia virens* (D. Don) Hook. & Arn., *Homoianthus brevicaulis* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1200-2900 m.

***Perezia prenanthoides*** Less.

Sinónimos: *Perezia brachylepis* Phil., *Calorezia prenanthoides* (Less.) Panero

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1200-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Estrella de los Andes.

***Perezia pungens*** (Humb. & Bonpl.) Less.

Sinónimos: *Perezia ciliaris* D. Don ex Hook. & Arn., *Clarionea ciliaris* (D. Don ex Hook. & Arn.) DC., *Chaetanthera pungens* Humb. & Bonpl., *Homoeanthus pungens* (Humb. & Bonpl.) Spreng., *Homanthis pungens* (Humb. & Bonpl.) Kunth, *Clarionia pungens* (Humb. & Bonpl.) D. Don

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Maransel, waji.

***Perezia recurvata*** (Vahl) Less. subsp. *beckii* (Hook. & Arn.) Cabrera

Sinónimos: *Perezia beckii* Hook. & Arn., *Homoeanthus pectinatus* Phil., *Perezia pectinata* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

***Perezia recurvata*** (Vahl) Less. subsp. *recurvata*

Sinónimos: *Chaetanthera recurvata* (Vahl) Spreng., *Clarionea recurvata* (Vahl) D. Don, *Perdicium recurvatum* Vahl, *Perezia doniana* Less., *Homoianthus donianus* (Less.) J. Remy, *Homoianthus inermis* Meyen & Walp., nom. illeg., *Perezia reflexa* Meyen, *Clarionia recurvata* (Vahl) D. Don, *Clarionea reflexa* (Meyen) Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Perezia recurvata*** (Vahl) Less. subsp. *triceps* (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Homoeanthus triceps* Phil., *Perezia triceps* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA.

Países limítrofes: Argentina.

***Perezia spathulata*** (Lag. ex D. Don) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Clarionea spathulata* Lag. ex D. Don, *Perezia viscosa* Poepp. ex Less., *Homoianthus viscosus* (Poepp. ex Less.) DC., *Perdicium viscosum* Poepp. ex Less., nom. nud., *Homoianthus germaini* Phil. ex Reiche, nom. nud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 100-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

## Perityle

### *Perityle emoryi* Torr.

Sinónimos: *Closia cotula* J. Remy var. *elata* (Phil.) Reiche, *Closia discoidea* Phil., *Closia elata* Phil., *Laphamia emoryi* (Torr.) Benth. & Hook.f. ex Jacks., *Perityle discoidea* (Phil.) I.M. Johnst., *Perityle emoryi* Torr. var. *elata* (Phil.) I.M. Johnst., *Closia anthemoides* Phil., *Closia brachypetala* Phil., *Closia chilensis* Regel & Körn., *Closia cotula* J. Remy, *Closia digitata* Phil., *Closia elata* Phil. var. *nana* Phil., *Closia foliosa* Phil., *Closia pusilla* Phil., *Closia viridis* Phil., *Closia villosa* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-3600 m.

Países limítrofes: Perú.

## Picradeniopsis

### *Picradeniopsis multiflora* (Hook. & Arn.) B.G. Baldwin

Sinónimos: *Bahia gilliesii* A. Gray, *Rothia intermedia* Kuntze, *Rothia pusilla* (Wedd.) Kuntze, *Schkuhria multiflora* Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 500-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Soiko de cabra, pasto de campo, manzanillón.

## Picris

### *Picris echioides* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, IPA.

## Picrosia

### *Picrosia longifolia* D. Don

Sinónimos: *Picrosia australis* Decne., *Psilopogon albiflorus* Phil., *Tragopogon fritillarioides* Less.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## Plazia

### *Plazia cheiranthifolia* (J. Remy) Wedd.

Sinónimos: *Aglaodendron cheiranthifolium* J. Remy

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 2600-2800 m.

### *Plazia daphnoides* Wedd.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 2600-4400 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chinchirkuma, koya macho, chajilla.

## Pleocarpus

### *Pleocarpus revolutus* D. Don

Sinónimos: *Jungia dentata* (D. Don) Reiche, *Jungia revoluta* (D. Don) Reiche, *Jungia revoluta* (D. Don) Reiche var. *dentata* (Phil.) Reiche, *Pleocarpus dentatus* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Nombre vulgar: Cola de ratón.

## Pluchea

### *Pluchea chingoyo* (Kunth) DC.

Sinónimos: *Conyza chingoyo* Kunth

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Chilca, chingoyo.

## Podanthus

### *Podanthus mitiqui* Lindl.

Sinónimos: *Euxenia mitiqui* DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Nombre vulgar: Mitique, mitriu.

### *Podanthus ovatifolius* Lag.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Mitique, palo negro.

## Polyachyrus

### *Polyachyrus annuus* I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Países limítrofes: Perú.



***Polyachyrus carduoides*** Phil.

Sinónimos: *Polyachyrus foliosus* Phil., *Polyachyrus glabratus* Phil., *Polyachyrus latifolius* Phil., *Polyachyrus rigidus* I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 800-3000 m.

Nombre vulgar: Renguilla, borlón de alforja, hediondilla, sokasoka.

***Polyachyrus cinereus*** Ricardi & Weldt

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Polyachyrus fuscus*** (Meyen) Walp.

Sinónimos: *Polyachyrus fuscus* (Meyen) Walp. var. *roseus* (Phil.) Reiche, *Polyachyrus roseus* Phil., *Diaphoranthus fuscus* Meyen

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Perú.

***Polyachyrus gayi*** J. Remy

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Polyachyrus poeppigii*** Kuntze ex Less. subsp. *multifidus* (D. Don) Ricardi & Weldt

Sinónimos: *Polyachyrus multifidus* D. Don, *Polyachyrus sanromani* Phil., *Polyachyrus selinoides* Reiche

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Polyachyrus poeppigii*** Kuntze ex Less. subsp. *poeppigii*

Sinónimos: *Polyachyrus calderensis* Phil., *Polyachyrus decurrens* Lag. ex DC., *Polyachyrus litoralis* Phil., *Polyachyrus macrotis* Phil., *Polyachyrus poeppigii* Kuntze ex Less. var. *litoralis* (Phil.) Reiche, *Polyachyrus tenuifolius* Phil., *Polyachyrus virgatus* I.M. Johnst.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Bolivia.

***Polyachyrus sphaerocephalus*** D. Don

Sinónimos: *Polyachyrus bridgesii* Poepp. & Endl., *Polyachyrus tarapacanus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Sokasoka.

**Porophyllum**

***Porophyllum ruderale*** (Jacq.) Cass.

Sinónimos: *Cacalia glandulosa* Salisb., nom. illeg., *Cacalia porophyllum* L., *Cacalia ruderale* (Jacq.) Sw., *Kleinia porophyllum* (L.) Willd., *Kleinia ruderale* Jacq., *Porophyllum ellipticum* Cass., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *genuinum* Urb., nom. illeg., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *intermedium* DC., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *runderale* (Jacq.) Urb., *Porophyllum latifolium* Benth., *Porophyllum macrolepidium* Malme, *Porophyllum porophyllum* (L.) Kuntze, comb. illeg., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *angustifolium* Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *ellipticum* (Cass.) A. Gray ex B.L. Rob., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *glandulosum* Chodat & Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *macrolepidium* (Malme) Chodat & Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. fma. *suffruticosum* Chodat & Hassl., *Tagetes integrifolia* Muschl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**Proustia**

***Proustia cuneifolia*** D. Don subsp. *cinerea* (Phil.) Luebert

Sinónimos: *Proustia cinerea* Phil., *Proustia cuneifolia* D. Don fma. *cinerea* (Phil.) Fabris

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 300-1200 m.

***Proustia cuneifolia*** D. Don subsp. *cuneifolia*

Sinónimos: *Proustia pungens* Poepp. ex Less., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *heterophylla* Kuntze, *Proustia cuneifolia* D. Don var. *integrifolia* Hook. & Arn., *Proustia cuneifolia* D. Don var. *spinulosa* Hook. & Arn., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *cuneifolia* (D. Don) Wedd., *Proustia cuneifolia* D. Don fma. *cuneifolia*

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 2000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Huañil, pucana, tipia, palo de yegua.

***Proustia cuneifolia*** D. Don subsp. *tipia* (Phil.) Luebert

Sinónimos: *Proustia tipia* Phil., *Proustia cuneifolia* D. Don fma. *tipia* (Phil.) Fabris

Arbusto. Endémico.



Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 0-700 m.  
Nombre vulgar: Tipia.

***Proustia pyrifolia* DC.**

Sinónimos: *Proustia pyrifolia* DC. var. *canescens* DC., *Proustia oblongifolia* D. Don, *Proustia glandulosa* DC., *Proustia pyrifolia* DC. fma. *glandulosa* (DC.) Fabris  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 200-1200 m.  
Nombre vulgar: Parrila blanca, tola blanca, voqui blanco.

**Pseudognaphalium**

***Pseudognaphalium aldunateoides* (J. Remy) C. Monti, Bayón & S.E. Freire**

Sinónimos: *Gnaphalium aldunateoides* J. Remy, *Gnaphalium diminutivum* Phil., *Gnaphalium perpusillum* Phil., *Gnaphalium phaeolepis* Phil., *Pseudognaphalium perpusillum* (Phil.) C. Monti, Bayón & S.E. Freire, *Gnaphalium insulare* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.  
Rango altitudinal: 500-3700 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Pseudognaphalium cabreræ* (S.E. Freire) S.E. Freire, Bayón, Baeza, Giuliano & C. Monti**

Sinónimos: *Gnaphalium philippii* Cabrera, hom. illeg., *Gnaphalium fastigiatum* Phil., hom. illeg., *Gnaphalium cabreræ* S.E. Freire, nom. illeg., *Pseudognaphalium cabreræ* (S.E. Freire) Deble, nom. illeg., *Pseudognaphalium fastigiatum* Bayón, nom. illeg., *Gnaphalium cabreræ* S.E. Freire  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, RME, MAU, ARA.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Pseudognaphalium cheiranthifolium* (Lam.) Hilliard & B.L. Burtt**

Sinónimos: *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam., *Gnaphalium acutifolium* Phil., *Gnaphalium araucanum* Phil., *Gnaphalium citrinum* Hook. & Arn., *Gnaphalium paniculatum* Bertero ex Colla, *Gnaphalium valdivianum* Phil., *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam. var. *paniculatum* (Bertero ex Colla) Skottsbo.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Té de burro.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Pseudognaphalium cymatoides* (Kunze ex DC.) Anderb.**

Sinónimos: *Gnaphalium moelleri* Phil., *Gnaphalium canum* Phil., hom. illeg., *Pseudognaphalium moelleri* (Phil.) Anderb., *Gnaphalium ulophyllum* Hook. & Arn., *Gnaphalium cymathoides* Kunze ex DC. var. *glabrum* Walp., *Gnaphalium cymathoides* Kunze ex DC., *Gnaphalium cheiranthifolium* Bertero, hom. illeg.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Hierba de San Juan.

***Pseudognaphalium gayanum* (J. Remy) Anderb.**

Sinónimos: *Gnaphalium heterophyllum* Phil., *Gnaphalium heterotrichum* Phil., *Gnaphalium leucocephalum* Phil., nom. illeg., *Gnaphalium pseudohelichrysum* Reiche, *Gnaphalium gayanum* J. Remy, *Gnaphalium robustum* Phil., *Pseudognaphalium heterotrichum* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium robustum* (Phil.) Anderb., *Hypelichrysum heterotrichum* (Phil.) Kirp.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.

***Pseudognaphalium lacteum* (Meyen & Walp.) Anderb.**

Sinónimos: *Gnaphalium lacteum* Meyen & Walp., *Gnaphalium argyrolepis* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, BIO.  
Rango altitudinal: 2500-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Viravira, viravira blanca.

***Pseudognaphalium landbeckii* (Phil.) Anderb.**

Sinónimos: *Gnaphalium landbeckii* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Pseudognaphalium munoziæ* Bayón C. Monti & S.E. Freire**

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 3500-4200 m.

***Pseudognaphalium psilophyllum*** (Meyen & Walp.) Anderb.

Sinónimos: *Gnaphalium glandulosum* Klatt, *Gnaphalium psilophyllum* Meyen & Walp., *Pseudognaphalium glandulosum* (Klatt) Anderb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, LLA.

Rango altitudinal: 800-4600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Viravira, chuncho viravira.

***Pseudognaphalium remyanum*** (Phil.) Anderb.

Sinónimos: *Gnaphalium remyanum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Bolivia.

***Pseudognaphalium tarapacanum*** (Phil.) Anderb.

Sinónimos: *Gnaphalium tarapacanum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, RME, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 3000-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Pseudognaphalium viravira*** (Molina) Anderb.

Sinónimos: *Gnaphalium andicola* Phil., *Gnaphalium pratense* Phil., *Gnaphalium longifolium* Phil., *Gnaphalium subnudum* Phil., *Pseudognaphalium pratense* (Phil.) Anderb., *Gnaphalium coquimbense* Phil., *Gnaphalium illapelinum* Phil. var. *illapelinum*, *Gnaphalium viravira* Molina, *Pseudognaphalium coquimbense* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium illapelinum* (Phil.) Anderb., *Gnaphalium viravira* Less., hom. illeg., *Pseudognaphalium andicola* (Phil.) C. Monti, Bayón & S.E. Freire

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hierba de la diuca, hierba de la vida, viravira.

## **Psilocarphus**

***Psilocarphus brevissimus*** Nutt.

Sinónimos: *Psilocarphus globiferus* Nutt.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 300-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Psilocarphus tenellus*** Nutt. var. ***globiferus*** (Bertero ex DC.) Morefield

Sinónimos: *Benzanilla chilensis* J. Remy, *Micropus globiferus* Bertero ex DC., *Psilocarphus chilensis* (J. Remy) A. Gray, *Psilocarphus globiferus* (Bertero ex DC.) Speg., comb. illeg., *Psilocarphus berteri* I.M. Johnst., *Psilocarphus globiferus* (Bertero ex DC.) Speg. var. *minimus* Cabrera

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

## **Schkuhria**

***Schkuhria pinnata*** (Lam.) Kuntze ex Thell.

Sinónimos: *Amblyopappus mendocina* Phil., *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *abrotanoides* (Roth) Cabrera, *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *octoaristata* (DC.) Cabrera, *Pectis pinnata* Lam., *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze, *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *pallida* Kuntze, *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *purpurascens* Kuntze, *Schkuhria abrotanoides* Roth, *Schkuhria abrotanoides* Roth var. *isopappa* (Benth.) Hieron., *Schkuhria abrotanoides* Roth var. *pomasquiensis* Hieron., *Schkuhria advena* Thell., *Schkuhria bonariensis* Hook. & Arn., *Schkuhria coquimbana* Phil., *Schkuhria isopappa* Benth., *Schkuhria octoaristata* DC., *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *typica* Cabrera, nom. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, COQ.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Cachanlahuen cimarrón, canchalahua.

## **Scolymus**

***Scolymus hispanicus*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL.

## **Senecio**

***Senecio acanthifolius*** Hombr. & Jacquinot

Sinónimos: *Senecio acanthifolius* Hombr. & Jacquinot subsp. *virens* (Phil.) Cabrera & Zardini, *Senecio virens* Phil., *Iocenes acanthifolius* (Hombr. & Jacq.) Nord., *Iocenes acanthifolius* (Hombr. & Jacq.) Nord. subsp. *virens* (Phil.) B. Nord., *Senecio ombrophyllus* Skottsb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio adenophyllus*** Meyen & Walp.

Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4200-4800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Tola hedionda, hachakoma del burro, tola del burro.

***Senecio adenotrichius*** DC.

Sinónimos: *Adenotrichia amplexicaulis* Lindl., *Heterolepis conyzoides* Bertero ex DC.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 300-1200 m.

***Senecio alcicornis*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio chrysanthemoides* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-900 m.

***Senecio algens*** Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4200-5200 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Senecio alloeophyllus*** O. Hoffm.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 1300-1800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio almeidae*** Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Senecio angulatus*** L.f.

Arbusto trepador. Introducido.  
Distribución: TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

***Senecio angustissimus*** Phil.

Sinónimos: *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *angustissimus* (Phil.) Speg., *Senecio nahuelbutanus* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio anthemidiphyllus*** J. Remy

Sinónimos: *Senecio campanae* Phil., *Senecio hakeifolius* Hook. & Arn. var. *viscidus* Hook. & Arn., *Senecio brachylepis* Phil., *Senecio psammophilus* Phil., hom. illeg.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio antofagastanus*** Cabrera

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 1000 m.

***Senecio aquaticus*** Hill. subsp. *aquaticus*

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: BIO, LLA.

***Senecio aquaticus*** Hill. subsp. *barbareifolius* (Wimm. &

Grab.) Walters  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, BIO, ARA, LRI, LLA.

***Senecio argyreus*** Phil.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 1000-1800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio aristianus*** J. Remy

Sinónimos: *Senecio guayacanicus* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Senecio arleguianus*** J. Remy

Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 1200 m.

***Senecio arnicoides*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio plantagineus* Bertero ex Colla, *Aster plantagineus* Poepp. ex DC.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 800 m.

***Senecio arnottii*** Hook.f.

Sinónimos: *Senecio limbardioides* Hook. & Arn., hom. illeg., *Senecio limbardioides* Hook. & Arn. var. *beta* Hook. & Arn., *Senecio arnottii* Hook.f. var. *major* Macloskie  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 0-300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio aspericaulis*** J. Remy

Sinónimos: *Senecio hypsophilus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 2400-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio atacamensis*** Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Mukuraka, chachacoma blanca, cacho de cabra, chachacoma del burro.

***Senecio baccharidifolius*** Poepp. ex DC.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1500-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio bahioides*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio bahioides* Hook. & Arn. var. *glaber*

Hook. & Arn., *Senecio bahioides* Hook. & Arn. var. *lanosus*

Hook. & Arn., *Senecio irregularis* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Senecio balsamicus*** Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2700 m.

***Senecio barbarae*** Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 4300-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio Barrosianus*** Cabrera

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 200-500 m.

***Senecio beauifilsii*** Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 1500-1900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio behnii*** Ricardi & Martic.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3200-3300 m.

Nombre vulgar: Viravira.

***Senecio benaventianus*** J. Remy

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 200-2000 m.

***Senecio berteroi*** (DC.) Pelsner

Sinónimos: *Robinsonia berteroi* (DC.) Sanders, Stuessy &

Martic., *Balbisia berteroi* DC., *Vendredia berterii* (DC.)

Baillon, *Rhetinodendron berteroi* (DC.) Hemsl.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nota: Posiblemente extinta.

***Senecio bipontinii*** Wedd.

Sinónimos: *Senecio carnifolius* Cabrera, *Senecio*

*sarcophyllus* Phil., hom. illeg., *Senecio schultzii* Wedd.,

hom. illeg., *Senecio julietii* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 120-2520 m.

***Senecio botijae*** Ehrh.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

***Senecio brachylobus*** Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 500 m.

***Senecio bracteolatus*** Hook. & Arn. var. *bracteolatus*

Sinónimos: *Senecio coxi* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio bracteolatus*** Hook. & Arn. var. *valderramae*  
(Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio valderramae* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 1000-1400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio breviscapus*** DC.

Sinónimos: *Senecio acaulis* Phil., *Senecio chamaecephalus*  
Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2600-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Senecio bridgesii*** Hook. & Arn.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.

***Senecio brunonianus*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Senecio serenensis* J. Remy  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 100 m.

***Senecio buglossus*** Phil.  
Sinónimos: *Senecio limonius* Phil., *Senecio valdivianus* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1400 m.  
Nombre vulgar: Hualtata, lengua de vaca.

***Senecio bustillosianus*** J. Remy var. *borchersii* (Phil.) Cabrera  
Sinónimos: *Senecio borchersii* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1800-2200 m.

***Senecio bustillosianus*** J. Remy var. *bustillosianus*  
Sinónimos: *Senecio schulzeanus* Meigen  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 2600-2700 m.

***Senecio cachinalensis*** Phil. var. *cachinalensis*  
Sinónimos: *Senecio breanus* Phil., *Senecio larrañagae* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 200-400 m.

***Senecio cachinalensis*** Phil. var. *copiapinus* (Phil.) Cabrera  
Sinónimos: *Senecio copiapinus* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA.

***Senecio calocephalus*** Poepp.  
Sinónimos: *Senecio columbaria* J. Remy  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Senecio candidans*** DC.  
Sinónimos: *Brachypappus candicans* (J. Vahl) Sch. Bip.,  
*Cacalia candicans* Vahl, *Culcitium gayanum* J. Remy,  
*Senecio culciremy* Cuatrec.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio candollei*** Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 3500-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Chukuchuku.

***Senecio cerberoanus*** J. Remy var. *cerberoanus*  
Sinónimos: *Senecio berterianus* DC. var. *obtusus* DC.,  
*Senecio phaedruss* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Senecio cerberoanus*** J. Remy var. *lanatus* Cabrera  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Senecio chamomillifolius*** Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Senecio chañaralensis*** Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Senecio chilensis*** Less. var. *argophyllus* (Phil.) Cabrera  
fma. *argophyllus*  
Sinónimos: *Senecio argophyllus* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio chilensis*** Less. var. *argophyllus* (Phil.) Cabrera  
fma. *discoideus* Cabrera  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 1500-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.



***Senecio chilensis*** Less. var. *chilensis*

Sinónimos: *Senecio argenteus* Kuntze ex DC., *Senecio linearifolius* Colla, *Senecio phagnaloides* DC.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 200-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio chillanensis*** Cabrera

Subarbusto. Endémico.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 700-1800 m.

***Senecio chionophilus*** Phil.

Sinónimos: *Senecio vulcanicus* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1500-2100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio chrysocomoides*** Hook. & Arn.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio chrysolepis*** Phil.

Sinónimos: *Senecio juncalemensis* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3400-4200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Senecio clarioneifolius*** J. Remy

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2300-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio coquimbensis*** Phil.

Sinónimos: *Senecio berterianus* DC., hom. illeg., *Senecio glanduloso-hirtellus* Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 100-700 m.

***Senecio coronopodiphyllus*** J. Remy

Sinónimos: *Metazanthus cacalioides* Meyen

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio corrugatus*** (Phil.) Pelsner

Sinónimos: *Robinsonia gayana* Decne., *Robinsonia corrugata* Phil., *Robinsonia longifolia* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Resino.

***Senecio coscayanus*** Ricardi & Martic.

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 3200 m.

***Senecio covasii*** Cabrera

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, MAU.

Rango altitudinal: 1800-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio crepidioides*** Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 400-600 m.

***Senecio crithmoides*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio carnifolius* Cabrera, *Senecio diazii* Phil., *Senecio remyanus* Phil., *Senecio sarcophyllus* Phil., hom. illeg., *Senecio schultzei* Wedd., hom. illeg., *Senecio julietii* Phil., *Senecio iberidifolius* Phil., p.p.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1700-4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio crusoei*** Pelsner

Sinónimos: *Robinsonia gracilis* Decne., *Robinsonia micrantha* Phil. ex Hemsl.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Resinillo.

***Senecio ctenophyllus*** Phil.

Sinónimos: *Senecio vittatus* Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Nombre vulgar: Flor amarilla, monte manzanilla, tuksatuksa.

***Senecio cumingii*** Hook. & Arn. var. *bracteosus* (J. Remy)

Cabrera

Sinónimos: *Senecio bracteosus* J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-600 m.

***Senecio cumingii*** Hook. & Arn. var. ***cumingii***

Sinónimos: *Senecio paralias* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Senecio cuneatus*** Hook.f.

Sinónimos: *Senecio arenicola* Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio darwinii*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio darwinii* Hook. & Arn. var. *laxus* Hook. & Arn.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio davilae*** Phil.

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 600-3000 m.

***Senecio depressus*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Culcitium depressum* D. Don ex Hook. & Arn., nom. nud., *Senecio poeppigii* Hook. & Arn. var. *condensatus* Reiche  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 3100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio dichotomus*** Phil.

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-2900 m.

***Senecio diemii*** Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA.  
Rango altitudinal: 1900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio digitatus*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio donianus*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio arachnoideus* Phil., hom. illeg.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2700-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio dryophyllus*** Meyen & Walp.

Sinónimos: *Senecio tarapacanus* Phil., *Senecio amphibolus* Wedd., *Senecio amphibolus* Wedd. var. *socialis* (Wedd.) Cabrera, *Senecio socialis* Wedd.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3500-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Wilaparpa, parpararpa.

***Senecio elquiensis*** Cabrera

Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 800 m.

***Senecio eriophyton*** J. Remy

Arbusto. Nativo.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 3500-4800 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Chachacoma, cachacoma.

***Senecio eruciformis*** J. Remy var. ***brachycephalus*** (Phil.)

Cabrera  
Sinónimos: *Senecio rutaceus* Phil. var. *brachycephalus* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.  
Rango altitudinal: 1200-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio eruciformis*** J. Remy var. ***eruciformis***

Sinónimos: *Senecio rutaceus* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 2200-2600 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Nica.

***Senecio espinosae*** Cabrera

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 2500 m.

***Senecio evenius*** (Phil.) Pelser

Sinónimos: *Robinsonia evenia* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Senecio farinifer*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio apricus* Phil., *Senecio belophyllus* J. Remy, *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *longifolia* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 700-1600 m.

***Senecio flaginoides*** DC.

Sinónimos: *Senecio albolanatus* Phil., hom. illeg., *Senecio leuciscus* Phil., *Senecio leyboldtii* Phil., *Senecio meyenii* Phil., *Senecio sericeus* Kuntze, p.p.

Arbusto. Nativo.

Distribución: NUB, MAG.

Rango altitudinal: 400-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio fistulosus*** Poepp. ex Less. var. *fistulosus*

Sinónimos: *Senecio hualtata* Bertero ex DC., *Senecio amplus* J. Remy, *Senecio cordillerae* Phil., *Senecio dombeyanus* DC., *Senecio hualtata* Bertero ex DC. var. *variabilis* (Phil.) Reiche, *Senecio quillotensis* Phil., *Senecio variabilis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1600-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hualtata, lampazo, paco.

***Senecio fistulosus*** Poepp. ex Less. var. *ochroleucus* (Hook. & Arn.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio fistulosus* Poepp. ex DC., nom. illeg., *Senecio ochroleucus* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, BIO, LRI.

Rango altitudinal: 1200-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio francisci*** Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1300-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio garaventai*** Cabrera

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1600-1900 m.

***Senecio gayanus*** DC.

Sinónimos: *Senecio soloanus* Phil., *Senecio sotoanus* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 700-1000 m.

***Senecio gilliesii*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Cacalia candicans* Poepp. ex DC., *Cacalia nivea* Kuntze ex DC., *Culcitium poeppigii* DC., *Senecio poeppigii* (DC.) Wedd., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 700-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio glaber*** Less.

Sinónimos: *Senecio molinae* Phil., *Senecio ahrendsi* Phil., *Senecio delfinii* Phil., *Senecio fernandezii* Phil., *Senecio möelleri* Phil., *Senecio phyllocomus* Phil., *Senecio pratensis* Phil., *Senecio pratensis* Phil. var. *delfinii* (Phil.) Reiche, *Senecio glaber* Less. var. *pratensis* (Phil.) Cabrera, *Senecio tocornali* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1100-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chilquilla.

***Senecio glabratus*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio auriculatus* Poepp. ex DC., *Senecio berterianus* Colla, *Senecio valparadisiacus* Colla, *Senecio macrotus* Kuntze ex Meyen

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-900 m.

***Senecio gnidioides*** Phil. var. *gilvus* (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio gilvus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio gnidioides*** Phil. var. *gnidioides*

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio grandjotii*** Cabrera

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 3200-3800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio grindeliifolius*** DC.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2700-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio gunkelii*** Cabrera

Arbusto. Endémico.  
Distribución: RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1500 m.

***Senecio haenkeanus*** Cuatrec.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4500-5000 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Chukuchuku.

***Senecio haenkei*** DC.

Sinónimos: *Senecio chionotus* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 800-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio hakeifolius*** Bertero ex DC. var. *hakeifolius*

Sinónimos: *Senecio hakeifolius* Bertero ex DC. var. *ochroleucus* (Phil.) Reiche, *Senecio leptophyllus* Hook. & Arn., *Senecio ochroleucus* Phil., hom. illeg., *Senecio valparadisiensis* J. Remy, *Senecio platycodon* Baker, p.p., *Senecio linearilobus* Bong. var. *beta* Hook. & Arn.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 100-3000 m.  
Nombre vulgar: Pie de pajarito.

***Senecio hakeifolius*** Bertero ex DC. var. *vidalii* (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Senecio vidalii* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 200 m.

***Senecio haloragis*** J. Remy var. *glandulosus* Cabrera

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Senecio haloragis*** J. Remy var. *haloragis*

Sinónimos: *Senecio germainii* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Senecio helgae*** Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 4000-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio hickenii*** Hauman

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 3500-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio hieracium*** J. Remy

Sinónimos: *Senecio pearcei* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 1200-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio hirsutulus*** Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Senecio hirtus*** Cabrera

Sinónimos: *Senecio crispus* Phil., hom. illeg.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3500-4000 m.  
Nombre vulgar: Chachacom.

***Senecio humifusus*** (Hook.f.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio darwinii* Hook. & Arn. var. *eradiatus* A. Gray  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 900-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio humillimus*** Sch. Bip. ex Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 3500-4800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Pasto, k'jota.

***Senecio illapelinus*** Phil.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 3100-3600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio illinitus*** Phil.

Sinónimos: *Senecio cervicornis* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Senecio invalidus*** C. Jeffrey

Sinónimos: *Senecio debilis* Phil., hom. illeg.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: LBO.  
Rango altitudinal: 1100-1500 m.

***Senecio isernii*** Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Senecio jacobiformis*** J. Remy

Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, COQ.  
Rango altitudinal: 0-2600 m.

***Senecio jaffuelii*** Cabrera

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 1700-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio jarae*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2400-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Romerillo.

***Senecio jilesii*** Cabrera

Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 2000 m.

***Senecio johnstonianus*** Cabrera

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 2000-2700 m.

***Senecio jorquerae*** Phil.

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

***Senecio jungei*** Phil.

Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

***Senecio kingii*** Hook.f.

Sinónimos: *Senecio gymnocaulos* Phil., *Senecio subdiscoideus* Sch. Bip. ex Wedd., *Metazanthus grandiflorus* Meyen, *Senecio breviculus* Phil., *Senecio caespitosus* Phil., *Senecio kingii* Hook.f. fma. *subdiscoideus* (Sch. Bip. ex Wedd.) Hosseus, *Senecio purpuratus* Phil., *Senecio purpuratus* Phil. var. *subdiscoideus* (Sch. Bip. ex Wedd.) Reiche, *Senecio kingii* Hook.f. var. *paradoxus* (Albov ex Kurtz) Cabrera  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 100-3800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio laetevirens*** Phil.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2000-3200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio laevicaulis*** DC.

Sinónimos: *Senecio holophyllus* J. Remy  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 2500 m.

***Senecio landbeckii*** Phil.

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

***Senecio laseguei*** Hombr. & Jacquinot

Sinónimos: *Senecio danyausii* Hombr. & Jacquinot var. *intermedius* Sch. Bip., *Senecio magellanicus* Phil., hom. illeg., *Senecio philippii* De Wild.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 100-300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio lastarrianus*** J. Remy

Sinónimos: *Senecio baccharidifolius* DC. var. *angustifolius* DC., *Senecio nitidus* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: LBO, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 900-2000 m.



***Senecio laucanus*** Ricardi & Martic.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4200-4300 m.

***Senecio leptocaulos*** Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 800-1600 m.

***Senecio leucomallus*** A. Gray var. *incisus* A. Gray

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio leucomallus*** A. Gray var. *leucomallus*

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio leucophyton*** Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 1500-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio leucus*** Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2500-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio linaresensis*** Soldano

Sinónimos: *Senecio subdentatus* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

***Senecio linariifolius*** Poepp. ex DC. var. *aclonetus* (Phil.)

Cabrera

Sinónimos: *Senecio aclonetus* Phil., *Senecio encelia* J.

Remy, *Senecio microcephalus* Phil. var. *aclonetus* (Phil.)

Kuntze

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

***Senecio linariifolius*** Poepp. ex DC. var. *heliophytoides* (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Senecio heliophytoides* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio linariifolius*** Poepp. ex DC. var. *linariifolius*

Sinónimos: *Senecio promaucanus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-2900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio lithostaurus*** Cabrera

Sinónimos: *Senecio remyanus* Phil. fma. *eradiatus* Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1500-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio looseri*** Cabrera

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 3000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio lorentziella*** Hicken

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2900-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio luridus*** Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2400 m.

***Senecio madagascariensis*** Poir.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ.

***Senecio madariagae*** Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-3400 m.

***Senecio magellanicus*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio culcitenellus* Cuatrec., *Senecio*

*vaginifolius* Sch. Bip., *Culcitium magellanicum* (Hook. &

Arn.) Hombr. & Jacquinot

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio mapuche*** Cabrera

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1800-2200 m.

***Senecio martinensis*** Dusén  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 600-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio masafuerae*** (Skotts.) Pelser  
Sinónimos: *Robinsonia masafuerae* (Skotts.) Pelser  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Senecio masatierrae*** Pelser  
Sinónimos: *Robinsonia macrocephala* Decne.,  
*Symphyochaeta macrocephala* (Decne.) Skotts.  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Incienso.  
Nota: Extinta.

***Senecio maulinus*** Reiche  
Sinónimos: *Senecio leucomallus* Phil., hom. illeg.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 200-2800 m.

***Senecio mesembrynus*** Cabrera  
Sinónimos: *Senecio bakeri* Reiche  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Senecio microcephalus*** Phil. var. *angustifolius* Cabrera  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: LLA.  
Rango altitudinal: 300-800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio microcephalus*** Phil. var. *microcephalus*  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: NUB, LRI.  
Rango altitudinal: 300-800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio microphyllus*** Phil.  
Sinónimos: *Senecio hakeifolius* Hook. & Arn. var.  
*adenophyllus* Hook. & Arn., *Senecio gypsophilus* Phil.,  
*Senecio bowenkampi* Phil., *Senecio alfalfalis* Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-2300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio micropifolius*** DC.  
Sinónimos: *Senecio pelolepis* Johnst.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 1900-4300 m.

***Senecio microtis*** Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-3200 m.

***Senecio minutifolius*** Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1600-3200 m.

***Senecio miser*** Hook.f.  
Sinónimos: *Senecio ericoides* Reiche, *Senecio fueginus*  
Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 100-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio montianus*** J. Remy  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: AYP, COQ, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 2400-3000 m.

***Senecio munnozii*** Cabrera  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Senecio murinus*** Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 400-1400 m.  
Nombre vulgar: Hierba de los ratones, hierba zonza.

***Senecio murorum*** J. Remy  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 100-200 m.  
Nombre vulgar: Monte azulillo.

***Senecio myriophyllus*** Phil.  
Arbusto o subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.

***Senecio neaei*** DC. var. ***incisus*** DC.

Sinónimos: *Senecio sericeus* Kuntze var. *incisus* (DC.) Kuntze

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio neaei*** DC. var. ***neaei***

Sinónimos: *Senecio sericeus* Kuntze var. *neaei* (DC.) Kuntze

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 300-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio nigrescens*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio chamaedryfolius* Less.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Nombre vulgar: Nilhue.

***Senecio nublensis*** Soldano

Sinónimos: *Senecio carnosus* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: NUB, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Senecio nutans*** Sch. Bip.

Sinónimos: *Senecio graveolens* Wedd.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3500-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Tola hembra, chachacoma, chachakoma macho.

***Senecio obtectus*** Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2200-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio oreinus*** Cabrera

Sinónimos: *Senecio andicola* Phil., hom. illeg., *Senecio monticola* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1700-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio oreophyton*** J. Remy

Sinónimos: *Senecio medicinalis* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3100-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hierba del incordio, chachacoma.

***Senecio otaeguianus*** Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Senecio otites*** Kunze ex DC.

Sinónimos: *Senecio chiloensis* Phil., *Senecio otophorus* Phil., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 600-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Trompetilla, tutuco, trompón.

***Senecio pachyphyllos*** J. Remy

Sinónimos: *Senecio domeykoanus* Phil., *Senecio sedifolius* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1200-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio pappii*** Ricardi & Martic.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, ANT.

Rango altitudinal: 3200-3600 m.

Nombre vulgar: Kopa de cóndor, chachakoma blanca, pupusa.

***Senecio parodii*** Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 300-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio patagonicus*** Hook. & Arn. var. ***alyssoides*** (Sch. Bip.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio danyausii* Hombr. & Jacquinot var. *alyssoides* Sch. Bip., *Senecio exilis* Hombr. & Jacquinot, *Senecio floccidus* Hombr. & Jacquinot

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senecio patagonicus*** Hook. & Arn. var. ***andersonii*** (Hook.f.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio andersonii* Hook.f., *Senecio andersonii* Hook.f. var.  $\beta$  Hook.f., *Senecio forsteri* Phil.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 100-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Senecio patagonicus* Hook. & Arn. var. *lobatifolius* (Hombr. & Jacquinot) Cabrera  
Sinónimos: *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinot var. B J. Remy, nom. illeg., *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinot var. *lobatifolia* Hombr. & Jacquinot, *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinot var. *trifurcatus* Sch. Bip.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Senecio patagonicus* Hook. & Arn. var. *patagonicus*  
Sinónimos: *Senecio lechleri* Phil., *Senecio palenae* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 200-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Senecio paucidentatus* DC. var. *limbardioides* (Hook. & Arn.) Cabrera  
Sinónimos: *Senecio limbardioides* Hook. & Arn., *Senecio olivaceus* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

*Senecio paucidentatus* DC. var. *paucidentatus*  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

*Senecio pemehuensis* Soldano  
Sinónimos: *Senecio scoparius* Phil., hom. illeg.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1400 m.

*Senecio pentaphyllus* Phil.  
Sinónimos: *Senecio lacinosus* Phil., *Senecio navarri* Phil., *Senecio pentaphyllus* Phil. var. *navarri* (Phil.) Reiche, *Senecio schoenleini* Meigen  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 2300-2500 m.

*Senecio peripotamus* C. Jeffrey  
Sinónimos: *Senecio rivularis* J. Remy, hom. illeg.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 300-2700 m.

*Senecio petersianus* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAU, ARA.  
Rango altitudinal: 1600-2100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Senecio petrophyus* Pelsner  
Sinónimos: *Robinsonia saxatilis* Danton  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 300 m.

*Senecio pfisteri* Ricardi & Martic.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4300-4400 m.

*Senecio philippicus* Regel & Körn.  
Sinónimos: *Senecio paposanus* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 200-900 m.

*Senecio philippii* Sch. Bip. ex Wedd.  
Sinónimos: *Senecio ammophilus* Phil., *Senecio hirthi* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Senecio phyllicifolius* Poepp. ex DC.  
Sinónimos: *Cineraria phyllicifolia* Poepp. ex DC.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 200-2000 m.

*Senecio phylloleptus* Cuatrec.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 3500 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Flor amarilla.

*Senecio pilquensis* H. Buek  
Sinónimos: *Senecio heterophyllus* DC., hom. illeg., *Senecio phyllomorphus* Steud., *Senecio porophylloides* J. Remy  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 900-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio pissisi*** Phil.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 3000-4100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio planiflorus*** Kunze ex Cabrera

Sinónimos: *Senecio littoralis* Poepp. ex DC., nom. illeg.,  
*Senecio sinuatilobus* DC. var. *littoralis* DC.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

***Senecio poeppigii*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio dealbatus* Phil., *Senecio micropifolius*  
DC. var.  $\beta$ . *monocephalus* DC., *Senecio williamsii* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 1300-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio polygaloides*** Phil.

Sinónimos: *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var.  
*tenuifolius* DC., *Senecio multibracteatus* Phil., hom. illeg.,  
*Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *discoideus* Kuntze  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, AIS.  
Rango altitudinal: 2000-3100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio polyphyllus*** Kunze ex DC.

Sinónimos: *Senecio tristis* Phil. var. *comberi* Greenm.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1700-2600 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Senecio portalesianus*** J. Remy var. *lanuginosus* (Phil.)  
Cabrera

Sinónimos: *Senecio antucensis* Phil. var. *lanuginosa* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1400-2500 m.

***Senecio portalesianus*** J. Remy var. *portalesianus*

Sinónimos: *Senecio antucensis* Phil., *Senecio polyphyllus*  
Kunze ex DC. var. *antucensis* (Phil.) Reiche, *Senecio*  
*ceratophyllus* D. Don ex Hook. & Arn. var.  $\beta$  *nana* D. Don  
ex Hook. & Arn.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 1500-2800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio portulacoides*** J. Remy

Sinónimos: *Senecio macer* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 1200-2800 m.

***Senecio prenanthifolius*** Phil.

Sinónimos: *Senecio ranconensis* Sch. Bip. ex Phil., nom.  
nud., *Senecio helianthoides* Phil., *Senecio ranconensis* Sch.  
Bip. ex Lechl., nom. nud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 1000-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio proteus*** J. Remy var. *geissei* (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio geissei* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 1200-1800 m.

***Senecio proteus*** J. Remy var. *proteus*

Sinónimos: *Senecio bracteolatus* Phil., *Senecio foliolosus*  
Reiche, *Senecio pinnatifidus* Phil., *Senecio stenophyllus*  
Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 800-3000 m.  
Nombre vulgar: Pajarito, palito blanco.

***Senecio pseudalmeidae*** Cabrera

Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 300 m.

***Senecio pseuderucoides*** Cabrera

Arbusto. Endémico.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 1900 m.

***Senecio pubescens*** Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 1500-1600 m.

***Senecio puchii*** Phil.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4200-4800 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Chachakoma, leña de tola, tola de piedra.



***Senecio pycnanthus*** Phil.

Sinónimos: *Senecio pycnanthus* Phil. var. *brevifolia* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.

***Senecio rahmeri*** Phil.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 4100-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio reicheanus*** Cabrera

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3600 m.  
Países limítrofes: Bolivia.

***Senecio renjifoanus*** Phil.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 1600-3300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio ricardii*** Martic. & Quezada

Arbusto. Endémico.  
Distribución: AYP, ATA.  
Rango altitudinal: 3100-3400 m.

***Senecio santeliciis*** Phil.

Sinónimos: *Senecio crispus* Phil. var. *santelisis* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3500-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio santiagoensis*** Kuntze

Sinónimos: *Senecio leucanthemifolius* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2300-2500 m.

***Senecio saxicola*** Wedd.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 200-300 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Senecio schoenemannii*** Phil.

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 1300 m.

***Senecio scopulorum*** Poepp.

Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO.  
Rango altitudinal: 900-1500 m.

***Senecio scorzonerifolius*** Meyen & Walp.

Sinónimos: *Senecio armeriifolius* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 4400-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.  
Nombre vulgar: Romerillo chico.

***Senecio segethii*** Phil.

Sinónimos: *Senecio peraltae* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2000-4100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio sericeonitens*** Speg.

Sinónimos: *Senecio patagonicus* Phil., hom. illeg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 700-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio serratifolius*** (Meyen & Walp.) Cuatrec.

Sinónimos: *Senecio cernuus* Phil., hom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4000-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Senecio sinuatilobus*** DC.

Sinónimos: *Senecio mollis* Poepp. ex DC.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Senecio skottsbergii*** Cabrera var. *anomalus* Cabrera

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Senecio skottsbergii*** Cabrera var. *skottsbergii*

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 600-1800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio smithii*** DC.

Sinónimos: *Brachypappus smithii* (DC.) Sch. Bip., *Senecio verbascifolius* Hombr. & Jacquinot ex Decne, *Senecio kurtzii* Phil., *Senecio punctarenicus* Krause, *Cineraria leucanthea*

Banks & Sol. ex Walp.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Senecio socompa* Cabrera  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 3500-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Senecio spinosus* DC.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 3400-4600 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Añawayaya, kaylla, espina, tola de espino, té del cuerno.

*Senecio subauritus* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 900-1500 m.

*Senecio subpubescens* Cabrera  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 1000-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *salsus* (Griseb.) Cabrera  
Sinónimos: *Senecio diversifolius* Phil., hom. illeg., *Senecio salsus* Griseb., *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *diversifolius* (Phil.) Cabrera  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2500-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Chachakoma macho.

*Senecio subumbellatus* Phil.  
Sinónimos: *Senecio thermarum* Phil., *Senecio antirrhinifolius* Phil., *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *subdiscoideus* DC., *Senecio multicaulis* Poepp., hom. illeg.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 1500-3600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Senecio sundtii* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3600-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

*Senecio sylvaticus* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

*Senecio tacorensis* Cabrera  
Sinónimos: *Senecio olivaceobracteatus* Ricardi & Martic.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3500-4200 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Koya blanca, monte blanco, payakoa, kpa de cóndor.

*Senecio talquinus* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 2100 m.

*Senecio tehuelches* (Speg.) Cabrera  
Sinónimos: *Senecio miser* Hook.f. var. *tehuelches* Speg.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 400-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Senecio thurifer* (Decne.) Pelsler  
Sinónimos: *Robinsonia thurifera* Decne.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

*Senecio tinctolobus* I.M. Johnst.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 3000-4300 m.

*Senecio tricuspидatus* Hook. & Arn. var. *dentatus* (Sch. Bip.) Cabrera  
Sinónimos: *Senecio ibari* Phil., *Senecio longipes* Hook.f., *Senecio longipes* Hook.f. var. *dentatus* Sch. Bip., *Senecio longipes* Hook.f. var. *integrifolius* Sch. Bip.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Senecio tricuspидatus* Hook. & Arn. var. *tricuspидatus*  
Sinónimos: *Senecio nordenskjöldii* O. Hoffm., *Senecio nordenskjöldii* O. Hoffm. var. *simplicior* O. Hoffm. ex Dusén  
Arbusto. Nativo.

Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio trifidus*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Senecio demissus* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2700-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio trifurcatus*** (G. Forst.) Less.  
Sinónimos: *Cineraria trifurcata* (G. Forst.) Spreng., *Senecio trifurcatus* (G. Forst.) Less. var. *pentadactylus* (Phil.) Speg., *Senecio trifurcatus* (G. Forst.) Less. var. *pisensis* Sch. Bip. ex Wedd., *Senecio pentadactylus* Phil., *Tussilago trifurcata* G. Forst.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 800-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio trifurcifolius*** Hieron.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4200-5100 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Senecio triodon*** Phil.  
Sinónimos: *Senecio baccharidifolius* DC. var. *subradiatus* DC.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 900-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio tripinnatifidus*** Reiche  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 1100-1300 m.

***Senecio tristis*** Phil.  
Sinónimos: *Senecio consanguineus* Phil., *Senecio setulosus* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1200-2100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio troncosii*** Phil.  
Sinónimos: *Senecio thinophilus* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Senecio viridis*** Phil. var. *radiatus* R.E. Fr.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2500-3700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio viridis*** Phil. var. *viridis*  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3000-4400 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Mocora, mocoraca.

***Senecio viscosissimus*** Colla  
Sinónimos: *Senecio hakeaefolius* Hook. & Arn., *Cineraria humilis* Poepp.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, LBO.  
Rango altitudinal: 0-400 m.

***Senecio volckmannii*** Phil.  
Sinónimos: *Senecio rosmarinus* Phil. var. *ascotanensis* (Phil.) Cabrera, *Senecio rosmarinus* Phil., *Senecio ascotanensis* Phil., *Senecio doña-e-annae* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 3300-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Romero, pukachaki, pata colorada, kopa de cóndor, viravira.

***Senecio vulgaris*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

***Senecio websteri*** Hook.f.  
Sinónimos: *Senecio websteri* Hook.f. var. *subdiscoideus* A. Gray  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio werdermannii*** Greenm.  
Sinónimos: *Senecio modestus* Phil., hom. illeg.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2000-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Senecio xerophilus*** Phil. var. *deserticola* (Cabrera) Cabrera  
Sinónimos: *Senecio deserticola* Cabrera, *Senecio cremophilus* Phil., hom. illeg., *Senecio eremophilus* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 4500 m.

***Senecio xerophilus*** Phil. var. *xerophilus*  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3700-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Romerillo, romerillo blanco.

***Senecio zapahuirensis*** Martic. & Quezada  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2100-3000 m.

***Senecio zoellneri*** Martic. & Quezada  
Sinónimos: *Culcitium albifolium* Zoellner  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4000-5000 m.  
Países limítrofes: Bolivia.  
Nombre vulgar: Chukuchuku.

***Senecio zosterifolius*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Senecio uliginosus* Phil., *Haplostichia stolonifera* Phil., *Senecio cotuloides* Reiche, *Senecio graminifolius* Phil., *Senecio potamogetonifolius* Sch. Bip. ex Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 600-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Sigesbeckia**

***Sigesbeckia serrata*** DC.  
Sinónimos: *Sigesbeckia jorullensis* auct. non Kunth  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 1300-2900 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

### **Silybum**

***Silybum marianum*** (L.) Gaertn.  
Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

### **Smallanthus**

***Smallanthus connatus*** (Spreng.) H. Rob.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL.

### **Solidago**

***Solidago argentinensis*** López Laph. & Semple  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 1000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Solidago chilensis*** Meyen  
Sinónimos: *Solidago linearifolia* DC., *Solidago microglossa* DC. var. *linearifolia* (DC.) Baker, *Aster sagei* Phil., *Solidago coquimbana* Phil., *Solidago floribunda* Phil., *Solidago laxiflora* Phil., *Solidago parviflora* Phil., *Solidago recta* Phil., *Solidago valdiviana* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Fulel, huellen.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Solidago patagonica*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

### **Soliva**

***Soliva sessilis*** Ruiz & Pav.  
Sinónimos: *Soliva microloma* Phil., *Soliva valdiviana* Phil., *Gymnostyles chilensis* Spreng.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Dicha.

***Soliva stolonifera*** (Brot.) R. Br. ex Sweet  
Sinónimos: *Soliva urbica* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: RME, MAU, JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

## Sonchus

*Sonchus arvensis* L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAG.

*Sonchus asper* (L.) Hill  
Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA, IDE.

*Sonchus oleraceus* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

*Sonchus tenerrimus* L.  
Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

## Spilanthes

*Spilanthes leiocarpa* DC.  
Sinónimos: *Ceratocephalus leiocarpus* (DC.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 200-300 m.  
Países limítrofes: Perú.

## Spinoliva

*Spinoliva ilicifolia* (Hook. & Arn.) G.Sancho subsp. *baccharoides* (D.Don ex Hook. & Arn.) G.Sancho  
Sinónimos: *Proustia baccharoides* D. Don ex Hook. & Arn., *Proustia ilicifolia* Hook. & Arn. fma. *baccharoides* (D. Don ex Hook. & Arn.) Fabris  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Nombre vulgar: Huañil, olivillo.

*Spinoliva ilicifolia* (Hook. & Arn.) G.Sancho subsp. *ilicifolia*  
Sinónimos: *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *ilicifolia* (Hook. & Arn.) DC., *Proustia olivillo* Phil., *Proustia reticulata* Phil., *Proustia ilicifolia* Hook. & Arn. fma. *ilicifolia*  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 900-2000 m.  
Nombre vulgar: Huañil, olivillo.

## Stevia

*Stevia philippiana* Hieron.  
Sinónimos: *Stevia hyssopifolia* Phil., hom. illeg., *Stevia menthaefolia* Phil., hom. illeg., *Stevia hyssopifolia* var. *panulensis* B.L. Rob. ex I.M. Johnst.; *Porophyllum tarapacanicum* Zoellner  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 780-3600 m.  
Nombre vulgar: Mulumulu.

## Symphotrichum

*Symphotrichum glabrifolium* (DC.) G.L. Nesom  
Sinónimos: *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *australis* (Phil.) Reiche, *Erigeron australis* Phil., *Erigeron glabrifolius* DC., *Erigeron scorzoneraefolium* J. Remy, *Aster glabrifolius* (DC.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 780-3600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Symphotrichum patagonicum* (Cabrera) G.L. Nesom  
Sinónimos: *Aster patagonicus* Cabrera  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 250-350 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Symphotrichum peteroanum* (Phil.) G.L. Nesom  
Sinónimos: *Aster peteroanus* Phil., *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *latifolius* Cabrera  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 1000-2200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Symphotrichum squamatum* (Spreng.) G.L. Nesom  
Sinónimos: *Aster exilis* Elliott var. *australis* A. Gray, *Aster moelleri* (Phil.) Reiche, *Baccharis asteroides* Bertero ex Colla, *Conyza berteriana* Phil., *Conyza squamata* Spreng., *Conyzanthus squamatus* (Spreng.) Tamamsch., *Erigeron depilis* Phil., *Erigeron semiamplexicaule* Meyen, *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron., *Tripolium oliganthum* Phil., *Tripolium moelleri* Phil., *Tripolium conspicuum* J. Remy, *Aster asteroides* (Bertero ex Colla) Rusby, comb. illeg., *Symphotrichum subulatum* (Michx.) G.L. Nesom var. *squamatum* (Spreng.) S.D. Sundb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.



***Symphotrichum vahlii*** (Gaudich.) G.L. Nesom  
Sinónimos: *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *tenuifolius* (Phil.) Cabrera, *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn., *Aster zosterifolius* Reiche, *Erigeron graminifolius* Phil., *Erigeron pugae* Phil., *Erigeron vahlii* Gaudich., *Symphotrichum vahlii* (Gaudich.) G.L. Nesom var. *tenuifolium* (Phil.) G.L. Nesom, *Tripolium humile* Phil., *Tripolium tenuifolium* Phil., *Astradelphus calbucanus* Phil., *Erigeron tripolioides* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### Tagetes

***Tagetes biflora*** Cabrera  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Tagetes minuta*** L.  
Sinónimos: *Tagetes bonariensis* Pers.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Quinchihue, soyko, suyko blanco.

***Tagetes multiflora*** Kunth  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 1000-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Soyko, sayko, té de burro.

### Tanacetum

***Tanacetum parthenium*** (L.) Sch. Bip.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

***Tanacetum vulgare*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: RME, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

### Taraxacum

***Taraxacum fernandezianum*** Dahlst. ex Skottsb.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-4000 m.  
Nota: La cita de Richards (1976) de su presencia en la Región Metropolitana de Santiago se considera dudosa.

***Taraxacum gilliesii*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Taraxacum ibari* Phil., *Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC. var. *magellanicum* (Comm. ex Sch. Bip.) Reiche, *Taraxacum magellanicum* Comm. ex Sch. Bip., *Taraxacum magellanicum* Comm. ex Sch. Bip. var. *lobatum* Dahlst.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Taraxacum officinale*** F.H. Wigg.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

### Tessaria

***Tessaria absinthioides*** (Hook. & Arn.) DC.  
Sinónimos: *Baccharis absinthioides* Hook. & Arn., *Gynheteria incana* Spreng., p.p., *Pluchea absinthioides* (Hook. & Arn.) H. Rob. & Cuatrec.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Brea, chilquilla, sorona, péril, callacoza, hierba de la zorra.

### Thamnosericis

***Thamnosericis lacerata*** (Phil.) F. Phil. fma. *lacerata*  
Sinónimos: *Rea lacerata* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: IDE.

***Thamnosericis lacerata*** (Phil.) F. Phil. fma. *obtusifolia* Skottsb.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: IDE.

### Tolpis

***Tolpis barbata*** (L.) Gaertn.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

### Tragopogon

#### *Tragopogon dubius* Scop.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: MAU.

#### *Tragopogon porrifolius* L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, AIS.

### Trichocline

#### *Trichocline aurea* (D. Don) Reiche

Sinónimos: *Bichenia aurea* D. Don, *Chaetanthera berteriana* Less., *Trichocline pedicularifolia* Walp.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1400 m.  
Nombre vulgar: Hierba de la yesca, yerguilla.

#### *Trichocline caulescens* Phil.

Sinónimos: *Onoseris lanata* Phil., *Trichocline nivea* Phil., *Trichocline stuebelii* Phil., *Chaetanthera crispa* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 1800-3500 m.  
Nombre vulgar: Wanti, garra de león, bailabaila.

#### *Trichocline cineraria* (D. Don) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Chaetanthera crenata* J. Remy, *Gerbera cineraria* (D. Don) Kuntze, *Leuceria contrayerba* Kurtz, *Trichocline contrayerba* (Kurtz) Hauman, *Trichocline crenata* (J. Remy) Reiche, *Bichenia cineraria* D. Don, *Bichenia crenata* (J. Remy) Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 1700-3400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

#### *Trichocline dealbata* (Hook. & Arn.) Benth. & Hook.f. ex Griseb.

Sinónimos: *Chaetanthera dealbata* Hook. & Arn., *Chaetanthera parviflora* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO.  
Rango altitudinal: 2000-3800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

#### *Trichocline deserticola* Zardini

Sinónimos: *Trichocline spathulata* (Phil.) Zardini, comb. illeg., *Onoseris spathulata* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Nombre vulgar: Pastito plomo, botón.

### Tripleurospermum

#### *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: RME, MAG.

### Triptilion

#### *Triptilion achilleae* DC.

Sinónimos: *Triptilion chilense* Bertero ex DC., nom. nud., *Triptilion dusenii* O. Hoffm., *Triptilion euphrasioides* DC., *Triptilion tenuifolium* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

#### *Triptilion benaventei* J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1000-1300 m.

#### *Triptilion berteroi* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 1200-1600 m.

#### *Triptilion capillatum* (D. Don) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Triptilion capillatum* (D. Don) Hook. & Arn. var. *andinum* (Phil.) Reiche, *Triptilion capillatum* (D. Don) Hook. & Arn. var. *laxum* (Phil.) Reiche, *Nassauvia capillata* D. Don, *Triptilion andinum* Phil., *Triptilion laxum* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 300-2200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

#### *Triptilion cordifolium* Lag. ex Lindl.

Sinónimos: *Nassauvia cordifolia* (Lag. ex Lindl.) D. Don, comb. illeg., *Triptilion maritimum* Poepp. ex DC., nom. nud.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Siempreviva del cerro.

#### *Triptilion gibbosum* J. Remy

Sinónimos: *Triptilion compactum* Phil., *Triptilion pusillum* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Triptilion spinosum* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Triptilion bulbosum* J. Remy, *Triptilion diffusum* D. Don, *Triptilion digitatum* Phil., *Triptilion pectinatum* Phil. var. *millefolium* (Phil.) Reiche, *Triptilion pectinatum* Phil., *Triptilion ramulosum* Phil., *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav. var. *eriochlaenum* DC., *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav. var. *integrifolium* (Phil.) Reiche, *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav. var. *remyanum* (Phil.) Reiche, *Nassauvia spinosa* (Ruiz & Pav.) D. Don, *Nassauvia diffusa* D. Don, nom. illeg., *Triptilion humile* Phil., *Triptilion integrifolium* Phil., *Triptilion laciniatum* Willd., *Triptilion millefolium* Phil., *Triptilion remyanum* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Siempreviva.

**Trixis**

***Trixis cacalioides* (Kunth) D. Don**

Sinónimos: *Perdicium cacalioides* Kunth

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**Urmenetea**

***Urmenetea atacamensis* Phil.**

Sinónimos: *Onoseris atacamensis* (Phil.) Hoffm.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2400-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Kótar, koka del desierto, coquilla, oreja de ratón.

**Urospermum**

***Urospermum picroides* (L.) F.W. Schmidt**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME.

**Verbesina**

***Verbesina aurita* Phil.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook.f. ex A. Gray**

Sinónimos: *Verbesina scabra* Phil., hom. illeg., *Ximenesia*

*encelioides* Cav., *Verbesina encelioides* (Cav.) Echegaray, comb. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Maravilla, flor amarilla, mirasol, mirasol chico.

***Verbesina saubinetia* Klatt**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 500-700 m.

**Villanova**

***Villanova oppositifolia* Lag.**

Sinónimos: *Vasquezia biternata* Phil., *Vasquezia oppositifolia*

(Lag.) S.F. Blake

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Villanova robusta* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2800-3800 m.

**Volutaria**

***Volutaria tubuliflora* (Murb.) Sennen**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ.

**Werneria**

***Werneria aretioides* Wedd.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Werneria cochlearis* Griseb.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Werneria glaberrima* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4200-4600 m.

Países limítrofes: Bolivia.  
Nombre vulgar: Maransel, comida de vizcacha.

***Werneria heteroloba*** Wedd.  
Sinónimos: *Werneria heteroloba* Wedd. fma. *microcephala* Rockh.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 3500-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Teqerere, pasto de bofedal.

***Werneria pinnatifida*** J. Remy  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 3400-4450 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Werneria pygmaea*** Gillies ex Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Werneria denticulata* S.F. Blake, *Werneria brachypappa* Phil., hom. illeg., *Werneria rhizoma* J. Remy, *Werneria brachypappa* Sch. Bip.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2200-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Mamañika, qatari, anojarpsike, vega.

***Werneria solivifolia*** Sch. Bip.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4000-4500 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Werneria spathulata*** Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4000-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Pupusa, pupusa de agua.

## **Xanthium**

***Xanthium spinosum*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Xanthium strumarium*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, NUB, BIO.

## **Xenophyllum**

***Xenophyllum ciliolatum*** (A. Gray) V.A. Funk  
Sinónimos: *Werneria ciliolata* A. Gray  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4000-5200 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Pupusa, poposa, yaretilla.

***Xenophyllum incisum*** (Phil.) V.A. Funk  
Sinónimos: *Werneria incisa* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4300-4400 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Pupusa del agua, pupusa del campo.

***Xenophyllum juniperinum*** (Hieron.) J. Calvo  
Sinónimos: *Werneria juniperina* Hieron.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4100-5200 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Xenophyllum poposum*** (Phil.) V.A. Funk  
Sinónimos: *Werneria poposa* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3500-5300 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Poposa, pupusa, jasuasos, asoaso, yareta.

***Xenophyllum pseudodigitatum*** (Rockh.) V.A. Funk  
Sinónimos: *Werneria pseudodigitata* Rockh.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4000-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Xenophyllum weddellii*** (Phil.) V.A. Funk  
Sinónimos: *Werneria weddellii* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4000-5000 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Poposa, pupusa, purapura.

## **Yunquea**

***Yunquea tenzii*** Skottsb.  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

## BALANOPHORACEAE

### Ombrophytum

***Ombrophytum subterraneum*** (Aspl.) B. Hansen  
Sinónimos: *Juelia subterranea* Aspl., *Juelia lilloana* Sleumer, *Juelia meyeri* Sleumer, *Ombrophytum peruvianum* auct. non Poepp. & Endl.  
Hierba parásita. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 500-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.  
Nombre vulgar: Maíz del monte, sicha, pora.

## BASELLACEAE

### Anredera

***Anredera cordifolia*** (Ten.) Steenis  
Arbusto trepador. Introducido.  
Distribución: VAL, IPA.

## BERBERIDACEAE

### Berberis

***Berberis actinacantha*** Mart.  
Sinónimos: *Berberis brachyacantha* Phil. ex Reiche, *Berberis coquimbensis* Muñoz, *Berberis crispa* Gay, *Berberis florida* Phil., *Berberis hakeoides* (Hook.f.) C.K. Schneid., *Berberis variiflora* C.K. Schneid., *Berberis actinacantha* Mart. var. *crispa* (Gay) Reiche, *Berberis congestiflora* Gay var. *hakeoides* Hook.f.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 100-1900 m.  
Nombre vulgar: Michay.

***Berberis chilensis*** Gillies ex Hook. & Arn. var. *brachybotria* (Gay) Landrum  
Sinónimos: *Berberis brachybotria* Gay, *Berberis brachybotria* Gay var. *brevispina* Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Berberis chilensis*** Gillies ex Hook. & Arn. var. *chilensis*  
Sinónimos: *Berberis diffusa* Gay, *Berberis ferox* Gay, *Berberis fragrans* Phil. ex Reiche, *Berberis chilensis* Gillies ex Hook. var. *diffusa* (Gay) Reiche, *Berberis chilensis* Gillies ex Hook. var. *ferox* (Gay) Reiche, *Berberis gayi* K. Koch

Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 300-1600 m.  
Nombre vulgar: Michay.

***Berberis congestiflora*** Gay  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: RME, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Michay.

***Berberis corymbosa*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Berberis paniculata* Phil., *Berberis corymbosa* Hook. & Arn. var. *paniculata* (Phil.) Reiche  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 300-600 m.

***Berberis darwinii*** Hook.  
Sinónimos: *Berberis costulata* Gand., *Berberis knightii* (Lindl.) K. Koch, *Mahonia knightii* Lindl.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Michay, quelung.

***Berberis empetrifolia*** Lam.  
Sinónimos: *Berberis mutabilis* Phil., *Berberis wawrana* C.K. Schneid., *Berberis empetrifolia* Lam. var. *magellanica* C.K. Schneid.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Zarcilla, monte negro, uva de la cordillera.

***Berberis glomerata*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Berberis glomerata* Hook. & Arn. var. *zahlbruckneriana* (C.K. Schneid.) Ahrendt, *Berberis zahlbruckneriana* C.K. Schneid.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.

***Berberis horrida*** Gay  
Sinónimos: *Berberis pilosifolia* Ahrendt, *Berberis actinacantha* Mart. var. *mollis* Reiche, *Berberis actinacantha* Mart. var. *horrida* (Gay) Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.



Rango altitudinal: 800-1000 m.  
Nombre vulgar: Michay.

***Berberis ilicifolia*** L.f.

Sinónimos: *Berberis subantarctica* Gand., *Berberis lagenaria* Poir.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chelia.

***Berberis litoralis*** Phil.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Nombre vulgar: Michay de Paposo.

***Berberis masafuerana*** Skottsbo.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200-1100 m.

***Berberis microphylla*** G. Forst.

Sinónimos: *Berberis buxifolia* Lam. var. *antucoana* (C.K. Schneid.) Orsi, *Berberis buxifolia* Lam., *Berberis heterophylla* Juss. ex Poir., *Berberis inermis* Pers., *Berberis antucoana* C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *nuda* C.K. Schneid., *Berberis marginata* Gay, *Berberis spinosissima* (Reiche) Ahrendt, *Berberis buxifolia* Lam. var. *spinosissima* Reiche, *Berberis buxifolia* Lam. var. *papillosa* C.K. Schneid., *Berberis dulcis* Sweet, *Berberis buxifolia* Lam. var. *antarctica* C.K. Schneid.

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Calafate, michay, mulun.

***Berberis montana*** Gay

Sinónimos: *Berberis chillanensis* (C.K. Schneid.) Sprague ex Bean, *Berberis chillanensis* (C.K. Schneid.) Sprague ex Bean var. *hirsutipes* Sprague, *Berberis coletioides* Lechl., *Berberis polypetalata* Phil., *Berberis montana* Gay var. *gracilis* C.K. Schneid., *Berberis montana* Gay var. *chillanensis* C.K. Schneid., *Berberis montana* Gay var. *coletioides* (Lechl.) C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *montana* (Gay) Reiche, *Berberis coletioides* Lechl. var. *gracilis* (C.K. Schneid.) Ahrendt

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Palo amarillo.

***Berberis negeriana*** Tischler

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 200-300 m.

***Berberis rotundifolia*** Poepp. & Endl.

Sinónimos: *Berberis philippii* Ahrendt, *Berberis polymorpha* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 200-2300 m.

***Berberis serratodentata*** Lechl.

Sinónimos: *Berberis pearcei* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Saloll.

***Berberis trigona*** Kunze ex Poepp. & Endl.

Sinónimos: *Berberis linearifolia* Phil., *Berberis linearifolia* Phil. var. *longifolia* (Reiche) Ahrendt, *Berberis grisebachii* Lechl., *Berberis trigona* Kunze ex Poepp. & Endl. var. *longifolia* Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 500-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Calafate, michay.

***Berberis valdiviana*** Phil.

Sinónimos: *Berberis valdiviana* Phil. var. *gracilifolia* Ahrendt

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Clen, espina en cruz.

## BERBERIDOPSISACEAE

### Berberidopsis

***Berberidopsis corallina*** Hook.f.

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 100-600 m.

Nombre vulgar: Michay rojo.

## BETULACEAE

### *Alnus*

*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.

Árbol. Introducido.

Distribución: COQ, RME, BIO, LLA.

Nombre vulgar: Aliso.

## BIGNONIACEAE

### *Argyria*

*Argyria adscendens* DC. var. *adscendens*

Sinónimos: *Argyria huidobriana* Clos, *Argyria lutea* Phil.,

*Argyria viridis* Phil. var. *lutea* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 900-3200 m.

Nombre vulgar: Triaca.

*Argyria adscendens* DC. var. *viridis* (Phil.) Gleisner & Ricardi

Sinónimos: *Argyria viridis* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 1800-2500 m.

*Argyria bifrons* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

*Argyria bustillosii* Phil.

Sinónimos: *Argyria australis* Phil., *Argyria potentillifolia*

DC. var. *australis* (Phil.) Macloskie, comb. illeg., *Argyria*

*potentillifolia* DC. var. *australis* (Phil.) Speg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LBO, BIO.

Rango altitudinal: 800-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

*Argyria checoensis* (Meyen) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Oxalis checoensis* Meyen, *Argyria incana* Phil.,

*Argyria sitiens* I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

*Argyria farnesiana* Gleisner & Ricardi

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 900-1000 m.

*Argyria geranioides* DC.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 900-1400 m.

*Argyria glutinosa* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1400-2900 m.

*Argyria potentillifolia* DC.

Sinónimos: *Argyria potentillaefolia* DC. var. *beta* Clos

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-3500 m.

*Argyria radiata* (L.) D. Don

Sinónimos: *Bignonia radiata* L., *Argyria canescens* D.

Don, *Argyria puberula* DC., *Argyria feuillie* DC., *Argyria*

*tenuifolia* C. Presl, *Oxymitus argyloides* C. Presl, *Argyria*

*chrysantha* Phil., *Argyria eremophila* Phil., *Argyria*

*glabriuscula* Phil., *Argyria villosa* Phil., *Argyria digitalina*

Phil., *Argyria viridis* Phil. var. *digitalina* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Flor del jote, cartucho, terciopelo.

*Argyria tomentosa* Phil.

Sinónimos: *Argyria tomentosa* Phil. var. *tenella* (Phil.)

Reiche, *Argyria tenella* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2400-2900 m.

*Argyria uspallatensis* DC.

Sinónimos: *Argyria trifoliata* DC., *Tecoma uspallatensis*

Mart. ex DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, VAL.

Rango altitudinal: 1700-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Campsidium*

*Campsidium valdivianum* (Phil.) Skottsb.

Sinónimos: *Campsidium chilense* Reissek & Seem., *Tecoma*

*valdiviana* Phil.

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,

MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Pilpilvoqui blanco, voqui bejuco, voqui de canasta.

### **Eccremocarpus**

*Eccremocarpus scaber* Ruiz & Pav.  
Sinónimos: *Calampelis scaber* (Ruiz & Pav.) D. Don, comb. illeg., *Calampelis scaber* (Ruiz & Pav.) Sweet, *Eccremocarpus scaber* Ruiz & Pav. var. *sepium* Bertero ex A.DC., *Eccremocarpus sepium* Bertero  
Arbusto trepador. Nativo.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 200-2400 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Chupa-chupa, chupapoto.

### **Tecoma**

*Tecoma fulva* (Cav.) D. Don  
Sinónimos: *Bignonia fulva* Cav., *Tecomaria fulvum* (Cav.) Seem., *Bignonia meyeniana* Schauer, *Stenolobium fulvum* (Cav.) Sprague  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 200-2300 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Chuvé.

## **BORAGINACEAE**

### **Amsinckia**

*Amsinckia calycina* (Moris) Chater  
Sinónimos: *Lithospermum calycinum* Moris, *Amsinckia angustifolia* Lehm., *Amsinckia angustifolia* Lehm. var. *pseudolycopsioides* Clos, *Lithospermum chilense* Colla  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Hierba rocilla.

*Amsinckia tessellata* A. Gray  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Asperugo**

*Asperugo procumbens* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: MAG.

### **Borago**

*Borago officinalis* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

### **Buglossoides**

*Buglossoides arvensis* (L.) I.M. Johnst.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AIS.

### **Cordia**

*Cordia decandra* Hook. & Arn.  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Nombre vulgar: Carbón, carbonillo.

### **Cryptantha**

*Cryptantha alfalfalis* (Phil.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Eritrichium alfalfalis* Phil., *Eritrichium rigidum* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: RME, LBO.  
Rango altitudinal: 700-1100 m.

*Cryptantha alyssoides* (A. DC.) Reiche  
Sinónimos: *Eritrichium alyssoides* A. DC., *Eritrichium gilliesii* Phil., *Eritrichium talquinum* Phil., *Cryptantha talquina* (Phil.) Brand  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1000-2700 m.

*Cryptantha aprica* (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Eritrichium apricum* Phil., *Eritrichium bridgesii* Phil., *Eritrichium lignosum* Phil., *Eritrichium denudatum* Phil., *Eritrichium closii* Phil., *Eritrichium rengifoanum* Phil., *Cryptantha candelabrum* Brand  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 400-2400 m.

***Cryptantha argentea*** I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Cryptantha aspera*** (Phil.) Grau

Sinónimos: *Eritrichium asperum* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-600 m.

***Cryptantha calycina*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Eritrichium calycinum* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 3100-3800 m.

***Cryptantha calycotricha*** I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Cryptantha capituliflora*** (Clos) Reiche

Sinónimos: *Eritrichium capituliflorum* Clos, *Eritrichium cephalanthum* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2000-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cryptantha chaetocalyx*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium chaetocalyx* Phil., *Cryptantha divaricata* Reiche, *Eritrichium pustulosum* Phil., *Eritrichium divaricatum* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Cryptantha chispae*** Grau

Sinónimos: *Eritrichium affine* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Cryptantha clandestina*** (Trevir.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Lithospermum clandestinum* Trevir., *Cryptantha philippiana* Brand  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

***Cryptantha cynoglossoides*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium cynoglossoides* Phil., *Eritrichium uspallatense* Phil., *Cryptantha phacelioides* auct. non (Clos) Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 700-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cryptantha dichita*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium dichita* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Nombre vulgar: Papur.

***Cryptantha diffusa*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium diffusum* Phil., *Eritrichium debile* Phil., *Cryptantha debilis* (Phil.) Reiche, *Cryptantha famatinae* Brand, *Cryptantha borchersii* (Phil.) Hauman, *Eritrichium borchersii* Phil., *Eritrichium micranthum* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2000-4100 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Chapinqhora macho.

***Cryptantha dimorpha*** (Phil.) Greene

Sinónimos: *Eritrichium dimorphum* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 600-2000 m.

***Cryptantha diplotricha*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Eritrichium diplotrichum* Phil., *Eritrichium diplotrichum* Phil. var. *humilis* Phil., *Eritrichium axillare* Phil., *Cryptantha hossei* Brand, *Cryptantha modesta* Brand, *Cryptantha capituliflora* (Clos) Reiche var. *compacta* Brand, *Cryptantha axillaris* (Phil.) Reiche, *Cryptantha diplotricha* (Phil.) Reiche var. *humilis* (Phil.) Reiche  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 2000-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cryptantha dolichophylla*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Eritrichium dolichophyllum* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 100-1200 m.

***Cryptantha filaginea*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Eritrichium filagineum* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-2600 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Cryptantha filiformis*** (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Eritrichium filiforme* Phil., *Eritrichium mite* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, COQ.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

***Cryptantha gayi*** I.M. Johnst.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-900 m.

***Cryptantha globulifera*** (Clos) Reiche  
Sinónimos: *Eritrichium globuliferum* Clos, *Eritrichium floribundum* Phil., *Cryptantha floribunda* (Phil.) Reiche, *Eritrichium carrizalense* Phil., *Eritrichium glareosum* Phil., *Eritrichium oliganthum* Phil., *Eritrichium parvulum* Phil., *Eritrichium sphaerophorum* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cryptantha glomerata*** Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. ***glomerata***  
Sinónimos: *Eritrichium strictum* Phil., *Eritrichium longisetum* Phil., *Eritrichium diplasianthum* Phil., *Eritrichium foliosum* Phil., *Cryptantha candolleana* Brand  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-2800 m.

***Cryptantha glomerata*** Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. ***quadrinuculata*** Grau  
Sinónimos: *Eritrichium vidali* Phil., *Cryptantha vidali* (Phil.) Reiche  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-600 m.

***Cryptantha glomerulifera*** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Eritrichium glomeruliferum* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2000-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cryptantha gnaphalioides*** (A. DC.) Reiche  
Sinónimos: *Eritrichium gnaphalioides* A. DC., *Eritrichium fruticosum* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-2900 m.  
Nombre vulgar: Té de burro.

***Cryptantha haplostachya*** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Eritrichium haplostachyum* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 200 m.

***Cryptantha hispida*** (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Eritrichium hispidum* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 2700-3800 m.  
Nombre vulgar: Itallapa.

***Cryptantha involucrata*** (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Eritrichium involucratum* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, RME.  
Rango altitudinal: 1300-3500 m.

***Cryptantha kingii*** (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Eritrichium kingii* Phil., *Eritrichium virens* Phil., *Eritrichium macrocalyx* Phil., *Cryptantha virens* (Phil.) Reiche, *Cryptantha macrocalyx* (Phil.) Reiche  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-600 m.

***Cryptantha limensis*** (A. DC.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Eritrichium limense* A. DC.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 3800 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Cryptantha linearis*** (Colla) Greene  
Sinónimos: *Eritrichium lineare* (Colla) DC., *Myosotis linearis* Colla, *Eritrichium minutiflorum* Phil., *Cryptantha minutiflora* (Phil.) Brand, *Eritrichium gracile* Phil., *Cryptantha gracilis* (Phil.) Reiche, *Eritrichium fallax* Phil., *Cryptantha fallax* (Phil.) Reiche  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Nombre vulgar: Sobaquillo.

***Cryptantha longifolia*** (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Eritrichium longifolium* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.

***Cryptantha marioricardiana*** Teillier  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-100 m.



***Cryptantha marticorenae*** Grau

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 300-900 m.

***Cryptantha phaceloides*** (Clos) Reiche  
Sinónimos: *Eritrichium phaceloides* Clos

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3300 m.

***Cryptantha romanii*** I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 500 m.

***Cryptantha spathulata*** (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Eritrichium spathulatum* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO.

***Cryptantha subamplexicaulis*** (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Eritrichium subamplexicaule* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Cryptantha taltalensis*** I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-400 m.

***Cryptantha volckmannii*** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Eritrichium volckmannii* Phil., *Eritrichium chrysanthum* Phil., *Cryptantha chrysantha* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 600-2900 m.

***Cryptantha werdermanniana*** I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 2300 m.

**Cynoglossum**

***Cynoglossum creticum*** Mill.

Hierba. Bienal. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Cynoglossum zeylanicum*** (Vahl ex Hornem.) Thunb. ex Lehm.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: MAU, ARA, LLA.

**Echium**

***Echium plantagineum*** L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

***Echium vulgare*** L.

Hierba. Bienal. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

**Johnstonella**

***Johnstonella parviflora*** (Phil.) Hasenstab & M.G. Simpson  
Sinónimos: *Cryptantha parviflora* (Phil.) Reiche, *Eritrichium parviflorum* Phil., *Eritrichium microphyllum* Phil., *Cryptantha microphylla* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Países limítrofes: Perú.

**Lappula**

***Lappula redowskii*** (Hornem.) Greene  
Sinónimos: *Myosotis redowskii* Hornem.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 100-150 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Myosotis**

***Myosotis albiflora*** Banks & Sol. ex Hook.f.  
Sinónimos: *Eritrichium albiflorum* Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Myosotis antarctica*** Hook. f.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Myosotis arvensis*** (L.) Hill

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

***Myosotis azorica*** H.C. Watson ex Hook.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: LLA.

***Myosotis discolor*** Pers. subsp. *canariensis* (Pit.) Grau  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AIS, MAG.

***Myosotis discolor*** Pers. subsp. *discolor*  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: MAU, ARA, LRI, MAG.

***Myosotis latifolia*** Poir.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ATA, RME, NUB, BIO, LRI.

***Myosotis laxa*** Lehm.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,  
AIS, JFE.

***Myosotis ramosissima*** Rochel  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: MAG.

***Myosotis scorpioides*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: RME, ARA, LLA, AIS, MAG.

***Myosotis stricta*** Link ex Roem. & Schult.  
Hierba. Anual o perenne. Introducida.  
Distribución: AIS, MAG.

***Myosotis sylvatica*** Ehrh. ex Hoffm.  
Hierba. Bienal. Introducida.  
Distribución: JFE.

## **Nama**

***Nama dichotomum*** (Ruiz & Pav.) Choisy  
Sinónimos: *Nama stricta* Phil., *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy fma. *amplifolia* Brand, *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy var. *amplifolia* (Brand) C.L. Hitchc., *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy var. *stricta* (Phil.) Brand, *Hydrolea dichotoma* Ruiz & Pav., *Marylaunidium dichotomum* (Ruiz & Pav.) Kuntze  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, RME.  
Rango altitudinal: 1000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Nama undulatum*** Kunth var. *australe* C.L. Hitchc.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 1000-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## **Nesocaryum**

***Nesocaryum stylosum*** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Heliotropium stylosum* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: IDE.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

## **Omphalodes**

***Omphalodes linifolia*** (L.) Moench  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ARA.

## **Pectocarya**

***Pectocarya anomala*** I.M. Johnst.  
Hierba. Anual o bienal. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2300-2600 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Pectocarya dimorpha*** (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *dimorpha* I.M. Johnst.  
Hierba. Anual o bienal. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Pectocarya linearis*** (Ruiz & Pav.) DC.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, AIS.

***Pectocarya pusilla*** (A. DC.) A. Gray  
Sinónimos: *Gravelia pusilla* A. DC.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: VAL, LBO.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

## **Phacelia**

***Phacelia brachyantha*** Benth.  
Sinónimos: *Phacelia brachyantha* Benth. var. *paniculata* A.DC., *Phacelia clinopodioides* Bertero ex Brand, *Phacelia simplicifolia* Colla  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAG.  
Rango altitudinal: 1500-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Phacelia cumingii*** (Benth.) A. Gray  
Sinónimos: *Eutoca cumingii* Benth., *Microgenetes cumingii* A.DC., *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *pusilla*

(Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *litoralis* (Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *grandis* (Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *frigida* (Phil.) Brand, *Eutoca frigida* Phil., *Eutoca peraltae* Phil., *Phacelia frigida* (Phil.) Reiche, *Eutoca litoralis* Phil., *Eutoca grandis* Phil., *Eutoca pinnatifida* Phil., *Eutoca pusilla* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 3200-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Phacelia nana*** Wedd.

Sinónimos: *Eutoca lomarifolia* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3500-4700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Phacelia pinnatifida*** Griseb. ex Wedd.

Sinónimos: *Phacelia boliviana* Brand, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *lobulata* Hicken, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *decumbens* Brand, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *elatior* Griseb., *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *foliosa* Reiche, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *robusta* Wedd., *Phacelia viscosa* Phil., *Phacelia foliosa* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1000-4600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Phacelia secunda*** J.F. Gmel. var. *pinnata* (Vahl) Deginani

Sinónimos: *Heliotropium pinnatum* Vahl, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *robusta* Brand, *Phacelia pinnata* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. var. *robusta* (Brand) J.F. Macbr., *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *pinnata* (Ruiz & Pav.) Constance, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *amoena* Brand, *Phacelia pinnata* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Aldea pinnata* Ruiz & Pav., *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *pinnata* (Vahl) Brand

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, MAG.

Rango altitudinal: 1500-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Phacelia secunda*** J.F. Gmel. var. *secunda*

Sinónimos: *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *plantaginea* Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *andina* Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *genuina* Brand, nom. illeg., *Aldea circinata* Willd., *Phacelia parviflora* Phil., *Phacelia circinata* (Willd.) Jacq., *Phacelia circinata* (Willd.) Jacq. var. *acutiloba* DC.,

*Phacelia circinata* (Willd.) Jacq. var. *paniculata* DC., *Phacelia circinata* (Willd.) Jacq. var. *obtusiloba* DC., *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *plantaginea* (Brand) Constance, *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *parviflora* (Phil.) Constance, *Hydrophyllum magellanicum* Lam., *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Phacelia setigera*** Phil.

Sinónimos: *Phacelia pinnatifida* Griseb. var. *setigera* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 4000-4800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Phacelia sinuata*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, COQ.

Rango altitudinal: 1000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Plagiobothrys***

***Plagiobothrys armeriifolius*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium armeriifolius* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LBO.

***Plagiobothrys calandrinoides*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium calandrinoides* Phil., *Eritrichium albiflorus* Griseb., *Eritrichium uliginosum* auct. non Phil., *Plagiobothrys lechleri* I.M. Johnst., *Allocarya alternifolia* Brand, *Allocarya humilis* Brand, *Plagiobothrys albiflorus* (Griseb.) R.L. Pérez-Mor. ex D.M. Moore, *Eritrichium nubigenum* Phil. ex F. Meigen

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAG.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Plagiobothrys collinus*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium collinum* Phil., *Cryptantha collina* (Phil.) Reiche, *Eritrichium inconspicuum* Phil., *Cryptantha inconspicua* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 100-500 m.

***Plagiobothrys corymbosus*** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Myosotis corymbosa* Ruiz & Pav., *Allocarya sessilifolia* Greene, *Allocarya sessiliflora* Reiche, *Allocarya corymbosa* (Ruiz & Pav.) Brand, *Eritrichium sessiliflorum* A.DC., *Cryptantha corymbosa* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst., *Allocarya tenuifolia* (Schlecht. ex Phil.) Greene, *Allocarya tenuifolia* (Schlecht. ex Phil.) Greene var. *pulchella* (Phil.) Reiche, *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex Phil., *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex Phil. var. *pulchellum* Phil., *Plagiobothrys tenuifolius* (Schlecht. ex Phil.) I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Plagiobothrys foliosus*** I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, ARA.

***Plagiobothrys fulvus*** (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Myosotis fulva* Hook. & Arn., *Eritrichium laxiflorum* Phil., *Eritrichium fulvum* Hook. & Arn. var. *pinguis* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Plagiobothrys germainii*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium germainii* Phil., *Allocarya germainii* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 200-300 m.

***Plagiobothrys gracilis*** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Myosotis gracilis* Ruiz & Pav., *Echinosperrum gracile* (Ruiz & Pav.) Lehm., *Rochelia gracilis* (Ruiz & Pav. ex G. Don) J.F. Macbr.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, RME, MAU, BIO.

***Plagiobothrys myosotoides*** (Lehm.) Brand

Sinónimos: *Plagiobothrys tinctorius* (Ruiz & Pav.) A. Gray, *Eritrichium tinctorium* A. DC., *Eritrichium pugae* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Plagiobothrys oppositifolius*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium oppositifolius* Phil., *Eritrichium*

*limonium* Phil., *Eritrichium cinereum* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ARA.

***Plagiobothrys pedicellaris*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Allocarya capitata* (Clos) Brand var. *longipes* (Phil. ex Reiche) Brand, *Allocarya tenuifolia* (Schlecht. ex Phil.) Greene var. *longipes* Phil. ex Reiche, *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex Phil. var. *longipes* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA.

***Plagiobothrys polycaulis*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium polycaulis* Phil., *Eritrichium delicatulum* Phil., *Eritrichium graminifolium* Phil., *Eritrichium bracteatum* Phil., *Eritrichium vernum* Phil., *Eritrichium flavicans* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Plagiobothrys pratensis*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium pratense* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LLA.

Rango altitudinal: 100-300 m.

***Plagiobothrys procumbens*** (Colla) A. Gray

Sinónimos: *Allocarya procumbens* (Colla) Greene, *Myosotis procumbens* Colla, *Eritrichium illapelinum* Phil., *Eritrichium tenuicaule* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Plagiobothrys pulchellus*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium pulchellum* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Plagiobothrys uliginosus*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium uliginosum* Phil., *Allocarya uliginosa* (Phil.) Greene, *Eritrichium pedicellare* Phil., *Allocarya pedicellaris* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: NUB, ARA.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Plagiobothrys verrucosus*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium verrucosum* Phil., *Plagiobothrys patagonicus* I.M. Johnst., *Plagiobothrys myosotoides*

(Lehm.) Brand var. *patagonicus* (I.M. Johnst.) Brand  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, AIS.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### Selkirkia

*Selkirkia berteroi* (Colla) Hemsl.  
Sinónimos: *Cynoglossum berteroi* Colla  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-600 m.

*Selkirkia limense* (Willd.) Holstein & Weigend  
Sinónimos: *Cynoglossum limense* Willd., *Cynoglossum decurrens* var. *limense* (Willd.) DC., *Cynoglossum decurrens* Ruiz & Pav., *Cynoglossum alatum* Molina  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI.

*Selkirkia pauciflora* (Ruiz & Pav.) Holstein & Weigend  
Sinónimos: *Cynoglossum pauciflorum* Ruiz & Pav., *Cynoglossum paniculatum* Hook. & Arn., *Mapucheia paniculata* (Hook. & Arn.) M. Serrano, R. Carbajal & S. Ortiz, *Cynoglossum azocartii* Phil., *Cynoglossum paniculatum* var. *azocartii* (Phil.) Reiche, *Cynoglossum paniculatum* fma. *azocartii* (Phil.) Brand, *Cynoglossum paniculatum* fma. *philippianum* Brand  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 100-1100 m.  
Nombre vulgar: No me olvides.

### Tiquilia

*Tiquilia atacamensis* (Phil.) A.T. Richardson  
Sinónimos: *Coldenia atacamensis* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Nombre vulgar: Káuchal.

*Tiquilia grandiflora* (Phil.) A.T. Richardson  
Sinónimos: *Coldenia grandiflora* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 1400 m.  
Países limítrofes: Perú.

*Tiquilia litoralis* (Phil.) A.T. Richardson  
Sinónimos: *Coldenia littoralis* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.  
Países limítrofes: Perú.

*Tiquilia paronychioides* (Phil.) A.T. Richardson  
Sinónimos: *Coldenia paronychioides* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-3300 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

*Tiquilia tacnensis* A.T. Richardson  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 1900-2000 m.  
Países limítrofes: Perú.

## BRASSICACEAE

### Alshehbazia

*Alshehbazia hauthalii* (Gilg & Muschl.) Salariao & Zuloaga  
Sinónimos: *Eudema hauthalii* Gilg & Muschl., *Onuris hauthalii* (Gilg & Muschl.) Al-Shehbaz, *Brayopsis hauthalii* (Gilg & Muschl.) Skotts., *Brayopsis skottsbergii* Gilg ex Skotts.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 300-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### Alyssum

*Alyssum alyssoides* (L.) L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: BIO, MAG.

### Arabidopsis

*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS.

### Atacama

*Atacama nivea* (Phil.) Toro, Mort & Al-Shehbaz  
Sinónimos: *Sisymbrium niveum* Phil., *Mathewsia nivea* (Phil.) O.E. Schulz  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 2500-3500 m.



## Barbarea

### *Barbarea verna* (Mill.) Asch.

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

## Brassica

### *Brassica napus* L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG, JFE.

### *Brassica nigra* (L.) W.D.J. Koch

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, JFE.

### *Brassica oleracea* L.

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: LLA, MAG, JFE, IPA.

### *Brassica rapa* L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

### *Brassica tournefortii* Gouan

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

## Camelina

### *Camelina microcarpa* Andr. ex DC.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME.

## Capsella

### *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA.

## Cardamine

### *Cardamine africana* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA, AIS.

### *Cardamine bonariensis* Pers.

Sinónimos: *Cardamine alsophila* Phil. var. *pusilla* (Phil.)

Reiche, *Cardamine nasturtioides* Bertero ex Barnéoud,

*Cardamine andicola* Phil., *Cardamine nemophila* Phil.,

*Cardamine pusilla* Phil., *Cardamine ramosissima* Steud.,

*Cardamine tridens* Phil., *Cardamine bracteata* Phil.,

*Cardamine caespitosa* Phil., *Cardamine alsophila* Phil.,

*Cardamine alsophila* Phil. var. *bracteata* (Phil.) Reiche,

*Cardamine alsophila* Phil. var. *caespitosa* (Phil.) Reiche,

*Cardamine alsophila* Phil. var. *tridens* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO,

MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Berro picante.

### *Cardamine chenopodiifolia* Pers.

Sinónimos: *Arabis commersonii* DC., *Arabis spathulata*

(Poir.) DC., *Sisymbrium bellidifolium* Poir., *Sisymbrium*

*spathulatum* Poir., *Heterocarpus fernandezianus* Phil.,

*Cardamine fernandeziana* (Phil.) Johow

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

### *Cardamine chilensis* DC.

Sinónimos: *Cardamine valdiviana* Phil., *Cardamine*

*chilensis* DC. var. *angustifolia* O.E. Schulz, *Cardamine*

*solisii* Phil., *Cardamine valdiviana* Phil. var. *callitrichoides*

(Speg.) O.E. Schulz, *Cardamine vulgaris* Phil. var.

*micropetala* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine chilensis* DC.

var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Cardamine nana* Barnéoud,

*Cardamine micropetala* Phil., *Cardamine ramosissima*

Steud. var. *micropetala* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual o perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,

LRI.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Cardamine cordata* Barnéoud

Sinónimos: *Cardamine cordata* Barnéoud var. *decumbens*

(Barnéoud) O.E. Schulz, *Cardamine nivalis* Gillies

ex Hook. & Arn. subsp. *andina* (Phil.) O.E. Schulz,

*Cardamine calbucana* Phil., *Cardamine monticosa* Phil.,

*Cardamine decumbens* Barnéoud, *Cardamine peteroana*

Phil., *Cardamine andina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 700-2900 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Cardamine geraniifolia* (Poir.) DC.

Sinónimos: *Dentaria geraniifolia* (Poir.) Reiche,

*Sisymbrium geraniifolium* Poir.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cardamine glacialis*** (G. Forst.) DC.

Sinónimos: *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *pubescens* Phil. ex O.E. Schulz, *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Griseb., *Cardamine strictula* Steud., *Sisymbrium glaciale* G. Forst., *Cardamine ciliata* Phil., *Cardamine gongyloides* Phil., *Cardamine litoralis* Phil., *Cardamine magellanica* Phil., *Cardamine palenae* Phil., *Cardamine soehrensii* Phil., *Cardamine pratensis* L. var. *minor* Barnéoud, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *pumila* A. Gray, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *elatior* A. Gray, *Cardamine hirsuta* L. var. *antiscorbutica* (Banks & Sol. ex Griseb.) Reiche, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. subsp. *litoralis* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine hirsuta* L. var. *magellanica* (Phil.) Reiche, *Cardamine hirsuta* L. var. *soehrensii* (Phil.) Reiche, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *soehrensii* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium grandiflorum* Molina

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, RME, MAU, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardamine hirsuta*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG, JFE.

***Cardamine kruesselii*** Johow ex Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

***Cardamine marginata*** Phil.

Sinónimos: *Cardamine vulgaris* Phil. var. *marginata* (Phil.) O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, ARA.

***Cardamine rostrata*** Griseb.

Sinónimos: *Cardamine rostrata* Griseb. var. *reniformis* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine reniformis* Phil., *Cardamine lechleriana* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardamine tenuirostris*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Cardamine tenuirostris* Hook. & Arn. subsp. *affinis* (Hook. & Arn.) O.E. Schulz, *Cardamine tenuirostris*

Hook. & Arn. subsp. *reicheana* O.E. Schulz, *Cardamine flavescens* Phil., *Cardamine affinis* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardamine tuberosa*** DC.

Sinónimos: *Cardamine tuberosa* DC. subsp. *cognata* (Steud.) O.E. Schulz, *Cardamine granulata* Phil., *Cardamine cognata* Steud., *Cardamine tuberosa* DC. var. *granulata* (Phil.) Reiche, *Cardamine thyrsoides* O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardamine variabilis*** Phil.

Sinónimos: *Cardamine integrifolia* Phil. var. *diversifolia* O.E. Schulz, *Cardamine variabilis* Phil. var. *pinnatisecta* O.E. Schulz, *Cardamine thermarum* Martic., *Cardamine triphylla* Phil., *Sisymbrium simpsonii* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardamine volckmannii*** Phil.

Sinónimos: *Cardamine nivalis* Gillies ex Hook. & Arn., *Cardamine petiolulata* Phil. ex O.E. Schulz, *Cardamine stricta* Phil., *Cardamine hirsuta* L. var. *nivalis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardamine vulgaris*** Phil.

Sinónimos: *Cardamine garaventae* O.E. Schulz, *Cardamine grandjotii* O.E. Schulz, *Cardamine macrostachya* Phil., *Cardamine vulgaris* Phil. var. *oligozyga* O.E. Schulz, *Cardamine hirsuta* L. var. *vulgaris* (Phil.) Reiche, *Cardamine intermedia* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

## Chorispora

### *Chorispora tenella* (Pall.) DC.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME.

## Cremolobus

### *Cremolobus chilensis* (Lag. ex DC.) DC.

Sinónimos: *Urbanodoxa tarapacana* Ricardi & Martic., *Biscutella chilensis* Lag. ex DC., *Cremolobus sinuatus* Hook., *Cremolobus pinnatifidus* Hook.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 0-4400 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## Descurainia

### *Descurainia antarctica* (E. Fourn.) O.E. Schulz

Sinónimos: *Descurainia argentea* O.E. Schulz, *Hesperis antarctica* (E. Fourn.) Kuntze

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Descurainia depressa* (Phil.) Prantl ex Reiche

Sinónimos: *Descurainia brachycarpa* (Phil.) Prantl ex Reiche, *Sisymbrium brachycarpum* Phil., nom. illeg., *Sisymbrium depressum* Phil.

Hierba. Bienal o perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3500-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### *Descurainia erodiifolia* (Phil.) Prantl ex Reiche

Sinónimos: *Sisymbrium erodiifolium* Phil.

Hierba. Bienal. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 200-3200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

### *Descurainia myriophylla* (Willd. ex DC.) R.E. Fr.

Sinónimos: *Sisymbrium myriophyllum* Willd. ex DC.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1900-4600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Qasabe.

### *Descurainia nuttallii* (Colla) O.E. Schulz

Sinónimos: *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.)

Prantl var. *elegantula* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia*

*cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *tenuissima* (Phil.) Reiche, *Sisymbrium tenuissimum* Phil., *Sophia tenuissima* (Phil.) Macloskie, *Sisymbrium elegantulum* Phil., *Sisymbrium nuttalli* Colla, *Sisymbrium macrophyllum* Barnéoud, *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl var. *macrophylla* (Barnéoud) Prantl ex Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Descurainia pimpinellifolia* (Barnéoud) O.E. Schulz

Sinónimos: *Descurainia glaucescens* (Phil.) Prantl ex Reiche, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche

fma. *umbellifera* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia pimpinellifolia* (Barnéoud) O.E. Schulz var. *glaucescens* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium pimpinellifolium* Barnéoud,

*Sisymbrium umbelliferum* Phil., *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl var. *pimpinellifolium* (Barnéoud) Reiche,

*Sophia glaucescens* (Phil.) Macloskie

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, MAG.

### *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche

Sinónimos: *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var.

*minutiflora* (Prantl ex Reiche) O.E. Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *rubescens* (Phil.) O.E.

Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var.

*florida* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia minutiflora* Prantl

ex Reiche var. *florida* (Phil.) Reiche, *Sisymbrium rubescens*

Phil., *Descurainia rubescens* (Phil.) Reiche, *Sisymbrium strictum* Phil., *Sisymbrium floridum* Phil., *Hesperis florida*

(Phil.) Kuntze, *Descurainia minutiflora* Prantl ex Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3200-4700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Kasawi.

## Diploaxis

### *Diploaxis muralis* (L.) DC.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, RME.

## Draba

### *Draba funiculosa* Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Draba gilliesii* Hook. & Arn.

Sinónimos: *Draba davilae* Phil., *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *davilae* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *rosulata* (Phil.) Reiche, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *stolonifera* (Barnéoud) Reiche, *Draba rosulata* Phil., *Draba stolonifera* Barnéoud, *Draba araucana* Phil., *Draba colchaguensis* Phil., *Draba gilliesii* Hook. & Arn. fma. *araucana* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *rosulata* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 400-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Draba macleanii* Hook.f.

Sinónimos: *Draba atacamensis* Gilg

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3900-4900 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### *Draba magellanica* Lam.

Sinónimos: *Draba magellanica* Lam. var. *saffordii* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba saffordii* Phil., *Draba incana* L. var. *magellanica* (Lam.) Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3400 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Draba pusilla* F. Phil.

Sinónimos: *Draba schoenleinii* F. Meigen

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, MAG.

Rango altitudinal: 500-3400 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Draba thlaspiiformis* (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Draba philippii* O.E. Schulz, *Eudema thlaspiiforme* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

### *Draba verna* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, BIO, AIS, MAG.

## Eruca

### *Eruca vesicaria* (L.) Cav. subsp. *sativa* (Mill.) Thell.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

### *Eruca vesicaria* (L.) Cav. subsp. *versicaria*

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

## Hesperis

### *Hesperis matronalis* L.

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: MAG.

## Hirschfeldia

### *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Fossat

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, JFE, IPA.

## Hollermayera

### *Hollermayera valdiviana* (Phil.) Ravenna

Sinónimos: *Hollermayera sylvatica* O.E. Schulz, *Armoracia valdiviana* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LLA.

Rango altitudinal: 600-700 m.

## Hornungia

### *Hornungia procumbens* (L.) Hayek

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, MAG.

## Isatis

### *Isatis tinctoria* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

## Ivania

### *Ivania cremnophila* (I.M. Johnst.) O.E. Schulz

Sinónimos: *Cardamine cremnophila* I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2700-3300 m.

Nombre vulgar: Hierba del gato.

***Ivania juncalensis*** Al-Shehbaz  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 2400-2600 m.

### **Lepidium**

***Lepidium angustissimum*** Phil.  
Sinónimos: *Lepidium tayloriae* Al-Shehbaz  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 1900-2400 m.

***Lepidium auriculatum*** Regel & Körn.  
Sinónimos: *Lepidium araucanum* Phil., *Lepidium bipinnatifidum* Desv. var. *araucanum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Lepidium bipinnatifidum*** Desv.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO, LLA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Mosquetón, picantilla.

***Lepidium bonariense*** L.  
Sinónimos: *Thlaspi multifidum* Poir., *Lepidium mendocinum* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, JFE, IPA.  
Rango altitudinal: 0-3300 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Hierba del tapón.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández y en la Isla de Pascua.

***Lepidium campestre*** (L.) W.T. Aiton  
Hierba. Anual. Introducida.  
Nota: Al-Shehbaz (2010) señala su presencia en Chile, sin mencionar región.

***Lepidium chichicara*** Desv.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-700 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Lepidium coronopus*** (L.) Al-Shehbaz  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: LLA.

***Lepidium cumingianum*** Fisch. & C.A. Mey.  
Sinónimos: *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *berteroanum* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *orbiculatum* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. var. *canescens* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. var. *subsagittatum* Thell.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR, VAL, RME, LBO, BIO.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Lepidium didymum*** L.  
Sinónimos: *Coronopus didymus* (L.) Sm., *Senebiera didyma* (L.) Pers.  
Hierba. Anual o bienal. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, IPA.  
Rango altitudinal: 0-2900 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nota: Introducida en la Isla de Pascua.

***Lepidium draba*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, AIS, MAG.

***Lepidium heterophyllum*** Benth.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ARA.

***Lepidium horstii*** Johow ex Skottsbo.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: IDE.  
Rango altitudinal: 300 m.

***Lepidium johnstonii*** C.L. Hitchc.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 700-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Lepidium latifolium*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ANT, COQ, MAU.

***Lepidium myrianthum*** Phil.  
Sinónimos: *Lepidium ruderales* L. var. *myrianthum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 200-3400 m.  
Países limítrofes: Argentina.



***Lepidium nitidum*** Nutt. ex Torr. & A. Gray  
Sinónimos: *Lepidium curicoanum* Phil., *Lepidium chilense* Kunze, *Lepidium bipinnatifidum* Desv. var. *curicoanum* (Phil.) Reiche, *Lepidium tenuifolium* Phil., *Lepidium bipinnatifidum* Desv. var. *tenuifolium* (Phil.) Reiche, *Lepidium tenuissimum* Steud.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Nota: Según Al-Shehbaz (2010), esta especie se distribuye en Chile y disyunto en California, Norte América.

***Lepidium philippianum*** (Kuntze) Thell.  
Sinónimos: *Nasturtium philippianum* Kuntze, *Lepidium philippianum* (Kuntze) Thell. var. *brachystylum* Thell., *Onuris reichei* Gilg & Muschl.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2400-3000 m.

***Lepidium pseudodidymum*** Thell. ex Druce  
Sinónimos: *Coronopus pinnatifidus* (DC.) Gaertn. var. *australis* (Hook.f.) Reiche  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Lepidium rahmeri*** Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, VAL.  
Rango altitudinal: 2600-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Kolka.

***Lepidium raimondii*** O.E. Schulz  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA.  
Rango altitudinal: 3000-4500 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Lepidium reichei*** Phil. ex Reiche  
Sinónimos: *Lepidium morrisonii* C.L. Hitchc., *Nasturtium brevicaule* (Barnéoud) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2500-3600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Lepidium sativum*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: BIO, ARA.

***Lepidium spathulatum*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-1600 m.

***Lepidium spicatum*** Desv.  
Sinónimos: *Lepidium spicatum* Desv. var. *calyx-persistente* Boelcke, *Lepidium spicatum* Desv. var. *racemosum* (Griseb.) Boelcke, *Lepidium racemosum* Griseb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Lepidium strictum*** (S. Watson) Rattan ex B.L. Rob.  
Sinónimos: *Lepidium oxycarpum* Torr. & A. Gray var. *strictum* S. Watson  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3800 m.

***Lepidium virginicum*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, IDE.

### **Lobularia**

***Lobularia maritima*** (L.)  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA.

### **Mancoa**

***Mancoa hispida*** Wedd.  
Sinónimos: *Mancoa minima* Rollins, *Radicula scabra* Rusby  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3400-4800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### **Mathewsia**

***Mathewsia auriculata*** Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: TAR, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 100-2700 m.

***Mathewsia foliosa*** Hook. & Arn.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Mathewsia incana*** Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Mathewsia linearifolia*** Turcz.  
Sinónimos: *Mathewsia collina* I.M. Johnst., *Mathewsia laciniata* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

### **Matthiola**

***Matthiola incana*** (L.) R.Br.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ANT, JFE.

### **Menonvillea**

***Menonvillea chilensis*** (Turcz.) B.D. Jacks.  
Sinónimos: *Menonvillea chilensis* (Turcz.) B.D. Jacks. var. *aptera* (Phil.) Rollins, *Menonvillea parviflora* Phil., *Menonvillea orbiculata* Phil. var. *parviflora* (Phil.) Reiche, *Menonvillea parvula* Phil., *Cymatoptera chilensis* Turcz., *Menonvillea aptera* Phil., *Menonvillea media* Turcz., *Menonvillea parviflora* Phil. var. *aptera* (Phil.) I.M. Johnst., *Menonvillea pinnatifida* Barnéoud var. *parvula* (Phil.) Gilg & Muschl., *Menonvillea orbiculata* Phil. fma. *glabra* Gilg & Muschl.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Menonvillea cicatricosa*** (Phil.) Rollins  
Sinónimos: *Hexaptera cicatricosa* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1800-2800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Menonvillea comberi*** Sandwith  
Sinónimos: *Menonvillea scapigera* (Phil.) Rollins subsp. *hirsuta* (Rollins) Prina, *Menonvillea hirsuta* Rollins  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ARA.  
Rango altitudinal: 1000-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Menonvillea constitutionis*** (F. Phil.) Rollins  
Sinónimos: *Hexaptera constitutionis* F. Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, MAU.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Menonvillea cuneata*** (Gillies & Hook.) Rollins  
Sinónimos: *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook., *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. var. *violacea* (Phil.) Reiche, *Hexaptera jussiaei* Barnéoud, *Hexaptera violacea* Phil., *Hexaptera jussiaei* Barnéoud var. *tridens* (Phil.) Reiche, *Hexaptera tridens* Phil., *Decaptera trifida* Turcz.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 1700-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Menonvillea filifolia*** Fisch. & C.A. Mey.  
Sinónimos: *Menonvillea linearis* DC. var. *filifolia* (Fisch. & C.A. Mey.) Rollins, *Menonvillea angustifolia* C. Presl  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.

***Menonvillea flexuosa*** Phil.  
Sinónimos: *Menonvillea crassa* Rollins, *Menonvillea falcata* Reiche, *Menonvillea flexuosa* Phil. fma. *tomentosa* Gilg & Muschl.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-3700 m.

***Menonvillea frigida*** (Phil.) Rollins  
Sinónimos: *Hexaptera frigida* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 3900-4700 m.

***Menonvillea linearis*** DC.  
Sinónimos: *Menonvillea robustula* Steud., *Menonvillea trifida* Phil., *Menonvillea linearis* DC. var. *trifida* (Phil.) Reiche, *Menonvillea virgata* Phil., *Menonvillea linearis* DC. var. *virgata* (Phil.) Reiche, *Dispeltophorus crassifolius* Lehm.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Menonvillea litoralis*** (Barnéoud) Rollins  
Sinónimos: *Menonvillea gayi* Phil., *Hexaptera litoralis* Barnéoud, *Menonvillea arachnoidea* O.E. Schulz  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 200-1100 m.

***Menonvillea macrocarpa*** (I.M. Johnst.) Rollins  
Sinónimos: *Hexaptera macrocarpa* I.M. Johnst.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA.

***Menonvillea marticorenae*** (Al-Shehbaz) Salariato & Al-Shehbaz

Sinónimos: *Menonvillea filifolia* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *marticorenae* Al-Shehbaz

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-900 m.

***Menonvillea minima*** Rollins

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Menonvillea nordenskjöldii*** (Dusén) Rollins

Sinónimos: *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. var. *nordenskjöldii* (Dusén) Gilg & Muschl., *Hexaptera nordenskjöldii* Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-2100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Menonvillea orbiculata*** Phil.

Sinónimos: *Menonvillea orbiculata* Phil. var. *perplexa* Rollins, *Menonvillea alata* Rollins

Hierba. Bienal. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Menonvillea pinnatifida*** Barnéoud

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 800-3000 m.

***Menonvillea purpurea*** (Hastings) Rollins

Sinónimos: *Hexaptera purpurea* Hastings, *Hexaptera linearis* Barnéoud

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

***Menonvillea rollinsii*** Al-Shehbaz & Martic.

Sinónimos: *Aimara rollinsii* (Al-Shehbaz & Martic.) Salariato & Al-Shehbaz

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2600-3400 m.

***Menonvillea scapigera*** (Phil.) Rollins subsp. *longipes* (Rollins) Prina

Sinónimos: *Menonvillea hookeri* Rollins, *Menonvillea perstylosa* Rollins, *Menonvillea longipes* Rollins, *Hexaptera pinnatifida* Gillies & Hook.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 1100-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Menonvillea spathulata*** (Gillies & Hook.) Rollins

Sinónimos: *Hexaptera pusilla* Phil., *Hexaptera spathulata* Gillies & Hook., *Hexaptera spathulata* Gillies & Hook. subsp. *pusilla* (Phil.) Gilg & Muschl., *Hexaptera spathulata* Gillies & Hook. var. *pusilla* (Phil.) Reiche, *Hexaptera cuneata* (Gillies & Hook.) Rollins var. *edentata* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 2200-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Menonvillea virens*** (Phil.) Rollins

Sinónimos: *Hexaptera virens* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

## **Mostacillastrum**

***Mostacillastrum andinum*** (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium corymbosum* Phil., *Sisymbrium corymbosum* Phil. var. *consanguineum* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz, *Hesperis andina* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium andinum* Phil. fma. *dolichocarpum* Hauman, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *latifolium* Phil., *Sisymbrium andinum* Phil. var. *morenoanum* (Chodat & Wilczek) O.E. Schulz, *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *andinum* (Phil.) Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *latifolium* (Phil.) Speg., *Sisymbrium andinum* Phil., *Sisymbrium amplexicaule* Phil. var. *corymbosum* (Phil.) Reiche, *Hesperis corymbosa* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium consanguineum* Phil. ex Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 1800-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mostacillastrum commune*** (Speg.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium sagittatum* var. *commune* Speg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 100-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mostacillastrum dianthoides*** (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium dianthoides* Phil., *Sisymbrium arequipanum* Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3200-4400 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Mostacillastrum ferreyrae*** (Förther & Weigend) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium ferreyrae* Förther & Weigend

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 300-1000 m.

Países limítrofes: Perú.

***Mostacillastrum gracile*** (Wedd.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Heterothrix gracilis* (Wedd.) O.E. Schulz, *Pennellia gracilis* (Wedd.) O.E. Schulz, *Sisymbrium gracile* Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.

Rango altitudinal: 1800-3900 m.

Países limítrofes: Perú.

***Mostacillastrum leptocarpum*** (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium andinum* Phil. var. *hastatum* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *juncalense* O.E. Schulz, *Hesperis leptocarpa* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium hastatum* Phil., *Sisymbrium leptocarpum* Hook. & Arn., *Sisymbrium gayanum* Barnéoud, *Nasturtium hastatum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1800-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mostacillastrum pectinifolium*** (Al-Shehbaz) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium pectinifolium* Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2300-3800 m.

Países limítrofes: Perú.

***Mostacillastrum sagittatum*** (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *ciliatum* (Phil.) Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn., *Hesperis sagittata* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Sophia sagittata* (Hook. & Arn.) Macloskie, *Sisymbrium ciliatum* Phil., *Sisymbrium fruticosum* Reiche, *Sisymbrium volckmannii* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 100-3700 m.

## **Nasturtium**

***Nasturtium microphyllum*** Boenn. ex Rchb.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, LBO.

***Nasturtium officinale*** R. Br.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

## **Neuontobotrys**

***Neuontobotrys berningeri*** O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

***Neuontobotrys elloanensis*** Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 3500 m.

***Neuontobotrys grayana*** (Baehni & J.F. Macbr.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium grayanum* Baehni & J.F. Macbr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2600-3300 m.

Países limítrofes: Perú.

***Neuontobotrys intricatissima*** (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Draba intricatissima* Phil., *Sisymbrium intricatissimum* (Phil.) Reiche, *Hesperis intricatissima* (Phil.) Kuntze, *Eremodraba intricatissima* (Phil.) O.E. Schulz

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 1400-2900 m.

Países limítrofes: Perú.

***Neuontobotrys lanata*** (Walp.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium lanatum* (Walp.) O.E. Schulz, *Sisymbrium foliosum* Phil., nom. illeg., *Sisymbrium pubescens* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz var. *glabrescens* O.E. Schulz, *Sisymbrium pubescens* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz, *Sisymbrium dommarosae* Martic., *Hesperis foliosa* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *pubescens* Phil. ex Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 2400-4100 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Chuchar.

***Neuontobotrys linearifolia*** (Kuntze) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Neuontobotrys linifolia* O.E. Schulz, *Hesperis linearifolia* Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ATA.

Rango altitudinal: 100-3800 m.



***Neuontobotrys mendocina*** (Romanczuk) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium mendocinum* Romanczuk

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2200-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Neuontobotrys polyphylla*** (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium polyphyllum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 3500-4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Neuontobotrys tarapacana*** (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium philippianum* I.M. Johnst.,

*Sisymbrium tarapacanicum* Phil., *Cardamine deserticola*

Phil., *Neuontobotrys deserticola* (Phil.) Al-Shehbaz, *Arabis tarapacana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1700-4600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: kamatokamata.

**Noccaea**

***Noccaea magellanica*** (Comm. ex Poir.) Holub

Sinónimos: *Thlaspi alpestre* L. var. *gracile* (Phil.) Gilg

& Muschl., *Thlaspi andicola* Hook. & Arn., *Thlaspi*

*glaucophyllum* Barnéoud, *Thlaspi gracile* Phil., *Thlaspi*

*magellanicum* Comm. ex Poir. var. *andicola* (Hook. & Arn.)

O.E. Schulz, *Thlaspi magellanicum* Comm. ex Poir., *Draba*

*depilis* Phil., *Thlaspi exile* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

**Onuris**

***Onuris alismatifolia*** Gilg ex Skottsbl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 500-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Onuris graminifolia*** Phil.

Sinónimos: *Onuris oligosperma* (Speg.) Gilg & Muschl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 1100-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Onuris hatcheriana*** (Gilg ex Macloskie) Gilg & Muschl.

Sinónimos: *Draba hatcheriana* Gilg ex Macloskie

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 900-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Onuris papillosa*** O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 100-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Onuris spgazziniana*** Gilg & Muschl.

Sinónimos: *Draba graminifolia* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 600-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

**Pennellia**

***Pennellia lechleri*** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Sinónimos: *Stenodraba lechleri* (E. Fourn.) Ravenna,

*Pennellia petraea* (Kuntze) O.E. Schulz, *Sisymbrium*

*petraeum* Phil., nom. illeg., *Stenodraba glareosa* Ravenna,

*Heterothrix petraea* (Kuntze) O.E. Schulz, *Sisymbrium*

*caespitosum* Phil., *Sisymbrium fastigiatum* Phil., *Stenodraba*

*fastigiata* (Phil.) Ravenna, *Sisymbrium lechleri* E. Fourn.,

*Weberbaueria lechleri* (E. Fourn.) Al-Shehbaz, *Hesperis*

*lechleri* (E. Fourn.) Kuntze, *Hesperis petraea* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, NUB, ARA.

Rango altitudinal: 300-2100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Pennellia parvifolia*** (Phil.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Sinónimos: *Sisymbrium parvifolium* Phil., *Sisymbrium*

*vestitum* (Ravenna) Al-Shehbaz, *Stenodraba parvifolia*

(Phil.) O.E. Schulz, *Stenodraba vestita* Ravenna,

*Weberbaueria parvifolia* (Phil.) Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

**Petroravenia**

***Petroravenia friesii*** (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Eudema friesii* O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2800-5000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.



***Petroravenia werdermannii*** (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Eudema werdermannii* O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3800-4700 m.

Países limítrofes: Argentina.

**Polypsecadium**

***Polypsecadium litorale*** (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium litorale* Phil., *Sisymbrium litorale*

Phil. var. *virgatum* O.E. Schulz, *Hesperis litoralis* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Polypsecadium magellanicum*** (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Brassica antarctica* Molina, *Brassica magellanica*

Juss. ex Pers., *Sisymbrium magellanicum* (Juss. ex Pers.) Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Polypsecadium zoellneri*** Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

**Raphanus**

***Raphanus raphanistrum*** L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,

NUB, BIO, ARA, LLA.

***Raphanus sativus*** L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,

NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

**Rapistrum**

***Rapistrum rugosum*** (L.) All.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,

BIO, ARA, LRI, IPA.

**Rorippa**

***Rorippa austroamericana*** Mart.-Laborde

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LLA.

Rango altitudinal: 2000-4300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Rorippa bonariensis*** (Poir.) Macloskie

Sinónimos: *Nasturtium bonariense* (Poir.) DC., *Sisymbrium*

*bonariense* Poir., *Cardamine indica* (L.) Kuntze var.

*bonariensis* (Poir.) Kuntze, *Nasturtium indicum* (L.) DC.

subsp. *bonariense* (Poir.) Kuntze & Muschl., *Nasturtium tweediei* O.E. Schulz, *Nasturtium macrorrhizum* Steud.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Rorippa coxii*** (F. Phil. ex Phil.) L.E. Navas

Sinónimos: *Nasturtium coxi* F. Phil. ex Phil., *Sisymbrium lacinosum* Phil., *Nasturtium patens* Phil., *Turritis chilensis*

Phil. ex Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, ARA.

Rango altitudinal: 100-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Rorippa mandonii*** (E. Fourn.) Mart.-Laborde

Sinónimos: *Sisymbrium mandonii* E. Fourn., *Diploaxis*

*vernalis* Phil., *Hesperis mandonii* (E. Fourn.) Kuntze, *Nasturtium eggersii* O.E. Schulz

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 100-3000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Rorippa palustris*** (L.) Besser

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

***Rorippa philippiana*** Macloskie

Sinónimos: *Nasturtium bonariense* (Poir.) DC. var. *micranthum* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2900 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Rorippa sarmentosa*** (Sol. ex G. Forst.) J.F. Macbr.

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

***Rorippa sylvestris*** (L.) Besser

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

## Sarcodraba

***Sarcodraba dusenii*** (O.E. Schulz) Al-Shehbaz  
Sinónimos: *Grammosperma dusenii* O.E. Schulz  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## Schizopetalon

***Schizopetalon arcuatum*** Al-Shehbaz  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 200-400 m.

***Schizopetalon bipinnatifidum*** Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 300-2400 m.

***Schizopetalon biseriatum*** Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-600 m.

***Schizopetalon brachycarpum*** Al-Shehbaz  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2100-2300 m.

***Schizopetalon corymbosum*** Al-Shehbaz  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.

***Schizopetalon dentatum*** (Barnéoud) Gilg & Muschl.  
Sinónimos: *Diploaxis chilensis* Barnéoud, *Perreymondia dentata* Barnéoud, *Perreymondia multifida* Barnéoud, *Perreymondia viridis* Phil., *Schizopetalon viride* (Phil.) Reiche  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 600-2300 m.

***Schizopetalon maritimum*** Barnéoud  
Sinónimos: *Schizopetalon gayanum* Barnéoud  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Schizopetalon rupestre*** (Barnéoud) Reiche  
Sinónimos: *Perreymondia rupestris* Barnéoud, *Perreymondia brongniartii* Barnéoud, *Schizopetalon brongniartii* (Barnéoud) Reiche, *Schizopetalon walkeri* Sims

var. *brongniartii* (Barnéoud) Gilg & Muschl., *Schizopetalon san-romanii* Phil., *Schizopetalon dentatum* (Barnéoud) Gilg & Muschl. var. *san-romanii* (Phil.) Gilg & Muschl.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 1900-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Schizopetalon tenuifolium*** Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Schizopetalon walkeri*** Sims  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.

## Sibara

***Sibara anethifolia*** (Phil.) Al-Shehbaz  
Sinónimos: *Werdermannia anethifolia* (Phil.) I.M. Johnst., *Nasturtium anethifolium* Phil., *Heterothrix anethifolia* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium carnosulum* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Sibara dilloniorum*** Al-Shehbaz  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Sibara macrostachya*** (Phil.) Al-Shehbaz  
Sinónimos: *Sisymbrium macrostachyum* Phil., *Werdermannia macrostachya* (Phil.) O.E. Schulz, *Nasturtium macrostachyum* Phil., *Sisymbrium pectinatum* Reiche, *Sisymbrium larranagae* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Sibara pinnata*** (Barnéoud) Al-Shehbaz  
Sinónimos: *Werdermannia pinnata* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Sisymbrium pinnatum* Barnéoud, *Sisymbrium pinnatum* Barnéoud var. *pubescens* Barnéoud, *Nasturtium deserticola* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 2800 m.

### **Sinapis**

*Sinapis arvensis* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ.

### **Sisymbrium**

*Sisymbrium altissimum* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: BIO.

*Sisymbrium austriacum* Jacq.  
Hierba. Bienal. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, ARA, LLA.

*Sisymbrium irio* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, ANT, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, MAG.

*Sisymbrium officinale* (L.) Scop.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

*Sisymbrium orientale* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG.

### **Teesdalia**

*Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: MAG.

### **Thlaspi**

*Thlaspi arvense* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, MAG.

### **Tomostima**

*Tomostima australis* (R. Br.) Al-Shehbaz, M. Koch & Jordon-Thaden  
Sinónimos: *Draba australis* R. Br.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Tropidocarpum**

*Tropidocarpum lanatum* (Barnéoud) Al-Shehbaz & R.A. Price  
Sinónimos: *Agallis montana* Phil., *Agallis lanata* (Barnéoud) Gilg & Muschl. ex O.E. Schulz, *Lepidium lanatum* Barnéoud  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 200-900 m.

### **Weberbaueria**

*Weberbaueria chillanensis* (Phil.) Al-Shehbaz  
Sinónimos: *Draba chillanensis* Phil., *Stenodraba chillanensis* (Phil.) O.E. Schulz  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 2000-2900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Weberbaueria colchaguensis* (Barnéoud) Al-Shehbaz  
Sinónimos: *Cardamine colchaguensis* Barnéoud, *Draba andina* Phil., *Draba patagonica* Phil., *Sisymbrium colchaguensis* (Barnéoud) Wedd. ex E. Fourn., *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz, *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz var. *hirticaulis* O.E. Schulz, *Stenodraba colchaguensis* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Stenodraba patagonica* (Phil.) Ravenna, *Arabis drabaeformis* Schtdl., *Arabis colchaguensis* (Barnéoud) Turcz., *Hesperis colchaguensis* (Barnéoud) Kuntze, *Braya pusilla* A. Gray, *Hesperis pusilla* (A. Gray) Kuntze, *Weberbaueria pusilla* (A. Gray) O.E. Schulz  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 500-3700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Weberbaueria imbricatifolia* (Barnéoud) Al-Shehbaz  
Sinónimos: *Draba imbricatifolia* Barnéoud, *Sisymbrium imbricatifolium* (Barnéoud) Wedd., *Hesperis imbricatifolia* (Barnéoud) Kuntze, *Stenodraba imbricatifolia* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Stenodraba imbricatifolia* (Barnéoud) O.E. Schulz var. *glabrata* O.E. Schulz, *Braya imbricatifolia* (Barnéoud) A. Gray  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 2800-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Weberbaueria lagunae* (O.E. Schulz) Al-Shehbaz  
Sinónimos: *Stenodraba suffruticosa* (Barnéoud) O.E. Schulz var. *lagunae* O.E. Schulz  
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 3800-4000 m.

**Weberbaueria stenophylla** (Leyb.) Al-Shehbaz  
Sinónimos: *Draba stenophylla* Leyb., *Draba cauquensis* Phil., *Draba leyboldii* Phil., *Stenodraba stenophylla* (Leyb.) O.E. Schulz, *Stenodraba stenophylla* (Leyb.) O.E. Schulz var. *leyboldii* (Phil.) O.E. Schulz  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, MAU.  
Rango altitudinal: 2000-4000 m.

**Weberbaueria suffruticosa** (Barnéoud) Al-Shehbaz  
Sinónimos: *Draba suffruticosa* Barnéoud, *Sisymbrium suffruticosum* (Barnéoud) E. Fourn., *Hesperis suffruticosa* (Barnéoud) Kuntze, *Stenodraba suffruticosa* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Draba imbricatifolia* Barnéoud var. *suffruticosa* (Barnéoud) Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 3300-4100 m.

### Xerodraba

**Xerodraba lycopodioides** (Speg.) Skottsbb.  
Sinónimos: *Xerodraba pectinata* (Speg.) Skottsbb., *Eudema lycopodioides* (Speg.) Gilg & Muschl., *Eudema pectinata* (Speg.) Gilg & Muschl.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-1400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Xerodraba patagonica** (Speg.) Skottsbb.  
Sinónimos: *Braya patagonica* Speg., *Eudema patagonica* (Speg.) Gilg & Muschl., *Draba monantha* Gilg ex Kuntze var. *microphylla* Gilg, nom. nud.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-1100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## CACTACEAE

### Austrocactus

**Austrocactus patagonicus** (F.A.C. Weber) Backeb.  
Sinónimos: *Cereus patagonicus* F.A.C. Weber, *Echinocactus intertextus* Phil.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ARA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Austrocactus philippii** (Regel & E. Schmidt) Buxb.  
Sinónimos: *Austrocactus hibernus* F. Ritter, *Erdisia philippii* (Regel & E. Schmidt) Britton & Rose, *Cereus philippi* Regel & Schmidt, *Echinocactus philippii* (Regel & E. Schmidt) K. Schum., *Echinopsis philippii* (Regel & E. Schmidt) G. Nicholson  
Subarbusto suculento. Nativo.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Austrocactus spiniflorus** (Phil.) F. Ritter  
Sinónimos: *Erdisia spiniflora* (Phil.) Britton & Rose, *Opuntia spiniflora* Phil., *Corryocactus spiniflorus* (Phil.) Hutchison, *Opuntia bicolor* Phil., *Opuntia clavata* Phil., *Cereus hypogaeus* F.A.C. Weber ex Regel, *Echinocereus hypogaeus* Rümpler, *Eulychnia clavata* Phil., *Echinocereus clavata* K. Schum.  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: RME, LBO.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

### Browningia

**Browningia candelaris** (Meyen) Britton & Rose  
Sinónimos: *Cereus candelaris* Meyen, *Cactus candelaris* (Meyen) Meyen  
Árbol suculento. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2000-3000 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Candelabro, cardón, sabaya.

### Copiapoa

**Copiapoa ahremephiana** N.P. Taylor & G.J. Charles  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

**Copiapoa boliviana** (Pfeiff.) F. Ritter  
Sinónimos: *Copiapoa atacamensis* Middled., *Echinocactus bolivianus* Pfeiff., *Copiapoa calderana* F. Ritter subsp. *atacamensis* (Middled.) D.R. Hunt  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

**Copiapoa calderana** F. Ritter  
Sinónimos: *Copiapoa atacamensis* Middled. var. *calderana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa calderana* F. Ritter var. *spiniosior* F. Ritter, *Copiapoa lembckeii* Backeb., nom. illeg.  
Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Copiapoa cinerascens*** (Salm-Dyck) Britton & Rose  
Sinónimos: *Copiapoa applanata* Backeb., nom. illeg.,  
*Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var.  
*intermedia* F. Ritter, *Echinocactus cinerascens* Salm-Dyck,  
*Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var.  
*appplanata* F. Ritter, *Echinocactus ambiguus* Hildm. ex K.  
Schum.

Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Copiapoa cinerea*** (Phil.) Britton & Rose var. ***cinerea***  
Sinónimos: *Copiapoa tenebrosa* F. Ritter, *Copiapoa cinerea*  
(Phil.) Britton & Rose var. *tenebrosa* (F. Ritter) A.E. Hoffm.,  
*Echinocactus cinereus* Phil.

Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Copiapoa cinerea*** (Phil.) Britton & Rose var. ***columna-***  
***alba*** (F. Ritter) Backeb.

Sinónimos: *Copiapoa columna-alba* F. Ritter var. *nuda*  
F. Ritter, *Copiapoa columna-alba* F. Ritter, *Copiapoa*  
*melanohystrix* F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Copiapoa cinerea*** (Phil.) Britton & Rose var. ***gigantea***  
(Backeb.) N.P. Taylor

Sinónimos: *Copiapoa gigantea* Backeb. var. *haseltoniana*  
(Backeb.) F. Ritter, *Copiapoa gigantea* Backeb., *Copiapoa*  
*haseltoniana* Backeb., *Copiapoa albispina* Backeb.,  
nom. nud., *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var.  
*haseltoniana* (Backeb.) N.P. Taylor

Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 700-1000 m.

***Copiapoa coquimbana*** (Rümppler) Britton & Rose var.  
***coquimbana***

Sinónimos: *Copiapoa alticostata* F. Ritter, *Copiapoa*  
*coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *alticostata*  
(F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümppler)  
Britton & Rose var. *armata* F. Ritter, *Copiapoa coquimbana*  
(Rümppler) Britton & Rose var. *pendulina* (F. Ritter) A.E.  
Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose  
var. *pseudocoquimbana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa*  
*coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *vallenarensis*  
(F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümppler)

Britton & Rose var. *wagenknechtii* F. Ritter, *Copiapoa*  
*pendulina* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter,  
*Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter var. *chaniarensis*  
F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter var.  
*domeykoensis* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F.  
Ritter var. *vulgata* F. Ritter, *Copiapoa vallenarensis* F. Ritter,  
*Copiapoa serenana* Voldan, *Echinocactus coquimbanus*  
Rümppler, *Copiapoa wagenknechtii* F. Ritter  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Copiapoa coquimbana*** (Rümppler) Britton & Rose var.  
***fiedleriana*** (K. Schum.) A.E. Hoffm.

Sinónimos: *Copiapoa fiedleriana* (K. Schum.) Backeb.,  
*Copiapoa pepiniana* (K. Schum.) Backeb. var. *fiedleriana*  
Backeb., *Echinocactus fiedlerianum* K. Schum.

Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Copiapoa dealbata*** F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa carrizalensis* F. Ritter, *Copiapoa*  
*carrizalensis* F. Ritter var. *gigantea* F. Ritter, *Copiapoa*  
*dealbata* F. Ritter var. *carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.,  
*Copiapoa dealbata* F. Ritter fma. *gigantea* (F. Ritter) A.E.  
Hoffm., *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var.  
*dealbata* (F. Ritter) Backeb.  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Copiapoa decorticans*** N.P. Taylor & G.J. Charles

Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Copiapoa echinata*** F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa echinata* F. Ritter fma. *pulla* F. Ritter,  
*Copiapoa echinata* F. Ritter var. *borealis* F. Ritter, *Copiapoa*  
*megarhiza* Britton & Rose var. *echinata* (F. Ritter) A.E.  
Hoffm., *Copiapoa totoralensis* F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Copiapoa echinoides*** (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose

Sinónimos: *Copiapoa cuprea* F. Ritter, *Copiapoa dura* F.  
Ritter, *Copiapoa echinoides* (Lem. ex Salm-Dyck) Britton  
& Rose var. *cuprea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Echinocactus*  
*echinoides* Lem. ex Salm-Dyck  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.



***Copiapoa eremophila*** F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *eremophila* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose fma. *albispina* F. Ritter  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 400-1000 m.

***Copiapoa grandiflora*** F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *grandiflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm.  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.

***Copiapoa humilis*** (Phil.) Hutchison var. ***esmeraldana*** (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Sinónimos: *Copiapoa esmeraldana* F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 200-500 m.

***Copiapoa humilis*** (Phil.) Hutchison var. ***humilis***

Sinónimos: *Copiapoa humilis* (Phil.) Hutchison var. *paposoensis* (F. Ritter) A. Hoffm., nom. illeg., *Copiapoa paposoensis* F. Ritter, nom. illeg., *Echinocactus humilis* Phil.  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 200-1000 m.

***Copiapoa humilis*** (Phil.) Hutchison var. ***longispina*** (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Sinónimos: *Copiapoa longispina* F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.

***Copiapoa humilis*** (Phil.) Hutchison var. ***taltalensis*** (Werderm.) A.E. Hoffm.

Sinónimos: *Copiapoa chanialensis* F. Ritter, *Copiapoa taltalensis* (Werderm.) Looser, *Echinocactus taltalensis* Werderm.  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.

***Copiapoa humilis*** (Phil.) Hutchison var. ***tenuissima*** (F. Ritter) G. Charles

Sinónimos: *Copiapoa tenuissima* F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 600-800 m.

***Copiapoa humilis*** (Phil.) Hutchison var. ***tocopillana*** (F. Ritter) G. Charles

Sinónimos: *Copiapoa tocopillana* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT.

***Copiapoa humilis*** (Phil.) Hutchison var. ***varispinata*** (F. Ritter) G. Charles

Sinónimos: *Copiapoa varispinata* F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.

***Copiapoa hypogaea*** F. Ritter var. ***hypogaea***

Sinónimos: *Copiapoa hypogaea* F. Ritter var. *barquitensis* F. Ritter, *Copiapoa mollicula* F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 400-500 m.

***Copiapoa hypogaea*** F. Ritter var. ***montana*** (F. Ritter) G. Charles

Sinónimos: *Copiapoa olivana* F. Ritter, *Copiapoa montana* F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.

***Copiapoa krainziana*** F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa krainziana* F. Ritter var. *scopulina* F. Ritter, *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *krainziana* (F. Ritter) Slaba  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 300-900 m.

***Copiapoa laui*** L. Diers

Sinónimos: *Copiapoa hypogaea* F. Ritter var. *laui* (L. Diers) A. Hoffm.  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 100-700 m.

***Copiapoa longistaminea*** F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *longistaminea* (F. Ritter) Slaba  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Copiapoa marginata*** (Salm-Dyck) Britton & Rose var. ***bridgesii*** (Pfeiff.) A.E. Hoffm.

Sinónimos: *Echinocactus bridgesii* Pfeiff., *Copiapoa bridgesii* (Pfeiff.) Backeb.  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 200-700 m.

***Copiapoa marginata*** (Salm-Dyck) Britton & Rose var. ***marginata***

Sinónimos: *Echinocactus marginatus* Salm-Dyck, *Echinocactus columnaris* Pfeiff., *Echinocactus streptocaulon* Hook., *Copiapoa streptocaulon* (Hook.) Oosten  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

***Copiapoa megarhiza*** Britton & Rose

Sinónimos: *Copiapoa megarhiza* Britton & Rose var. *microrhiza* F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 200-800 m.

***Copiapoa rarissima*** F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.

***Copiapoa rupestris*** F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *hornilloensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *rupestris* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa desertorum* F. Ritter, *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *rubriflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa hornilloensis* F. Ritter, *Copiapoa rubriflora* F. Ritter  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Copiapoa serpentisulcata*** F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa serpentisulcata* F. Ritter var. *castanea* F. Ritter  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Copiapoa solaris*** (F. Ritter) F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa conglomerata* (Phil.) Lembcke, *Copiapoa ferox* Lembcke & Backeb., nom. illeg., *Echinocactus conglomeratus* Phil., *Pilocopiapoa solaris* F. Ritter  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

**Corryocactus**

***Corryocactus brevistylus*** (K. Schum. ex Vaupel) Britton & Rose

Sinónimos: *Corryocactus krausii* Backeb., *Cereus brevistylus* K. Schum.  
Arbusto suculento. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2000-3500 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Guacalla.

**Cumulopuntia**

***Cumulopuntia dactylifera*** (Vaupel) E.F. Anderson

Sinónimos: *Cumulopuntia pentlandii* (Salm-Dyck) F. Ritter var. *dactylifera* (Vaupel) F. Ritter, *Opuntia dactylifera* Vaupel

Subarbusto suculento. Nativo.

Distribución: ANT.

Países limítrofes: Perú.

***Cumulopuntia echinacea*** (Ritter) Ritter

Sinónimos: *Tephrocactus echinaceus* F. Ritter, *Opuntia echinacea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Cumulopuntia boliviana* (Salm-Dyck) F. Ritter subsp. *echinacea* (F. Ritter) D.R. Hunt, *Maihueniopsis boliviana* (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. *echinacea* (Ritter) Faúndez & R. Kiesling  
Arbusto suculento. Nativo.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2600-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

***Cumulopuntia ignescens*** (Vaup.) Ritter

Sinónimos: *Tephrocactus ignescens* (Vaupel) Backeb., *Opuntia ignescens* Vaupel, *Cumulopuntia boliviana* (Salm-Dyck) F. Ritter subsp. *ignescens* (Vaupel) D.R. Hunt, *Maihueniopsis boliviana* (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. *ignescens* (Vaup.) Faúndez & R. Kiesling  
Arbusto suculento. Nativo.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3300-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Piskayu.

***Cumulopuntia sphaerica*** (C.F. Först.) E.F. Anderson

Sinónimos: *Opuntia leucophaea* Phil., *Cumulopuntia tubercularis* F. Ritter, *Opuntia sphaerica* C.F. Först., *Echinocactus berteri* auct. non (Colla) Gay  
Subarbusto suculento. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Jalajala, puskeye.

**Cylindropuntia**

***Cylindropuntia tunicata*** (Lehm.) F.M. Knuth

Arbusto suculento. Introducido.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

## Echinopsis

**Echinopsis atacamensis** (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley  
Sinónimos: *Cereus atacamensis* Phil., *Trichocereus atacamensis* (Phil.) Beckeb., *Helianthocereus atacamensis* (Phil.) Backeb.

Árbol suculento. Nativo.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 2000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Pasakana.

**Echinopsis chiloensis** (Colla) Friedrich & G.D. Rowley  
subsp. **chiloensis**

Sinónimos: *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *australis* F. Ritter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *borealis* F. Ritter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *conjungens* F. Ritter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *eburneus* F. Ritter, nom. illeg., *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *panhoplites* (K. Schum.) F. Ritter, nom. illeg., *Cactus chiloensis* Colla, *Cereus chiloensis* (Colla) DC., *Cereus quisco* J. Remy ex Gay

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

**Echinopsis chiloensis** (Colla) Friedrich & G.D. Rowley  
subsp. **litoralis** (Johow) Lowry

Sinónimos: *Echinopsis litoralis* (Johow) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose subsp. *litoralis* (Johow) Lowry, *Cereus litoralis* Johow, *Trichocereus litoralis* (Johow) Looser, *Echinopsis bolligeriana* Mächler & H.E. Walter

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-200 m.

**Echinopsis coquimbana** (Molina) Friedrich & G.D. Rowley  
Sinónimos: *Trichocereus coquimbana* (Molina) Britton & Rose, *Cactus coquimbanus* Molina, *Cereus coquimbanus* (Molina) K. Schum.

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

**Echinopsis deserticola** (Werderm.) Friedrich & G.D. Rowley

Sinónimos: *Echinopsis deserticola* (Werderm.) Friedrich & G.D. Rowley var. *fulvilana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Echinopsis spinibarbis* (Pfeiff.) A.E. Hoffm., *Trichocereus deserticola* (Werderm.) Looser, *Trichocereus fulvilanus* F. Ritter, *Eulychnia spinibarbis* (Pfeiff.) Britton & Rose,

*Cereus deserticola* Werderm., *Trichocereus spinibarbis* (Pfeiff.) F. Ritter, *Cereus spinibarbis* Pfeiff.

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 400-800 m.

**Echinopsis ferox** (Britton & Rose) Backeb.

Sinónimos: *Lobivia ferox* Britton & Rose, *Pseudolobivia ferox* (Britton & Rose) Backeb.

Subarbusto suculento. Nativo.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**Echinopsis formosa** (Pfeiff.) Jacobi ex Salm-Dyck

Sinónimos: *Echinocactus formosa* Pfeiff., *Acanthocalycium formosum* (Pfeiff.) Backeb., *Soehrencia formosa* (Pfeiff.) Backeb., *Trichocereus formosus* (Pfeiff.) F. Ritter, *Lobivia longispina* Britton & Rose

Arbusto suculento. Nativo.

Distribución: ANT.

Países limítrofes: Argentina.

**Echinopsis glauca** (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley  
fma. **pendens** (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley

Sinónimos: *Trichocereus glaucus* F. Ritter fma. *pendens* F. Ritter

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 400-600 m.

**Echinopsis nigripilis** (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley

Sinónimos: *Cereus nigripilis* Phil., *Trichocereus nigripilis* (Phil.) Baker, *Trichocereus coquimbanus* (Molina) Britton & Rose var. *nigripilis* (Phil.) Borg

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

**Echinopsis skottsbergii** (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley

Sinónimos: *Trichocereus skottsbergii* Backeb.

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

## Eriosyce

**Eriosyce aspillagae** (Söhrens) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus aspillagae* (Söhrens) F. Ritter, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *aspillagae* (Söhrens) A.E. Hoffm., *Neoporteria aspillagae* (Söhrens) Backeb., *Echinocactus aspillagae* Söhrens, *Eriosyce aspillagae* (Söhrens) Katt. subsp. *maechleri* H.E. Walter

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Eriosyce aurata*** (Pfeiff.) Backeb. var. ***aurata***

Sinónimos: *Eriosyce algarrobensis* F. Ritter, *Eriosyce ceratistes* Britton & Rose, *Eriosyce ihotzkyana* F. Ritter var. *ausseliana* (F. Ritter) F. Ritter, *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *algarrobensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *mollensis* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *vallenarensis* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Echinocactus auratus* Pfeiff., *Echinocactus ceratistes* Otto ex Pfeiff., *Echinocactus sandillon* Gay  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

***Eriosyce aurata*** (Pfeiff.) Backeb. var. ***spinibarbis*** (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Eriosyce spinibarbis* F. Ritter  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 2000-2500 m.

***Eriosyce caligophila*** R. Pinto

Sinónimos: *Islaya caligophila* (R. Pinto) Faúndez & R. Kiesling  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 600-700 m.

***Eriosyce chilensis*** (Hildm. ex K. Schum.) Katt. var. ***albidiflorus*** (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Katt. var. *albidiflorus* F. Ritter  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Eriosyce chilensis*** (Hildm. ex K. Schum.) Katt. var. ***chilensis***

Sinónimos: *Pyrrhocactus chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) F. Ritter, *Pyrrhocactus krausii* F. Ritter, *Neoporteria chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Britton & Rose, *Echinocactus chilensis* Hildm. ex K. Schum., *Neochilenia chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Backeb.  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Eriosyce confinis*** (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus confinis* F. Ritter, *Neoporteria confinis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria*

*kunzei* (C.F. Först.) Backeb. var. *confinis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neochilenia confinis* (F. Ritter) Backeb.  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Eriosyce crispa*** (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus crispus* F. Ritter, *Neoporteria crispa* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *crispa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Horridocactus crispus* (F. Ritter) Backeb.  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Eriosyce curvispina*** (Bertero ex Colla) Katt. subsp. ***curvispina***

Sinónimos: *Pyrrhocactus curvispinus* (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb., *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *descendens* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *mollensis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *robustus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus coliguayensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus grandiflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *aconcaguensis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *orientalis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus limariensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus lissocarpus* F. Ritter, *Pyrrhocactus pamaensis* F. Ritter, *Neoporteria choapensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *coliguayensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *limariensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria litoralis* F. Ritter, *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *aconcaguensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *choapensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce limariensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt. var. *gracilis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt. var. *lissocarpa* (F. Ritter) Katt., *Cactus curvispinus* Bertero ex Colla, *Horridocactus curvispinus* (Bertero ex Colla) Backeb., *Pyrrhocactus choapensis* F. Ritter, *Horridocactus choapensis* (F. Ritter) Backeb., *Pyrrhocactus aconcaguensis* F. Ritter, *Horridocactus aconcaguensis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *aconcaguensis* (F. Ritter) & *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *limariensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H., *Pyrrhocactus lissocarpus* F. Ritter var. *gracilis* F. Ritter  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 200-2000 m.



***Eriosyce curvispina*** (Bertero ex Colla) Katt. subsp. ***curvispina*** var. ***tuberisulcata*** (Jacobi) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus tuberisulcatus* (Jacobi) A. Berger, *Pyrrhocactus armatus* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* Backeb., nom. illeg., *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. fma. *vegasanus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *mutabilis* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *robustus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus odoriflorus* F. Ritter, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *armata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *odoriflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria tuberisulcata* (Jacobi) Donald & G.D. Rowley, *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *armata* (F. Ritter) Katt., *Echinocactus tuberisulcatus* Jacobi, *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *robusta* (F. Ritter) Katt., *Cactus horridus* Bertero ex Colla, nom. illeg., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *mutabilis* (F. Ritter) Katt., *Pyrrhocactus robustus* F. Ritter, *Echinocactus horridus* (Bertero ex Colla) J. Remy ex Gay

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Eriosyce curvispina*** (Bertero ex Colla) Katt. subsp. ***marksiana*** (Ritter) R. Ferryman

Sinónimos: *Pyrrhocactus marksianus* F. Ritter, *Pyrrhocactus marksianus* F. Ritter var. *tunensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus truncatipetalus* F. Ritter, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *lissocarpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *marksiana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria marksiana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt.

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 200-500 m.

***Eriosyce engleri*** (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus engleri* (F. Ritter) F. Ritter, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *engleri* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria engleri* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Horridocactus engleri* F. Ritter

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 1900 m.

***Eriosyce eriosyzoides*** (F. Ritter) Ferryman

Sinónimos: *Pyrrhocactus eriosyzoides* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus atroviridis* F. Ritter, *Pyrrhocactus eriosyzoides* (F. Ritter) F. Ritter var. *domeykoensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus transiens* F. Ritter, *Neoporteria carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria carrizalensis* (F. Ritter)

A.E. Hoffm. var. *totalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria eriosyzoides* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria huascensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *huascensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria kunzei* (C.F. Först.) Backeb., *Neoporteria totalensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *domeykoensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *transitensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A. Hoffm., comb. illeg., *Neochilenia transitensis* (F. Ritter) Backeb., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. subsp. *atroviridis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. var. *carrizalensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. var. *huascensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. var. *totalensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce kunzei* (C.F. Först.) Katt. var. *transitensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman, *Horridocactus eriosyzoides* F. Ritter, *Eriosyce kunzei* auct. non (C.F. Först.) Katt., *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *transitensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman subsp. *atroviridis* (F. Ritter) Ferryman, *Horridocactus atroviridis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *atroviridis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria atroviridis* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *carrizalensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Pyrrhocactus carrizalensis* F. Ritter, *Horridocactus carrizalensis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria totalensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *carrizalensis* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *huascensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Pyrrhocactus huascensis* F. Ritter, *Neochilenia huascensis* (F. Ritter) Backeb., *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *totalensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Pyrrhocactus totalensis* F. Ritter, *Neochilenia totalensis* (F. Ritter) Backeb., *Pyrrhocactus kunzei* (C.F. Först.) Y. Ito

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Eriosyce esmeraldana*** (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Neoporteria esmeraldana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Thelocephala esmeraldana* (F. Ritter) F. Ritter, *Chileorebutia esmeraldana* F. Ritter, *Neochilenia esmeraldana* (F. Ritter) Backeb.

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 100-200 m.

***Eriosyce garaventae*** (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus garaventai* (F. Ritter) F. Ritter, *Horridocactus garaventai* F. Ritter, *Neoporteria subaiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria garaventae*



(F. Ritter) Ferryman, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *garaventae* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 1000-3000 m.

***Eriosyce heinrichiana*** (Backeb.) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus heinrichianus* (Backeb.) F. Ritter, *Pyrrhocactus chaniarensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *australis* F. Ritter, *Pyrrhocactus jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *spiniosior* F. Ritter, *Pyrrhocactus setosiflorus* F. Ritter var. *intermedius* F. Ritter, *Pyrrhocactus trapichensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus wagenknechtii* F. Ritter, *Neoporteria chorosensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria deherdtiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg., *Neoporteria dimorpha* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose, *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *chaniarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *chorosensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *dimorpha* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *setosiflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *trapichensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *wagenknechtii* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria occulta* (Phil.) Britton & Rose, *Neoporteria ritteri* Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria setosiflora* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. subsp. *intermedia* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. var. *setosiflora* (F. Ritter) Katt., *Pyrrhocactus setosiflorus* F. Ritter, *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt., *Chilenia occulta* (Phil.) Backeb., *Echinocactus occultus* Phil., *Chilenia jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Backeb.  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Eriosyce ihotzkyana*** F. Ritter

Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Eriosyce iquiquensis*** (F. Ritter) Ferryman

Sinónimos: *Pyrrhocactus saxifragus* F. Ritter, *Neoporteria aricensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria aricensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *floribunda* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Neoporteria aricensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *saxifraga* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria iquiquensis* (F. Ritter) Donald & G.D.

Rowley, *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *residua* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria residua* (F. Ritter & Buining) Donald & G.D. Rowley, *Islaya iquiquensis* (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling, *Neochilenia iquiquensis* (F. Ritter) Backeb., *Pyrrhocactus aricensis* (F. Ritter) Backeb., *Pyrrhocactus residuus* F. Ritter & Buining, *Eriosyce recondita* (F. Ritter) Katt. subsp. *iquiquensis* (F. Ritter) Katt.

Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 600-1000 m.

***Eriosyce islayensis*** (C.F. Först.) Katt.

Sinónimos: *Islaya islayensis* (C.F. Först.) Backeb., *Echinocactus islayensis* C.F. Först.  
Arbusto suculento. Nativo.  
Distribución: TAR.  
Países limítrofes: Perú.

***Eriosyce krausii*** (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Neoporteria esmeraldana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *malleolata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Thelocephala krausii* (F. Ritter) F. Ritter, *Thelocephala longirapa* F. Ritter, *Thelocephala malleolata* (F. Ritter) F. Ritter, *Thelocephala malleolata* (F. Ritter) F. Ritter var. *solitaria* (F. Ritter) F. Ritter, *Chileorebutia kraussii* Ritter, *Neochilenia kraussii* (Ritter) Backeb., *Neoporteria odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb. var. *kraussii* (Ritter) Hoffman, *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. *malleolata* Hoffman & Walter, *Chileorebutia malleolata* Ritter, *Neochilenia malleolata* (Ritter) Backeb., *Thelocephala malleolata* (Ritter) Ritter, *Neoporteria odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb. (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb. var. *malleolata*, *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. *malleolata* Hoffman & Walter var. *weisserii* Hoffman & Walter, *Thelocephala weisserii* (Hoffman & Walter) Faúndez & Saldivia  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Eriosyce lapampaensis*** F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 200-2500 m.

***Eriosyce laui*** Luthy

Sinónimos: *Islaya laui* (Luthy) Faúndez & R. Kiesling, *Rimacactus laui* (Luthy) Mottram  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 500-700 m.

***Eriosyce megacarpa*** F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Eriosyce napina*** (Phil.) Katt.  
Sinónimos: *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. fma. *nuda* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. var. *duripulpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. var. *lembckeii* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. var. *glabrescens* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neochilenia lembckeii* Backeb., *Eriosyce aerocarpa* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce napina* (Phil.) Katt. var. *duripulpa* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce napina* (Phil.) Katt. subsp. *lembckeii* Katt., *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. *fulva* (F. Ritter) Katt., *Thelocephala aerocarpa* (F. Ritter) F. Ritter, *Thelocephala duripulpa* (F. Ritter) F. Ritter, *Thelocephala fulva* F. Ritter, *Thelocephala nuda* F. Ritter, *Echinocactus napinus* Phil., *Thelocephala napina* (Phil.) Y. Ito, *Chileorebutia napina* (Phil.) F. Ritter, *Neochilenia napina* (Phil.) Backeb., *Neochilenia napina* (Phil.) Backeb. var. *mitis* (Phil.) Backeb., *Eriosyce napina* (Phil.) Katt. subsp. *aerocarpa* (F. Ritter) Ferryman, *Chileorebutia aerocarpa* F. Ritter, *Neochilenia aerocarpa* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. var. *aerocarpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Thelocephala lembckeii* (Backeb.) F. Ritter, *Chileorebutia duripulpa* F. Ritter, *Neochilenia duripulpa* (F. Ritter) Backeb., *Eriosyce napina* (Phil.) Katt. subsp. *challensis* R. Keim & I. Schaub, *Eriosyce spectabilis* A.E. Hoffm. & H.E. Walter, nom. nud.  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 100-600 m.

***Eriosyce occulta*** Katt.  
Sinónimos: *Pyrrhocactus philippianus* Faúndez, *Pyrrhocactus occultus* F. Ritter, nom. illeg., *Pyrrhocactus occultus* F. Ritter var. *spiniosior* F. Ritter, nom. illeg.  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Eriosyce odieri*** (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. ***glabrescens*** (F. Ritter) Katt.  
Sinónimos: *Thelocephala glabrescens* (F. Ritter) F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Eriosyce odieri*** (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. ***malleolata*** (F. Ritter) A.E. Hoffm. & H. Walter var. ***weisseri*** A.E. Hoffm. & H. Walter  
Sinónimos: *Thelocephala weisseri* (A. Hoffm. & H.

Walter) Faúndez & Saldivia  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.

***Eriosyce odieri*** (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. ***odieri***  
Sinónimos: *Neoporteria monte-amargensis* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg., *Neoporteria odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb., *Neoporteria reichei* (K. Schum.) Backeb., *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. var. *monte-amargensis* Katt., *Thelocephala odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter, *Neochilenia odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb., *Chileorebutia odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter, *Echinocactus odieri* Lem. ex Salm-Dyck  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-400 m.

***Eriosyce paucicostata*** (F. Ritter) Ferryman subsp. ***echinus*** (Ritter) R. Ferryman  
Sinónimos: *Pyrrhocactus echinus* F. Ritter, *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *echinus* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *echinus* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *glaucescens* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus glaucescens* F. Ritter  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 400-800 m.

***Eriosyce paucicostata*** (F. Ritter) Ferryman subsp. ***floccosa*** (Ritter) R. Ferryman  
Sinónimos: *Pyrrhocactus floccosus* F. Ritter, *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. var. *floccosa* (F. Ritter) Katt., *Pyrrhocactus floccosus* F. Ritter var. *minor* (F. Ritter) F. Ritter, *Neoporteria eriocephala* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *floccosa* (F. Ritter) A.E. Hoffm.  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 200-600 m.

***Eriosyce paucicostata*** (F. Ritter) Ferryman subsp. ***paucicostata***  
Sinónimos: *Pyrrhocactus paucicostatus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *densispinus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *elongatus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *flaviflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus paucicostatus* (F. Ritter) F. Ritter var. *viridis* (F. Ritter) F. Ritter, *Neoporteria fusca* (Muehlenpf.) Britton & Rose, *Neoporteria haenkeana* (C.F. Först.) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria paucicostata*

(F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *neohankeana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *viridis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria woutersiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg., *Delaetia woutersiana* Backeb., nom. illeg., *Eriosyce taltalensis* (Hutchinson) Katt. subsp. *paucicostata* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus paucicostatus* F. Ritter, *Neoporteria neohankeana* (F. Ritter) Ferryman, *Neochilenia paucicostata* (F. Ritter) Backeb. Arbusto suculento. Perenne. Endémica. Distribución: ANT. Rango altitudinal: 0-600 m.

***Eriosyce recondita*** (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus reconditus* F. Ritter, *Pyrrhocactus vexatus* F. Ritter, *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *vexata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neochilenia recondita* (F. Ritter) Backeb. Subarbusto suculento. Endémico. Distribución: ANT. Rango altitudinal: 400-1000 m.

***Eriosyce rodentiophila*** F. Ritter

Sinónimos: *Eriosyce rodentiophila* F. Ritter var. *lanata* F. Ritter Arbusto suculento. Endémico. Distribución: ANT, ATA. Rango altitudinal: 100-600 m.

***Eriosyce senilis*** (Backeb.) Katt.

Sinónimos: *Neoporteria nidus* (Söhrrens ex K. Schum.) Britton & Rose, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter fma. *crassispina* F. Ritter, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter fma. *tenuispina* F. Ritter, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter var. *robusta* (F. Ritter) F. Ritter, *Neoporteria multicolor* F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrrens) Britton & Rose var. *coimasensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria nidus* (Söhrrens) Britton & Rose var. *gerocephala* (Y. Ito) F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrrens) Britton & Rose var. *matancillana* F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrrens) Britton & Rose var. *multicolor* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria robusta* F. Ritter, *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *robusta* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt. subsp. *coimasensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt. subsp. *elquiensis* Katt., *Echinocactus senilis* Phil., nom. illeg., *Neoporteria gerocephala* Y. Ito, *Neoporteria senilis* Backeb., *Echinocactus nidus* Söhrrens ex K. Schum. Arbusto suculento. Endémico. Distribución: COQ. Rango altitudinal: 200-500 m. Nombre vulgar: Viejito.

***Eriosyce simulans*** (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus simulans* F. Ritter, *Neoporteria simulans* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. subsp. *simulans* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia simulans* (F. Ritter) Backeb. Arbusto suculento. Endémico. Distribución: COQ. Rango altitudinal: 100-400 m.

***Eriosyce sociabilis*** (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Neoporteria sociabilis* F. Ritter, *Neoporteria sociabilis* F. Ritter var. *napina* F. Ritter Arbusto suculento. Endémico. Distribución: ATA.

***Eriosyce subgibbosa*** (Haw.) Katt. subsp. ***clavata*** (Söhrrens ex K. Schum.) Katt.

Sinónimos: *Neoporteria clavata* (Söhrrens ex K. Schum.) Werderm., *Neoporteria clavata* (Söhrrens ex K. Schum.) Werderm. fma. *grandiflora* F. Ritter, *Neoporteria clavata* (Söhrrens ex K. Schum.) Werderm. var. *nigrihorrida* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Neoporteria clavata* (Söhrrens ex K. Schum.) Werderm. var. *parviflora* F. Ritter, *Neoporteria clavata* (Söhrrens ex K. Schum.) Werderm. var. *procera* F. Ritter, *Neoporteria microsperma* F. Ritter, *Neoporteria microsperma* F. Ritter var. *graciana* F. Ritter, *Neoporteria microsperma* F. Ritter var. *serenana* F. Ritter, *Neoporteria nigrihorrida* Backeb., *Neoporteria nigrihorrida* (Backeb.) Backeb. fma. *crassispina* F. Ritter, *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter, *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter var. *microsperma* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter var. *napina* F. Ritter, *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter var. *vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *nigrihorrida* (Backeb.) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *vallenarensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *wagenknechtii* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. subsp. *clavata* (Söhrrens ex K. Schum.) Katt. Arbusto suculento. Endémico. Distribución: COQ. Rango altitudinal: 0-800 m.

***Eriosyce subgibbosa*** (Haw.) Katt. subsp. ***subgibbosa*** var. ***castanea*** (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Neoporteria castanea* F. Ritter Arbusto suculento. Endémico. Distribución: LBO, MAU.

***Eriosyce subgibbosa*** (Haw.) Katt. subsp. ***subgibbosa*** var. ***subgibbosa***

Sinónimos: *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose, *Neoporteria castanea* F. Ritter var. *tunensis* F. Ritter, *Neoporteria litoralis* F. Ritter var. *intermedia* F. Ritter, *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var.



*intermedia* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *litoralis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *orientalis* F. Ritter, *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *litoralis* (F. Ritter) Katt., *Echinocactus subgibbosus* Haw., *Cereus dichroacanthus* Mart. ex Pfeiff., *Echinocactus acutissima* Otto & Dietr., *Echinocactus castaneoides* Cels ex Salm-Dyck, *Cactus berteri* Colla  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

*Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *pilisipina* (F. Ritter) Katt.  
Sinónimos: *Pyrrhocactus pilisipina* Ritter, *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *pilisipina* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria pilisipina* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-600 m.

*Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *pygmaea* R. Ferryman  
Sinónimos: *Pyrrhocactus pygmaeus* F. Ritter, *Pyrrhocactus gracilis* F. Ritter, *Pyrrhocactus pulchellus* F. Ritter, *Neoporteria calderana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley fma. *gracilis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley fma. *pygmaea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *calderana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *pulchella* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *scoparia* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria scoparia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria taltalensis* Hutchison var. *transiens* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. var. *pygmaea* (F. Ritter) Katt.  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-400 m.

*Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *taltalensis*  
Sinónimos: *Pyrrhocactus taltalensis* (Hutchison) F. Ritter, *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt., *Pyrrhocactus tenuis* F. Ritter, *Neoporteria rupicola* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria taltalensis* Hutchison, *Neochilenia taltalensis* (Hutchison) Backeb., *Pyrrhocactus rupiculus* F. Ritter  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 500-700 m.

*Eriosyce tenebrica* (F. Ritter) Katt.  
Sinónimos: *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. var. *fankhauseri* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Thelocephala fankhauseri* F. Ritter, *Thelocephala tenebrica* F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 100-600 m.

*Eriosyce villosa* (Monv.) Katt.  
Sinónimos: *Neoporteria villosa* (Monv.) A. Berger, *Neoporteria laniceps* F. Ritter, *Neoporteria villosa* (Monv.) A. Berger var. *laniceps* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Cactus villosus* Monv., *Neoporteria atrispinosa* Backeb., *Echinocactus villosus* (Monv.) Labour.  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-900 m.  
Nombre vulgar: Quisco.

## **Eulychnia**

*Eulychnia acida* Phil.  
Sinónimos: *Eulychnia acida* Phil. var. *elata* F. Ritter, *Eulychnia acida* Phil. var. *procumbens* F. Ritter  
Árbol suculento. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.  
Nombre vulgar: Copao.

*Eulychnia aricensis* F. Ritter  
Árbol suculento. Endémico.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 400-700 m.

*Eulychnia breviflora* Phil.  
Sinónimos: *Eulychnia barquitenis* F. Ritter, *Eulychnia breviflora* Phil. var. *taltalensis* F. Ritter, *Eulychnia breviflora* Phil. var. *tenuis* F. Ritter, *Eulychnia saint-pieana* F. Ritter var. *barquitenis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Cereus panoplaeatus* Monv.  
Árbol suculento. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Nombre vulgar: Copao.

*Eulychnia castanea* Phil.  
Sinónimos: *Cereus castaneus* (Phil.) K. Schum., *Philippicereus castaneus* (Phil.) Backeb.  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Eulychnia iquiquensis*** (K. Schum.) Britton & Rose  
Sinónimos: *Eulychnia iquiquensis* (K. Schum.) Britton & Rose var. *pullilana* F. Ritter, *Cereus iquiquensis* K. Schum., *Eulychnia breviflora* Phil. subsp. *iquiquensis* (K. Schum.) D.R. Hunt  
Árbol suculento. Endémico.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Nombre vulgar: Copao.

***Eulychnia saint-pieana*** F. Ritter  
Árbol suculento. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

### **Haageocereus**

***Haageocereus australis*** Backeb.  
Sinónimos: *Haageocereus australis* Backeb. fma. *subtilispinus* F. Ritter, *Haageocereus multicolorspinus* Buining  
Arbusto suculento. Nativo.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Haageocereus fascicularis*** (Meyen) F. Ritter  
Sinónimos: *Cereus fascicularis* Meyen, *Trichocereus fascicularis* (Meyen) Britton & Rose, *Weberbauerocereus fascicularis* (Meyen) Backeb.  
Arbusto suculento. Endémico.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2000-3000 m.  
Nombre vulgar: Chikachika.

### **Maihuenia**

***Maihuenia patagonica*** (Phil.) Britton & Rose  
Sinónimos: *Opuntia patagonica* Phil.  
Subarbusto suculento. Nativo.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Maihuenia poeppigii*** (Otto ex Pfeiff.) K. Schum.  
Sinónimos: *Opuntia poeppigii* Otto & Pfeiff., *Maihuenia philippii* (F.A.C. Weber) K. Schum., *Pereskia philippii* F.A.C. Weber, *Pereskia poeppigii* Salm-Dyck, *Opuntia maihuen* J. Remy  
Subarbusto suculento. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Maihuén.

### **Maihueniopsis**

***Maihueniopsis archiconoidea*** F. Ritter  
Sinónimos: *Opuntia archiconoidea* (F. Ritter) D.R. Hunt  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 1200-1800 m.

***Maihueniopsis atacamensis*** (Phil.) F. Ritter  
Sinónimos: *Opuntia atacamensis* Phil., *Tephrocactus atacamensis* (Phil.) F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 4100 m.  
Nombre vulgar: Chuchampe.

***Maihueniopsis camachoi*** (Espinosa) F. Ritter  
Sinónimos: *Tephrocactus camachoi* (Espinosa) Backeb., *Opuntia camachoi* Espinosa, *Tephrocactus chilensis* Backeb.  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 3900 m.  
Nombre vulgar: Kume.

***Maihueniopsis colorea*** (F. Ritter) F. Ritter  
Sinónimos: *Tephrocactus coloreus* F. Ritter, *Opuntia colorea* (F. Ritter) D.R. Hunt  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 1300-3500 m.

***Maihueniopsis crassispinga*** F. Ritter  
Sinónimos: *Opuntia crassispinga* (F. Ritter) D.R. Hunt  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 200 m.

***Maihueniopsis darwinii*** (Hensl.) F. Ritter  
Sinónimos: *Opuntia darwinii* Hensl., *Tephrocactus darwinii* (Hensl.) Backeb. ex Fric  
Subarbusto suculento. Nativo.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Maihueniopsis domeykoensis*** F. Ritter  
Sinónimos: *Opuntia domeykoensis* (F. Ritter) D.R. Hunt  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.



***Maihueniopsis glomerata*** (Haw.) R. Kiesling  
Sinónimos: *Opuntia glomerata* Haw., *Maihueniopsis tarapacana* (Phil.) F. Ritter, *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb., *Opuntia conoidea* (F. Ritter ex Backeb.) G.D. Rowley, *Tephrocactus conoideus* F. Ritter ex Backeb., *Tephrocactus reicheanus* (Espinosa) Backeb., *Maihueniopsis conoidea* (F. Ritter ex Backeb.) F. Ritter, *Opuntia ovallei* Gay, *Opuntia tarapacana* Phil., *Tephrocactus tarapacanus* (Phil.) Backeb.  
Subarbusto suculento. Nativo.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Maihueniopsis grandiflora*** F. Ritter  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 1700 m.

***Maihueniopsis nigrispina*** (K. Schum.) R. Kiesling  
Sinónimos: *Opuntia nigrispina* K. Schum., *Tephrocactus nigrispinus* (K. Schum.) Backb.  
Subarbusto suculento. Nativo.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 2500-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Maihueniopsis ovata*** (Pfeiff.) F. Ritter  
Sinónimos: *Opuntia ovata* Pfeiff., *Tephrocactus ovatus* (Pfeiff.) Backeb.  
Subarbusto suculento. Nativo.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1000-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Gatito, perrito.

***Maihueniopsis rahmeri*** (Phil.) F. Ritter  
Sinónimos: *Opuntia rahmerii* Phil.  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: TAR.

***Maihueniopsis wagenknechtii*** F. Ritter  
Sinónimos: *Opuntia wagenknechtii* (F. Ritter) D.R. Hunt  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 2000 m.

### **Miqueliopuntia**

***Miqueliopuntia miquelii*** (Monv.) F. Ritter  
Sinónimos: *Opuntia miquelii* Monv., *Cylindropuntia miquelii* (Monv.) Backeb., *Opuntia geissei* Phil., *Austrocilindropuntia miquelii* (Monv.) Backb.  
Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

### **Neowerdermannia**

***Neowerdermannia chilensis*** Backeb.  
Sinónimos: *Weingartia chilensis* (Backeb.) Backeb., *Sulcorebutia chilensis* (Backeb.) F.H. Brandt  
Subarbusto suculento. Endémico.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 3000-3500 m.

### **Oreocereus**

***Oreocereus hempelianus*** (Gürke) D.R. Hunt  
Sinónimos: *Arequipa australis* F. Ritter, *Arequipa hempeliana* (Gürke) Kreuz. & Buining, *Echinopsis hempelianus* Gürke, *Oreocereus australis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.  
Arbusto suculento. Nativo.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 2400-3700 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Achacaño.

***Oreocereus leucotrichus*** (Phil.) Wagenkn. ex F. Ritter  
Sinónimos: *Oreocereus variicolor* Backeb., *Arequipa leucotricha* (Phil.) Britton & Rose, *Echinocactus leucotrichus* Phil., *Borzicactus leucotrichus* (Phil.) Kimnach  
Arbusto suculento. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2400-3500 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Pichaja, chastudo.

### **Pterocactus**

***Pterocactus australis*** (F.A.C. Weber) Backeb.  
Sinónimos: *Opuntia australis* F.A.C. Weber  
Subarbusto suculento. Nativo.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Pterocactus hickenii*** Britton & Rose  
Sinónimos: *Opuntia skottsbergii* Britton & Rose, *Pterocactus skottsbergii* (Britton & Rose) Backeb.  
Subarbusto suculento. Nativo.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## Tunilla

***Tunilla soehrensii*** (Britton & Rose) Hunt & Iliff  
Sinónimos: *Platyopuntia chilensis* Ritt., *Tunilla chilensis* (Ritt.) D. Hunt & J. Iliff, *Airampona chilensis* (Ritt.) Doweld.  
Arbusto suculento. Nativo.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 3500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## CALCEOLARIACEAE

### Calceolaria

***Calceolaria aiseniana*** Ehrh.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Calceolaria alba*** Ruiz & Pav.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.

***Calceolaria andina*** Benth.  
Sinónimos: *Calceolaria secunda* Witasek  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 800-3000 m.

***Calceolaria angustifolia*** (Lindl.) Sweet  
Sinónimos: *Calceolaria berteri* Colla, *Calceolaria salicariifolia* Phil., *Calceolaria integrifolia* L. var. *angustifolia* Lindl.  
Arbusto o subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-2600 m.

***Calceolaria arachnoidea*** Graham subsp. *arachnoidea*  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1900-2600 m.  
Nombre vulgar: Relbún de la cordillera.

***Calceolaria arachnoidea*** Graham subsp. *nubigena* (Poepp.) C. Ehrh.  
Sinónimos: *Calceolaria nubigena* Poepp., *Calceolaria arachnoidea* Graham var. *lanata* Meyen ex Walp. & Schauer, *Calceolaria arachnoidea* Graham var. *viridis* Benth.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Nombre vulgar: Relbún de la cordillera.

***Calceolaria ascendens*** Lindl. subsp. *ascendens*  
Sinónimos: *Calceolaria uspallatensis* Kraenzl.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-1900 m.

***Calceolaria ascendens*** Lindl. subsp. *exigua* (Witasek) Nic. García  
Sinónimos: *Calceolaria exigua* Witasek, *Calceolaria miserrima* Kraenzl., *Calceolaria parvifolia* Phil., nom. illeg.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1600-2100 m.

***Calceolaria ascendens*** Lindl. subsp. *glandulifera* (Witasek) C. Ehrh.  
Sinónimos: *Calceolaria bipartita* Phil., *Calceolaria glandulifera* Witasek  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 800-2000 m.

***Calceolaria ascendens*** Lindl. subsp. *pristiphylla* (Phil.) C. Ehrh.  
Sinónimos: *Calceolaria pristiphylla* Phil., *Calceolaria ascendens* Lindl. var. *pristiphylla* (Phil.) Kraenzl.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 500-1800 m.

***Calceolaria asperula*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO.  
Rango altitudinal: 900-2000 m.

***Calceolaria auriculata*** Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 200 m.

***Calceolaria biflora*** Lam.  
Sinónimos: *Calceolaria plantaginea* Sm., *Calceolaria falklandica* (S. Moore) Kraenzl., *Fagelia falklandica* S. Moore  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria caleuana*** Muñoz-Schick & Moreira

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2100-2300 m.

***Calceolaria campanae*** Phil.

Sinónimos: *Calceolaria gnaphaliifolia* Kraenzl.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

***Calceolaria cana*** Cav.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 600-2500 m.

***Calceolaria cavanillesii*** Phil.

Sinónimos: *Calceolaria recta* Witasek  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 500-2100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria collina*** Phil. subsp. ***collina***

Sinónimos: *Calceolaria coquimbensis* (Benth.) Kraenzl.,  
*Calceolaria ascendens* Lindl. var. *coquimbensis* Benth.  
Arbusto o subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Calceolaria collina*** Phil. subsp. ***conferta*** (Witasek) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria conferta* Witasek, *Calceolaria fulva* Witasek fma. *viscosa* Witasek  
Arbusto o subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 400-1600 m.

***Calceolaria collina*** Phil. subsp. ***subincisa*** (Benth.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria abscondita* Witasek, *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *subincisa* Benth., *Calceolaria quadriradiata* Phil.  
Arbusto o subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 200-800 m.

***Calceolaria corymbosa*** Ruiz & Pav. subsp. ***corymbosa***

Sinónimos: *Calceolaria herbertiana* Lindl., *Calceolaria cordata* Phil., *Calceolaria herbertiana* Lindl. var. *parviflora* Lindl.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.  
Nombre vulgar: Arguenita del cerro.

***Calceolaria corymbosa*** Ruiz & Pav. subsp. ***floccosa*** (Witasek) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria floccosa* Witasek  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 2200-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria corymbosa*** Ruiz & Pav. subsp. ***mimuloides*** (Clos) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria mimuloides* Clos, *Calceolaria oligantha* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2200-3500 m.

***Calceolaria corymbosa*** Ruiz & Pav. subsp. ***montana*** (Cav.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria montana* Cav., *Calceolaria villosa* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 2200-3100 m.

***Calceolaria corymbosa*** Ruiz & Pav. subsp. ***santiaguina*** C. Ehrh.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 700-2300 m.

***Calceolaria corymbosa*** Ruiz & Pav. subsp. ***tetraphylla*** (Phil.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria tetraphylla* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 700-1600 m.

***Calceolaria crenatiflora*** Cav.

Sinónimos: *Calceolaria hollermayeri* Kraenzl., *Calceolaria cunninghamii* Vatke, *Calceolaria pendula* Sweet  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria densifolia*** Phil. subsp. ***densifolia***

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 1200-1300 m.

***Calceolaria densifolia*** Phil. subsp. *laxa* C. Ehrh.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 1300-1700 m.

***Calceolaria dentata*** Ruiz & Pav. subsp. *araucana* (Phil.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria araucana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 200-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria dentata*** Ruiz & Pav. subsp. *cumingiana* (Witasek) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *cumingiana* (Witasek) Reiche, *Calceolaria cummingiana* Witasek

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Calceolaria dentata*** Ruiz & Pav. subsp. *dentata*

Sinónimos: *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *compacta* (Phil.) Reiche, *Calceolaria laetevirens* Kraenzl., *Calceolaria compacta* Phil., *Calceolaria chiloensis* Lindl., *Calceolaria ascendens* Lindl. var. *chiloensis* (Lindl.) Kraenzl.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria filicaulis*** Clos subsp. *filicaulis*

Sinónimos: *Calceolaria flabellifolia* Kraenzl., *Calceolaria palenae* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 1400-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria filicaulis*** Clos subsp. *luxurians* (Witasek) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria luxurians* Witasek, *Calceolaria cana* Cav. var. *pannosa* (Phil.) Reiche, *Calceolaria pannosa* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2200-3100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria flavovirens*** C. Ehrh.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2200-3000 m.

***Calceolaria georgiana*** F. Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 400-700 m.

***Calceolaria germainii*** Witasek

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 600-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria glandulosa*** Poepp. ex Benth. subsp. *alichahuensis* (Muñoz-Schick) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria alichahuensis* Muñoz-Schick, *Calceolaria dumetorum* Phil., *Calceolaria glutinosa* Meigen, nom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 700-2100 m.

***Calceolaria glandulosa*** Poepp. ex Benth. subsp. *glandulosa*

Sinónimos: *Calceolaria kingii* Phil., *Calceolaria atrovirens* Witasek

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Calceolaria hypericina*** Poepp. ex Benth.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1800-3000 m.

***Calceolaria inamoena*** Kraenzl.

Sinónimos: *Calceolaria aberrans* Kraenzl.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3500-3800 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Kukumelo.

***Calceolaria integrifolia*** L.

Sinónimos: *Calceolaria rugosa* Ruiz & Pav.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria lanigera*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 900-1500 m.

***Calceolaria latifolia*** Benth.

Sinónimos: *Calceolaria latifolia* Benth. var. *longepetiolata* (Phil.) Reiche, *Calceolaria longepetiolata* Phil., *Calceolaria stachydifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 500-1100 m.

***Calceolaria lepida*** Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1800 m.

***Calceolaria meyeniana*** Phil. subsp. *cheiranthoides* (Witasek) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria cheiranthoides* Reiche ex Witasek

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 500 m.

***Calceolaria meyeniana*** Phil. subsp. *glabrata* (Phil.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria glabrata* Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

***Calceolaria meyeniana*** Phil. subsp. *meyeniana*

Sinónimos: *Calceolaria glabrata* Phil. var. *meyeniana* (Phil.) Reiche, *Calceolaria landbecki* Phil., *Calceolaria andicola* Witasek, *Calceolaria crocea* Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, ARA.

Rango altitudinal: 600-2300 m.

***Calceolaria meyeniana*** Phil. subsp. *nahuelbutae* (Phil.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria vernicosa* Phil., *Calceolaria nahuelbutae* Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 800-1300 m.

***Calceolaria morisii*** Walp.

Sinónimos: *Calceolaria polyphylla* Kraenzl., *Calceolaria hypoleuca* Kuntze, nom. nud., *Calceolaria wettsteiniana* Witasek, *Calceolaria salviaefolia* Colla, nom. illeg.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Calceolaria nitida*** Colla

Sinónimos: *Calceolaria pseudoglandulosa* Clos

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 400-500 m.

***Calceolaria nudicaulis*** Benth.

Sinónimos: *Calceolaria pratensis* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 500-1800 m.

Nombre vulgar: Topatopa.

***Calceolaria pallida*** Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1600-2200 m.

***Calceolaria paposana*** Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-600 m.

***Calceolaria paralia*** Cav.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 600-2300 m.

***Calceolaria petioalaris*** Cav.

Sinónimos: *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *cuspidata* (Phil.) Reiche, *Calceolaria cuspidata* Phil., *Calceolaria effusa* Phil., *Calceolaria connata* Hook. ex Graham, *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *oblongifolia* Clos, *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *latifolia* Clos

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Calceolaria philippii*** Eyz.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO.

Rango altitudinal: 1300 m.

***Calceolaria picta*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Calceolaria pinifolia*** Cav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 2600-4300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria pinnata*** L.

Sinónimos: *Calceolaria bipinnatifida* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT.



Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Calceolaria poikilanthos*** Sandwith  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA.  
Rango altitudinal: 1300-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria polifolia*** Hook.  
Sinónimos: *Calceolaria spatellifolia* Kraenzl.  
Arbusto o subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-2300 m.  
Nombre vulgar: Té de burro.

***Calceolaria polyrrhiza*** Cav.  
Sinónimos: *Calceolaria lanceolata* Cav., *Calceolaria prichardii* (Rendle) Kraenzl., *Fagelia prichardii* Rendle, *Calceolaria acutifolia* Witasek, *Calceolaria chubutensis* Skotts., *Calceolaria mendocina* Phil., *Calceolaria cymbiflora* Sandwith, *Calceolaria lanceolata* Cav. var. *acutifolia* (Witasek) Reiche, *Calceolaria lanceolata* Cav. var. *pusilla* (Witasek) Reiche, *Calceolaria pusilla* Witasek, *Calceolaria lanceolata* Cav. fma. *acutifolia* (Witasek) W. Bowden, *Calceolaria patagonica* Kraenzl.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 500-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria purpurea*** Graham  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 900-2300 m.

***Calceolaria rinconada*** Ehrh.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 200-600 m.

***Calceolaria rubiginosa*** C. Ehrh.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 400-700 m.

***Calceolaria segethii*** Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 800-2200 m.

***Calceolaria spathulata*** Witasek  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1900-2000 m.

***Calceolaria stellariifolia*** Phil.  
Sinónimos: *Calceolaria rupicola* F. Meigen  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, RME.  
Rango altitudinal: 2700-4300 m.  
Nombre vulgar: Zapatilla, willjaya.

***Calceolaria talcana*** Grau & Ehr. Bayer  
Arbusto o subarbusto. Endémico.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 500-1300 m.

***Calceolaria tenella*** Poepp. & Endl.  
Sinónimos: *Calceolaria skottsbergii* Gand.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria thyrsoflora*** Graham  
Sinónimos: *Calceolaria thyrsoflora* Graham var. *alliacea* Phil., *Calceolaria bridgesii* Kunze  
Arbusto o subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Nombre vulgar: Hierba dulce, palqui, palo dulce.

***Calceolaria tripartita*** Ruiz & Pav.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-3900 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Calceolaria undulata*** Benth.  
Sinónimos: *Calceolaria foliosa* Phil., *Calceolaria brevistyla* Clos  
Arbusto o subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 1300-2200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria uniflora*** Lam.  
Sinónimos: *Calceolaria nana* Sm., *Calceolaria darwinii* Benth., *Calceolaria uniflora* Lam. var. *darwinii* (Kuntze) Witasek ex Reiche, *Fagelia darwinii* Kuntze, *Calceolaria minima* Witasek  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria valdiviana*** Phil. subsp. ***crassifolia*** (Phil.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria crassifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Calceolaria valdiviana*** Phil. subsp. ***valdiviana***

Sinónimos: *Calceolaria llaimae* Kraenzl., *Calceolaria plantaginea* Sm. var. *obtusifolia* Clos, *Calceolaria obtusifolia* (Clos) Witasek, *Calceolaria tenera* Phil., *Calceolaria werdermannii* Kraenzl., *Calceolaria tenerifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 600-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria verbascifolia*** Bertero ex Phil.

Sinónimos: *Calceolaria borchersi* Phil., *Calceolaria oreas* Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, LBO.

Rango altitudinal: 500-1300 m.

***Calceolaria viscosissima*** (Hook.) Lindl.

Sinónimos: *Calceolaria pubescens* Phil., *Calceolaria robusta* A. Dietr., *Calceolaria integrifolia* L. var. *viscosissima* Hook., *Calceolaria gmelinii* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Calceolaria volckmannii*** Phil.

Sinónimos: *Calceolaria benthami* Phil., *Calceolaria bigemina* Phil., *Calceolaria poeppigiana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Calceolaria williamsii*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, BIO.

Rango altitudinal: 2400-2700 m.

## **Jovellana**

***Jovellana guentheri*** Kraenzl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Jovellana punctata*** Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Calceolaria puncticulata* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Jovellana violacea*** (Cav.) G. Don

Sinónimos: *Calceolaria violacea* Cav.

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-600 m.

## **CALYCERACEAE**

### **Boopis**

***Boopis australis*** Decne.

Sinónimos: *Acarpha australis* (Decne.) Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Boopis filifolia*** Speg.

Sinónimos: *Boopis prichardii* S. Moore

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Boopis gracilis*** Phil.

Sinónimos: *Boopis pozoaeformis* Phil., *Boopis gracilis*

Phil. var. *decumbens* Chodat & Wilczek, *Boopis gracilis*

Phil. var. *pozoaeformis* (Phil.) Hicken, *Boopis bicolor* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Boopis graminea*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Boopis multicaulis*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

***Boopis patagonica*** Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Boopis pusilla*** Phil.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 1600 m.

**Calycera**

***Calycera eryngioides*** J. Remy

Sinónimos: *Anomocarpus eryngioides* (J. Remy) Miers  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.  
Nombre vulgar: Repollito de cordillera.

***Calycera herbacea*** Cav. var. ***herbacea***

Sinónimos: *Calycera herbacea* Cav. var. *viridiflora* (Phil.)  
Pontiroli, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers, *Calycera nudicaulis* Phil., *Boopis viridiflora* Miers, *Chodat & Hassl.*, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers fma. *squarrosa* (Miers)  
Hicken, *Gymnocaulus viridiflorus* Phil., *Boopis australis* Decne. var. *squarrosa* (Miers) Reiche, *Boopis squarrosa* Miers  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, ARA.  
Rango altitudinal: 2200-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Calycera herbacea*** Cav. var. ***sinuata*** (Miers) Pontiroli

Sinónimos: *Calycera sinuata* Miers, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers fma. *sinuata* (Miers) Hicken, *Calycera intermedia* Phil., *Calycera involucrata* Phil., *Calycera crenata* R.E. Fr.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 2500-4900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Calycera leucanthema*** (Poepp. ex Less.) Kuntze

Sinónimos: *Calycera integrifolia* (Phil.) Reiche, *Boopis integrifolia* Phil., *Boopis leucanthema* Poepp. ex Less., *Acicarpa lanata* Lag., *Anomocarpus leucanthemus* (Poepp. ex Less.) Miers, *Anomocarpus tenuifolius* Miers, *Anomocarpus tenuis* Miers, *Leucocera annua* Turcz., *Calycera lanata* Benth. & Hook.f.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 300-700 m.

***Calycera sessiliflora*** Phil.

Sinónimos: *Calycera sessiliflora* Phil. var. *axillaris* (Miers) Reiche, *Anomocarpus axillaris* Miers, *Anomocarpus*

*subsessiliflorus* Miers, nom. illeg.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 700-1900 m.

***Calycera sympaganthera*** (Ruiz & Pav.) Kuntze

Sinónimos: *Calycera balsamitaefolia* (Juss.) Rich., nom. illeg., *Calycera sympaganthera* (Ruiz & Pav.) Martic. & Quezada, comb. illeg., *Scabiosa sympaganthera* Ruiz & Pav., *Boopis balsamitaefolia* Juss., nom. illeg.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1300 m.

**Gamocarpha**

***Gamocarpha alpina*** (Poepp. ex Less.) H.V. Hansen

Sinónimos: *Boopis alpina* Poepp. ex Less., *Gamocarpha poeppigii* DC. var. *angustifolia* (Phil.) Reiche, *Boopis angustifolia* Phil., *Gamocarpha ligulata* Miers  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1500-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gamocarpha dentata*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gamocarpha gilliesii*** Miers

Sinónimos: *Gamocarpha breviscapa* Phil., *Boopis gilliesii* (Miers) Hauman, *Boopis breviscapa* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, VAL, LBO.  
Rango altitudinal: 200-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gamocarpha polycephala*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: NUB.

***Gamocarpha pumila*** Miers

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.

***Gamocarpha selliana*** Reiche

Sinónimos: *Gamocarpha patagonica* Speg., *Gamocarpha selliana* Reiche var. *multicaulis* Dusén  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 500-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## Moschopsis

### *Moschopsis leyboldii* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 3000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Moschopsis monocephala* (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Boopis monocephala* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 4000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Waje, anukaylla.

### *Moschopsis rosulata* (N.E. Br.) Dusén

Sinónimos: *Acicarpha rosulata* N.E. Br., *Moschopsis spathulata* Dusén, *Gamocarpha rosulata* (N.E. Br.) Skottsbo.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 700-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Moschopsis subandina* (Speg.) Dusén

Sinónimos: *Gamocarpha subandina* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI.

Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Moschopsis trilobata* Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

## Nastanthus

### *Nastanthus caespitosus* (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Boopis caespitosa* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, MAU.

Rango altitudinal: 500-4300 m.

Nombre vulgar: Chicorea.

### *Nastanthus compactus* (Phil.) Miers

Sinónimos: *Nastanthus diazi* (Phil.) Phil. ex Reiche, *Boopis diazi* Phil., *Boopis compacta* Phil.

Hierba. Bienal. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, MAU.

Rango altitudinal: 3000-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Nastanthus scapigerus* (J. Remy) Miers

Sinónimos: *Nastanthus laciniatus* Miers, *Boopis laciniata* (Miers) Ball, *Boopis scapigera* J. Remy, *Boopis miersii* Phil., *Nastanthus spathulatus* (Phil.) Miers var. *spathulatus*, *Boopis spathulata* Phil., *Boopis bellidifolia* Phil., *Nastanthus bellidifolius* (Phil.) Reiche, *Boopis dubia* Phil., *Boopis reichei* Phil., *Boopis araucana* Phil., *Nastanthus araucanus* (Phil.) Reiche, *Nastanthus scapiger* Miers

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, MAG.

Rango altitudinal: 500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Nastanthus ventosus* (Meyen) Miers

Sinónimos: *Calycera andina* Miers, nom. nud., *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *pinnatifidus* (Miers) Reiche, *Nastanthus pinnatifidus* Miers, *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *laciniatus* (Miers) Reiche, *Calycera ventosa* Meyen, *Boopis ventosa* (Meyen) Kuntze, *Boopis scapigera* J. Remy var. *ventosus* (Meyen) Wedd., *Nastanthus caespitosus* (Phil.) Reiche var. *ventosus* (Meyen) Pontiroli, *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *agglomeratus*, *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *breviflorus* (Phil.) Reiche, *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *gayanus* (Phil.) Reiche, *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *gilliesii* (Miers) Reiche, *Boopis breviflora* Phil., *Boopis gayana* Phil., *Nastanthus gilliesii* Miers, *Nastanthus gayanus* (Phil.) Miers

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1500-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

## CAMPANULACEAE

### Campanula

#### *Campanula rapunculoides* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: JFE.

### Cyphocarpus

#### *Cyphocarpus innocuus* Sandwith

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1000 m.

#### *Cyphocarpus psammophilus* Ricardi

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 800 m.

***Cyphocarpus rigescens* Miers**

Sinónimos: *Cyphocarpus rigescens* Miers fma. *glabratus* Phil. ex E. Wimm.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Nombre vulgar: Pata de pajarito.

**Downingia**

***Downingia pusilla* (G. Don ex A. DC.) Torr.**

Sinónimos: *Bolelia humilis* Greene, *Clintonia pusilla* G. Don ex A. DC., *Downingia humilis* (Greene) Greene, *Lobelia pusilla* Poepp., *Bolelia pusilla* (Poepp.) Greene  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-3200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Legenere**

***Legenere valdiviana* (Phil.) E. Wimm.**

Sinónimos: *Howellia limosa* Greene, *Howellia valdiviana* (Phil.) E. Wimm., *Legenere limosa* (Greene) McVaugh, *Lobelia valdiviana* (Phil.) Vatke, *Mezleria valdiviana* Phil., *Dortmannia valdiviana* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: LLA.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Lobelia**

***Lobelia anceps* L.f.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Lobelia bridgesii* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Tupa bridgesii* (Hook. & Arn.) A. DC., *Rapuntium bridgesii* (Hook. & Arn.) C. Presl, *Dortmannia bridgesii* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Lobelia blanda* (D. Don) Heynh., *Tupa blanda* D. Don, *Rapuntium blandum* (D. Don) C. Presl, *Rapuntium lucaeanum* C. Presl, *Lobelia lucaeana* (C. Presl) A. DC., *Dortmannia blanda* (D. Don) Kuntze, *Dortmannia lucaeana* (C. Presl) Kuntze  
Subarbusto. Endémica.  
Distribución: LRI.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Nombre vulgar: Tupa rosada.

***Lobelia excelsa* Bonpl.**

Sinónimos: *Lobelia salicifolia* Sweet, *Tupa salicifolia* (Sweet) G. Don, *Tupa glaucescens* Phil., *Rapuntium excelsum* (Bonpl.) C. Presl, *Dortmannia excelsa* (Bonpl.) Kuntze, *Lobelia gigantea* auct. non Cav., *Lobelia arguta* Lindl., *Tupa arguta* (Lindl.) G. Don, *Dortmannia arguta* (Lindl.) Kuntze, *Lobelia neriifolia* Moris, *Tupa kingi* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Nombre vulgar: Tupa.

***Lobelia oligophylla* (Wedd.) Lammers**

Sinónimos: *Pratia repens* Gaudich., *Hypsela reniformis* (Kunth) C. Presl, *Pratia longiflora* Hook.f., *Hypsela oligophylla* (Wedd.) Benth. & Hook.f. ex Zahlbr., *Lobelia pratiana* Gaudich. ex Lammers, *Lysipomia reniformis* Kunth, *Pratia atacamensis* Phil., *Pratia oligophylla* Wedd., *Pratia pencana* Phil., *Pratia subsessilis* Wedd., *Hypsela longiflora* (Hook.f.) F. Phil., *Hypsela subsessilis* (Wedd.) Benth. & Hook.f. ex Zahlbr., *Hypsela atacamensis* (Phil.) F. Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Qatari.

***Lobelia polyphylla* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Lobelia ovata* Reiche, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don, *Rapuntium polyphyllum* (Hook. & Arn.) C. Presl, *Dortmannia polyphylla* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Tupa ovata* Phil., *Rapuntium subdentatum* C. Presl, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. fma. *subdentata* (C. Presl) E. Wimm., *Tupa subdentata* (C. Presl) A. DC., *Dortmannia subdentata* (C. Presl) Kuntze, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *besseriana* (C. Presl) Reiche, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *besseriana* (C. Presl) Vatke, *Tupa besseriana* (C. Presl) A. DC., *Tupa purpurea* G. Don, *Tupa serrata* Phil., *Rapuntium besserianum* C. Presl, *Rapuntium purpureum* (G. Don) C. Presl, *Dortmannia besseriana* (C. Presl) Kuntze, *Dortmannia purpurea* (G. Don) Kuntze, *Rapuntium bracteosum* C. Presl, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. fma. *bracteosa* (C. Presl) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *bracteosa* (C. Presl) Reiche, *Tupa bracteosa* (C. Presl) A. DC., *Dortmannia bracteosa* (C. Presl) Kuntze, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *angustifolia* Hook. & Arn. ex A. DC., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *angustifolia* (Hook. & Arn.) A. DC., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *coquimbana* (Vatke) Reiche, *Tupa coquimbana* Phil., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. fma. *linearifolia* (Phil.) E. Wimm., *Tupa linearifolia* Phil., *Tupa axilliflora* Phil.,



*Lobelia axilliflora* (Phil.) Reiche, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. fma. *hyssopifolia* (C. Presl) E. Wimm., *Rapuntium hyssopifolium* C. Presl, *Tupa hyssopifolia* (C. Presl) A. DC., *Dortmanna hyssopifolia* (C. Presl) Kuntze, *Tupa gayana* Phil., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *latifolia* (A. DC.) Heynh., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *latifolia* A. DC., *Lobelia poeppigiana* Kunze ex A. DC., *Rapuntium poeppigianum* (Kunze ex A. DC.) C. Presl, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *bracteosa* (C. Presl) Vatke, *Lobelia hyssopifolia* (C. Presl) Gay, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *angustifolia* (Hook. & Arn. ex A. DC.) Heynh., *Tupa atropurpurea* Vis., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *coquimbana* Vatke, *Tupa poeppigiana* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Nombre vulgar: Tupa.

### ***Lobelia tupa* L.**

Sinónimos: *Lobelia mucronata* Cav. var. *berteroi* (A. DC.) E. Wimm., *Lobelia mucronata* Cav. fma. *hookeri* (A. DC.) E. Wimm., *Lobelia mucronata* Cav., *Lobelia mucronata* Cav. fma. *ovalifolia* E. Wimm., *Lobelia tupa* L. var. *bicalcarata* (Kuntze) E. Wimm., *Lobelia tupa* L. var. *montana* Reiche, *Lobelia tupa* L. var. *pavonii* E. Wimm., *Lobelia serrata* Meyen, *Tupa feuillei* G. Don, *Tupa feuillei* G. Don var. *macrophylla* Vatke, *Rapuntium tupa* (L.) C. Presl, *Dortmanna tupa* (L.) Kuntze, *Dortmanna philippiana* Kuntze, *Lobelia bicalcarata* (Kuntze) Zahlbr. ex K. Schum., *Dortmanna bicalcarata* Kuntze, *Lobelia tupa* L. var. *mucronata* (Cav.) Reiche, *Tupa mucronata* (Cav.) A. DC., *Tupa cavanillesiana* G. Don, nom. illeg., *Tupa feuillei* G. Don var. *mucronata* (Cav.) Vatke, *Rapuntium mucronatum* (Cav.) C. Presl, *Tupa mucronata* (Cav.) A. DC. var. *hookeri* A. DC., *Tupa berteroi* A. DC., *Tupa feuillei* G. Don var. *berteroi* (A. DC.) Vatke, *Dortmanna berteroi* (A. DC.) Kuntze, *Lobelia tupa* L. var. *berteroi* (A. DC.) Reiche, *Lobelia feuillei* (G. Don) Voss, nom. illeg., *Dortmanna mucronata* (Cav.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Tupa, tabaco del diablo.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

### **Triodanis**

***Triodanis perfoliata* (L.) Nieuwl. subsp. *biflora* (Ruiz & Pav.) Lammers**

Sinónimos: *Triodanis biflora* (Ruiz & Pav.) Greene, *Campanula biflora* Ruiz & Pav., *Pentagonia biflora* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Specularia biflora* (Ruiz & Pav.) Fisch. &

A. Gray, *Triodanis perfoliata* (L.) Nieuwl. var. *biflora* (Ruiz & Pav.) T.R. Bradley

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, VAL, RME, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### **Wahlenbergia**

***Wahlenbergia berteroi* Hook. & Arn.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Wahlenbergia fernandeziana* A. DC.**

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Wahlenbergia grahamae* Hemsl.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 400-600 m.

***Wahlenbergia linarioides* (Lam.) A. DC.**

Sinónimos: *Campanula arida* Kunth, *Campanula chilensis* Molina, *Campanula linarioides* Lam., *Wahlenbergia arida* (Kunth) Griseb., *Wahlenbergia linarioides* (Lam.) A. DC. var. *arida* (Kunth) A. DC., *Wahlenbergia linarioides* (Lam.) A. DC. var. *micrantha* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Uño-perquén.

***Wahlenbergia masafuerae* (Phil.) Skotts.**

Sinónimos: *Euphorbia masafuerae* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

***Wahlenbergia tuberosa* Hook.f.**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Perú.

## CAPRIFOLIACEAE

### Centranthus

*Centranthus ruber* (L.) DC.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: JFE.

### Dipsacus

*Dipsacus sativus* (L.) Honck.  
Hierba. Biental. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LRI, JFE.

### Knautia

*Knautia integrifolia* Bertol.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ARA.

### Sambucus

*Sambucus nigra* L.  
Arbusto o árbol pequeño. Introducido.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

### Scabiosa

*Scabiosa atropurpurea* L.  
Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA, JFE.

### Stangea

*Stangea paulae* Graebn.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 4700-5200 m.  
Países limítrofes: Perú.

### Valeriana

*Valeriana aequiloba* Clos  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

*Valeriana atacamensis* Borsini  
Sinónimos: *Valeriana pubescens* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

*Valeriana boelckei* Rossow  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, ARA.  
Rango altitudinal: 1500-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Valeriana bracteosa* Phil.  
Sinónimos: *Valeriana rupestris* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, NUB.  
Rango altitudinal: 1000-1600 m.

*Valeriana bridgesii* Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Valeriana regularis* Clos, *Valeriana simplex*  
Clos, *Valeriana phellocarpa* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 200-900 m.

*Valeriana carnosa* Sm.  
Sinónimos: *Valeriana magellanica* Lam.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS,  
MAG.  
Rango altitudinal: 0-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Valeriana castellanosi* Borsini  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 4200-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Valeriana chilensis* Borsini  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 1000-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Valeriana clarionifolia* Phil.  
Sinónimos: *Valeriana spegazzini* Skotts., *Valeriana*  
*sarcophylla* Stuck. & Briq., *Phyllactis clarionifolia* (Phil.)  
Speg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, AIS.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Valeriana crispa* Ruiz & Pav.  
Sinónimos: *Valeriana oreocharis* Phil., *Valeriana floribunda*  
Phil., *Valeriana lobata* (Hook. & Arn.) Höck, *Astrephia*  
*lobata* Hook. & Arn., *Valeriana excelsa* Reiche  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana fonckii*** Phil.

Sinónimos: *Valeriana crenata* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana fragilis*** Clos

Sinónimos: *Betckea heterophylla* Phil., *Valeriana heterophylla* Phil., *Valeriana integrifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Valeriana graciliceps*** Clos

Sinónimos: *Valeriana lutescens* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

***Valeriana grandifolia*** Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Valeriana hebecarpa*** DC.

Sinónimos: *Valeriana columbaria* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana hornschuchiana*** Walp.

Sinónimos: *Valeriana glauca* auct. non DC., *Valeriana rotundiloba* Clos, *Valeriana bustillosii* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana hyalinorrhiza*** Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Bolivia.

***Valeriana interrupta*** Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

***Valeriana lapathifolia*** Vahl

Sinónimos: *Valeriana cordata* Griseb., *Valeriana cordata* Griseb. var. *dentata* Phil., *Valeriana andonaegui* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hualhuilque, gualhuilque.

***Valeriana laxiflora*** DC.

Sinónimos: *Valeriana laxa* Phil., *Valeriana rupicola* Poepp. & Endl., *Valeriana sparsiflora* Clos, *Valeriana foliosa* Phil., *Valeriana lyrata* Phil., *Valeriana pearcei* Phil., *Valeriana laxiflora* DC. var. *cardaminifolia* Poepp. & Endl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana lepidota*** Clos

Sinónimos: *Valeriana colchaguensis* Phil., *Valeriana maipoana* Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1000-2300 m.

***Valeriana leucocarpa*** DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana macrorrhiza*** DC.

Sinónimos: *Phyllactis macrorrhiza* (DC.) Wedd., *Phyllactis gilliesii* (Hook. & Arn.) Wedd., *Valeriana gilliesii* (Hook. & Arn.) Stuck. & Briq., *Betckea gilliesii* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1500-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Triaca del cerro.

***Valeriana moyanoi*** Speg.

Sinónimos: *Valeriana fonckii* Phil. var. *spiciformis* Dusén, *Valeriana radicalis* Clos var. *patagonica* Hicken

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana nivalis*** Wedd.

Sinónimos: *Valeriana altoandina* Cabrera  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3600-4800 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.  
Nombre vulgar: Waji.

***Valeriana obtusifolia*** DC.

Sinónimos: *Valeriana obovata* Clos, *Valeriana aegilitis* Phil., *Valeriana araucana* Phil., *Valeriana crassicaulis* Phil., *Valeriana compacta* Phil., nom. illeg.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 0-1100 m.

***Valeriana papilla*** Bertero ex DC.

Sinónimos: *Valeriana berterii* Colla, *Valeriana papilla* Bertero ex DC. var. *andicola* Clos  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 200-2000 m.  
Nombre vulgar: Papilla.

***Valeriana peltata*** Clos

Sinónimos: *Valeriana pterocarpa* Hook. & Arn.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Valeriana petersenii*** Weberling & Reese

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 3000-5000 m.  
Países limítrofes: Bolivia.

***Valeriana philippiana*** Briq.

Sinónimos: *Valeriana pulchella* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 1000-2400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana polemoniifolia*** Phil.

Sinónimos: *Valeriana pugae* Phil., *Valeriana caudata* Phil., *Valeriana germainii* Briq.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana pycnantha*** A. Gray

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4000-4900 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Valeriana radicalis*** Clos

Sinónimos: *Valeriana andina* F. Meigen  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2000-3400 m.

***Valeriana samolifolia*** (DC.) Colla

Sinónimos: *Plectritis congesta* (Lindl.) DC., *Betckea samolifolia* DC., *Valerianella samolifolia* (DC.) A. Gray, *Plectritis samolifolia* (DC.) Höck  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana sedifolia*** d'Urv.

Sinónimos: *Phyllactis sedifolia* (d'Urv.) Wedd., *Valeriana sedoides* Hombr. & Jacq., *Aretiastrum sedifolium* (d'Urv.) Graebn., Macloskie, *Valeriana magellanica* Hombr. & Jacquinet ex Decne  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 500-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana senecioides*** Phil.

Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Valeriana sphaerocarpa*** Phil.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: VAL.

***Valeriana stricta*** Clos

Sinónimos: *Valeriana glauca* DC., *Valeriana glauca* DC. var. *elegans* (Clos) Reiche, *Valeriana elegans* Clos  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1000-3300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Valeriana urbanii*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3500-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Waje.

***Valeriana vaga*** Clos

Sinónimos: *Valeriana muriculata* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1000-2800 m.

***Valeriana valdiviana*** Phil.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

***Valeriana velutina*** Clos

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 1500-2200 m.

***Valeriana verticillata*** Clos

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

***Valeriana virescens*** Clos

Sinónimos: *Valeriana montteana* Phil., *Valeriana virescens*  
Clos var. *montteana* (Phil.) Reiche  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Valerianella**

***Valerianella eriocarpa*** Desv.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: BIO, ARA, LRI.

***Valerianella locusta*** (L.) Laterr.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

***Valerianella rimosa*** Bast

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ARA.

**CARDIOPTERIDACEAE**

**Citronella**

***Citronella mucronata*** (Ruiz & Pav.) D. Don

Sinónimos: *Villaresia mucronata* Ruiz & Pav., *Villaresia gongonha* (Mart.) Miers var. *pungens* (Miers) Engl., *Villaresia chilensis* Stuntz, *Villaresia pungens* Miers, *Villaresia mucronata* Ruiz & Pav. var. *laeta* Miers, *Patagua chilensis* Poepp. ex Nege

Árbol. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-700 m.  
Nombre vulgar: Huillipatagua, naranjillo.

**CARICACEAE**

**Carica**

***Carica chilensis*** (Planch. ex A. DC.) Solms

Sinónimos: *Vasconcellea chilensis* Planch. ex A. DC., *Papaya chilensis* (Planch. ex A. DC.) Kuntze, *Carica pyriformis* Hook. & Arn.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Palo gordo, monte gordo.

**CARYOPHYLLACEAE**

**Agrostemma**

***Agrostemma githago*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: BIO, ARA.

**Arenaria**

***Arenaria digyna*** D.K.F. Schldl.

Sinónimos: *Arenaria serpylloides* Gay  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 500-4200 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Arenaria fastigiata*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.

***Arenaria oligosperma*** Naudin

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ.

***Arenaria pleurantha*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LLA, AIS.

***Arenaria rivularis*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.



Rango altitudinal: 3200-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Arenaria serpens* Kunth**

Sinónimos: *Arenaria microphylla* Phil., *Arenaria andicola* Gillies, *Arenaria andicola* Gillies var. *caespitosa* (Phil.) Hauman, *Arenaria caespitosa* Phil., *Arenaria palustris* Naudin, *Arenaria palustris* Naudin var. *patagonica* (Phil.) Reiche, *Arenaria patagonica* Phil., *Arenaria serpens* Kunth var. *andicola* (Gillies) Rohrb., *Arenaria serpens* Kunth var. *caespitosa* (Phil.) Hauman, *Arenaria serpens* Kunth var. *microphylla* (Phil.) Spæg., *Arenaria serpens* Kunth var. *palustris* (Naudin) Spæg., *Arenaria serpens* Kunth var. *patagonica* (Phil.) Spæg., *Arenaria serpylloides* Naudin var. *andicola* (Gillies) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 3000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Arenaria serpyllifolia* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, BIO, AIS, MAG.

**Augustea**

***Augustea coquimbensis* (Gereau & Martic.) Iamónico**

Sinónimos: *Polycarpon coquimbense* Gereau & Martic.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1200-1700 m.

**Cardionema**

***Cardionema andinum* (Phil.) A. Nelson & J.F. Macbr.**

Sinónimos: *Pentacaena andina* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

***Cardionema kurtzii* Subils**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1500-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardionema ramosissima* (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.**

Sinónimos: *Acanthonychia ramosissima* (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr., *Loeflingia ramosissima* Weinm., *Paronychia ramosissima* (Weinm.) DC., *Pentacaena ramosissima* (Weinm.) Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-3600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Jaramilla.

**Cerastium**

***Cerastium arvense* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Cerastium fontanum* Baumg. subsp. *vulgare* (Hartmann) Greuter & Burdet**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Cerastium glomeratum* Thuill.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Cerastium humifusum* Cambess.**

Sinónimos: *Cerastium montioides* Naudin

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Cerastium mucronatum* Wedd.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4300-4400 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

**Colobanthus**

***Colobanthus lycopodioides* Griseb.**

Sinónimos: *Colobanthus lechleri* Phil., *Drudea lycopodioides* (Griseb.) Griseb.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, MAG.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Colobanthus quitensis* (Kunth) Bartl.**

Sinónimos: *Colobanthus cherlerioides* Hook.f., *Colobanthus crassifolius* (d'Urv.) Hook.f., *Colobanthus meigeni* Phil., *Sagina crassifolia* d'Urv., *Sagina quitensis* Kunth, *Colobanthus saginoides* Bartl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,

MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

*Colobanthus subulatus* (d'Urv.) Hook.f.  
Sinónimos: *Colobanthus subulatus* (d'Urv.) Hook.f. var. *darwinii* Hook.f., *Sagina subulata* d'Urv.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### Corrigiola

*Corrigiola crassifolia* Chaudhri  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, RME.

*Corrigiola propinqua* Gay  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, LBO.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

*Corrigiola squamosa* Hook. & Arn. var. *latifolia* (Gay) Skottsb.  
Sinónimos: *Corrigiola latifolia* Gay  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

*Corrigiola squamosa* Hook. & Arn. var. *poepigii* Chaudhri  
Sinónimos: *Corrigiola glomeruliflora* Steud.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

*Corrigiola squamosa* Hook. & Arn. var. *squamosa*  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

### Dianthus

*Dianthus armeria* L.  
Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: ARA.

### Drymaria

*Drymaria cordata* (L.) Willd. ex Roem. & Schult.  
Sinónimos: *Drymaria cordata* (L.) Willd. ex Roem. & Schult. var. *pacifica* Mizush., *Holosteum cordatum* L.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

*Drymaria engleriana* (Muschl.) Baehni & J.F. Macbr. var. *devia* (Baehni & J.F. Macbr.) J.A. Duke  
Sinónimos: *Drymaria devia* Baehni & J.F. Macbr.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 3500 m.  
Países limítrofes: Perú.

*Drymaria paposana* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

### Herniaria

*Herniaria cinerea* DC.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ.

### Lychnis

*Lychnis coronaria* (L.) Desr.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: BIO, ARA.

### Microphyes

*Microphyes litoralis* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-800 m.  
Países limítrofes: Bolivia.

*Microphyes minima* (Miers ex Colla) Briq.  
Sinónimos: *Microphyes lanuginosus* Phil., *Talinum minimum* Miers ex Colla  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.

*Microphyes robustus* Ricardi var. *pallidus* Ricardi  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 500-900 m.

*Microphyes robustus* Ricardi var. *robustus*  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 800-1000 m.

### **Paronychia**

***Paronychia chilensis*** DC. subsp. *chilensis* var. *chilensis*

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, JFE.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Paronychia chilensis*** DC. subsp. *chilensis* var. *mutica* (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Paronychia mutica* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, BIO.

***Paronychia chilensis*** DC. subsp. *subandina* (Phil.) Chaudhri

Sinónimos: *Paronychia subandina* Phil., *Paronychia chilensis* DC. var. *subandina* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

***Paronychia coquimbensis*** Gay var. *appressa* (Phil.) Chaudhri

Sinónimos: *Paronychia appressa* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

***Paronychia coquimbensis*** Gay var. *coquimbensis*

Sinónimos: *Paronychia chilensis* DC. var. *coquimbensis* (Gay) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

***Paronychia franciscana*** Eastw.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, JFE.

Rango altitudinal: 100-1500 m.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernandez.

***Paronychia johnstonii*** Chaudhri var. *johnstonii*

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

***Paronychia johnstonii*** Chaudhri var. *scabrida* Chaudhri

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

***Paronychia microphylla*** Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2200-3500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Té de burro.

***Paronychia setigera*** (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm.

Sinónimos: *Herniaria setigera* Gillies ex Hook. & Arn., *Paronychia chilensis* DC. var. *andina* (Phil.) Reiche,

*Paronychia subandina* Gand., nom. illeg., *Paronychia andina* Phil., nom. illeg., *Paronychia australis* Gillies

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

### **Petrorhagia**

***Petrorhagia dubia*** (Raf.) G. López & Romo

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

***Petrorhagia prolifera*** (L.) P.W. Ball & Heyw.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, NUB, BIO, ARA.

### **Philippiella**

***Philippiella patagonica*** Speg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

### **Polycarpon**

***Polycarpon moreiranum*** Muñoz-Schick

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 774 m.

***Polycarpon tetraphyllum*** (L.) L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

### **Pycnophyllopsis**

***Pycnophyllopsis lanatum*** (Phil.) M. E. Timaná

Sinónimos: *Pycnophyllum lanatum* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1550-2600 m.

### **Pycnophyllum**

***Pycnophyllum bryoides*** (Phil.) Rohrb.

Sinónimos: *Stichophyllum bryoides* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4100-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Yaretilla.

***Pycnophyllum glomeratum* Mattf.**

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 4200-4500 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Pycnophyllum macropetalum* Mattf.**

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4000-4800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Ayro macho.

***Pycnophyllum molle* J. Remy**

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3500-4800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Yaretilla.

***Pycnophyllum spathulatum* Mattf.**

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4000-5000 m.  
Países limítrofes: Bolivia.

**Reicheella**

***Reicheella andicola* (Phil.) Pax**

Sinónimos: *Lyallia andicola* Phil., *Bryopsis andicola*  
Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Nombre vulgar: Yaretilla de agua.

**Sabulina**

***Sabulina acutiflora* (Fenzl ex Endl.) Dillenb. & Kadereit**

Sinónimos: *Minuartia acutiflora* (Fenzl ex Endl.) Mattf.,  
*Alsine acutiflora* Fenzl ex Endl., *Alsine minuta* (Naudin)  
Rohrb., *Arenaria minuta* Naudin, *Minuartia minuta*  
(Naudin) Roquero  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

**Sagina**

***Sagina apetala* Ard. var. *apetala***

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LLA.

***Sagina apetala* Ard. var. *pachyrrhiza* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Sagina pachyrrhiza* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: RME.

***Sagina apetala* Ard. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Sagina valdiviana* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: LLA.

***Sagina chilensis* Naudin**

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Sagina procumbens* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,  
MAG.

**Saponaria**

***Saponaria officinalis* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LRI, LLA, AIS.

**Scleranthus**

***Scleranthus annuus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

**Silene**

***Silene andicola* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Melandrium andicum* (Gillies ex Hook. &  
Arn.) Rohrb., *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var.  
*cucubaloides* (Fenzl) Hosseus, *Melandrium cucubaloides*  
Fenzl ex Rohrb., *Lychnis andicola* (Gillies ex Hook. &  
Arn.) Rusby  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 1500-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Silene antarctica* (Kuntze) Pedersen**

Sinónimos: *Lychnis antarctica* Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 1000-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Silene armeria* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: BIO, ARA.

***Silene chilensis* (Naudin) Bocquet**

Sinónimos: *Lychnis chilensis* Naudin, *Lychnis terminalis* Naudin, *Melandrium andicolum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rohrb. var. *nubigenum* (Phil.) Reiche, *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb., *Silene nubigena* Phil., *Melandrium terminale* (Naudin) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 2000-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Silene chubutensis* (Speg.) Bocquet**

Sinónimos: *Lychnis chubutensis* Speg., *Melandrium chubutense* (Speg.) Speg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Silene gallica* L.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Silene magellanica* (Desr.) Bocquet**

Sinónimos: *Lychnis magellanica* Desr., *Melandrium magellanicum* (Desr.) Fenzl ex Rohrb., *Lychnis graminea* Molina, nom. nud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Silene mandonii* (Rohrb.) Bocquet**

Sinónimos: *Melandrium mandonii* Rohrb., *Melandrium rimbachii* Mattf.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 1500-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Silene patagonica* (Speg.) Bocquet**

Sinónimos: *Silene densifolia* (Dusén) Bocquet, *Lychnis patagonica* Speg., *Melandrium densifolium* Dusén, *Melandrium patagonicum* (Speg.) Speg., *Lychnis*

*patagonica* Speg. fma. *glabriuscula* H. Ross  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 1000-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Silene plutonica* Naudin**

Sinónimos: *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var. *plutonicum* (Naudin) Hosseus, *Melandrium plutonicum* (Naudin) Reiche, *Silene glutinosa* Walp., nom. nud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 1000-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Silene vulgaris* (Moench) Garcke**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: RME, ARA.

**Spergula**

***Spergula arvensis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

***Spergula bocconii* (Scheele) Pedersen**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG, JFE, IDE.

***Spergula cerviana* (Cham. & Schltdl.) D. Dietr.**

Sinónimos: *Arenaria cerviana* Cham. & Schltdl., *Spergularia cerviana* (Cham. & Schltdl.) G. Don, *Lepigonum purpureum* Kindb. var. *firmum* Kindb., *Spergularia firma* (Kindb.) Rohrb., *Spergularia polyantha* Phil., *Arenaria polyantha* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Spergula depauperata* (Naudin) Pedersen**

Sinónimos: *Spergularia depauperata* (Naudin) Rohrb., *Arenaria depauperata* Naudin, *Lepigonum depauperatum* (Naudin) Kindb., *Spergularia depauperata* (Naudin) Rohrb. var. *tenella* (Phil.) Hauman & Irigoyen, *Spergularia tenella* Phil., *Tissa depauperata* (Naudin) Reiche, *Tissa depauperata* (Naudin) Reiche var. *tenella* (Phil.) Hauman, *Lepigonum grandiflorum* Kindb., *Spergularia grandiflora* (Kindb.) Rohrb., *Spergularia rengifoii* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, NUB, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 500-3800 m.  
Países limítrofes: Argentina.



***Spergula pissisi*** (Phil.) Volponi  
Sinónimos: *Spergularia pissisii* (Phil.) I.M. Johnst.,  
*Arenaria pissisi* Phil., *Tissa pissisi* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2500-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Spergula platensis*** (Cambess.) Shinnors  
Sinónimos: *Balardia platensis* Cambess.  
Hierba. Anual o bienal. Nativa.  
Distribución: RME, BIO, ARA.  
Países limítrofes: Argentina.

***Spergula rubra*** (L.) D. Dietr.  
Hierba. Anual o perenne. Introducida.  
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,  
JFE.

***Spergula villosa*** Pers.  
Sinónimos: *Spergularia villosa* (Pers.) Cambess., *Arenaria  
berteroana* Phil., *Spergularia villosa* (Pers.) Cambess. var.  
*berteroana* (Phil.) Rohrb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

## **Spergularia**

***Spergularia aberrans*** I.M. Johnst.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT.

***Spergularia arbuscula*** (Gay) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Paronychia arbuscula* Gay, *Arenaria teretifolia*  
Phil., *Arenaria lignosa* Phil., *Spergularia lignosa* (Phil.)  
Rohrb., *Spergularia fruticosa* Phil., *Spergularia teretifolia*  
(Phil.) Phil., *Tissa lignosa* (Phil.) Reiche, *Tissa teretifolia*  
(Phil.) Reiche  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Spergularia confertiflora*** Steud.  
Sinónimos: *Spergularia confertiflora* Steud. var. *polyphylla*  
(Phil.) Skotts., *Spergularia polyphylla* (Phil.) Rohrb., *Tissa  
polyphylla* (Phil.) Reiche, *Arenaria rubra* L. var. *polyphylla*  
Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE, IDE.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Spergularia cremnophila*** I.M. Johnst.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Spergularia denticulata*** (Phil.) Phil.  
Sinónimos: *Arenaria denticulata* Phil., *Tissa denticulata*  
(Phil.) Reiche  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Spergularia dillenii*** Lebel  
Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: COQ, RME, MAU.

***Spergularia fasciculata*** Phil.  
Sinónimos: *Tissa stuebellii* Hieron., *Tissa fasciculata* (Phil.)  
Reiche, *Spergularia stuebellii* (Hieron.) I.M. Johnst.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3000-3800 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Alhucema.

***Spergularia floribunda*** (Gay) Rohrb.  
Sinónimos: *Arenaria floribunda* Gay, *Spergularia  
coquimbensis* Phil., *Tissa floribunda* (Gay) Reiche,  
*Lepigonum floribundum* (Gay) Kindb.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Spergularia manicata*** (Skotts.) Kool & Thulin  
Sinónimos: *Sanctambrosia manicata* (Skotts.) Skotts.,  
*Paronychia manicata* Skotts.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: IDE.

***Spergularia marina*** (L.) Griseb.  
Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, LLA, AIS, MAG.

***Spergularia masafuerana*** Skotts.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Spergularia media*** (L.) C. Presl  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

*Spergularia pycnantha* R. Roszbach  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

*Spergularia stenocarpa* (Phil.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Arenaria stenocarpa* Phil., *Spergularia larrañagae* Phil., *Spergularia borchersi* Phil., *Tissa borchersi* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

### Stellaria

*Stellaria alsine* Grimm  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: AIS, MAG.

*Stellaria arvalis* Fenzl ex F. Phil.  
Sinónimos: *Stellaria cuspidata* Schtdl. var. *alsineformis* Naudin  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Stellaria chilensis* Pedersen  
Sinónimos: *Stellaria concinna* Ravenna, *Stellaria circinata* Ravenna, *Stellaria celsa* Ravenna  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.  
Rango altitudinal: 0-3400 m.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

*Stellaria debilis* d'Urv.  
Sinónimos: *Alsine axillaris* (Phil.) Macloskie, *Alsine chubutensis* (Speg.) Macloskie, *Alsine debile* (d'Urv.) Macloskie, *Stellaria axillaris* Phil., *Stellaria chubutensis* Speg., *Stellaria debilis* d'Urv. var. *condensata* (A. Gray ex Macloskie) Hauman & Irigoyen, *Stellaria stenopetala* Phil., *Stellaria stenopetala* Phil. var. *axillaris* (Phil.) Hauman, *Stellaria stenopetala* Phil. var. *chubutensis* (Speg.) Hauman, *Stellaria stenopetala* Phil. var. *magellanica* Phil., *Stellaria stenopetala* Phil. var. *typica* Hauman, nom. illeg., *Stellaria xanthospora* Chodat & Wilczek  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Stellaria media* (L.) Vill.  
Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

*Stellaria pallida* (Dumort.) Crép.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: RME, MAG.

*Stellaria parviflora* Banks & Sol. ex Hook.f. subsp. *ignis* Pedersen  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Stellaria weddellii* Pedersen  
Sinónimos: *Stellaria cuspidata* Schtdl. var. *sessilifolia* Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 3100-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

### CELASTRACEAE

#### Lepuropetalon

*Lepuropetalon spathulatum* Muhl. ex Elliott  
Sinónimos: *Pyxidantha spathulata* Muhl., *Cryptopetalum pusillum* Hook. & Arn., *Lepuropetalon pusillum* (Hook. & Arn.) Gay  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

#### Maytenus

*Maytenus boaria* Molina  
Sinónimos: *Maytenus boaria* Molina var. *angustifolia* Turcz., *Maytenus chilensis* DC., *Maytenus chilensis* DC. var. *angustifolius* DC., *Celastrus uncinatus* Ruiz & Pav., *Maytenus crenulatus* C. Presl, *Boaria molinae* A. DC., *Maytenus magellanica* auct. non (Lam.) Hook.f., *Maytenus uncinatus* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Senecia maytenus* Lam., *Celastrum maytenus* Willd.  
Árbol. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Maitén.

**Maytenus chubutensis** (Speg.) Lourteig, O'Donell & Sleumer

Sinónimos: *Pernettya chubutensis* Speg.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

**Maytenus disticha** (Hook.f.) Urb.

Sinónimos: *Myginda disticha* Hook.f., *Rhacoma disticha* (Hook.f.) Loes.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

**Maytenus magellanica** (Lam.) Hook.f.

Sinónimos: *Cassine magellanica* Lam., *Celastrus megellanicus* (Lam.) DC., *Maytenus andina* Phil., *Euthalis lucida* Banks & Sol. ex Hook.f.

Árbol. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Leña dura.

## CERATOPHYLLACEAE

### Ceratophyllum

**Ceratophyllum demersum** L.

Sinónimos: *Ceratophyllum tricuspidatum* Dumort., *Ceratophyllum oxyacanthum* Cham., *Ceratophyllum tuberculatum* Cham., *Ceratophyllum apiculatum* Cham., *Ceratophyllum chilense* Leyb., *Ceratophyllum aquaticum* H.C. Watson, *Ceratophyllum australis* Griseb.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, NUB.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Cola de zorro, lila de agua, pelo de agua, baba de sapo, hilo de agua.

## CHENOPODIACEAE

### Atriplex

**Atriplex atacamensis** Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 200-3000 m.

Nombre vulgar: Cachiyuyo.

**Atriplex chapinii** I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

**Atriplex chilensis** Colla

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-100 m.

**Atriplex chizae** Rosas

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

**Atriplex clivicola** I.M. Johnst.

Sinónimos: *Atriplex clivicola* I.M. Johnst. var. *lopholepis* I.M. Johnst., *Obione clivicola* (I.M. Johnst.) Ulbr.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-700 m.

**Atriplex coquimbana** Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 300-500 m.

**Atriplex costellata** Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-200 m.

**Atriplex deserticola** Phil.

Sinónimos: *Atriplex podocarpa* Phil., *Atriplex retusa* Gay, *Obione retusa* (Gay) Ulbr.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cachiyuyo.

**Atriplex glaucescens** Phil.

Sinónimos: *Atriplex polyphylla* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1300-3700 m.

Nombre vulgar: Juirajuirá.

**Atriplex hortensis** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, RME.

***Atriplex hystrix*** Phil.

Sinónimos: *Atriplex mucronata* Phil., nom. illeg., *Obione hystrix* (Phil.) Ulbr., *Obione mucronata* (Phil.) Ulbr.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Atriplex imbricata*** (Moq.) D. Dietr. var. ***foliolosa*** (Phil.)

Rosas

Sinónimos: *Atriplex foliolosum* Phil., *Atriplex sanambrosiana* Sparre

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Atriplex imbricata*** (Moq.) D. Dietr. var. ***imbricata***

Sinónimos: *Atriplex axillaris* Phil., *Atriplex microphylla* Phil., *Obione imbricata* Moq., *Atriplex salaris* Phil., *Obione axillaris* (Phil.) Ulbr.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3500-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Cachiyuyo, chókel, ojalar, kopakopa macho, pilaya.

***Atriplex leuca*** Phil.

Sinónimos: *Atriplex densifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Atriplex madariagae*** Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 200-2700 m.

Nombre vulgar: Cachial, kachiyuyo, kórial, chókel, juirajura.

***Atriplex myriophylla*** Phil.

Sinónimos: *Atriplex pusilla* (Wedd.) Phil., comb. illeg., *Obione pusilla* Wedd., hom. illeg., *Obione myriophylla* (Phil.) Ulbr.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Atriplex nummularia*** Lindl.

Arbusto. Introducido.

Distribución: ANT, COQ.

***Atriplex oreophila*** Phil.

Sinónimos: *Atriplex humilis* Phil., hom. illeg., *Atriplex hypsophila* I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Atriplex patula*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, BIO, ARA, LLA, MAG.

***Atriplex peruviana*** Moq.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 0-1900 m.

Países limítrofes: Perú.

***Atriplex philippii*** R.E. Fr.

Sinónimos: *Atriplex prostrata* Phil., hom. illeg.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Nombre vulgar: Pasto cenizo.

***Atriplex prostrata*** Boucher ex DC.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, RME, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

***Atriplex repanda*** Phil.

Sinónimos: *Atriplex angustifolia* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Sereno.

***Atriplex rosea*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ.

***Atriplex semibaccata*** R. Br.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

***Atriplex suberecta*** I. Verd.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ.

***Atriplex taltalensis*** I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Atriplex tatarica*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME.

*Atriplex vallenarensis* Rosas  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-600 m.

*Atriplex vulgarissima* Speg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Bassia**

*Bassia hyssopifolia* (Pall.) Kuntze  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, ATA, VAL, RME.

### **Beta**

*Beta vulgaris* L. subsp. *maritima* (L.) Arcang.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ATA, VAL, RME.

*Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris*  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: TAR, JFE.

### **Chenopodiastrum**

*Chenopodiastrum murale* (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,  
LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IDE.

### **Chenopodium**

*Chenopodium album* L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,  
LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

*Chenopodium antarcticum* (Hook.f.) Benth. & Hook.f.  
Sinónimos: *Blitum antarcticum* Hook.f., *Chenopodium antarcticum* (Hook.f.) Speg., comb. illeg.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Chenopodium carnosulum* Moq.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, LLA, AIS, MAG.

*Chenopodium crusoeanum* Skottsbo.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

*Chenopodium ficifolium* Sm.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, LLA, MAG.

*Chenopodium frigidum* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.  
Rango altitudinal: 3200-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Chápir, yuyo, quínoa chica, illankoma.

*Chenopodium glaucum* L.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: IPA.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Huataru (Rapa Nui).

*Chenopodium hircinum* Schrad.  
Sinónimos: *Chenopodium hircinum* Schrad. var. *typicum* A. Ludw. & Aellen, nom. illeg.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,  
LBO, NUB, LRI.  
Rango altitudinal: 0-1400 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Yuyo, quinoa, illinkoma, ajara, quinoa de los abuelos.

*Chenopodium mandonii* (S. Watson) Aellen  
Sinónimos: *Teloxys mandonii* S. Watson  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, VAL.  
Rango altitudinal: 2000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

*Chenopodium nesodendron* Skottsbo.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 300-500 m.

*Chenopodium papulosum* Moq.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, BIO, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Chenopodium petiolare* Kunth  
Sinónimos: *Chenopodium sparsiflorum* Phil., *Chenopodium hastatum* Phil.



Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 2000-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Yuyo, kañawe, juirajuirea, obleo, kantalo.

***Chenopodium philippianum*** Aellen

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 2000-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Chenopodium quinoa*** Willd.

Sinónimos: *Chenopodium quinoa* Willd. fma. *purpurascens* Aellen  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, NUB, LLA.  
Rango altitudinal: 0-3800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Quínoa, quingua, quinua, chula, ch'iva, ch'ivaqhora.

***Chenopodium sanctae-clarae*** Johow

Arbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Chenopodium sancti-ambrosii*** Skottsbo.

Arbusto. Endémico.  
Distribución: IDE.  
Rango altitudinal: 300-500 m.

***Chenopodium trifurcatum*** Phil.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 350-2900 m.

***Chenopodium vulvaria*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: TAR, ANT, VAL, RME, LBO, MAU.

**Dysphania**

***Dysphania ambrosioides*** (L.) Mosyakin & Clemants  
Sinónimos: *Ambrina parvula* Phil., *Ambrina ambrosioides* (L.) Spach, *Teloxys ambrosioides* (L.) W.A. Weber, *Chenopodium ambrosioides* L., *Ambrina incisa* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IDE.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Paico, arka, toronjil dulce.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Dysphania chilensis*** (Schrad.) Mosyakin & Clemants  
Sinónimos: *Ambrina andicola* Phil., *Ambrina denudata* Phil., *Chenopodium ambrosioides* L. var. *euchilense* Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. fma. *denudatum* (Phil.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *andicola* (Phil.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *chilense* (Schrad.) Griseb., *Chenopodium anthelminticum* L. var. *chilense* (Schrad.) Griseb., *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *chilense* (Schrad.) Aellen, *Ambrina chilensis* (Schrad.) Spach, *Chenopodium vagans* Standl., *Chenopodium chilense* Schrad.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Paico.

***Dysphania microcarpa*** (Phil.) Mosyakin & Clemants

Sinónimos: *Roubieva microcarpa* Phil., *Chenopodium zoellneri* Aellen, *Chenopodium multifidum* L. var. *microcarpum* (Phil.) Reiche, *Chenopodium microcarpum* (Phil.) A. Troncoso  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: VAL, RME.

***Dysphania multifida*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

**Maireana**

***Maireana brevifolia*** (R. Br.) Paul G. Wilson  
Arbusto. Introducido.  
Distribución: IDE.

**Nitrophila**

***Nitrophila atacamensis*** (Phil.) Hieron. ex Ulbr.  
Sinónimos: *Glaux atacamensis* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 2300-4000 m.

**Oxybasis**

***Oxybasis glauca*** (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, LLA, AIS, MAG.

***Oxybasis macrosperma*** (Hook.f.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

Sinónimos: *Chenopodium halophilum* Phil., *Chenopodium macrospermum* Hook.f. subsp. *macrospermum*, *Chenopodium macrospermum* Hook.f. subsp. *salsum* (Phil.) A. Troncoso, *Blitum salsum* Phil., *Chenopodium macrospermum* Hook.f. subsp. *halophilum* (Phil.) Aellen, *Chenopodium macrospermum* Hook.f. var. *halophilum* (Phil.) Standl.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Oxybasis urbica*** (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: JFE.

### Salsola

***Salsola kali*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

### Sarcocornia

***Sarcocornia andina*** (Phil.) Freitag, M.A. Alonso & M.B. Crespo

Sinónimos: *Salicornia andina* Phil., *Salicornia fruticosa* var. *andina* (Phil.) Gunckel, *Salicornia peruviana* var. *andina* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 2300-4200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Sarcocornia magellanica*** (Phil.) M.A. Alonso & M.B. Crespo

Sinónimos: *Salicornia magellanica* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Sarcocornia neei*** (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo

Sinónimos: *Salicornia peruviana* Kunth var. *corticosa* (Meyen) Reiche, *Salicornia peruviana* Kunth var. *doeringii* (Lorentz & Niederl.) Reiche, *Salicornia copiapina* Phil., *Salicornia neei* Lag.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Sosa, hierba sosa, hierba del salitre.

Nota: Introducida en Archipiélago de Juan Fernández. Alonso & Crespo (2008) excluyen a *Sarcocornia fruticosa* de las Américas, creando la combinación *Sarcocornia neei*, sin ser su sinónimo.

***Sarcocornia pulvinata*** (R.E. Fr.) A.J. Scott

Sinónimos: *Salicornia pulvinata* R.E. Fr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3600-4200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Janki, jankijanki, champa, yaretilla de la vega.

### Suaeda

***Suaeda argentinensis*** A. Soriano

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Suaeda foliosa*** Moq.

Sinónimos: *Suaeda foliosa* Moq. var. *tenuifolia* (Phil.) Standl., *Suaeda brevifolia* Phil., *Suaeda divaricata* Moq. var. *brevifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda divaricata* Moq. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda divaricata* Moq. var. *tenuifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda tenuifolia* Phil., *Suaeda parvifolia* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Países limítrofes: Bolivia.

***Suaeda multiflora*** Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-900 m.

***Suaeda nesophila*** I.M. Johnst.

Sinónimos: *Suaeda divaricata* Moq. var. *microphylla* F. Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Suaeda patagonica*** Speg.

Sinónimos: *Lerchea patagonica* (Speg.) Speg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

## CLEOMACEAE

### Cleome

#### *Cleome chilensis* DC.

Sinónimos: *Cleome chilensis* DC. var. *pubescens* DC.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 300-700 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Hierba de los dedos, flor de la abeja, tacma.

## COLUMELLIACEAE

### Desfontainia

#### *Desfontainia fulgens* D. Don

Sinónimos: *Desfontainia chilensis* Gay, *Desfontainia novemdentata* Gand., *Desfontainia ilicifolia* Phil., *Desfontainia hookeri* Dunal, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *hookeri* (Dunal) Reiche, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *chilensis* (Gay) Reiche, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *parvifolia* (D. Don) Hook., *Desfontainia acutangula* Dunal, *Desfontainia costaricensis* Wooson, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pavon, *Desfontainia obovata* Kraenzl., *Desfontainia parvifolia* D. Don, *Desfontainia pulchra* Mold., *Desfontainia splendens* Humb. & Bonpl., *Desfontainia steyemarkii* Mold., *Linkia peruviana* Pers., *Linkia spinosa* (Ruiz & Pav.) Poiret, *Linkia splendens* (Humb. & Bonpl.) Poiret

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chapico, michai blanco, taique, trautrau.

## CONVOLVULACEAE

### Calystegia

#### *Calystegia sepium* (L.) R.Br.

Arbusto trepador. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE, IPA.

#### *Calystegia soldanella* (L.) Roem. & Schult.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 3-280 m.

#### *Calystegia tuguriorum* R. Br. ex Hook. f.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 30-150 m.

Países limítrofes: Argentina.

### Convolvulus

#### *Convolvulus arvensis* L.

Hierba trepadora. Perenne. Introducido.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

#### *Convolvulus bonariensis* Cav.

Sinónimos: *Aniseia diversifolia* Walp., *Convolvulus bonariensis* Cav. var. *multiflorus* Phil., *Convolvulus dissectus* Cav. var. *diversifolius* (Walp.) Reiche, *Convolvulus triflorus* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Correhuela, bocina.

#### *Convolvulus chilensis* Pers.

Sinónimos: *Convolvulus dissectus* Cav., nom. illeg., *Convolvulus canescens* Phil., nom. illeg., *Convolvulus dissectus* Cav. var. *canescens* (Phil.) Reiche

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Nombre vulgar: Correhuela, bocina.

#### *Convolvulus demissus* Choisy

Sinónimos: *Convolvulus andinus* Phil., *Convolvulus demissus* Choisy var. *andinus* (Phil.) Reiche, *Convolvulus demissus* Choisy var. *ovatus* (Phil.) Reiche, *Convolvulus ovatus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Convolvulus hermanniae* L'Hér.

Sinónimos: *Aniseia costata* (Meyen) Walp., *Convolvulus costatus* Meyen, *Convolvulus crenatus* Jacq., *Convolvulus erosus* Desr., *Convolvulus hermanniae* L'Hér. var. *elongatus* Choisy, *Convolvulus hermanniae* L'Hér. var. *viridis* Meisn., *Convolvulus incanus* Vahl, *Ipomoea hermanniae* (L'Hér.) G. Don

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Convolvulus laciniatus*** Desr. var. ***hirsutus*** Desr.  
Sinónimos: *Convolvulus lasianthus* Cav.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Convolvulus laciniatus*** Desr. var. ***laciniatus***  
Sinónimos: *Convolvulus geranioides* Phil., *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn. var. *glabra* Griseb., *Convolvulus laciniatus* Desr. var. *peduncularis* Meisn.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### **Cressa**

***Cressa truxillensis*** Kunth  
Sinónimos: *Cressa australis* R. Br. var. *petiolata* Meisn., *Cressa cretica* L. var. *truxillensis* (Kunth) Choisy  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, RME.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### **Cuscuta**

***Cuscuta andina*** Phil.  
Sinónimos: *Cuscuta racemosa* Mart. var. *andina* (Phil.) Reiche  
Hierba parásita. Anual. Nativa.  
Distribución: MAU.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

***Cuscuta campestris*** Yunck.  
Hierba parásita. Anual. Introducida.  
Distribución: TAR, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

***Cuscuta chilensis*** Ker Gawl.  
Sinónimos: *Cuscuta aurea* Phil.  
Hierba parásita. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 1000-2300 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Cabello de ángel, cúscuta.

***Cuscuta epithymum*** (L.) Murray ex L. var. ***angustissima*** (Engelm.) Yunck.  
Hierba parásita. Anual. Introducida.  
Distribución: RME, ARA.

***Cuscuta micrantha*** Choisy var. ***holwayi*** Yunck.  
Hierba parásita. Anual. Endémica.  
Distribución: MAU.  
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

***Cuscuta micrantha*** Choisy var. ***latiflora*** Engelm.  
Hierba parásita. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

***Cuscuta micrantha*** Choisy var. ***micrantha***  
Sinónimos: *Cuscuta micrantha* Choisy var. *typica* Yunck., nom. illeg.  
Hierba parásita. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO.  
Rango altitudinal: 3000 m.  
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

***Cuscuta microstyla*** Engelm. var. ***bicolor*** (Hunz.) Hunz.  
Sinónimos: *Cuscuta bicolor* Hunz.  
Hierba parásita. Anual. Nativa.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2000-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

***Cuscuta microstyla*** Engelm. var. ***microstyla***  
Sinónimos: *Cuscuta microstyla* Engelm. var. *typica* Hunz., nom. illeg.  
Hierba parásita. Anual. Endémica.  
Distribución: RME, BIO.  
Rango altitudinal: 1600-3100 m.  
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

***Cuscuta odorata*** Ruiz & Pav.  
Hierba parásita. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, LBO.  
Rango altitudinal: 600-1500 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

***Cuscuta pauciflora*** Phil.  
Hierba parásita. Anual. Nativa.  
Distribución: MAU, LRI.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

***Cuscuta purpurata* Phil.**

Hierba parásita. Anual. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-300 m.  
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

***Cuscuta pusilla* Phil.**

Hierba parásita. Anual. Endémica.  
Distribución: LLA.  
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

***Cuscuta rustica* Hunz.**

Hierba parásita. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 4000 m.  
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

***Cuscuta suaveolens* Ser.**

Sinónimos: *Cuscuta racemosa* Mart. var. *chiliana* Engelm.,  
*Cuscuta floribunda* Phil.  
Hierba parásita. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO,  
MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

***Cuscuta werdermannii* Hunz.**

Hierba parásita. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 300 m.  
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

**Dichondra**

***Dichondra microcalyx* (Hallier f.) Fabris**

Sinónimos: *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var.  
*microcalyx* Hallier f., *Dichondra repens* auct. non J.R.  
Forst. & G. Forst., *Dichondra sericea* Sw. var. *microcalyx*  
(Hallier f.) H.T. Buck  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, ARA.  
Rango altitudinal: 0-900 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Dichondra sericea* Sw. var. *holosericea* (O'Donell) Fabris**

Sinónimos: *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var.  
*holosericea* O'Donell  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Dichondra sericea* Sw. var. *sericea***

Sinónimos: *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var.  
*sericea* (Sw.) Choisy, *Dichondra parviflora* Meisn.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,  
NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

**Evolvulus**

***Evolvulus sericeus* Sw. var. *elongatus* (Choisy) O'Donell**

Sinónimos: *Evolvulus incanus* Pers. var. *elongatus* Choisy,  
*Leucomalla lanuginosa* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Evolvulus sericeus* Sw. var. *sericeus***

Sinónimos: *Evolvulus araucanus* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**Ipomoea**

***Ipomoea dumetorum* Willd. ex Roem. & Schult.**

Sinónimos: *Convolvulus dumetorum* Kunth, *Convolvulus*  
*pauciflorus* Roem. & Schult., *Convolvulus pauciflorus* Roem.  
& Schult. var. *chilensis* (A. Braun & Bouché) Kuntze, *Ipomoea*  
*chilensis* A. Braun & Bouché, *Ipomoea paposana* Phil.  
Hierba trepadora. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 900-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr.**

Hierba trepadora. Perenne. Introducida.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Ipomoea pes-caprae* (L.) R. Br.**

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: IPA.  
Nombre vulgar: Tanoa, tano'a.

***Ipomoea purpurea* (L.) Roth**

Sinónimos: *Convolvulus purpureus* L.  
Hierba trepadora. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.



## CORIARIACEAE

### Coriaria

#### *Coriaria ruscifolia* L.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-1600 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Deu, huique, huiqui, matarratones.

## CRASSULACEAE

### Crassula

#### *Crassula closiana* (Gay) Reiche

Sinónimos: *Tillaea closiana* Gay

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

#### *Crassula connata* (Ruiz & Pav.) A. Berger var. *connata*

Sinónimos: *Crassula erecta* (Hook. & Arn.) Berger, *Tillaea connata* Ruiz & Pav., *Tillaeae erecta* Hook. & Arn., *Tillaeae minima* Gay

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,

LBO, MAU, NUB, LLA.

Rango altitudinal: 0-3300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

#### *Crassula connata* (Ruiz & Pav.) A. Berger var. *erectoides*

M. Bywater & Wickens

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Nota: Presente en Arizona, California y México.

#### *Crassula connata* (Ruiz & Pav.) A. Berger var. *muscooides*

M. Bywater & Wickens

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LLA.

#### *Crassula decumbens* Thunb.

Sinónimos: *Crassula ovallei* (Phil.) Reiche, *Crassula radicans* (Phil.) Reiche, *Tillaea ovallei* Phil., *Tillaea radicans* Phil., *Tillaea rencana* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL.

#### *Crassula drummondii* (Torr. & A. Gray) Fedde

Sinónimos: *Tillaea drummondii* Torr. & A. Gray

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Crassula moschata* G. Forst.

Sinónimos: *Bulliarda magellanica* DC., nom. nud., *Crassula magellanica* (Willd. ex Schult.) Macloskie, *Tillaea magellanica* Willd. ex Schult., *Tillaea moschata* (G. Forst.) DC., *Tillaea chiloensis* Gay

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Crassula peduncularis* (Sm.) F. Meigen

Sinónimos: *Crassula paludosa* (Schltdl.) Reiche, *Tillaea paludosa* Schltdl. ex Lechl., nom. nud., *Tillaea peduncularis* Sm.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Crassula solieri* (Gay) F. Meigen

Sinónimos: *Tillaea solierii* Gay, *Tillaea andicola* Phil., *Crassula andicola* (Phil.) Meigen

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 100-500 m.

Nota: También en Norteamérica.

#### *Crassula tillaea* Lest.-Garl.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

### Sedum

#### *Sedum acre* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

## CUCURBITACEAE

### Sicyos

#### *Sicyos baderoa* Hook. & Arn. var. *ambrosianus* (Skotts.)

Mart. & Quezada

Sinónimos: *Sicyos bryoniaefolius* Moris var. *ambrosianus* Skotts.

Hierba trepadora. Anual. Endémica.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 400-500 m.

***Sicyos baderoa* Hook. & Arn. var. *baderoa***

Sinónimos: *Sicyos bryoniaefolius* Moris

Hierba trepadora. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, JFE.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Brionia, calabacillo, tupac-llanco.

**CUNONIACEAE**

**Caldcluvia**

***Caldcluvia paniculata* (Cav.) D. Don**

Sinónimos: *Weinmannia paniculata* Cav., *Dieterica paniculata* (Cav.) Ser. ex A. DC., *Caldcluvia paniculata* (Cav.) D. Don var. *mochaena* Kunke, *Weinmannia corymbosa* Ruiz & Pav., *Weinmannia chilensis* DC.

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Tiaca, triaca, quiaca.

**Eucryphia**

***Eucryphia cordifolia* Cav.**

Sinónimos: *Pellinia cordifolia* (Cav.) Molina

Árbol. Nativo.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ulmo, muermo.

***Eucryphia glutinosa* (Poepp. & Endl.) Baill.**

Sinónimos: *Eucryphia pinnatifolia* Gay, *Fagus glutinosa* Poepp. & Endl., *Eucryphia glandulosa* Reiche

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Nombre vulgar: Guindo santo.

**Weinmannia**

***Weinmannia trichosperma* Cav.**

Sinónimos: *Weinmannia dentata* Ruiz & Pav., *Windmannia trichosperma* (Cav.) Kuntze

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Tineo, palo santo, teñiu, tinel, maden.

**DROSERACEAE**

**Drosera**

***Drosera uniflora* Willd.**

Sinónimos: *Drosera macloviana* Gand.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Atrapa-moscas.

**ELAEOCARPACEAE**

**Aristotelia**

***Aristotelia chilensis* (Molina) Stuntz**

Sinónimos: *Aristotelia glandulosa* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Aristotelia macqui* L'Hér., *Aristotelia macqui* L'Hér. var. *alpestris* Reiche, *Aristotelia macqui* L'Hér. var. *andina* Phil., *Cornus chilensis* Molina, *Aristotelia glabra* Miers

Árbol. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Maqui, clon.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

**Crinodendron**

***Crinodendron hookerianum* Gay**

Sinónimos: *Tricuspidaria hookeriana* (Gay) A. Cunn., *Tricuspidaria lanceolata* Miq., *Crinodendron eriocladum* Gand.

Árbol. Endémico.

Distribución: ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Nombre vulgar: Chaquihue, chequehue, polizón, olivillo.

***Crinodendron patagua* Molina**

Sinónimos: *Tricuspidaria dependens* Ruiz & Pav., *Crinodendron dependens* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Tricuspidaria hexapetala* Turcz., *Tricuspidaria patagua* (Molina) Miers

Árbol. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Nombre vulgar: Patagua, patahua.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

## ELATINACEAE

### Elatine

#### *Elatine triandra* Schkuhr

Sinónimos: *Elatine chilensis* Naudin, *Elatine nivalis* Speg., *Elatine hydropiper* L. var. *triandra* (Schkuhr) Fiori

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Yerbilla, hierbilla.

## ERICACEAE

### Empetrum

#### *Empetrum rubrum* Vahl ex Willd.

Sinónimos: *Empetrum nigrum* L. var. *andinum* DC., *Empetrum maclovianum* Gand.

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Brecillo, murtilla de Magallanes.

### Gaultheria

#### *Gaultheria antarctica* Hook.f.

Sinónimos: *Pernettya serpyllifolia* (Lam.) DC., *Arbutus serpyllifolia* Lam., *Gaultheria microphylla* Hook.f., *Gaultheria serpyllifolia* (Lam.) Skotts., *Pernettya hookeri* Nied.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Gaultheria caespitosa* Poepp. & Endl.

Sinónimos: *Pernettya minima* Phil., *Gaultheria minima* (Phil.) Sandwith

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Gaultheria insana* (Molina) D.J. Middleton

Sinónimos: *Hippomanica insana* Molina, *Pernettya furiens* (Hook. & Arn.) Klotzsch, *Pernettya insana* (Molina) Gunckel, *Gaultheria furiens* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Arbutus furiens* Hook. & Arn., *Arbutus punctata* Hook. & Arn., *Gaultheria punctata* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.,

*Pernettya punctata* (Hook. & Arn.) Klotzsch, *Arbutus vernalis* Poepp. & Endl., *Gaultheria vernalis* (Poepp. & Endl.) Kunze, *Pernettya vernalis* (Poepp. & Endl.) Phil., *Pernettya melanocarpa* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hued-hued.

#### *Gaultheria linifolia* (Phil.) Teillier & R.A. Rodr.

Sinónimos: *Pernettya linifolia* Phil., *Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng. var. *linifolia* (Phil.) Reiche, *Pernettya prostrata* (Cav.) DC. var. *linifolia* (Phil.) Sleumer, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *linifolia* (Phil.) Kausel, *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch var. *linifolia* (Phil.) Sleumer, *Gaultheria poeppigii* DC. var. *linifolia* (Phil.) D.J. Middleton

Arbusto. Endémico.

Distribución: RME, ARA, LRI, LLA.

#### *Gaultheria marticorenae* Teillier & P.W. Fritsch

Sinónimos: *Pernettya angustifolia* Lindl., *Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng. var. *angustifolia* (Lindl.) Reiche, *Gaultheria mucronata* (L.f.) Hook. var. *angustifolia* (Lindl.) D.J. Middleton, *Pernettya leucocarpa* DC. var. *linearis* Reiche, *Gaultheria angustifolia* (Lindl.) Teillier

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chaura.

#### *Gaultheria mucronata* (L.f.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Gaultheria mucronata* (L.f.) Hook. & Arn. var. *microphylla* (Hombr.) D.J. Middleton, *Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng. var. *microphylla* Decne., *Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng., *Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng. var. *parvifolia* (Phil.) Skotts., *Pernettya rupicola* Phil., *Arbutus mucronata* L.f., *Arbutus rigida* Banks & Sol. ex Hook.f., *Pernettya ovalifolia* Hombr. & Jacq., *Pernettya oblongifolia* Hombr. & Jacq., *Pernettya mucronata* DC. var. *rupicola* (Phil.) Reiche, *Pernettya litoralis* Phil., *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn., *Pernettya parvifolia* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chaura.

***Gaultheria nubigena*** (Phil.) B.L. Burt & Sleumer

Sinónimos: *Pernettya nubigena* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gaultheria phillyreifolia*** (Pers.) Sleumer

Sinónimos: *Pernettya palenae* Phil., *Pernettya philippii*

Gand., *Pernettya phillyreifolia* (Pers.) DC., *Arbutus*

*phillyreifolia* Pers., *Gaultheria florida* Phil., *Gaultheria*

*myrtilloides* Hook. & Arn., *Gaultheria phillyreifolia* (Pers.)

Sleumer var. *florida* (Phil.) Kausel, *Gaultheria lanceolata*

Phil., *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn. var. *racemosa*

Phil. ex Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,

AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chaura.

***Gaultheria poeppigii*** DC.

Sinónimos: *Gaultheria poeppigii* DC. var. *nana* (Sleumer)

D.J. Middleton, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud.

var. *myrtilloides*, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud.

var. *nana* (Sleumer) Sleumer, *Pernettya poeppigii* (DC.)

Klotzsch, *Gaultheria myrtilloides* Poepp. & Endl., nom.

illeg., *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch var. *nana*

Sleumer, *Pernettya buxifolia* Phil., *Pernettya leucocarpa*

DC. var. *buxifolia* (Phil.) Reiche, *Pernettya phillyreifolia*

(Pers.) DC. var. *araucana* Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chaura, chal, cheúkk, gus, amain-ngush.

***Gaultheria pumila*** (L.f.) D.J. Middleton var. *leucocarpa* (DC.) D.J. Middleton

Sinónimos: *Gaultheria pumila* (L.f.) D.J. Middleton var.

*crassifolia* (Phil.) D.J. Middleton, *Pernettya pumila* (L.f.)

Hook. var. *crassifolia* (Phil.) Sleumer, *Pernettya pumila*

(L.f.) Hook. var. *leucocarpa* (DC.) Kausel, *Pernettya*

*breviflora* Phil., *Pernettya crassifolia* Phil., *Pernettya*

*empetrifolia* (Lam.) Gaudich. var. *leucocarpa* (DC.) Wedd.,

*Pernettya leucocarpa* DC., *Pernettya trinervia* Gand.,

*Pernettya leucocarpa* DC. var. *gayana* DC., *Pernettya*

*gayana* (DC.) Decne.

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,

LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 600-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Gaultheria pumila*** (L.f.) D.J. Middleton var. *pumila*

Sinónimos: *Pernettya pumila* (L.f.) Hook., *Arbutus pumila*

L.f., *Arbutus empetrifolia* Lam., *Pernettya empetrifolia*

(Lam.) Gaudich., *Pernettya pumila* (L.f.) Hook. var.

*empetrifolia* (Lam.) Hook.f.

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,

LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chaura, chal, chan ámain.

***Gaultheria racemulosa*** (DC.) D.J. Middleton

Sinónimos: *Pernettya rigida* (Bertero ex Colla) DC.,

*Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng. var.

*mutica* Hook. & Arn., *Pernettya bridgesii* Phil., *Pernettya*

*racemulosa* DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 100-1400 m.

Nombre vulgar: Murtillo de Juan Fernández.

***Gaultheria renjifoana*** Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO.

***Gaultheria tenuifolia*** (Phil.) Sleumer

Sinónimos: *Pernettya elegans* Phil., *Pernettya reticulata*

Phil., *Pernettya tenuifolia* Phil., *Gaultheria tenuifolia*

(Phil.) Sleumer var. *elegans* (Phil.) Kausel, *Pernettya*

*promaucana* Phil., *Gaultheria elegans* (Phil.) Reiche,

*Gaultheria salicifolia* Phil., *Gaultheria tenuifolia* (Phil.)

Sleumer var. *promaucana* (Phil.) Kausel

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Lebetanthus***

***Lebetanthus myrsinites*** (Lam.) Dusén

Sinónimos: *Prionotes americana* Hook., *Lebetanthus*

*americanus* (Hook.) Endl., *Jacquinotia myrsinites* Hombr.

& Jacq., *Jacquinotia prostrata* Hombr. & Jacq., *Jacquinotia*

*volubilis* Hombr. & Jacq., *Prionotes myrsinites* (Lam.)

Skottsb.

Subarbusto epífito o terrestre. Nativo.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

## ESCALLONIACEAE

### Escallonia

#### *Escallonia alpina* Poepp. ex DC. var. *alpina*

Sinónimos: *Escallonia araucana* Phil., *Escallonia fonckii* Phil., *Escallonia fonckii* Phil. var. *araucana* (Phil.) Reiche, *Escallonia alpina* Poepp. ex DC. var. *glaberrima* Phil., *Escallonia sparsiflora* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Escallonia alpina* Poepp. ex DC. var. *carmelitana* (Meyen) Acevedo & Kausel

Sinónimos: *Escallonia carmelitana* Meyen, *Escallonia flavescens* C. Presl

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Escallonia alpina* Poepp. ex DC. var. *glabrata* (Phil.) Sleumer

Sinónimos: *Escallonia glabrata* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 600-2000 m.

#### *Escallonia angustifolia* C. Presl

Sinónimos: *Escallonia coquimbensis* J. Remy, *Escallonia angustifolia* C. Presl var. *coquimbensis* (J. Remy) Acevedo & Kausel, *Escallonia coquimbensis* J. Remy var. *salicifolia* Reiche

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, MAU.

Rango altitudinal: 0-3300 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Ñipa, q'ero.

#### *Escallonia callcottiae* Hook. & Arn.

Sinónimos: *Escallonia callcottiae* Hook. & Arn. var. *fernandeziana* (Phil.) Engl., *Escallonia rubricaulis* Colla, *Escallonia fernandeziana* Phil.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-800 m.

#### *Escallonia florida* Poepp. ex DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Nombre vulgar: Saucó cimarrón.

#### *Escallonia gayana* Acevedo & Kausel

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

#### *Escallonia illinita* C. Presl var. *illinita*

Sinónimos: *Escallonia glandulosa* Lodd. non Sm., *Escallonia rubra* Bertero non Ruiz & Pav., *Escallonia grahamiana* Hook. & Arn., *Escallonia viscosa* Forbes

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Nombre vulgar: Corontillo, ñipa, barraco, siete camisas.

#### *Escallonia illinita* C. Presl var. *pubicalycina* Briq.

Sinónimos: *Escallonia illinita* C. Presl var. *stenopetala* (Kunze) Acevedo & Kausel, *Escallonia stenopetala* Kunze, *Escallonia illinita* C. Presl var. *beta* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 100-3000 m.

#### *Escallonia leucantha* J. Remy

Sinónimos: *Escallonia bellidifolia* Phil., *Escallonia pycnantha* Briq., *Escallonia modesta* Briq.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Luncillo, siete camisas.

#### *Escallonia myrtoidea* Bertero ex DC.

Sinónimos: *Escallonia arguta* C. Presl, *Escallonia reflexa* Gillies, *Escallonia andina* Phil., *Escallonia illinita* C. Presl var. *andina* (Phil.) Reiche, *Escallonia claudii* Killip, *Escallonia microcarpa* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 100-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Luncalun.

#### *Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *glabra* Engl.

Sinónimos: *Escallonia resinosa* auct. non Ruiz & Pav., *Escallonia berteriana* DC., *Escallonia resiniflua* Walp., *Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *berteriana* (DC.) Pamp., *Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *resiniflua* (Walp.) Pamp.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Corontillo, mardoño.



***Escallonia pulverulenta*** (Ruiz & Pav.) Pers. var. ***pulverulenta***

Sinónimos: *Stereoxylon pulverulentum* Ruiz & Pav., *Escallonia spinulosa* Kunth ex Engl., nom. nud.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Nombre vulgar: Corontillo, mardoño.

***Escallonia revoluta*** (Ruiz & Pav.) Pers.

Sinónimos: *Stereoxylon revolutum* Ruiz & Pav., *Escallonia thyrsoidea* Bertero, nom. nud., *Escallonia hirsuta* C. Presl, *Escallonia affinis* Rupr. ex A. Gray, nom. nud.

Árbol. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Nombre vulgar: Lun, siete camisas.

***Escallonia rosea*** Griseb.

Sinónimos: *Escallonia pterocladon* Hook., *Escallonia rupestris* Phil., *Escallonia chonotica* Phil., *Escallonia montana* Phil., *Escallonia longidens* Phil., *Escallonia rosea* Griseb. var. *rupestris* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Siete camisas, siete camisas colorado.

***Escallonia rubra*** (Ruiz & Pav.) Pers. var. ***dumetorum*** (Phil.) Acevedo & Kausel

Sinónimos: *Escallonia berberifolia* auct. non (Humb. & Bonpl.) Kunth, *Escallonia dumetorum* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Escallonia rubra*** (Ruiz & Pav.) Pers. var. ***glutinosa*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Escallonia glutinosa* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 100-2100 m.

***Escallonia rubra*** (Ruiz & Pav.) Pers. var. ***macrantha*** (Hook. & Arn.) Reiche

Sinónimos: *Escallonia macrantha* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémico.

Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Escallonia rubra*** (Ruiz & Pav.) Pers. var. ***rubra***

Sinónimos: *Stereoxylon rubrum* Ruiz & Pav., *Escallonia poeppigiana* DC., *Escallonia poeppigiana* DC. var. *longifolia* DC., *Escallonia punctata* DC., *Escallonia duplicato-serrata* J. Remy, *Escallonia littoralis* Phil., *Escallonia littoralis* Phil. var. *concinna* (Phil.) Reiche, *Escallonia concinna* Phil., *Escallonia macrantha* Hook. & Arn. var. *duplicato-serrata* (J. Remy) Engl., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *punctata* (DC.) Hook.f., *Escallonia rahmeri* Phil., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *glabriuscula* Hook. & Arn., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *uniflora* Poepp. & Endl., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *multiflora* Poepp. & Endl., *Escallonia commutata* Regel

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ñipa, siete camisas colorado, möki, müki.

***Escallonia rubra*** (Ruiz & Pav.) Pers. var. ***thalassica*** Kausel

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-400 m.

***Escallonia serrata*** Sm.

Sinónimos: *Celastrus venustus* Banks & Sol. ex Hook.f., *Stereoxylon serratum* (Sm.) Poir.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Escallonia virgata*** (Ruiz & Pav.) Pers.

Sinónimos: *Stereoxylon virgatum* Ruiz & Pav., *Escallonia stricta* J. Remy, *Escallonia patagonica* Gand., *Escallonia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *philippiana* Engl., *Escallonia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *pavoniana* Pamp., *Escallonia philippiana* (Engl.) Mast., *Escallonia stenophylla* Phil., *Escallonia angustifolia* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Mata negra, meki.

## Tribeles

***Tribeles australis*** Phil.

Sinónimos: *Chalepoa magellanica* Hook.f., *Tribeles philippii* Macloskie

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### Valdivia

*Valdivia gayana* J. Remy

Sinónimos: *Valdivia gayana* Remy var. *hollermayeri*

Gunckel, *Valdivia gayana* Remy var. *robusta* Gunckel

Subarbusto. Endémico.

Distribución: LRI.

Rango altitudinal: 0-300 m.

## EUPHORBIACEAE

### Adenopeltis

*Adenopeltis serrata* (W.T. Aiton) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Excoecaria marginata* (Baill.) Griseb.,

*Adenopeltis colliguaya* Bertero ex A. Juss., *Excoecaria*

*serrata* W.T. Aiton, *Excoecaria colliguaya* (Bertero ex A.

Juss.) Baill., *Stillingia glandulosa* Dombey ex Baill.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Nombre vulgar: Colliguay macho, lechón.

### Avellanita

*Avellanita bustillosii* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 300-800 m.

Nombre vulgar: Avellanita.

### Chiropetalum

*Chiropetalum berterianum* Schltld. var. *berterianum*

Sinónimos: *Argythamnia berteriana* (Schltld.) Müll.

Arg., *Chiropetalum berterianum* Schltld. fma. *macrantha*

Skotts.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA.

Rango altitudinal: 200-1800 m.

*Chiropetalum berterianum* Schltld. var. *psiladenium*

Skotts.

Sinónimos: *Argythamnia berteriana* (Schltld.) Müll. Arg.

var. *psiladenia* (Skotts.) J.W. Ingram

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 600 m.

*Chiropetalum canescens* Phil.

Sinónimos: *Argythamnia canescens* (Phil.) F. Phil.,

*Argythamnia sponiella* Müll. Arg., *Chiropetalum gigouxii*

Espinosa, *Chiropetalum sponiella* (Müll. Arg.) Pax

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

*Chiropetalum cremnophilum* I.M. Johnst.

Sinónimos: *Argythamnia cremnophila* (I.M. Johnst.) J.W.

Ingram

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200 m.

*Chiropetalum tricuspdatum* (Lam.) A. Juss.

Sinónimos: *Croton tricuspdatum* Lam., *Argythamnia*

*tricuspdatum* (Lam.) Müll. Arg. var. *lanceolata* (Cav.)

Müll. Arg., *Chiropetalum lanceolatum* (Cav.) A. Juss.,

*Croton lanceolatum* Cav., *Chiropetalum tricuspdatum*

(Lam.) A. Juss. var. *lanceolatum* (Cav.) Pax & K. Hoffm.,

*Chiropetalum ovatum* Phil., *Argythamnia tricuspdatum*

(Lam.) Müll. Arg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,

BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ventosilla.

### Colliguaja

*Colliguaja dombeyana* A. Juss.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-2700 m.

Nombre vulgar: Colliguay.

*Colliguaja integerrima* Gillies & Hook.

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, AIS,

MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Colliguay.

*Colliguaja odorifera* Molina

Sinónimos: *Colliguaja triquetra* Gillies & Hook., *Colliguaja*

*obtusata* Regel, *Croton colliguay* Molina

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,

BIO.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Colliguay.

***Colliguaja salicifolia*** Gillies & Hook.

Sinónimos: *Colliguaja dombeyana* Gay, nom. illeg.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 200-1800 m.  
Nombre vulgar: Colliguay.

**Croton**

***Croton chilensis*** Müll. Arg.

Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 300-800 m.  
Nombre vulgar: Higuera.

***Croton setiger*** Hook

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, MAU, BIO.

**Dysopsis**

***Dysopsis glechomoides*** (A. Rich.) Müll. Arg.

Sinónimos: *Hydrocotyle glechomoides* A. Rich., *Dysopsis gayana* Baill., *Dysopsis glechomoides* (A. Rich.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., *Molina chilensis* Gay  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Dysopsis hirsuta*** (Müll. Arg.) Skottsb.

Sinónimos: *Dysopsis glechomoides* (A. Rich.) Müll. Arg. var. *hirsuta* Müll. Arg.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.

**Euphorbia**

***Euphorbia amandi*** Oudejans

Sinónimos: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *dentata* R.E. Fr.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 1500-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: J'alpa.

***Euphorbia araucana*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ARA.

***Euphorbia besseri*** (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Sinónimos: *Anisophyllum besseri* Klotzsch & Garcke  
Hierba. Perenne. Endémica.

Nota: Distribución desconocida.

***Euphorbia collina*** Phil. var. *andina* (Phil.) Subils

Sinónimos: *Euphorbia andina* Phil., *Euphorbia dasyclada* Dusén, *Euphorbia portulacoides* L. var. *andensis* Croizat  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, ARA, MAG.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Euphorbia collina*** Phil. var. *collina*

Sinónimos: *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *collina* (Phil.) Croizat  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Euphorbia collina*** Phil. var. *minor* (Hicken) Subils

Sinónimos: *Euphorbia portulacoides* L. var. *minor* Hicken  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 2000-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Euphorbia collina*** Phil. var. *spathulata* (Chodat & Wilczek) Subils

Sinónimos: *Euphorbia portulacoides* L. var. *spathulata* Chodat & Wilczek  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Euphorbia copiapina*** Phil.

Sinónimos: *Euphorbia calderensis* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.

***Euphorbia cyathophora*** Murray

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT.

***Euphorbia elquiensis*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.

***Euphorbia engelmannii*** Boiss.

Sinónimos: *Euphorbia rotundifolia* Hook. & Arn., nom. illeg., *Euphorbia hortensis* Engelm. ex Boiss., nom. nud., *Euphorbia engelmannii* Boiss. var. *depressa* Boiss., *Euphorbia inclinata* Boiss., nom. nud., *Chamaesaracha engelmannii* (Boiss.) Soják

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 900-2000 m.

***Euphorbia falcata* L.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: RME.

***Euphorbia germainii* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 1600-3200 m.

***Euphorbia helioscopia* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LLA.

***Euphorbia hirta* L.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, IPA.

***Euphorbia hypericifolia* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, IPA.

***Euphorbia klotzschii* Oudejans var. *argentina* (Müll. Arg. ex Griseb.) Oudejans**

Sinónimos: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *argentina* Müll. Arg. ex Griseb.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Euphorbia klotzschii* Oudejans var. *klotzschii***

Sinónimos: *Anisophyllum ovalifolium* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Croizat  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Euphorbia klotzschii* Oudejans var. *schizosepala* (Engelm. ex Boiss.) Oudejans**

Sinónimos: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *schizosepala* Engelm. ex Boiss.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Euphorbia lactiflua* Phil.**

Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-700 m.  
Nombre vulgar: Lechero.

***Euphorbia lathyris* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Euphorbia macraulonia* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.

***Euphorbia maculata* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

***Euphorbia meyeniana* Klotzsch**

Sinónimos: *Chamaesyce meyeniana* (Klotzsch) Croizat  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Bolivia.

***Euphorbia ovalleana* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.

***Euphorbia peplus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

***Euphorbia philippiana* (Klotzsch & Garcke) Boiss.**

Sinónimos: *Tithymalus philippianus* Klotzsch & Garcke  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: BIO.

***Euphorbia platyphyllos* L.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

***Euphorbia porphyrantha* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA.  
Países limítrofes: Perú.

***Euphorbia portulacoides* L.**

Sinónimos: *Euphorbia chilensis* Gay, *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *normalis* (Kuntze) Croizat, *Euphorbia portulacoides* L. var. *normalis* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Euphorbia raphilippii*** Oudejans

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.

***Euphorbia serpens*** Kunth

Sinónimos: *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, MAU,  
NUB, BIO, ARA, IPA.  
Rango altitudinal: 0-900 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Pato (Rapa Nui).  
Nota: Introducida en la Isla de Pascua.

***Euphorbia tarapacana*** Phil.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 100-1300 m.

***Euphorbia terracina*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL.

***Euphorbia thinophila*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Euphorbia verna*** Phil.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: BIO.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

**Ficus**

***Ficus carica*** L.

Árbol. Introducido.  
Distribución: ANT, JFE.  
Nombre vulgar: Higuera.

**Mercurialis**

***Mercurialis annua*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, VAL.

**Ricinus**

***Ricinus communis*** L.

Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.  
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO,  
LLA, JFE, IPA.

**FABACEAE**

**Acacia**

***Acacia aroma*** Gillies ex Hook. & Arn.

Arbusto o árbol pequeño. Introducido.  
Distribución: AYP, TAR.

***Acacia caven*** (Molina) Molina

Sinónimos: *Acacia cavenia* (Molina) Hook. & Arn., *Acacia farnesiana* (L.) Willd. fma. *cavenia* (Molina) E.C. Clos, *Mimosa cavenia* Molina, *Mimosa caven* Molina, *Vachellia caven* (Molina) Seigler & Ebinger, *Vachellia caven* (Molina) Seigler & Ebinger var. *caven* (Molina) Molina, *Vachellia caven* (Molina) Seigler & Ebinger var. *dehiscens* Ciald., *Acacia caven* (Molina) Molina var. *dehiscens* Burkart ex Ciald.

Árbol. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Espino.

***Acacia dealbata*** Link

Arbusto o árbol pequeño. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LRI, LLA, JFE.

Nombre vulgar: Aromo.

***Acacia horrida*** (L.) Willd.

Árbol. Introducido.

Distribución: ATA, RME.

***Acacia karroo*** Hayne

Arbusto o árbol pequeño. Introducido.

Distribución: TAR, RME.

***Acacia macracantha*** Humb. & Bonpl. ex Willd.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Acacia melanoxylon*** R. Br.

Árbol. Introducido.



Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Nombre vulgar: Aromo australiano.

***Acacia paradoxa*** DC.

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL.

***Acacia visco*** Lorentz ex Griseb.

Sinónimos: *Acacia concinna* Phil., hom. illeg.

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**Adesmia**

***Adesmia aegiceras*** Phil.

Sinónimos: *Adesmia glanduligera* I.M. Johnst., *Adesmia remyana* Phil., *Adesmia subumbellata* Phil., *Adesmia trijuga* Gillies ex Hook. & Arn. var. *remyana* (Phil.) Burkart, *Adesmia trijuga* Gillies ex Hook. & Arn. var. *robustior* Hook. & Arn., *Patagonium aegiceras* (Phil.) Kuntze, *Patagonium aegiceras* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Patagonium trijugum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *remyanum* (Phil.) Reiche

Subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cuerno de cabra, jarilla.

***Adesmia aphylla*** Clos

Sinónimos: *Patagonium aphyllum* (Clos) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1800-3000 m.

Nombre vulgar: Panza de burro.

***Adesmia arachnipes*** Clos

Sinónimos: *Adesmia oresigena* Phil., *Patagonium arachnipes* (Clos) Kuntze, *Patagonium oresigenum* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1600-3500 m.

***Adesmia araucana*** Phil.

Sinónimos: *Patagonium araucanum* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 800-1500 m.

***Adesmia argentea*** Meyen

Sinónimos: *Adesmia cinerea* Clos, *Patagonium argenteum*

(Meyen) Kuntze, *Patagonium cinereum* (Clos) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Nombre vulgar: Jarilla, varilla blanca, varilla mansa.

***Adesmia argyrophylla*** Phil.

Sinónimos: *Adesmia kingii* Phil., *Adesmia sessiliflora* Phil., *Adesmia furcata* Phil., *Adesmia divaricata* (Phil. ex Reiche) Dyer, *Patagonium argyrophyllum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium kingii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium sessiliflorum* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-2800 m.

***Adesmia aromatica*** Burkart

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1100-1300 m.

***Adesmia aspera*** Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Patagonium asperum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *asperum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia atacamensis*** Phil.

Sinónimos: *Adesmia glandulosa* Phil., *Patagonium atacamense* (Phil.) Kuntze, *Patagonium glandulosum* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Nombre vulgar: Allaval, jarilla, pasto de huanaco.

***Adesmia aurantiaca*** (Dusén) Burkart

Sinónimos: *Adesmia pumila* Hook.f. var. *aurantiaca* Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia balsamica*** Bertero ex Colla

Sinónimos: *Patagonium balsamicum* (Bertero ex Colla) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Jarilla.

***Adesmia bedwellii*** Skottsbo.

Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 200-700 m.  
Nombre vulgar: Varilla brava.

***Adesmia bicolor*** (Poir.) DC.

Sinónimos: *Hedysarum bicolorum* Poir., *Hedysarum pendulum* Poir., *Adesmia glabriuscula* Vogel, *Adesmia pendula* Poir., *Adesmia radicans* Clos, *Patagonium glabriusculum* (Vogel) Kuntze, *Patagonium radicans* (Clos) Kuntze, *Patagonium bicolor* (Poir.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-2200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia bijuga*** Phil.

Sinónimos: *Patagonium bijugum* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: MAU.

***Adesmia boronioides*** Hook.f.

Sinónimos: *Patagonium boronioides* (Hook.f.) Kuntze  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Paramela.

***Adesmia brachysemeon*** Phil.

Sinónimos: *Patagonium bracteatum* (Hook. & Arn.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-2200 m.

***Adesmia bracteata*** Hook. & Arn.

Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1200-2600 m.

***Adesmia brevixillata*** Burkart

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

***Adesmia burkartii*** M.N. Correa

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 1200-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia calycicomosa*** Burkart

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1100-1400 m.

***Adesmia capitellata*** (Clos) Hauman

Sinónimos: *Adesmia oligophylla* Phil., *Lotus capitellatus* Clos, *Patagonium oligophyllum* (Phil.) Kuntze, *Hosackia capitellata* (Clos) Brand  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2300-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia colinensis*** (Phil. ex Reiche) Martic.

Sinónimos: *Patagonium colinense* Phil. ex Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1000-2000 m.

***Adesmia concinna*** Phil.

Arbusto. Endémico.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 200-1400 m.

***Adesmia conferta*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia brachycarpa* Phil., *Adesmia izquierdi* Phil. ex Reiche, *Adesmia stipulacea* Clos, *Adesmia venosa* Phil., *Patagonium brachycarpum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium confertum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium stipulaceum* (Clos) Kuntze, *Patagonium venosum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 100-1800 m.

***Adesmia confusa*** Ulibarri

Sinónimos: *Patagonium arboreum* (Bertero ex Clos) Kuntze, *Adesmia arborea* Bertero ex Clos, hom. illeg., *Adesmia berteroniana* Steud., nom. nud.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.  
Nombre vulgar: Palhuén, espinillo, varilla brava.

***Adesmia coquimbensis*** Burkart

Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 1900 m.

***Adesmia coronilloides*** Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia codonocalyx* G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Adesmia germainii* Phil., *Adesmia glauca* Phil., *Patagonium coronilloides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium coronilloides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche, comb. illeg., *Patagonium germainii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium germainii* (Phil.) Reiche, comb. illeg.,

*Patagonium coronilloides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze  
var. *glaucum* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Patagonium  
glaucum* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAU.  
Rango altitudinal: 2200-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Adesmia corymbosa* Clos  
Sinónimos: *Adesmia palenae* Phil., *Adesmia fernandezii*  
Phil., *Adesmia tenuis* Phil., *Adesmia vallis-pulchrae* Phil.,  
nom. nud., *Patagonium vallis-pulchrae* Reiche, *Patagonium  
corymbosum* (Clos) Kuntze, *Patagonium palenae* (Phil.)  
Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS,  
MAG.  
Rango altitudinal: 200-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Adesmia cuneata* Meyen ex Vogel  
Sinónimos: *Patagonium cuneatum* (Meyen ex Vogel)  
Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO.  
Rango altitudinal: 2100-2800 m.

*Adesmia curvifolia* Clos  
Sinónimos: *Patagonium curvifolium* (Clos) Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 1000-1500 m.

*Adesmia darapskyana* (Phil. ex Reiche) Martic.  
Sinónimos: *Patagonium darapskyanum* Phil. ex Reiche  
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 2300-2800 m.

*Adesmia davilae* Phil.  
Sinónimos: *Patagonium davilae* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 2000 m.

*Adesmia denticulata* Clos  
Sinónimos: *Patagonium denticulatum* (Clos) Kuntze  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1600 m.

*Adesmia denudata* Phil.  
Sinónimos: *Patagonium denudatum* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2300 m.

*Adesmia dessaueri* (Phil. ex Reiche) Ulibarri  
Sinónimos: *Patagonium dessaueri* Phil. ex Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, LBO.

*Adesmia dichotoma* Clos  
Sinónimos: *Patagonium dichotomum* (Clos) Kuntze,  
*Patagonium cinereum* (Clos) Kuntze var. *dichotomum*  
(Clos) Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 900-2800 m.

*Adesmia disperma* Phil.  
Sinónimos: *Patagonium disperpum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 200-300 m.

*Adesmia dumosa* Phil.  
Sinónimos: *Patagonium dumosum* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, RME.

*Adesmia echinus* C. Presl  
Sinónimos: *Adesmia gayana* Phil., *Patagonium echinus* (C.  
Presl) Kuntze, *Patagonium gayanum* (Phil.) Kuntze  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, MAU.  
Rango altitudinal: 2800-4400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Adesmia elata* Clos  
Sinónimos: *Patagonium elatum* (Clos) Kuntze, *Patagonium  
leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *elatum* (Clos)  
Reiche, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze  
var. *macrostachyum* Phil. ex Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,  
AIS.  
Rango altitudinal: 700-1300 m.

*Adesmia elegans* Clos  
Sinónimos: *Patagonium elegans* (Clos) Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, MAU.

*Adesmia emarginata* Clos  
Sinónimos: *Patagonium emarginatum* (Clos) Kuntze  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 200-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Paramela, paramilla.

***Adesmia eremophila*** Phil.

Sinónimos: *Adesmia latistipula* Phil. ex Reiche, *Patagonium eremophilum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium latistipula* Phil. ex Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Adesmia erinacea*** Phil.

Sinónimos: *Adesmia senticula* Phil., *Patagonium erinaceum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium erinaceum* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Patagonium senticulum* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, MAU.  
Rango altitudinal: 2500-4400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia exilis*** Clos

Sinónimos: *Adesmia berteroi* Phil. ex Kuntze, nom. nud., *Adesmia decumbens* Phil., *Adesmia decumbens* Phil. var. *berteroi* Phil. ex G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Adesmia humifusa* Phil., *Adesmia valdesia* Clos, *Patagonium decumbens* (Phil.) Kuntze, *Adesmia inconspicua* Phil., *Patagonium exile* (Clos) Kuntze, *Patagonium inconspicuum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium valdesium* (Clos) Kuntze, *Patagonium humifusum* Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1400-3300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia filicaulis*** Phil.

Sinónimos: *Patagonium filicaule* (Phil.) Kuntze, *Patagonium radicans* (Clos) Kuntze var. *filicaule* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: NUB, ARA.  
Rango altitudinal: 500-1500 m.

***Adesmia filifolia*** Clos

Sinónimos: *Patagonium filifolium* (Clos) Kuntze  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Adesmia frigida*** Phil.

Sinónimos: *Adesmia adenophora* Phil., *Patagonium frigidum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium adenophorum* (Phil.) Reiche  
Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 1900-4500 m.

***Adesmia fuentesii*** G.F. Grandjot

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2000-3500 m.

***Adesmia glaucescens*** Phil.

Sinónimos: *Patagonium araucanum* (Phil.) Kuntze var. *glaucescens* (Phil.) Reiche, *Patagonium glaucescens* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Adesmia glomerula*** Clos var. *australior* Burkart

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1700-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia glomerula*** Clos var. *glomerula*

Sinónimos: *Adesmia compacta* Phil., *Adesmia humilis* Phil., *Patagonium compactum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium glomerulum* (Clos) Kuntze, *Patagonium humile* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 2000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia glutinosa*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Patagonium glutinosum* (Hook. & Arn.) Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 700-3000 m.

***Adesmia godoyae*** (Phil. ex Reiche) Martic.

Sinónimos: *Patagonium godoyae* Phil. ex Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, RME.  
Rango altitudinal: 700-1000 m.

***Adesmia gracilis*** Meyen ex Vogel

Sinónimos: *Patagonium gracile* (Meyen ex Vogel) Kuntze  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, RME, MAU.  
Rango altitudinal: 200-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia gracillima*** I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, RME.

***Adesmia hemisphaerica*** Hauman

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: TAR, ANT, COQ, RME.  
Rango altitudinal: 3200-3600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia hirsuta*** Phil.

Sinónimos: *Patagonium hirsutum* (Phil.) Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.

***Adesmia horrida*** Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia leucopogon* Phil., *Patagonium horridum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium leucopogon* (Phil.) Kuntze, *Patagonium horridum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *minor* Reiche  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2800-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Cuerno de cabra.

***Adesmia hystrix*** Phil.

Sinónimos: *Adesmia sentis* Phil., *Adesmia villanuevae* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Patagonium hystrix* (Phil.) Kuntze, *Patagonium sentis* (Phil.) Reiche, *Patagonium villanuevae* Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2000-4100 m.

***Adesmia jilesiana*** Burkart

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 3000-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia lanata*** Hook.f.

Sinónimos: *Patagonium lanatum* (Hook.f.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, MAG.  
Rango altitudinal: 100-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia landbecki*** Phil.

Sinónimos: *Patagonium landbecki* (Phil.) Kuntze, *Patagonium longisetum* (DC.) Kuntze var. *landbeckii* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Adesmia laxa*** Clos

Sinónimos: *Patagonium laxum* (Clos) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Adesmia leiocarpa*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia psilocarpa* Phil., *Patagonium psilocarpum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Adesmia littoralis*** Burkart

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Adesmia longipes*** Phil.

Sinónimos: *Patagonium longipes* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 1300-3200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia longiseta*** DC.

Sinónimos: *Patagonium longisetum* (DC.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, RME, LBO, ARA.  
Rango altitudinal: 2000-3200 m.

***Adesmia lotoides*** Hook.f.

Sinónimos: *Adesmia lotoides* Hook.f. var. *vaginata* Hook.f., *Adesmia unifoliolata* Skottsbl., *Patagonium lotoides* (Hook.f.) Kuntze, *Patagonium lotoides* (Hook.f.) Reiche, comb. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia loudonia*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Patagonium loudonii* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium loudonii* (Hook. & Arn.) Reiche, comb. illeg.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.

***Adesmia medinae*** (Phil. ex Reiche) Ulibarri

Sinónimos: *Patagonium medinae* (Phil. ex Reiche) Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO, MAU.



***Adesmia melanocaulos*** Phil.

Sinónimos: *Adesmia diaziana* I.M. Johnst., *Patagonium melanocaulon* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-1100 m.

***Adesmia melanthes*** Phil.

Sinónimos: *Patagonium melanthes* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3700-4200 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Adesmia micrantha*** Phil.

Sinónimos: *Patagonium micranthum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze var. *micranthum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA.

***Adesmia microcalyx*** Phil. var. *calvescens* Burkart

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: NUB, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1100 m.

***Adesmia microcalyx*** Phil. var. *microcalyx*

Sinónimos: *Patagonium microcalyx* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1100 m.

***Adesmia microphylla*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia spinosa* A. Lesson, *Patagonium microphyllum* (Hook. & Arn.) Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Nombre vulgar: Palhuén.

***Adesmia minor*** (Hook. & Arn.) Burkart var. *caespitosa* (Phil.) Ulibarri & Burkart

Sinónimos: *Adesmia caespitosa* Phil., *Patagonium caespitosum* (Phil.) Reiche  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 3800-4400 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Cuerno de cabra.

***Adesmia monosperma*** Clos

Sinónimos: *Adesmia calycosa* Phil., *Patagonium monospermum* (Clos) Kuntze, *Patagonium calycosum* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 200-2600 m.

***Adesmia montana*** Phil.

Sinónimos: *Patagonium montanum* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 2100-2800 m.

***Adesmia mucronata*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia closii* Phil., *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium closii* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-2600 m.

***Adesmia multicuspis*** Clos

Sinónimos: *Adesmia oxalidophylla* Phil., *Adesmia melanocarpa* (Phil. ex Reiche) Dyer, *Patagonium oxalidophyllum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium multicuspe* (Clos) Kuntze, *Patagonium oxalidophyllum* (Phil.) Kuntze var. *melanocarpum* Phil. ex Reiche  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 1100-2300 m.

***Adesmia obcordata*** Clos

Sinónimos: *Patagonium obovatum* (Clos) Kuntze, *Patagonium obcordatum* (Clos) Kuntze  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: RME, LBO.  
Rango altitudinal: 200-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia obovata*** Clos

Sinónimos: *Adesmia leptacantha* Phil., *Patagonium obovatum* (Clos) Kuntze, *Patagonium leptacanthum* (Phil.) Kuntze  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: RME, LBO, MAU, AIS.  
Rango altitudinal: 200-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Cuerno de cabra, jarilla.

***Adesmia obscura*** Clos

Sinónimos: *Adesmia graveolens* Phil., *Adesmia villosa* Phil., hom. illeg., *Patagonium obscurum* (Clos) Kuntze, *Patagonium graveolens* (Phil.) Kuntze, *Patagonium obscurum* (Clos) Kuntze var. *graveolens* (Phil.) Reiche, *Patagonium villosum* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2000-3400 m.

***Adesmia occulta*** (R.E. Fr.) Burkart

Sinónimos: *Patagonium occultum* R.E. Fr.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-4400 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Adesmia odontophylla*** Phil.

Sinónimos: *Patagonium odontophyllum* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

***Adesmia ovalensis*** Ulibarri

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 200-300 m.

***Adesmia papposa*** (Lag.) DC. var. ***papposa***

Sinónimos: *Adesmia arvensis* Phil., *Adesmia chillanensis* Phil., *Adesmia elongata* Phil., *Aeschynomene papposa* Lag., *Patagonium papposum* (Lag.) Kuntze, *Patagonium chillanense* (Phil.) Reiche, *Patagonium arvense* (Phil.) Kuntze, *Patagonium elongatum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *elongatum* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia papposa*** (Lag.) DC. var. ***radicifolia*** (Clos) M.N.

Correa

Sinónimos: *Adesmia radicifolia* Clos, *Patagonium radicifolium* (Clos) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-3100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia parviflora*** Clos

Sinónimos: *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze, *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze var. *diffusum* Bertero ex Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

***Adesmia parvifolia*** Phil.

Sinónimos: *Adesmia axillaris* Phil., *Adesmia parvifolia* Phil. var. *axillaris* (Phil.) Reiche, *Patagonium parvifolium* (Phil.) Reiche, *Patagonium parvifolium* (Phil.) Reiche var. *axillare* (Phil.) Reiche, *Patagonium axillare* (Phil.) Kuntze, *Patagonium lanatum* (Hook.f.) Kuntze var.

*axillaris* (Phil.) Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia pauciflora*** Vogel

Sinónimos: *Patagonium pauciflorum* (Vogel) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: RME.

***Adesmia pearcei*** Phil.

Sinónimos: *Patagonium pearcei* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO.

***Adesmia pedicellata*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia genistoides* C. Presl, *Adesmia ulicina* C. Presl, *Adesmia calopogon* Phil., *Adesmia deserticola* Phil., *Patagonium pedicellatum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium deserticum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium genistoides* (C. Presl) Kuntze, *Patagonium genistoides* (C. Presl) Reiche, comb. illeg., *Patagonium ulicinum* (C. Presl) Kuntze, *Patagonium calopogon* Phil. ex Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

***Adesmia pentaphylla*** Phil.

Sinónimos: *Patagonium pentaphyllum* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2200-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia peraltae*** (Phil. ex Reiche) Ulibarri

Sinónimos: *Patagonium peraltae* Phil. ex Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Nombre vulgar: Varilla.

***Adesmia phylloidea*** Clos

Sinónimos: *Adesmia virgata* Bertero ex Steud., nom. nud., *Patagonium phylloideum* (Clos) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 100-1400 m.

***Adesmia pinifolia*** Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Patagonium pinifolium* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze ex Taub.

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1500-3700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Leña amarilla.

***Adesmia pirionii*** I.M. Johnst.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 100-900 m.

***Adesmia polyphylla*** Phil.  
Sinónimos: *Patagonium polyphyllum* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3200-4500 m.  
Países limítrofes: Bolivia.

***Adesmia propinqua*** Clos  
Sinónimos: *Adesmia dendroides* Phil., *Patagonium propinquum* (Clos) Kuntze, *Patagonium dendroides* (Phil.) Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 100-1500 m.

***Adesmia prostrata*** Clos var. *eglandulosa* Burkart  
Sinónimos: *Adesmia coluteoides* Phil., *Patagonium coluteoides* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 500-1500 m.

***Adesmia prostrata*** Clos var. *prostrata*  
Sinónimos: *Patagonium prostratum* (Clos) Kuntze, *Adesmia meyeniana* Phil., *Patagonium meyenianum* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1000-1500 m.

***Adesmia pumila*** Hook.f.  
Sinónimos: *Patagonium pumilum* (Hook.f.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia pungens*** Clos  
Sinónimos: *Adesmia intricata* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Patagonium intricatum* Phil., *Patagonium pungens* (Clos) Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-2100 m.

***Adesmia pusilla*** Phil.  
Sinónimos: *Patagonium pusillum* (Phil.) Kuntze

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 100-600 m.

***Adesmia quadripinnata*** (Hicken) Burkart  
Sinónimos: *Adesmia oligophylla* Phil. var. *quadripinnata* Hicken  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 800-2600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia rahmeri*** Phil.  
Sinónimos: *Patagonium rahmeri* (Phil.) Reiche  
Hierba. Anual o bienal. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 2600-4400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia ramosissima*** Phil.  
Sinónimos: *Patagonium ramosissimum* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, LBO.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.

***Adesmia reclinata*** Muñoz  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Nombre vulgar: Lentecilla.

***Adesmia renjifoana*** (Phil. ex Reiche) Ulibarri  
Sinónimos: *Adesmia renjifoana* Phil., nom. nud., *Patagonium renjifoanum* Phil. ex Reiche  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: LBO.  
Rango altitudinal: 1500-2600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia resinosa*** (Phil. ex Reiche) Martic.  
Sinónimos: *Patagonium resinosum* Phil. ex Reiche  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1700-2000 m.

***Adesmia retusa*** Griseb.  
Sinónimos: *Adesmia grisebachii* Phil., *Patagonium retusum* (Griseb.) Kuntze var. *grisebachii* (Phil.) Reiche, *Patagonium retusum* (Griseb.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia rubroviridis*** Burkart

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 2200-2600 m.

***Adesmia salicornioides*** Speg.

Sinónimos: *Patagonium salicornioides* (Speg.) Speg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia sandwithii*** Burkart

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia schneideri*** Phil.

Sinónimos: *Adesmia rigida* Skotts., *Patagonium schneideri* (Phil.) Kuntze, *Patagonium schneideri* (Phil.)

Reiche, comb. illeg.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, RME, LBO.

Rango altitudinal: 200-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia spinosissima*** Meyen

Sinónimos: *Adesmia rupicola* Wedd., *Patagonium spinosissimum* (Meyen) Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2700-4300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Adesmia spuma*** Werderm. ex Burkart

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2000-4600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia subterranea*** Clos

Sinónimos: *Patagonium subterraneum* (Clos) Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1200-4300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cuerno de cabra.

***Adesmia tenella*** Hook. & Arn. var. ***macrocarpa*** Ulibarri

Sinónimos: *Patagonium angustifolium* (Hook. & Arn.)

Reiche, comb. illeg.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

***Adesmia tenella*** Hook. & Arn. var. ***misera*** (Phil.) Skotts.

Sinónimos: *Adesmia smithiae* DC. var. *misera* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Adesmia tenella*** Hook. & Arn. var. ***tenella***

Sinónimos: *Adesmia angustifolia* Hook. & Arn., *Adesmia vesicaria* Bertero ex Colla, *Adesmia parvula* Phil., *Adesmia tenuicaulis* Phil., *Patagonium parvulum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium tenuicaule* (Phil.) Reiche, *Patagonium vesicarium* (Bertero ex Colla) Reiche, *Patagonium vesicarium* (Bertero ex Colla) Kuntze, comb. illeg.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Adesmia tomentosa*** Meyen

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, MAU.

Rango altitudinal: 200-300 m.

***Adesmia torcaea*** Phil.

Sinónimos: *Patagonium torcaeum* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 200-3200 m.

***Adesmia trifoliata*** Phil.

Sinónimos: *Adesmia philippiana* (Hosseus) Burkart, *Patagonium philippianum* Hosseus, *Patagonium triphyllum* Speg., *Patagonium trifoliatum* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 2000 m.

***Adesmia trifoliolata*** Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Patagonium trifoliolatum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze ex Taub.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 200-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia uspallatensis*** Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Patagonium uspallatense* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 1900-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia verrucosa*** Meyen

Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 1700-3600 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Adesmia villosa*** Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-2400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia viscida*** Bertero ex Colla

Sinónimos: *Adesmia aprica* Phil., *Adesmia simonsi* Phil., *Patagonium apricum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *apricum* (Phil.) Reiche, *Patagonium simonsii* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.

***Adesmia viscidissima*** I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 700-800 m.

***Adesmia viscosa*** Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia pulchra* Phil., *Patagonium pulchrum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium viscosum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: LBO, ARA.  
Rango altitudinal: 300-800 m.

***Adesmia volckmannii*** Phil.

Sinónimos: *Patagonium campestre* Rendle, *Patagonium volckmannii* (Phil.) Kuntze, *Adesmia quadrijuga* Phil., *Patagonium quadrijugum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium volckmannii* (Phil.) Reiche, comb. illeg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 200-2200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia zoellneri*** Ulibarri

Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.

**Albizia**

***Albizia lophantha*** (Willd.) Benth.

Árbol. Introducido.

Distribución: VAL, RME, MAU, BIO, JFE.

**Anarthrophyllum**

***Anarthrophyllum andicolum*** (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.

Sinónimos: *Anarthrophyllum andicolum* (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil. var. *bridgesii* Chodat & Wilcz., *Anarthrophyllum juniperinum* (Meyen) F. Phil., *Genista andicola* Gillies ex Hook. & Arn., *Genista juniperina* Meyen  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.  
Nombre vulgar: Pichi-romero.

***Anarthrophyllum cumingii*** (Hook. & Arn.) F. Phil.

Sinónimos: *Genista cumingii* Hook. & Arn., *Anarthrophyllum cumingii* (Hook. & Arn.) F. Phil. var. *angustifolia* Chodat & Wilcz.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1800-3000 m.

***Anarthrophyllum desideratum*** (DC.) Benth. var. ***desideratum***

Sinónimos: *Genista desiderata* DC., *Anarthrophyllum desideratum* Neger, nom. illeg.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Anarthrophyllum desideratum*** (DC.) Benth. var. ***morenonis*** (Kuntze) Speg.

Sinónimos: *Anarthrophyllum morenonis* Kuntze  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Anarthrophyllum elegans*** (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.

Sinónimos: *Genista elegans* Gillies ex Hook. & Arn., *Anarthrophyllum pungens* Chodat  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 1000-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Anarthrophyllum gayanum*** (A. Gray) B.D. Jacks.

Sinónimos: *Genista gayana* A. Gray, *Genista umbellata* Clos, *Anarthrophyllum umbellatum* (Clos) F. Phil.  
Subarbusto. Nativo.



Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 2000-3700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Anarthrophyllum rigidum*** (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron.

Sinónimos: *Genista rigida* Gillies ex Hook. & Arn., *Anarthrophyllum brevistipula* Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: MAU, MAG.  
Rango altitudinal: 200-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Astragalus**

***Astragalus amatus*** Clos

Sinónimos: *Astragalus procumbens* Hook. & Arn., *Phaca tricolor* Clos, *Astragalus tricolor* (Clos) Reiche, *Astragalus ferrugineus* Clos, *Astragalus leucomallus* Phil., *Phaca brachyptera* Phil., *Astragalus brachypterus* (Phil.) Reiche, *Astragalus litoreus* Phil., *Tragacantha breviaolata* Kuntze, *Astragalus subandinus* Speg., *Astragalus chilensis* E. Sheld.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 2-2600 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Astragalus arequipensis*** Vogel

Sinónimos: *Astragalus bolivianus* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 450-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Astragalus arnottianus*** (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche

Sinónimos: *Phaca arnottiana* Gillies ex Hook. & Arn., *Phaca uspallatensis* Phil., *Phaca reedi* Phil., *Astragalus reedii* (Phil.) Hauman, *Phaca nana* Phil., *Astragalus nanus* (Phil.) Reiche, *Astragalus philippi* Speg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 1620-3200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus bellus*** (Kuntze) R.E. Fr.

Sinónimos: *Phaca pulchella* Clos, *Astragalus pulchellus* (Clos) Reiche, *Tragacantha bella* Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ.  
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus berteri*** Colla

Sinónimos: *Astragalus prostratus* Hook. & Arn., *Astragalus*

*alberjilla* Steud., *Phaca grata* Clos, *Astragalus gratus* (Clos) Reiche, *Astragalus filifolius* Clos, *Astragalus elongatus* (Phil.) Reiche, *Phaca concinna* Phil., *Astragalus concinnus* (Phil.) Reiche, *Astragalus cauquenensis* Phil., *Astragalus pencanus* Phil., *Tragacantha longior* Kuntze, *Astragalus rhudolphi* Speg., *Phaca elongata* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

***Astragalus berterianus*** (Moris) Reiche

Sinónimos: *Phaca berteriana* Moris, *Phaca canescens* Hook. & Arn., *Astragalus canescens* (Hook. & Arn.) Gray, nom. illeg., *Astragalus oblongifolius* Clos, *Astragalus sphaerocarpus* Clos, *Astragalus placens* Clos var. *oblongifolius* (Clos) Reiche, *Phaca laxiflora* Phil., *Astragalus laxiflorus* (Phil.) Reiche, *Phaca dolichostachya* Phil., *Astragalus dolichostachys* (Phil.) Reiche, *Phaca dissitiflora* Phil., *Astragalus laxiflorus* (Phil.) Reiche var. *dissitiflora* (Phil.) Reiche, *Astragalus aconcaguensis* Speg.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.

***Astragalus bustillosii*** Clos

Sinónimos: *Phaca depauperata* Phil., *Astragalus depauperatus* (Phil.) Reiche, *Phaca saxifraga* Phil., *Astragalus brachycalyx* Phil., *Tragacantha atacamensis* Kuntze, *Astragalus atacamensis* (Kuntze) R.E. Fr., *Astragalus tarapacanus* Speg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 1900-4870 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Garbanzo silvestre.

***Astragalus cachinalensis*** Phil.

Sinónimos: *Tragacantha cachinalensis* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Anual o bienal. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 800-800 m.

***Astragalus chamissonis*** (Vogel) Reiche

Sinónimos: *Phaca chamissonis* Vogel, *Phaca ochroleuca* Hook. & Arn., *Astragalus ochroleucus* (Hook. & Arn.) Gray, nom. illeg., *Astragalus ovalensis* Clos, *Astragalus chilensis* (Nees) Reiche, hom. illeg., *Astragalus placens* Clos, *Astragalus volckmannii* Phil., *Astragalus araucanus* (F. Phil.) Reiche, *Astragalus monospermus* Phil., *Astragalus laetevirens* Phil., *Phaca chilensis* Nees, *Phaca araucana* F. Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 10-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Hierba loca.

***Astragalus confinis*** I.M. Johnst.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR.  
Países limítrofes: Perú.

***Astragalus coquimbensis*** (Hook. & Arn.) Reiche  
Sinónimos: *Phaca coquimbensis* Hook. & Arn., *Astragalus vasticola* I.M. Johnst., *Phaca carrizalensis* Phil., *Phaca atacamensis* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-510 m.

***Astragalus cruckshanksii*** (Hook. & Arn.) Griseb.  
Sinónimos: *Phaca cruckshanksii* Hook. & Arn., *Astragalus amunategui* Phil., *Tragacantha cruckshanksii* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *glabrescens* Kuntze, *Astragalus landbecki* (Phil.) Reiche, *Phaca landbecki* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1200-3700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus cryptanthus*** Wedd.  
Sinónimos: *Phaca clandestina* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 3850-4150 m.  
Países limítrofes: Bolivia.

***Astragalus cryptobotrys*** I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Phaca cryptantha* Phil., *Astragalus clandestinus* (Phil.) Hieron.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3815-4550 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus curvicaulis*** (Clos) Reiche  
Sinónimos: *Phaca curvicaulis* Clos, *Astragalus elatus* (Hook. & Arn.) Reiche, comb. illeg., *Phaca elata* Hook. & Arn., *Tragacantha curvicaulis* (Clos) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 1900-2800 m.  
Nombre vulgar: Hierba loca.

***Astragalus darumbium*** (Bertero ex Colla) Clos  
Sinónimos: *Sutherlandia darumbium* Bertero ex Colla, *Phaca macrophysa* Phil., *Astragalus macrophysus* (Phil.) Reiche,

*Phaca robusta* Phil., *Astragalus macrophysus* (Phil.) Reiche var. *robustus* (Phil.) Reiche, *Tragacantha firma* Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO.  
Rango altitudinal: 900-3200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus diminutivus*** (Phil.) Gómez-Sosa  
Sinónimos: *Astragalus deminutivus* I.M. Johnst., *Phaca diminutiva* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Astragalus dodtii*** Phil.  
Sinónimos: *Astragalus rengifoii* Phil., *Astragalus melanogonatus* I.M. Johnst., *Tragacantha dodtii* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Astragalus domeykoanus*** (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Phaca domeykoana* Phil., *Phaca orites* Phil., *Astragalus orites* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1380-1380 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus edmonstonei*** (Hook.) B.L. Rob.  
Sinónimos: *Phaca edmonstonei* Hook., *Astragalus flavus* (Hook. & Arn.) E. Sheld., *Astragalus chrysanthus* (Moris) Reiche, nom. illeg., *Phaca flava* Hook. & Arn., *Phaca chrysantha* Moris, *Astragalus affinis* Steud., *Phaca podocarpa* Phil., *Phaca acutidens* Phil., *Astragalus hohenacheri* Speng., *Tragacantha flava* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Tragacantha chrysantha* (Moris) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 5-200 m.  
Nombre vulgar: Hierba loca.

***Astragalus germainii*** Phil.  
Sinónimos: *Astragalus segethi* Phil., *Astragalus dilectus* Phil., *Astragalus closianus* Phil., *Astragalus dessaueri* Phil., *Astragalus alfalfalis* Phil., *Astragalus azureus* Phil. ex Reiche, *Astragalus germaini* Phil. var. *azureus* Phil. ex Fr., *Tragacantha germaini* (Phil.) Kuntze, *Tragacantha closiana* (Phil.) Kuntze, *Tragacantha dilecta* (Phil.) Kuntze, *Tragacantha segethii* (Phil.) Kuntze  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 2200-2950 m.

***Astragalus johnstonii*** Gómez-Sosa

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1250-1350 m.

***Astragalus limariensis*** Muñoz

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, COQ.  
Rango altitudinal: 0-3960 m.  
Nombre vulgar: Tetilla.

***Astragalus looseri*** I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1500-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus magellanicus*** Gómez-Sosa

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 250-250 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus maulensis*** Speg.

Sinónimos: *Phaca brachytopis* Phil., hom. illeg.,  
*Astragalus brachytopis* (Phil.) Reiche, comb. illeg.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.

***Astragalus micranthellus*** Wedd.

Sinónimos: *Tragacantha micranthella* (Wedd.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4000-4250 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Astragalus minimus*** Vogel

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4300-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Astragalus minutissimus*** Wedd.

Sinónimos: *Tragacantha minutissima* (Wedd.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 3720-4400 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Astragalus monteroi*** I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ARA.  
Rango altitudinal: 1-3 m.

***Astragalus monticola*** Phil.

Sinónimos: *Astragalus barceloi* Phil., *Tragacantha monticola* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2500-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus nivicola*** Gómez-Sosa

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 90-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus nudus*** Clos

Sinónimos: *Tragacantha nuda* (Clos) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 2-1350 m.  
Nombre vulgar: Alfalfillo.

***Astragalus orthocarpus*** I.M. Johnst.

Sinónimos: *Astragalus oliganthus* (Phil.) Reiche, nom. illeg.,  
*Phaca oligantha* Phil., *Tragacantha oligantha* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO.  
Rango altitudinal: 380-1750 m.

***Astragalus palenae*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Phaca palenae* Phil., *Phaca rahmeri* Phil.,  
*Astragalus rahmeri* (Phil.) Reiche, *Astragalus pallens* Reiche,  
*Phaca oreophila* Phil., *Tragacantha oreophila* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 10-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus paposanus*** I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, COQ.  
Rango altitudinal: 100-2600 m.

***Astragalus patagonicus*** (Phil.) Speg.

Sinónimos: *Phaca patagonica* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 150-380 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus pehuenches*** Niederl.

Sinónimos: *Phaca inflata* Gillies ex Hook. & Arn.,  
*Astragalus inflatus* (Gillies ex Hook. & Arn.) Steud., *Phaca*

*striata* Clos, *Astragalus striatus* (Clos) Reiche, *Phaca macrocarpa* Phil., *Astragalus macrocarpus* (Phil.) Reiche, nom. illeg., *Tragacantha bisinflata* Kuntze, *Tragacantha grandis* Kuntze, *Astragalus grandis* (Kuntze) Speg., *Tragacantha striata* (Clos) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 700-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus pissisii*** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Astragalus canescens* (Hook. & Arn.) Reiche var. *pissisii* (Phil.) Reiche, *Phaca pissisii* Phil., *Tragacantha pissisii* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.  
Rango altitudinal: 350-3100 m.

***Astragalus pusillus*** Vogel  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3650-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Astragalus reichei*** Speg.  
Sinónimos: *Phaca compacta* Phil., *Astragalus compactus* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT.  
Países limítrofes: Bolivia.

***Astragalus schinectorum*** Barneby  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 2800-2800 m.

***Astragalus tacorensis*** Gómez-Sosa  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus triflorus*** (DC.) A. Gray  
Sinónimos: *Phaca triflora* DC., *Tragacantha triflora* (DC.) Kuntze  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 100-700 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Astragalus trifoliatus*** Phil.  
Sinónimos: *Astragalus valparadisiensis* Speg., *Tragacantha trifoliata* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 5-5 m.

***Astragalus vagus*** (Clos) Reiche  
Sinónimos: *Phaca vaga* Clos, *Astragalus san-romani* (Phil.) Reiche, *Phaca san-romani* Phil., *Tragacantha vaga* (Clos) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 450-4300 m.

***Astragalus valerianensis*** I.M. Johnst.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA.

***Astragalus verticillatus*** (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Phaca verticillata* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 250-1800 m.

***Astragalus vesiculosus*** Clos  
Sinónimos: *Phaca nubigena* Meyen ex Vogel, *Astragalus nubigenus* (Meyen ex Vogel) Taub., *Astragalus meyenianus* Speg., *Phaca bustilloi* Phil., *Tragacantha andina* Kuntze, *Astragalus rupestris* Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 2250-3410 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Astragalus werdermannii*** I.M. Johnst.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

### **Balsamocarpon**

***Balsamocarpon brevifolium*** Clos  
Sinónimos: *Caesalpinia brevifolia* (Clos) Benth.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1900 m.  
Nombre vulgar: Algarrobillá.

### **Caesalpinia**

***Caesalpinia angulata*** (Hook. & Arn.) Baill.  
Sinónimos: *Caesalpinia angulicaulis* Clos, *Zuccagnia angulata* Hook. & Arn., *Sophora angulata* (Hook. & Arn.) Ravenna  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1900 m.  
Nombre vulgar: Retamo.

***Caesalpinia gilliesii*** (Wall. ex Hook.) D. Dietr.  
Sinónimos: *Poinciana gilliesii* Wall. ex Hook., *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) Benth., nom. illeg., *Erythrostemon gilliesii* (Wall. ex Hook.) Klotzsch  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Caesalpinia major*** (Medik.) Dandy & Exell  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: IPA.  
Nombre vulgar: Ngaoho, naoho (Rapa Nui).

***Caesalpinia spinosa*** (Molina) Kuntze  
Sinónimos: *Poinciana spinosa* Molina, *Caesalpinia tinctoria* (Kunth) Benth. ex Reiche, *Tara spinosa* (Molina) Britton & Rose, *Caesalpinia chilensis* DC.  
Árbol. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Tara.

### **Calliandra**

***Calliandra chilensis*** Benth.  
Sinónimos: *Feuillea chilensis* (Benth.) Kuntze, *Acacia nigra* Clos  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 1100 m.

### **Crotalaria**

***Crotalaria grahamiana*** Wight & Arn.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.

***Crotalaria incana*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 40-60 m.

***Crotalaria pallida*** Aiton  
Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.  
Nombre vulgar: Nga ehe ehe (Rapa Nui).

### **Cytisus**

***Cytisus scoparius*** (L.) Link  
Arbusto. Introducido.  
Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Cytisus striatus*** Rothm.  
Arbusto. Introducido.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

### **Dalea**

***Dalea azurea*** (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Parosela azurea* (Phil.) J.F. Macbr., *Psoralea azurea* Phil., *Lotodes azureum* (Phil.) Kuntze  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Dalea moquehuana*** J.F. Macbr.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 1900-2700 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Dalea pennellii*** (J.F. Macbr.) J.F. Macbr. var. *chilensis*  
Barneby  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2500-3300 m.

### **Desmanthus**

***Desmanthus virgatus*** (L.) Willd.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: AYP.

### **Dipogon**

***Dipogon lignosus*** (L.) Verdc.  
Arbusto trepador. Introducido.  
Distribución: TAR.

### **Errazurizia**

***Errazurizia multifoliolata*** (Clos) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Errazurizia glandulifera* Phil., *Psoralea multifoliolata* Clos, *Dalea multifoliolata* (Clos) Reiche, *Parosela multifoliolata* (Clos) J.F. Macbr.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1400 m.

### **Galega**

***Galega officinalis*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.



### **Geoffroea**

*Geoffroea decorticans* (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart  
Sinónimos: *Gourliea decorticans* Gillies ex Hook. & Arn.,  
*Lucuma spinosa* Molina, *Gourliea chilensis* Clos, *Gourliea spinosa* (Molina) Skeels  
Árbol. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 100-2600 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Chañar.

### **Glycyrrhiza**

*Glycyrrhiza astragalina* Gillies ex Hook. & Arn.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: VAL, BIO.  
Rango altitudinal: 1000-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Hoffmannseggia**

*Hoffmannseggia aphylla* (Phil.) G.P. Lewis & Sotuyo  
Sinónimos: *Caesalpinia aphylla* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 0-3200 m.

*Hoffmannseggia doellii* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 2300-3500 m.

*Hoffmannseggia eremophila* (Phil.) Burkart ex Ulibarri  
Sinónimos: *Hoffmannseggia andina* Miers var. *eremophila* (Phil.) Reiche, *Hoffmannseggia andina* Miers, nom. nud.,  
*Hoffmannseggia andina* Phil., *Zuccagnia eremophila* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Hoffmannseggia glauca* (Ortega) Eifert  
Sinónimos: *Hoffmannseggia falcaria* Cav., nom. illeg.,  
*Larrea glauca* Ortega, *Caesalpinia glauca* (Ortega) Kunth,  
*Caesalpinia falcaria* (Cav.) L. Fisher  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Porotillo, culchao.

*Hoffmannseggia minor* (Phil.) Ulibarri  
Sinónimos: *Hoffmannseggia doellii* Phil. var. *minor* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 800-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

*Hoffmannseggia prostrata* Lag. ex DC.  
Sinónimos: *Hoffmannseggia gracilis* (Ruiz & Pav.) Hook. & Arn.,  
*Caesalpinia prostrata* (Lag. ex DC.) J.F. Macbr.,  
*Larrea gracilis* Ruiz & Pav.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-2700 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Ají.

*Hoffmannseggia trifoliata* Cav.  
Sinónimos: *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. var. *microphylla* Speg.,  
*Hoffmannseggia trifoliata* Cav. var. *glandulosa* Speg.,  
*Hoffmannseggia trifoliata* Cav. fma. *normalis* Speg.,  
*Hoffmannseggia trifoliata* Cav. fma. *microphylla* Speg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Hoffmannseggia viscosa* (Ruiz & Pav.) Hook.  
Sinónimos: *Caesalpinia ternata* (Phil.) J.F. Macbr., *Larrea viscosa* Ruiz & Pav.,  
*Caesalpinia viscosa* (Ruiz & Pav.) Fisch., *Hoffmannseggia ternata* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 1500-3000 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

### **Indigofera**

*Indigofera truxillensis* Kunth  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Países limítrofes: Perú.

### **Lablab**

*Lablab purpureus* (L.) Sweet  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: IPA.

### **Lathyrus**

*Lathyrus berterioanus* Colla ex Savi  
Sinónimos: *Lathyrus gracilis* Phil., *Lathyrus debilis* Vogel  
var. *berterioanum* (Colla ex Savi) Reiche  
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

***Lathyrus cabrerianus*** Burkart

Sinónimos: *Lathyrus pubescens* Clos, hom. illeg., *Lathyrus dumetorum* Burkart, hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Países limítrofes: Argentina.

***Lathyrus campestris*** Phil.

Sinónimos: *Lathyrus debilis* Vogel var. *campestris* (Phil.)

Reiche, *Lathyrus gracillimus* Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAU, LLA.

Países limítrofes: Argentina.

***Lathyrus cicera*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

***Lathyrus crassipes*** Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, BIO, LLA.

Países limítrofes: Argentina.

***Lathyrus hookeri*** G. Don

Sinónimos: *Lathyrus sessilifolius* Hook. & Arn., *Lathyrus chilensis* Steud., *Lathyrus petiolaris* Clos, *Lathyrus pisaster* Clos, *Lathyrus roseus* Phil., *Lathyrus litoralis* Phil., *Lathyrus ovalifolius* Phil., *Lathyrus trichocalyx* Phil., *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *araucanus* Phil., *Lathyrus heterocirrus* Phil., *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *heterocirrus* (Phil.) Reiche, *Lathyrus sessilifolius* Hook. & Arn. fma. *trichocalyx* (Phil.) Burkart, *Lathyrus hookeri* G.

Don var. *trichocalyx* (Phil.) Burkart

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, BIO.

Países limítrofes: Argentina.

***Lathyrus japonicus*** Willd. var. *aleuticus* (Greene) Fernald

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AIS.

***Lathyrus japonicus*** Willd. var. *japonicus*

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

***Lathyrus lomanus*** I.M. Johnst.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

***Lathyrus macropus*** Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Lathyrus linearifolius* Griseb., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

***Lathyrus magellanicus*** Lam. var. *glaucescens* Speg.

Sinónimos: *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *oxyphylla* Speg., *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *campestris* Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Arvejilla.

***Lathyrus magellanicus*** Lam. var. *longipes* (Phil.) Burkart

Sinónimos: *Lathyrus longipes* Phil., *Lathyrus dumetorum* Phil. var. *longipes* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Arvejilla.

***Lathyrus magellanicus*** Lam. var. *magellanicus*

Sinónimos: *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *subsessilifolius* Kuntze, *Lathyrus magellanicus* D. Don, nom. illeg., *Lathyrus patagonicus* Hauman, *Lathyrus pterocaulos* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Arvejilla.

***Lathyrus magellanicus*** Lam. var. *tucumanensis* Burkart

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI.

Países limítrofes: Argentina.

***Lathyrus multiceps*** Clos

Sinónimos: *Lathyrus multiceps* Clos var. *setiger* (Phil.) Acevedo, *Lathyrus setiger* Phil., *Lathyrus eurypetalus* Phil., *Lathyrus setiger* Phil. var. *eurypetalus* (Phil.) Reiche, *Lathyrus ecirrhosus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

***Lathyrus nervosus*** Lam.

Sinónimos: *Lathyrus trigonus* Vogel, *Lathyrus ovalifolius* Phil. var. *mucronatus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

***Lathyrus pubescens*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Lathyrus petiolaris* Vogel, *Lathyrus acutifolius* Vogel, *Lathyrus andicolus* Gand., *Lathyrus dumetorum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Lathyrus pusillus*** Elliott  
Sinónimos: *Lathyrus stipularis* J. Presl, *Lathyrus montevidensis* Vogel, *Lathyrus arvensis* Phil., *Lathyrus debilis* Vogel var. *arvensis* (Phil.) Reiche, *Lathyrus crassipes* Phil., nom. illeg., *Lathyrus dicirrhus* Clos  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: LLA.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Lathyrus sativus*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

***Lathyrus subandinus*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

#### **Leucaena**

***Leucaena leucocephala*** (Lam.) de Wit  
Arbusto o árbol pequeño. Introducido.  
Distribución: IPA.

#### **Lotus**

***Lotus corniculatus*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ATA, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

***Lotus pedunculatus*** Cav.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, IPA.

***Lotus subpinnatus*** Lag.  
Sinónimos: *Hosackia subpinnata* (Lag.) Torr. & A. Gray  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-2300 m.

***Lotus tenuis*** Waldst. & Kit. ex Willd.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LLA.

#### **Lupinus**

***Lupinus albus*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: BIO, ARA.

***Lupinus angustifolius*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: NUB, BIO.

***Lupinus arboreus*** Sims  
Arbusto. Introducido.  
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

***Lupinus luteus*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL.

***Lupinus microcarpus*** Sims  
Sinónimos: *Lupinus comberanus* C.P. Sm., *Lupinus fischeranus* C.P. Sm., *Lupinus verticillatus* C.P. Sm.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.  
Nombre vulgar: Altramuz, hierba del traro.

***Lupinus oreophilus*** Phil.  
Sinónimos: *Lupinus oreophilus* Greene, nom. illeg.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2700-4400 m.

***Lupinus polyphyllus*** Lindl.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.

***Lupinus subcaulis*** Griseb.  
Sinónimos: *Lupinus chilensis* C.P. Sm.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3000-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Lupinus subinflatus*** C.P. Sm.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2500-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Lupinus tarapacensis*** C.P. Sm.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Países limítrofes: Perú.

***Lupinus werdermannianus*** C.P. Sm.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: TAR.

## Macroptilium

### *Macroptilium lathyroides* (L.) Urban

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: IPA.

## Medicago

### *Medicago arabica* (L.) Huds.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

### *Medicago arborea* L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: RME, MAU.

### *Medicago lupulina* L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE, IPA.

### *Medicago minima* (L.) Bartal.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, ARA, MAG.

### *Medicago polymorpha* L. var. *confinis* (Koch) Ooststr. & B. Reichg.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

### *Medicago polymorpha* L. var. *polymorpha*

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

### *Medicago polymorpha* L. var. *vulgaris* (Benth.) Shinnery

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

### *Medicago sativa* L.

Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

## Melilotus

### *Melilotus albus* Medik.

Hierba o subarbusto. Bienal. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, AIS, MAG.

### *Melilotus indicus* (L.) All.

Hierba o subarbusto. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

### *Melilotus officinalis* (L.) Lam.

Hierba o subarbusto. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAG.

## Ornithopus

### *Ornithopus compressus* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO.

### *Ornithopus pinnatus* (Mill.) Druce

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: BIO.

### *Ornithopus sativus* Brot.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO.

## Otholobium

### *Otholobium glandulosum* (L.) J.W. Grimes

Sinónimos: *Psoralea glandulosa* L., *Lotodes glandulosum* (L.) Kuntze, *Hoita glandulosa* (L.) Rydb.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 600-1400 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

## Prosopis

### *Prosopis alba* Griseb.

Sinónimos: *Prosopis siliquastrum* (Cav. ex Lag.) DC. var. *longisiliqua* Phil., *Prosopis atacamensis* Phil.

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Algarrobo blanco.

### *Prosopis burkartii* Muñoz

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR.

### *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz emend. Burkart

Sinónimos: *Prosopis siliquastrum* (Cav. ex Lag.) DC., *Ceratonia chilensis* Molina, *Acacia siliquastrum* Cav. ex Lag., *Prosopis schinopoma* Stuck.

Árbol. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Algarrobo del centro.

***Prosopis flexuosa* DC. var. *flexuosa***

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Prosopis flexuosa* DC. var. *fruticosa* (Meyen) F.A. Roig**

Sinónimos: *Prosopis fruticosa* Meyen

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 100-800 m.

***Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth.**

Sinónimos: *Strombocarpa strombulifera* (Lam.) A. Gray,

*Acacia strombulifera* (Lam.) Willd., *Spirolobium australe* Orb., *Mimosa circinalis* Cav., nom. illeg., *Mimosa strombulifera* Lam., *Prosopis reptans* Benth. var. *chilensis* Zoellner

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Espinillo, retortón.

***Prosopis tamarugo* Phil.**

Árbol. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

**Rhynchosia**

***Rhynchosia minima* (L.) DC.**

Arbusto trepador. Introducido.

Distribución: AYP.

**Robinia**

***Robinia pseudoacacia* L.**

Árbol. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE, IPA.

**Senna**

***Senna arnottiana* (Gillies ex Hook.) H.S. Irwin & Barneby**

Sinónimos: *Cassia arnottiana* Gillies ex Hook., *Cassia andina* Phil., *Cassia arnottiana* Gillies ex Hook. var. *andina* (Phil.) Reiche

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 800-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Senna birostris* (Dombey ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby**

var. ***arequipensis* (Meyen ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby**

Sinónimos: *Cassia arequipensis* Meyen ex Vogel, *Cassia tarapacana* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2200-3900 m.

Países limítrofes: Perú.

***Senna brongniartii* (Gaudich.) H.S. Irwin & Barneby**

Sinónimos: *Cassia misera* Phil., *Cassia brongniartii* Gaudich.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 100-1100 m.

Países limítrofes: Perú.

***Senna candolleana* (Vogel) H.S. Irwin & Barneby**

Sinónimos: *Cassia closiana* Phil., *Cassia obtusa* Clos, *Cassia candolleana* Vogel, *Cassia emarginata* Clos, nom. illeg., *Cassia bicapsularis* L. var. *chilensis* Benth.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Senna cruckshanksii* (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby**

Sinónimos: *Cassia stipulacea* Aiton var. *tenuistipula* Bertero ex Vogel, *Cassia campanae* Phil., *Cassia confusa* Phil. var. *campanae* (Phil.) Reiche, *Cassia cruckshanksii* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 400-600 m.

***Senna cumingii* (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby**

var. ***alcaparra* (Phil.) H.S. Irwin & Barneby**

Sinónimos: *Cassia alcaparra* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Senna cumingii* (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby**

var. ***coquimbensis* (Vogel) H.S. Irwin & Barneby**

Sinónimos: *Cassia coquimbensis* Vogel, *Cassia flaccida* Clos

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-400 m.



***Senna cumingii*** (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. ***cumingii***

Sinónimos: *Cassia cumingii* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Senna cumingii*** (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. ***eremobia*** (Phil.) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimos: *Cassia eremobia* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Senna huidobriana*** (Phil.) Zoellner & San Martin

Sinónimos: *Cassia huidobriana* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Senna paposana*** (Phil.) Zoellner & San Martin

Sinónimos: *Cassia paposana* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

***Senna septemtrionalis*** (Viv.) H.S. Irwin & Barneby

Árbol. Introducido.

Distribución: LBO.

***Senna stipulacea*** (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. ***anglorum*** H.S. Irwin & Barneby

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Senna stipulacea*** (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. ***stipulacea***

Sinónimos: *Cassia stipulacea* Aiton, *Cassia foetida* Ruiz & Pav. ex G. Don, *Cassia myrtifolia* Phil. ex Reiche, *Cassia stipulacea* Willd., nom. illeg., *Cassia pencana* Phil. ex sched.

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Quebracho, alcaparra.

***Senna urmenetae*** (Phil.) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimos: *Cassia urmenetae* Phil., *Cassia glaucescens* Benth., *Cassia oreades* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

## **Sophora**

***Sophora cassioides*** (Phil.) Sparre

Sinónimos: *Edwardsia cassioides* Phil.

Árbol. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Nombre vulgar: Pilo, pelú.

***Sophora fernandeziana*** (Phil.) Skotts. var. ***fernandeziana***

Sinónimos: *Sophora tetraptera* J.S. Muell. subsp. *fernandeziana* Skotts.

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Nombre vulgar: Mayu-monte, mayu del monte.

***Sophora fernandeziana*** (Phil.) Skotts. var. ***reedeanae*** (Phil.) Skotts.

Sinónimos: *Edwardsia reedeanae* Phil., *Sophora reediana* (Phil.) Yakovlev

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

***Sophora macrocarpa*** Sm.

Sinónimos: *Sophora donihuensis* Ravenna

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Nombre vulgar: Mayu, mayo.

***Sophora masafuerana*** (Phil.) Skotts.

Sinónimos: *Edwardsia masafuerana* Phil.

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Nombre vulgar: Pelú de Juan Fernández, leña dura, madera dura.

***Sophora toromiro*** (Phil.) Skotts.

Sinónimos: *Edwardsia toromiro* Phil., *Sophora tetraptera* auct., non J. Mill.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Toromiro.

Nota: Extinto en estado silvestre.

## **Spartium**

***Spartium junceum*** L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: AYP, ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

## Teline

### *Teline monspessulana* (L.) K. Koch

Arbusto. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Nombre vulgar: Retamilla.

## Trifolium

### *Trifolium angustifolium* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

### *Trifolium antucoense* D. Heller

Sinónimos: *Trifolium circumdatum* Kunze, nom. illeg., *Lupinaster circumdatus* (Kunze) C. Presl, *Trifolium inconspicuum* Poepp. ex D. Heller, nom. nud.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LBO, BIO, LLA.

### *Trifolium arvense* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, AIS, MAG.

### *Trifolium aureum* Pollich

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: MAG.

### *Trifolium campestre* Schreb.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

### *Trifolium cernuum* Brot.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, MAU.

### *Trifolium chilense* Hook. & Arn.

Sinónimos: *Lupinaster ochreatus* (Kunze ex Steud.) C. Presl, *Trifolium ochreatum* Kunze ex Steud.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 600-900 m.

### *Trifolium depauperatum* Desv.

Sinónimos: *Lupinaster depauperatus* (Desv.) C. Presl

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Países limítrofes: Perú.

### *Trifolium dubium* Sibth.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

### *Trifolium fragiferum* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

### *Trifolium glomeratum* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

### *Trifolium hybridum* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: BIO, LLA, MAG.

### *Trifolium incarnatum* L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA.

### *Trifolium macraei* Hook. & Arn.

Sinónimos: *Trifolium bicephalum* Elmer, *Trifolium catalinae* S. Watson, *Trifolium mercedense* P.B. Kenn, *Trifolium traskae* P.B. Kenn

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Nota: Se encuentra también en California.

### *Trifolium microdon* Hook. & Arn.

Sinónimos: *Trifolium lechleri* Phil., *Trifolium chrysanthum* Hook. & Arn., *Trifolium microdon* Hook. & Arn. var. *pilosum* Eastw., *Trifolium tricuspdatum* Bertero ex Steud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nota: Se encuentra también en Estados Unidos y Canadá.

### *Trifolium phyanthum* Hook. & Arn.

Sinónimos: *Trifolium valdivianum* Phil. ex D. Heller & Zohary, nom. nud.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO, LLA.

### *Trifolium polymorphum* Poir. var. *grandiflorum* Parodi

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Trifolium polymorphum* Poir. var. *polymorphum*

Sinónimos: *Trifolium grandiflorum* Hook. & Arn., *Amoria*

*polymorpha* (Poir.) C. Presl, *Trifolium rivale* Closs, non Steud., *Trifolium crosnierii* Clos, *Trifolium indecorum* Clos, *Trifolium simplex* Clos, *Trifolium brevipes* Phil., *Trifolium concinum* Phil., *Trifolium ampicarpum* Phil., *Trifolium rubrum* Larrañaga

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-2700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Trifolium pratense* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Trifolium repens* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Trifolium spadiceum* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: MAG.

***Trifolium striatum* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

***Trifolium subterraneum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, LBO, MAU, BIO, ARA.

***Trifolium suffocatum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO.

***Trifolium tomentosum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, BIO.

***Trifolium triaristatum* Bertero ex Colla**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, BIO, LLA.

Nota: Se encuentra también en México y Estados Unidos.

***Trifolium vernum* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, LBO.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

***Trifolium vestitum* D. Heller & Zohary**

Sinónimos: *Trifolium volekmanni* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

**Trigonella**

***Trigonella monspeliaca* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO.

**Ulex**

***Ulex europaeus* L.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

**Vicia**

***Vicia araucana* Phil.**

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: MAU, NUB.

***Vicia benghalensis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG.

***Vicia berteroana* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME, LBO.

***Vicia bijuga* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Lathyrus anomalus* Phil., *Vicia solisii* Phil., *Vicia saffordii* Phil., *Vicia sericella* Speg., *Vicia sericella* Speg. var. *glabrata* Speg.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: RME, NUB, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Vicia coquimbensis* Martic.**

Sinónimos: *Vicia truncata* Phil., hom. illeg.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

***Vicia diversifolia* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LLA.

***Vicia graminea* Sm.**

Sinónimos: *Vicia graminea* Sm. var. *heterophylla* Kuntze, *Vicia graminea* Sm. var. *multiflora* Hook. & Arn., *Vicia grata* Phil.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: RME, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Vicia hirsuta*** (L.) Gray  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

***Vicia inconspicua*** Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-400 m.

***Vicia lanceolata*** Phil.  
Hierba. Anual o bienal. Endémica.  
Distribución: MAU.

***Vicia linearifolia*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Vicia hookeri* G. Don, *Vicia micrantha* Hook. & Arn.  
Hierba trepadora. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL, BIO, ARA, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Vicia magellanica*** Hook.f. var. *dianthes* (Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Vicia dianthes* Phil.  
Hierba. Anual o bienal. Endémica.  
Distribución: ARA.

***Vicia magellanica*** Hook.f. var. *magellanica*  
Sinónimos: *Vicia graminea* auct. non Sm., *Vicia kingii* Hook.f., *Vicia patagonica* Hook.f., *Vicia depauperata* Clos, *Vicia patagonica* Hook.f. var. *depauperata* (Clos) Speg., *Vicia andicola* Phil. non Kunth  
Hierba. Anual o bienal. Nativa.  
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Vicia modesta*** Phil.  
Hierba. Anual o bienal. Endémica.  
Distribución: ANT, VAL.

***Vicia mucronata*** Clos  
Hierba. Anual o bienal. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Vicia nana*** Vogel  
Sinónimos: *Vicia dentata* Gillies ex Hook. & Arn., *Vicia valdiviana* Phil., *Vicia leptantha* Phil.

Hierba trepadora. Anual. Nativa.  
Distribución: BIO, LLA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Vicia nigricans*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Vicia macraei* Hook. & Arn., *Vicia coxii* Phil., *Vicia darapskiana* Phil., *Vicia andina* Phil., *Vicia leyboldii* Phil., *Vicia magnifolia* Clos, *Vicia moorei* Phil., *Vicia speciosa* Phil., *Vicia commutata* Phil., *Vicia fodinarum* Phil., *Vicia apiculata* Phil., *Vicia apiculata* Phil. var. *parvifolia* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Vicia pallida*** Hook. & Arn.  
Hierba. Anual o bienal. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

***Vicia parviflora*** Cav.  
Arbusto trepador. Introducido.  
Distribución: ARA.

***Vicia sativa*** L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: RME, BIO, ARA, LLA.

***Vicia sativa*** L. subsp. *sativa*  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

***Vicia sessiliflora*** Clos  
Hierba. Anual o bienal. Endémica.  
Distribución: LLA.

***Vicia setifolia*** Kunth  
Sinónimos: *Vicia graminea* Sm. var. *setifolia* (Kunth) Kuntze, *Vicia acerosa* Clos, *Vicia acerosa* Clos var. *angustifolia* (Clos) Reiche, *Vicia angustifolia* Clos, hom. illeg.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: RME, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Vicia subserrata*** Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 100-200 m.

***Vicia tetrasperma*** (L.) Schreb.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, VAL, RME, LBO, MAU, AIS, MAG.

***Vicia vicina*** Clos

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Vicia villosa*** Roth

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

**Weberbauerella**

***Weberbauerella chilensis*** Faúndez & Saldivia

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ATA.

Rango altitudinal: 2500-3600 m.

**FAGACEAE**

**Quercus**

***Quercus robur*** L.

Árbol. Introducido.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Nombre vulgar: Encino, roble europeo.

**FRANCOACEAE**

**Araeoandra**

***Araeoandra tenuicaulis*** (Barnéoud) Lefor

Sinónimos: *Viviania tenuicaulis* Barnéoud

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

**Balbisia**

***Balbisia gracilis*** (Meyen) Hunz. & Ariza

Sinónimos: *Wendtia gracilis* Meyen, *Wendtia gracilis* Meyen var. *typica* Knuth, nom. illeg., *Wendtia reynoldsii* Endl. ex Walp., *Wendtia trigyna* (Kunze) Kuntze, *Wendtia trigyna* (Kunze) Kuntze var. *poepigiana* Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Balbisia microphylla*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Ledocarpon microphylla* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ATA.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

Nombre vulgar: Purisa, pupuña.

***Balbisia peduncularis*** (Lindl.) D. Don

Sinónimos: *Ledocarpon pedunculare* Lindl., *Cruckshanksia cistiflora* Hook. & Arn., *Ledocarpon cistiflorum* Meyen, nom. nud.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-500 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Flor de San José, amancai, palo negro, copa de oro, mancay.

***Balbisia stitchkinii*** Ricardi

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3800-4000 m.

**Cissarobryon**

***Cissarobryon elegans*** Kunze ex Poepp.

Sinónimos: *Cissarobryon aristulatum* Phil., *Cissarobryon macrophyllum* Phil., *Cissarobryon parvifolium* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

**Francoa**

***Francoa appendiculata*** Cav. var. *appendiculata*

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 800-1500 m.

***Francoa appendiculata*** Cav. var. *ramosa* (D. Don) Rolfe

Sinónimos: *Francoa ramosa* D. Don

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

***Francoa appendiculata*** Cav. var. *sonchifolia* (Cav.) Rolfe

Sinónimos: *Francoa sonchifolia* Cav.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Hierba del pasmo, llaupangue.



## Tetilla

### *Tetilla hydrocotylifolia* DC.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA.

## Viviania

### *Viviania crenata* (Hook.) G. Don

Sinónimos: *Macraea crenata* Hook.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Nombre vulgar: Oreganillo.

### *Viviania marifolia* Cav.

Sinónimos: *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch, *Macraea rosea* Lindl., *Viviania brevipedunculata* Phil., *Viviania laxa* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 3200-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Oreganillo, té de burro.

### *Viviania ovata* Phil.

Sinónimos: *Viviania bernalessii* Phil., *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch var. *ovata* (Phil.) Reiche, *Viviania viridis* Phil. ex Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

## FRANKENIACEAE

### Frankenia

#### *Frankenia chilensis* K. Presl

Sinónimos: *Frankenia campestris* Schauer, *Frankenia chilensis* K. Presl var. *campestris* (Schauer) Gunckel, *Frankenia erecta* Gay, *Frankenia nicolletiana* Gay, *Frankenia farinosa* J. Remy, *Frankenia aspera* Phil., *Frankenia chilensis* K. Presl var. *aspera* (Phil.) I.M. Johnst., *Frankenia florida* Phil., *Frankenia nicolletiana* Gay var. *florida* (Phil.) Reiche, *Frankenia glabrata* Phil., *Frankenia chilensis* K. Presl var. *florida* (Phil.) Gunckel, *Coldenia glabra* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, RME.

Países limítrofes: Perú.

#### *Frankenia microphylla* Cav.

Sinónimos: *Franca microphylla* (Cav.) Vis., *Frankenia microphylla* Cav. var. *relaxata* Speg., *Niederleinia microphylla* (Cav.) Hieron. ex Nied.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Frankenia salina* (Molina) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Frankenia berteriana* Gay, *Frankenia micrantha* Gay, *Frankenia salina* (Molina) I.M. Johnst. var. *micrantha* (Gay) Gunckel, *Franca grandifolia* (Cham. & Schltdl.) Greene, *Frankenia campestris* (Gay) Tidestrom, *Frankenia grandifolia* Cham. & Schltdl. var. *micrantha* (Gay) W.L. Bray, *Frankenia grandifolia* Cham. & Schltdl., *Frankenia grandifolia* Cham. & Schltdl. var. *campestris* Gray, *Frankenia latifolia* K. Presl, *Frankenia micrantha* Gay var. *berteriana* (Gay) W.L. Bray, *Ocimum salinum* Molina, *Velezia latifolia* Eschsch.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Hierba del salitre, salitre, vichilla, dichilla.

#### *Frankenia triandra* J. Remy

Sinónimos: *Anthobryum triandrum* (J. Remy) Surgis, *Anthobryum aretioides* Phil., *Anthobryum clarenii* (R.E. Fr.) Cabrera, *Anthobryum tetragonum* Phil., *Frankenia clarenii* R.E. Fries, *Pycnophyllum sulcatum* Griseb., *Anthobryum aretioides* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3300-4800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Llaretilla.

#### *Frankenia vidalii* F. Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 200-500 m.

## GENTIANACEAE

### Centaurium

#### *Centaurium cathanlahuen* (Molina) B.L. Rob.

Sinónimos: *Gentiana cathanlahuen* Molina, *Gentiana peruviana* Lam., *Chironia chilensis* Willd., nom. illeg., *Erythraea chilensis* (Willd.) Pers., *Centaurium chilense* (Willd.) Druce, nom. illeg., *Erythraea chilensis* (Willd.) Pers. var. *humilis* Phil. ex Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Canchanlahue, canchanlahuen, cachén, canchanlahua.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

#### ***Centaurium erythraea*** Rafn

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: LLA, AIS.

#### ***Centaurium littorale*** (Turner) Gilmour

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ARA, LLA, AIS.

#### ***Centaurium pulchellum*** (Sw.) Druce

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LRI, LLA.

#### ***Centaurium spicatum*** (L.) Fritsch ex Janch.

Hierba. Anual o perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

### **Cicendia**

#### ***Cicendia quadrangularis*** (Lam.) Griseb.

Sinónimos: *Microcala quadrangularis* (Dombey ex Lam.) Griseb., *Gentiana quadrangularis* Lam., *Exacum quadrangulare* (Lam.) Willd., *Exacum chilense* Bertero, nom. nud., *Exacum inflatum* Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### **Gentiana**

#### ***Gentiana prostrata*** Haenke

Sinónimos: *Gentiana sedifolia* Kunth, *Gentiana gayi* Griseb., *Gentiana podocarpa* (Phil.) Griseb., *Gentiana prostrata* Haenke var. *podocarpa* (Phil.) Kusn., *Gentiana ramosissima* Phil., *Varasia podocarpa* Phil., *Gentiana sedifolia* Kunth var. *lineata* Phil., *Gentiana minima* Phil., *Varasia sessilis* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 1800-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Mamañika.

### **Gentianella**

#### ***Gentianella coquimbensis*** (Briq.) Martic. & Quezada

Sinónimos: *Gentiana coquimbensis* Briq., *Gentianella coquimbensis* (Briq.) T.N. Ho & S.W. Liu, comb. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1600-3500 m.

#### ***Gentianella magellanica*** (Gaudich.) Fabris ex D.M. Moore

Sinónimos: *Gentiana lactea* Phil., *Gentiana pearcei* Phil., *Gentiana valdiviana* Phil., *Gentiana magellanica* Gaudich., *Gentiana araucana* Phil., *Gentiana modesta* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### ***Gentianella multicaulis*** (Gillies ex Griseb.) Fabris

Sinónimos: *Gentianella gilliesii* (Gilg) Martic. & Arroyo, nom. illeg., *Gentiana gilliesii* Gilg, nom. illeg.

Hierba. Bienal. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

#### ***Gentianella ottonis*** (Phil.) Muñoz

Sinónimos: *Gentiana ottonis* Phil., *Gentiana hexamera* Phil., *Gentiana ottonis* Phil. var. *hexamera* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 2400-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### ***Gentianella tarapacana*** (Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu

Sinónimos: *Gentiana tarapacana* Gilg

Hierba. Bienal. Endémica.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3800 m.

## **GERANIACEAE**

### **Erodium**

#### ***Erodium botrys*** (Cav.) Bertol.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI.

#### ***Erodium cicutarium*** (L.) L'Hér. ex Aiton

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Erodium geoides*** A. St.-Hil.

Sinónimos: *Erodium botrys* auct. non (Cav.) Bertol.  
Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, ARA.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Erodium malacoides*** (L.) L'Hér. ex Aiton var. *malacoides*

Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

***Erodium malacoides*** (L.) L'Hér. ex Aiton var. *ribifolium* (Jacq.) DC.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME.

***Erodium moschatum*** (L.) L'Hér. ex Aiton

Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

**Geranium**

***Geranium bertereanum*** Colla

Sinónimos: *Geranium andinum* Phil., *Geranium proximum* Steud., *Geranium patagonicum* Hook.f., *Geranium apricum* Phil., *Geranium chilense* Aedo & Muñoz Garm., *Geranium collae* Aedo, Muñoz Garm. & Pando, *Geranium neohispidum* Aedo & Muñoz Garm., *Geranium submolle* Steud., *Geranium columbinum* auct. non L., *Geranium bertereanum* Colla var. *apricum* (Phil.) Reiche, *Geranium bertereanum* Colla var. *caespitosum* Reiche, *Geranium bertereanum* Colla var. *hispidum* Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Geranium core-core*** Steud.

Sinónimos: *Geranium argentinum* R. Knuth, *Geranium moorei* Phil., *Geranium commutatum* Steud., *Geranium ochsenii* Phil., *Geranium squamosum* Phil., *Geranium subsericeum* R. Knuth, *Geranium rapulum* A. St.-Hil. & Naudin, *Geranium columbinum* auct. non L., *Geranium commutatum* Steud. var. *oschenii* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Core-core.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Geranium dissectum*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

***Geranium magellanicum*** Hook.f.

Sinónimos: *Geranium magellanicum* Hook.f. var. *typicum* R. Knuth, nom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Geranium molle*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

***Geranium purpureum*** Vill.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

***Geranium pusillum*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: RME, MAU, AIS, MAG, JFE.

***Geranium robertianum*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

***Geranium sessiliflorum*** Cav.

Sinónimos: *Geranium acaule* auct. non Willd., *Geranium sessiliflorum* Cav. fma. *albiflorum* Kuntze, nom. nud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, COQ, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-4800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Geranium skottsbergii*** R. Knuth

Sinónimos: *Geranium columbinum* auct. non L., *Geranium philippii* J.F. Macbr., *Geranium bertereanum* Colla var. *ciliatum* Reiche, *Geranium bertereanum* Colla var. *philippii* (J.F. Macbr.) L.E. Navas  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.

## GESNERIACEAE

### Asteranthera

*Asteranthera ovata* (Cav.) Hanst.

Sinónimos: *Asteranthera chilensis* Hanst., *Columnnea ovata* Cav.

Hierba epífita. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Estrellita, estrellita del bosque, voqui.

### Mitraria

*Mitraria coccinea* Cav.

Sinónimos: *Gesneria chilensis* Molina

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Botellita, chilca, voquivoqui, vochi-vochi.

### Sarmienta

*Sarmienta scandens* (J.D. Brandis ex Molina) Pers.

Sinónimos: *Sarmienta repens* Ruiz & Pavón, nom. illeg., *Urceolaria scandens* J.D. Brandis ex Molina, *Urceolaria chilensis* Molina, *Ulceolaria chilensis* Roemer. & Schultes

Subarbusto epífita. Endémico.

Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Italahué, votri, medallita, habaslahué, canucán.

## GOMORTEGACEAE

### Gomortega

*Gomortega keule* (Molina) Baill.

Sinónimos: *Lucuma keule* Molina, *Gomortega nitida* Ruiz & Pav., *Keulia chilensis* Molina, *Adenostemum nitidum* (Ruiz & Pav.) Pers.

Árbol. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Nombre vulgar: Queule, keule.

## GOODENIACEAE

### Selliera

*Selliera radicans* Cav.

Sinónimos: *Goodenia radicans* (Cav.) Pers., *Goodenia repens* Labill., *Selliera fasciculata* Buchenan, *Selliera herpystica* Schldt., *Selliera microphylla* Colenso, *Selliera repens* de Vriese

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Nombre vulgar: Roseta nudosa de los pantanos, maleza de las marismas.

## GRISELINIACEAE

### Griselinia

*Griselinia carlomunozii* M.O. Dillon & Muñoz-Schick

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 200-500 m.

*Griselinia jodinifolia* (Griseb.) Taub.

Sinónimos: *Decostea jodinifolia* Griseb.

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

*Griselinia racemosa* (Phil.) Taub.

Sinónimos: *Decostea racemosa* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lamulahuen.

*Griselinia ruscifolia* (Clos) Ball

Sinónimos: *Decostea ruscifolia* Clos, *Griselinia ruscifolia* (Clos) Taub., comb. illeg.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lilinguen.

*Griselinia scandens* (Ruiz & Pav.) Taub.

Sinónimos: *Decostea scandens* Ruiz & Pav., *Griselinia alata* Ball

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-800 m.  
Nombre vulgar: Yelmo.

## GROSSULARIACEAE

### Ribes

#### *Ribes bicolor* Phil.

Sinónimos: *Ribes glandulosum* Ruiz & Pav., *Ribes ruizii* Rehder  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1700 m.

#### *Ribes cucullatum* Hook. & Arn.

Sinónimos: *Ribes lacarense* Phil., *Ribes nubigenum* Phil., *Ribes nebularum* Phil., *Ribes montanum* Phil., *Ribes brachystachya* Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Zarzaparrilla.

#### *Ribes densiflorum* Phil.

Sinónimos: *Ribes cucullatum* Hook. & Arn. var. *densiflorum* (Phil.) Sparre, *Ribes nitidissimum* Neger  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 1000-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

#### *Ribes integrifolium* Phil.

Arbusto. Endémico.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1100-1400 m.  
Nombre vulgar: Parrilla falsa.

#### *Ribes magellanicum* Poir.

Sinónimos: *Ribes ovallei* Phil., *Ribes parviflorum* Phil., *Ribes parvifolium* Phil., *Ribes ahrendsii* Phil., *Ribes palenae* Phil., *Ribes micranthum* Phil., *Ribes magellanicum* Poir. subsp. *parviflorum* (Phil.) Sparre  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Zarzaparrilla, parrilla.

#### *Ribes nemorosum* Phil.

Sinónimos: *Ribes polyanthes* Phil., *Ribes rupicola* Phil., *Ribes stolpi* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1400-1800 m.  
Nombre vulgar: Zarzaparrilla.

#### *Ribes punctatum* Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Rebis punctata* (Ruiz & Pav.) Spach, *Rebis ebracteolata* Spach, *Ribes ebracteolatum* (Spach) Gay, *Ribes sublobatum* Phil., *Ribes collinum* Phil., *Ribes berterioanum* Phil., *Ribes heterophyllum* Phil., *Ribes georgianum* F. Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 500-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Brevilla, zarzaparrilla, parrilla, uvilla.

#### *Ribes trilobum* Meyen

Sinónimos: *Rebis gayanum* (Spach) Reiche, *Ribes villosum* Gay  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-2400 m.  
Nombre vulgar: Parrilla, muhul.

#### *Ribes valdivianum* Phil.

Sinónimos: *Ribes valdivianum* Phil. var. *sessiliflorum* Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## GUNNERACEAE

### Gunnera

#### *Gunnera berteroi* Phil.

Sinónimos: *Gunnera laxiflora* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 2700-3100 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

#### *Gunnera bracteata* Steud. ex G. Benn.

Sinónimos: *Gunnera glabra* Phil., *Gunnera insularis* Phil., *Gunnera pyramidalis* Schindl.  
Hierba. Perenne. Endémica.



Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Pangué.

***Gunnera lobata*** Hook.f.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Gunnera magellanica*** Lam.  
Sinónimos: *Dysemone integrifolia* Banks ex Blume, *Misandra magellanica* J.F. Gmel., *Gunnera plicata* Vahl, *Gunnera falklandica* Hook.f., *Gunnera reichei* Schindl., *Gunnera integrifolia* Blume  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Gunnera masafuerae*** Skottsbo.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Pangué.

***Gunnera peltata*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Pangué.

***Gunnera tinctoria*** (Molina) Mirb. var. *meyerii* (L.E. Mora) L.E. Mora, Pabón-Mora & F. González  
Sinónimos: *Gunnera chilensis* Lam. var. *meyerii* L.E. Mora  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Pangué, nalca.

***Gunnera tinctoria*** (Molina) Mirb. var. *tinctoria*  
Sinónimos: *Panke tinctoria* Molina, *Gunnera chilensis* Lam., *Gunnera scabra* Ruiz & Pav., *Panke anapodophyllifolia* Feuille, *Panke chilensis* Oersted, *Panke caulescens* J.F. Gmelin  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Pangué, nalca.

***Gunnera tinctoria*** (Molina) Mirb. var. *valdiviensis* (L.E. Mora) L.E. Mora, Pabón-Mora & F. González  
Sinónimos: *Gunnera chilensis* Lam. var. *valdiviensis* L.E. Mora  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LLA.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Nombre vulgar: Pangué, nalca.

## HALORAGACEAE

### Haloragis

***Haloragis masafuerae*** Skottsbo. var. *asperrima* (Skottsbo.) Orchard  
Sinónimos: *Haloragis asperrima* Skottsbo.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.

***Haloragis masafuerae*** Skottsbo. var. *masafuerae*  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-600 m.

***Haloragis masatierrana*** Skottsbo.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.

### Myriophyllum

***Myriophyllum aquaticum*** (Vell.) Verdc.  
Sinónimos: *Myriophyllum proserpinacoides* Gillies ex Hook. & Arn.  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Lima, lima trencilla, wakalima, loroma, aguasana.

***Myriophyllum quitense*** Kunth  
Sinónimos: *Myriophyllum elatinoides* Gaudich. var. *ternatum* (Gaudich.) Reiche, *Myriophyllum ternatum* Gaudich., *Myriophyllum ternatum* Gaudich. var. *tetraphyllum* Hook. & Arn.  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Loroma, aguasana, loroma hembra.

## HELIOTROPIACEAE

### Heliotropium

#### *Heliotropium amplexicaule* Vahl

Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 550-600 m.

#### *Heliotropium angiospermum* Murray

Hierba o subarbusto. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: TAR.

#### *Heliotropium chenopodiaceum* (A. DC.) Clos var. *chenopodiaceum*

Sinónimos: *Heliophytum chenopodiaceum* A. DC.,

*Cochranea chenopodiacea* (A. DC.) Miers

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-1700 m.

#### *Heliotropium chenopodiaceum* (A. DC.) Clos var. *ericoideum* (Miers) Reiche

Sinónimos: *Cochlearia ericoidea* Miers, *Heliotropium pearcei* Phil., *Eritrichium glabratum* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

#### *Heliotropium curassavicum* L.

Sinónimos: *Heliotropium curassavicum* L. var. *parviflorum*

Ball, *Heliotropium curassavicum* L. var. *genuinum* I.M.

Johnst., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,

LBO.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

#### *Heliotropium eremogenum* I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-300 m.

#### *Heliotropium filifolium* (Miers) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Cochranea filifolia* Miers, *Heliotropium*

*chenopodiaceum* (A. DC.) Clos var. *filifolium* (Miers)

Reiche, *Cochranea kingi* Phil., *Heliotropium kingi* (Phil.)

Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

#### *Heliotropium floridum* (A. DC.) Clos

Sinónimos: *Heliophytum floridum* A.DC., *Cochranea*

*florida* (A. DC.) Miers, *Heliotropium floridum* (A. DC.)

Clos var. *latifolium* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-600 m.

#### *Heliotropium geissei* F. Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1000-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Heliotropium glutinosum* Phil.

Sinónimos: *Cochranea glutinosa* (Phil.) Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 1100-1500 m.

#### *Heliotropium huascoense* I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

#### *Heliotropium inconspicuum* Reiche

Sinónimos: *Cochranea parviflora* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1000-1200 m.

#### *Heliotropium jaffuelii* I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

#### *Heliotropium krauseanum* Fedde

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 700 m.

Países limítrofes: Perú.

#### *Heliotropium linariifolium* Phil.

Sinónimos: *Heliotropium linearifolium* F. Phil.,

*Heliotropium longiflorum* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

#### *Heliotropium longistylum* Phil.

Sinónimos: *Cochranea longistyla* (Phil.) Phil., *Heliotropium*

*vernicosum* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

***Heliotropium megalanthum*** I.M. Johnst.

Sinónimos: *Cochranea corymbosa* Miers, *Heliotropium corymbosum* (Miers) Reiche, *Heliotropium crassifolium* Phil., *Cochranea crassifolia* (Phil.) Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Heliotropium myosotifolium*** (A. DC.) Reiche

Sinónimos: *Heliotropium stenophyllum* Hook. & Arn. var. *myosotifolium* (A. DC.) Clos, *Heliophytum stenophyllum* (Hook. & Arn.) A. DC. var. *myosotifolium* A. DC., *Cochranea myosotifolia* (A. DC.) Miers, *Cochranea hebecula* Miers, *Cochranea hispidula* Miers, *Heliotropium hispidulum* (Miers) Reiche, *Cochranea sentis* Phil., *Heliotropium canum* Phil., *Heliotropium hispidulum* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ATA.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

***Heliotropium paronychioides*** A. DC.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 100-3100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Heliotropium philippianum*** I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Heliotropium pycnophyllum*** Phil.

Sinónimos: *Cochranea pycnophylla* (Phil.) F. Phil. ex Reiche, *Heliotropium breanum* Phil., *Heliotropium brevifolium* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

***Heliotropium sclerocarpum*** Phil.

Sinónimos: *Cochranea sclerocarpa* Phil., *Heliotropium chenopodiaceum* (A. DC.) Clos var. *sclerocarpa* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Heliotropium sinuatum*** (Miers) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Cochranea sinuata* Miers, *Heliotropium izagae* Phil., *Heliotropium rosmarinifolium* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Heliotropium stenophyllum*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Heliophytum stenophyllum* (Hook. & Arn.) A. DC., *Cochranea stenophylla* (Hook. & Arn.) Miers, *Meladendron chilense* Molina, *Heliotropium rosmarinifolium* Bertero ex Steud., nom. nud., *Heliotropium rosmarinifolium* Bertero ex A.DC., *Heliotropium stenophyllum* (Hook. & Arn.) A. DC. var. *rosmarinifolium* (Bertero ex A. DC.) Clos, *Cochranea conferta* Miers, nom. nud., *Cochranea congesta* Miers

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Heliotropium taltalense*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Cochranea taltalensis* Phil., *Heliotropium rugosum* Phil., *Cochranea rugosa* (Phil.) Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

## HYDRANGEACEAE

### Hydrangea

***Hydrangea serratifolia*** (Hook. & Arn.) F. Phil.

Sinónimos: *Cornidia serratifolia* Hook. & Arn., *Cornidia integerrima* Hook. & Arn., *Hydrangea integerrima* (Hook. & Arn.) Engl., *Hydrangea scandens* Poepp.

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Canelilla, pehuelden, voqui naranjo, laurela.

## HYPERICACEAE

### Hypericum

***Hypericum androsaemum*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, LRI, LLA.

***Hypericum caespitosum*** Cham. & Schldtl.

Sinónimos: *Hypericum chilense* Gay, *Hypericum muscoides* Phil., *Hypericum chilense* Gay var. *muscoides* (Phil.) Reiche, *Hypericum uliginosum* Kunth var. *prostratum* R. Keller, *Hypericum brevistylum* auct. non Choisy

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Nombre vulgar: Ñanco.

***Hypericum perforatum* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Hypericum silenoides* Juss.**

Sinónimos: *Hypericum paposanum* I.M. Johnst., *Hypericum indecorum* Kunth, *Hypericum multiflorum* Kunth

Hierba. Anual o perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ARA, LRI.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Hypericum x inodorum* L.**

Hierba o subarbusto. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: VAL, MAU, ARA, LLA, AIS.

**KRAMERIACEAE**

**Krameria**

***Krameria cistoidea* Hook. & Arn.**

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Nombre vulgar: Pacul, chañarcillo.

***Krameria lappacea* (Dombey) Burdet & B.B. Simpson**

Sinónimos: *Landia lappacea* Dombey, *Krameria triandra* Ruiz & Pav. var. *humboldtiana* Chodat, *Krameria iluca* Phil., *Krameria pentapetala* Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 300-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**LAMIACEAE**

**Cuminia**

***Cuminia eriantha* (Benth.) Benth.**

Sinónimos: *Bystropogon erianthus* Benth., *Cuminia fernandezia* Colla, *Johowia fernandezia* (Colla) Epling & Looser, *Cuminia brevidens* Benth., *Skottsbergiella fernandezia* (Colla) Epling, *Cuminia eriantha* (Benth.) Benth. var. *fernandezia* (Colla) Harley

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200-500 m.

**Galeopsis**

***Galeopsis tetrahit* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LLA.

**Gardoquia**

***Gardoquia gilliesii* Graham**

Sinónimos: *Satureja gilliesii* (Graham) Briq., *Gardoquia chilensis* Benth., *Satureja chilensis* (Benth.) Briq., *Clinopodium chilense* (Benth.) Govaerts

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Oreganillo.

***Gardoquia multiflora* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Satureja multiflora* (Ruiz & Pav.) Briq., *Clinopodium multiflorum* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Rizoa ovatifolia* Cav.

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Nombre vulgar: Menta de árbol.

**Glechoma**

***Glechoma hederacea* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ARA, LRI, LLA, MAG.

**Kurzamra**

***Kurzamra pulchella* (Clos) Kuntze**

Sinónimos: *Soliera pulchella* Clos, *Micromeria pulchella* (Clos) Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3500-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Poleo de cordillera.

**Lamium**

***Lamium amplexicaule* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

***Lamium purpureum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAG.

## Lepechinia

### *Lepechinia chilensis* (Molina) R. Morales

Sinónimos: *Lepechinia chamaedryoides* (Balb.) Epling, *Rosmarinus chilensis* Molina, *Sphacele chilense* (Molina) Briq., *Sphacele chamaedryoides* (Balb.) Briq., *Sphacele campanulata* Benth., *Dracocephalum chamaedryoides* Balb., *Phytoxis sidertifolia* Molina, *Phytoxis acidissima* Molina, *Alguelagum chilense* (Molina) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Nombre vulgar: Salvia, salvia macho, lahuén, alhuelaluén.

### *Lepechinia salviae* (Lindl.) Epling

Sinónimos: *Sphacele salviae* (Lindl.) Briq., *Sphacele lindleyi* Benth., *Stachys salviae* Lindl., *Gardoquia salviaefolia* Colla, *Alguelagum salviae* (Lindl.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Nombre vulgar: Salvia, salvia blanca, lahuenlahuén.

### *Lepechinia subhastata* (Benth.) Epling

Sinónimos: *Sphacele subhastata* Benth., *Alguelagum subhastatum* (Benth.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

## Lycopus

### *Lycopus europaeus* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LRI, LLA.

## Marrubium

### *Marrubium vulgare* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, AIS, JFE.

## Melissa

### *Melissa officinalis* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

## Mentha

### *Mentha aquatica* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

### *Mentha pulegium* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

### *Mentha suaveolens* Ehrh.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

### *Mentha x piperita* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

## Micromeria

### *Micromeria darwinii* Benth.

Sinónimos: *Clinopodium darwinii* (Benth.) Kuntze, *Clinopodium darwinii* (Benth.) Kuntze var. *pusilla* (Phil.) Epling, *Satureja darwinii* (Benth.) Briq., *Satureja pusilla* Macloskie, *Micromeria darwinii* Benth. var. *pusilla* (Phil.) Speg., *Micromeria pusilla* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Micromeria gilliesii* Benth.

Sinónimos: *Clinopodium gilliesii* (Benth.) Kuntze, *Satureja parvifolia* (Phil.) Epling, *Satureja gilliesii* (Benth.) Briq., *Oreosphacus parvifolia* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 1200-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Muña.

## Molucella

### *Molucella laevis* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

## Prunella

### *Prunella vulgaris* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.



## Salvia

### *Salvia gilliesii* Benth.

Sinónimos: *Salvia cuspidata* Ruiz et Pav. subsp. *gilliesii* (Benth.) J.R.I. Wood, *Salvia gilliesii* Benth. var. *glandulosa* Griseb.

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

### *Salvia rhombifolia* Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Salvia pilosa* Vahl, *Salvia foliosa* Benth., *Salvia tafallae* Benth., *Salvia paposana* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

### *Salvia tubiflora* Sm.

Sinónimos: *Salvia biflora* Ruiz & Pav., *Salvia excisa* Ruiz & Pav., *Salvia scrobiculata* Meyen, *Salvia biflora* Ruiz & Pav. var. *glabrata* Benth.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Perú.

### *Salvia verbenaca* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME.

## Scutellaria

### *Scutellaria nummulariifolia* Hook.f.

Sinónimos: *Cruzia serpyllacea* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Scutellaria racemosa* Pers.

Sinónimos: *Scutellaria rojasii* Briq., *Scutellaria rumicifolia* Kunth, *Scutellaria hastata* Larrañaga, *Scutellaria heterophylla* Willd. ex Benth., *Scutellaria bonariensis* Willd. ex Benth.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

### *Scutellaria valdiviana* (Clos) Epling

Sinónimos: *Theresa valdiviana* Clos

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, BIO, LRI.

Rango altitudinal: 0-200 m.

## Stachys

### *Stachys albicaulis* Lindl.

Sinónimos: *Stachys eriophylla* Briq.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hierba de Santa María.

### *Stachys arvensis* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, LLA, JFE, IPA.

### *Stachys bridgesii* Benth.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Nombre vulgar: Hierba de Santa Rosa.

### *Stachys eremicola* Epling

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

### *Stachys gilliesii* Benth.

Sinónimos: *Stachys petiolosa* Briq.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

### *Stachys grandidentata* Lindl.

Sinónimos: *Stachys toronjicillo* Phil., *Stachys closi* Phil.,

*Stachys serrata* Clos

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-2900 m.

Nombre vulgar: Hierba santa.

### *Stachys macraei* Benth.

Sinónimos: *Stachys chonotica* Hook.f.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Stachys ochroleuca*** Phil.

Sinónimos: *Stachys litoralis* Phil., *Stachys dubia* Briq., *Stachys rupestris* Phil., *Stachys meyeniana* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

***Stachys pannosa*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Stachys philippiana*** Vatke

Sinónimos: *Stachys andina* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

***Stachys sericea*** Cav.

Sinónimos: *Stachys glabrata* Phil., *Stachys sidertidoides* Gillies ex Benth., *Stachys candidissima* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 500-2500 m.

***Stachys truncata*** Kunze ex Benth.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, MAU, AIS.

Rango altitudinal: 0-600 m.

**Teucrium**

***Teucrium bicolor*** Sm.

Sinónimos: *Teucrium orchideum* Lindl., *Teucrium cavanilliesii* Bertero ex Steud., nom. nud., *Teucrium chilense* Desf. ex Steud., nom. nud., *Teucrium heterophyllum* Cav.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2100 m.

Nombre vulgar: Oreganillo.

***Teucrium nudicaule*** Hook.

Sinónimos: *Teucrium leucanthum* Phil., *Teucrium nudicaule* Hook. var. *leucanthum* (Phil.) Epling, *Teucrium tripartitum* Meyen

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2100 m.

**LARDIZABALACEAE**

**Boquila**

***Boquila trifoliolata*** (DC.) Decne.

Sinónimos: *Lardizabala trifoliolata* DC., *Lardizabala funaria* (Molina) Looser, *Cogyllia ternata* Molina, *Dolichos funarius* Molina, *Boissiera trifoliata* Dombey ex DC., nom. nud., *Boquila discolor* Decne., *Lardizabala discolor* Kunze ex Poepp. & Endl.

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pilpilvoqui, voqui blanco, voqui pil-pil.

**Lardizabala**

***Lardizabala biternata*** Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Cogyllia biternata* (Ruiz & Pav.) Molina, *Boissiera triternata* Dombey ex DC., nom. nud., *Lardizabala triternata* Ruiz & Pav., *Lardizabala infuscata* Miers, *Lardizabala sylvicola* Miers, *Cogyllia triternata* (Ruiz & Pav.) Molina

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Cóguil, coguilera, voqui-cóguil, collivoqui, voqui blanco, huipinga, coile.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

**LAURACEAE**

**Beilschmiedia**

***Beilschmiedia berteroa*** (Gay) Kosterm.

Sinónimos: *Cryptocarya berteroa* Gay, *Bellota nitida* Phil., *Cryptocarya nitida* Phil., *Boldu chilinum* Nees ex Meisn., *Boldu nitidum* (Phil.) Meisn., *Bellota pauciflora* Phil.

Árbol. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Belloto, belloto del centro.

***Beilschmiedia miersii*** (Gay) Kosterm.

Sinónimos: *Bellota miersii* Gay, *Boldu chilinum* Nees

Árbol. Endémico.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Belloto, belloto del norte.

## Cryptocarya

### *Cryptocarya alba* (Molina) Looser

Sinónimos: *Peumus rubra* Molina, *Peumus alba* Molina, *Cryptocarya rubra* (Molina) Skeels, *Peumus mammosa* Molina, *Laurus peumus* Molina, *Cryptocarya peumus* Nees, *Icosandra rufescens* Phil., *Cryptocarya stenantha* Phil., *Cryptocarya peumus* Nees var. *stenantha* (Phil.) Mez, *Cryptocarya peumus* Nees var. *laxiflora* Phil. ex Mez, *Cryptocarya laxiflora* Phil., *Cryptocarya peumo* (Dombey ex Lam.) Kosterm., *Cryptocarya mammosa* (Molina) Kosterm., *Laurus peumo* Dombey ex Lam.

Árbol. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Peumo.

## Persea

### *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees

Sinónimos: *Persea meyeniana* Nees, *Laurus linguy* Miers ex Bertero, *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees var. *canescens* Nees, *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees var. *palustris* Nees, *Persea intermedia* Phil., *Nothaphoebe lingue* Baeza, *Nothaphoebe meyeniana* Baeza, *Laurus lingue* Ruiz & Pav.

Árbol. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lingue.

## LENTIBULARIACEAE

## Pinguicula

### *Pinguicula antarctica* Vahl

Sinónimos: *Pinguicula magellanica* Comm. ex Franch.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Flor de pantano, violeta cimarrona, violeta de pantano, grasilla.

### *Pinguicula chilensis* Gay

Sinónimos: *Pinguicula antarctica* Donat, hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

## Utricularia

### *Utricularia gibba* L.

Sinónimos: *Utricularia gayana* A.DC., *Utricularia tenuis* Cav., *Utricularia tenuis* Cav. var. *poepigii* A. DC.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chupa bichos, bolsita de agua, manguera.

## LINACEAE

## Cliococca

### *Cliococca selaginoides* (Lam.) C.M. Rogers & Mildner

Sinónimos: *Linum selaginoides* Lam., *Cliococca tenuifolia* Bab., *Linum babingtonii* Planch., *Linum selaginoides* Lam. var. *chilense* Planch., *Linum microphyllum* Larrañaga

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Merulahuén.

## Linum

### *Linum bienne* Mill.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

### *Linum catharticum* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

### *Linum chamissonis* Schiede

Sinónimos: *Linum aquilinum* Molina var. *grandiflorum* Hook. & Arn., *Linum oligophyllum* Hook. & Arn., nom. illeg., *Linum macraei* Benth. var. *cumingii* Urban

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Ñanco, ñancolahuén, retamilla, nanco, nancolahuén.

### *Linum cremnophilum* I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

### *Linum macraei* Benth. var. *macraei*

Sinónimos: *Linum aquilinum* Molina, *Mesyinium chilense*

Raf., *Linum chironioides* Griseb., *Linum macraei* Benth. var. *olygophyllum* (Hook. & Arn.) Reiche, *Linum cumingii* Lodd.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Ñancolahuén.

***Linum macraei*** Benth. var. *marticorenae* Mildner

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Linum prostratum*** Dombey ex Lam.

Sinónimos: *Linum paposanum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 200-1000 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Linum ramosissimum*** Gay

Sinónimos: *Linum obtusifolium* Phil., *Linum chamissonis*

Schiede var. *obtusifolium* (Phil.) Reiche, *Linum chamissonis*

Schiede var. *ramosissimum* (Gay) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Linum usitatissimum*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, VAL, NUB, BIO, ARA, JFE.

## LINDERNIACEAE

### Lindernia

***Lindernia dubia*** (L.) Pennell

Sinónimos: *Gratiola dubia* L., *Lindernia dubia* (L.) Pennell

var. *anagallidea* (Michx.) Cooperr.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## LOASACEAE

### Blumenbachia

***Blumenbachia dissecta*** (Hook. & Arn.) Weigend & Grau

Sinónimos: *Loasa dissecta* Hook. & Arn., *Caiophora*

*espigneira* (Gay) Urb. & Gilg, *Blumenbachia espigneira*

Gay, *Caiophora dissecta* (Hook. & Arn.) Urb. & Gilg,

*Loasa microcalyx* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Países limítrofes: Argentina.

***Blumenbachia prietea*** Gay

Sinónimos: *Caiophora prietea* (Gay) Urb. & Gilg

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

***Blumenbachia silvestris*** Poepp.

Sinónimos: *Caiophora silvestris* (Poepp.) Urb. & Gilg,

*Caiophora scandens* Meyen & Klotzsch ex Walp.,

*Caiophora silvestris* (Poepp.) Urb. & Gilg var. *mitis*

(Phil.) Urb. & Gilg, *Caiophora tomentosula* Urb. & Gilg,

*Blumenbachia mitis* Phil., *Blumenbachia domeykoana*

Phil., *Loasa ochagaviae* Phil., *Loasa volckmanni* Phil.,

*Blumenbachia nemorosa* Phil., *Blumenbachia scandens*

Meyen

Hierba. Bienal o perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ortiga caballuna.

### Caiophora

***Caiophora chuquitensis*** (Meyen) Urb. & Gilg

Sinónimos: *Loasa chuquitensis* Meyen, *Blumenbachia*

*chuquitensis* (Meyen) Hook. f., *Caiophora superba* Phil.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Caiophora cirsifolia*** C. Presl

Sinónimos: *Caiophora sepiaria* (Ruiz & Pav. ex G. Don)

J.F. Macbr., *Blumenbachia sepiaria* Ruiz & Pav. ex G. Don

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Países limítrofes: Perú.

***Caiophora coronata*** (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Loasa coronata* Gillies ex Arn., *Blumenbachia*

*coronata* (Gillies ex Arn.) Hieron., *Caiophora absinthiifolia*

C. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Ortiguilla.

***Caiophora deserticola*** Weigend & M. Ackermann

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Países limítrofes: Perú.

***Caiophora rosulata*** (Wedd.) Urb. & Gilg  
Sinónimos: *Loasa rosulata* Wedd., *Caiophora anemonoides*  
Urb. & Gilg, *Caiophora rahmeri* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Países limítrofes: Bolivia.

### **Grausa**

***Grausa gayana*** (Urb. & Gilg) Weigend & R.H. Acuña  
Sinónimos: *Loasa sagittata* auct. non Hook. & Arn., *Loasa gayana* Urb. & Gilg  
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.  
Distribución: ARA, LRI, LLA.

***Grausa lateritia*** (Gillies ex Arn.) Weigend & R.H. Acuña  
Sinónimos: *Loasa acaulis* (Phil.) Urb. & Gilg, *Blumenbachia acaulis* Phil., *Loasa lateritia* Gillies ex Arn.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Países limítrofes: Argentina.

***Grausa martinii*** (Phil.) Weigend & R.H. Acuña  
Sinónimos: *Loasa martinii* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ARA, LRI, LLA.

***Grausa micrantha*** (Poepp.) Weigend & R.H. Acuña  
Sinónimos: *Loasa remyi* Gay, *Loasa micrantha* Poepp.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

***Grausa sagittata*** (Hook. & Arn.) Weigend & R.H. Acuña  
Sinónimos: *Loasa sagittata* Hook. & Arn.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LLA.

### **Huidobria**

***Huidobria chilensis*** Gay  
Sinónimos: *Loasa chilensis* (Gay) Urb. & Gilg  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.

***Huidobria fruticosa*** Phil.  
Sinónimos: *Loasa fruticosa* (Phil.) Urb. & Gilg  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

### **Loasa**

***Loasa acanthifolia*** Desr.  
Sinónimos: *Loasa punicea* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Ortiga brava.

***Loasa acerifolia*** Dombey ex Juss.  
Sinónimos: *Loasa furcata* Phil., *Loasa solaniifolia* Gay,  
*Loasa williamsi* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,  
LLA.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Ortiga brava.

***Loasa argentina*** Urb. & Gilg  
Sinónimos: *Loasa patagonica* Urb. & Gilg, nom. nud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

***Loasa arnottiana*** Gay  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ.

***Loasa caespitosa*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

***Loasa elongata*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Loasa bertrandii* Phil., *Loasa urmenetae* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.

***Loasa floribunda*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Loasa floribunda* Hook. & Arn. var.  
*brachysepala* Urb. & Gilg  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.

***Loasa heterophylla*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Loasa aphanantha* Urb. & Gilg, *Loasa parviflora* Phil., hom. illeg., *Loasa insons* Poepp. var.  
*prostrata* Poepp., *Loasa barneoudii* Gay, *Loasa elongata*  
Phil., nom. nud., *Loasa subandina* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.  
Países limítrofes: Argentina.

***Loasa humilis*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.

***Loasa illapelina*** Phil.  
Sinónimos: *Loasa illapelina* Phil. var. *laciniata* (Phil.) Urb.  
& Gilg, *Loasa leucantha* Phil.



Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.

***Loasa insons*** Poepp.

Sinónimos: *Loasa intricata* Gay, *Loasa tricolor* Ker Gawl.  
var. *insons* (Poepp.) Urb. & Gilg, *Loasa meyeniana* Walp.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Países limítrofes: Argentina.

***Loasa mollensis*** Muñoz-Schick & Trenquallye

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: VAL.

***Loasa multifida*** Gay

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.

***Loasa nitida*** Desr.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: TAR, ANT.

***Loasa pallida*** Gillies ex Arn.

Sinónimos: *Loasa aldunatea* Gay  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Nombre vulgar: Ortiga caballuna.

***Loasa paradoxa*** Urb. & Gilg

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME.

***Loasa placei*** Lindl.

Sinónimos: *Loasa tricolor* Ker Gawl. var. *placei* (Lindl.)  
Urb. & Gilg  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

***Loasa prostrata*** Gillies ex Arn.

Sinónimos: *Loasa tricolor* Ker Gawl. var. *prostrata* (Gillies  
ex Arn.) Urb. & Gilg, *Loasa prostrata* Gillies ex Arn. var.  
*cumingii* Hook. & Arn., *Loasa alba* D. Don  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

***Loasa sclareifolia*** Juss.

Sinónimos: *Loasa sclareifolia* Juss. var. *brachycarpa* Urb.  
& Gilg, *Loasa sclareifolia* Juss. var. *inermis* Urb. & Gilg,  
*Loasa sclareifolia* Juss. var. *nemoralis* (Phil.) Urb. & Gilg,  
*Loasa nemoralis* Phil.  
Hierba. Bienal o perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA.  
Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ortiga brava.

***Loasa sigmoidea*** Urb. & Gilg

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.  
Países limítrofes: Argentina.

***Loasa tricolor*** Ker Gawl.

Sinónimos: *Loasa bryoniaefolia* Schrad. ex DC.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Cardito.

***Loasa triloba*** Dombey ex Juss.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA, LRI.

**Mentzelia**

***Mentzelia albescens*** (Gillies ex Arn.) Griseb.

Sinónimos: *Bartonia albescens* Gillies ex Arn., *Bartonia  
sinuata* C. Presl, *Nuttallia albescens* (Gillies ex Arn.)  
Standl.  
Hierba. Bienal. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Países limítrofes: Argentina.

***Mentzelia bartonioides*** (C. Presl) Urb. & Gilg

Sinónimos: *Mentzelia andina* I.M. Johnst., hom. illeg.,  
*Mentzelia pinnatifida* Sleumer, hom. illeg., *Acrolasia  
bartonioides* C. Presl, *Acrolasia solieri* Gay, *Mentzelia  
solieri* (Gay) Urb. & Gilg ex Urb., *Mentzelia pinnatifida*  
(Phil.) Urb. & Gilg, *Mentzelia andina* Urb. & Gilg, *Acrolasia  
bartonioides* Gay, hom. illeg., *Acrolasia pinnatifida* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ.  
Países limítrofes: Argentina.

***Mentzelia scabra*** Kunth subsp. *atacamensis* (Urb. & Gilg)

Weigend  
Sinónimos: *Mentzelia chilensis* Gay var. *atacamensis* Urb.  
& Gilg  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: AYP, ANT, COQ.

***Mentzelia scabra*** Kunth subsp. *chilensis* (Gay) Weigend

Sinónimos: *Mentzelia ignea* (Phil.) Urb. & Gilg, *Mentzelia  
chilensis* Gay, *Loasa ignea* Phil.  
Arbusto o subarbusto. Nativo.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Países limítrofes: Bolivia.

## Nasa

*Nasa urens* (Jacq.) Weigend  
Sinónimos: *Loasa urens* Jacq.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Países limítrofes: Perú.

## Pinnasa

*Pinnasa bergii* (Hieron.) Weigend & R.H. Acuña  
Sinónimos: *Loasa bergii* Hieron.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

*Pinnasa nana* (Phil.) Weigend & R.H. Acuña  
Sinónimos: *Loasa nana* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, ARA, LLA.  
Países limítrofes: Argentina.

*Pinnasa pinnatifida* (Gillies ex Arn.) Weigend & R.H. Acuña  
Sinónimos: *Loasa pinnatifida* (Gillies ex Arn., *Loasa bridgesii* Urb. & Gilg, *Loasa chillana* Urb. & Gilg, *Loasa filicifolia* Poepp., *Loasa acutiloba* Urb. & Gilg, *Loasa poeppigiana* Urb. & Gilg, *Loasa tripartita* Urb. & Gilg  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Países limítrofes: Argentina.

*Pinnasa volubilis* (Dombey ex Juss.) Weigend & R.H. Acuña  
Sinónimos: *Loasa volubilis* Dombey ex Juss., *Loasa artemisiifolia* Poepp. ex Urb. & Gilg, *Loasa volubilis* Dombey ex Juss. var. *alpina* Poepp.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

## Presliophytum

*Presliophytum malesherbioides* (Phil.) R.H. Acuña & Weigend  
Sinónimos: *Loasa malesherbioides* Phil., *Loasa longiseta* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Países limítrofes: Argentina.

*Presliophytum sessiliflorum* (Phil.) R.H. Acuña & Weigend  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA.

## Scyphanthus

*Scyphanthus elegans* Sweet  
Sinónimos: *Grammatocarpus volubilis* C. Presl, *Scyphanthus stenocarpus* (Poepp.) Urb. & Gilg, *Grammatocarpus cumingii* C. Presl  
Hierba trepadora. Anual o bienal. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Nombre vulgar: Monjita.

## LORANTHACEAE

### Desmaria

*Desmaria mutabilis* (Poepp. & Endl.) Tiegh. ex T. Durand & B.D. Jacks.  
Sinónimos: *Loranthus mutabilis* Poepp. & Endl., *Phrygilanthus mutabilis* (Poepp. & Endl.) Eichl., *Gaiandendron mutabile* (Poepp. & Endl.) Engl. & Prantl.  
Arbusto parásito. Endémico.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1700 m.

### Ligaria

*Ligaria cuneifolia* (Ruiz & Pav.) Tiegh.  
Sinónimos: *Loranthus cuneifolius* Ruiz & Pav., *Ligaria coronata* Tiegh., *Loranthus linearifolius* Bertero  
Arbusto parásito. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### Notanthera

*Notanthera heterophylla* (Ruiz & Pav.) G. Don  
Sinónimos: *Loranthus heterophyllus* Ruiz & Pav., *Phrygilanthus berteroi* (Hook. & Arn.) Eichler, *Loranthus buxifolius* Cham. & Schldt., *Loranthus eschscholzianus* Mart. ex Schult. & Schult.f., *Loranthus valdivianus* Miq., *Loranthus berteroi* Hook. & Arn., *Psittacanthus berteroi* (Hook. & Arn.) G. Don, *Phrygilanthus heterophyllus* (Ruiz & Pav.) Eichler  
Arbusto parásito. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Nombre vulgar: Quintral del boldo.

## Tristerix

***Tristerix aphyllus*** (DC.) Barlow & Wiens  
Sinónimos: *Phrygilanthus aphyllus* (DC.) Eichler fma. *luteus* Follmann, *Loranthus aphyllus* DC., *Loranthus cactorum* Hook. & Arn., *Phrygilanthus aphyllus* (DC.) Eichler, *Loranthus pumilus* Miers ex Schult. & Schult.f.  
Arbusto parásito. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.  
Nombre vulgar: Quintral del quisco.

***Tristerix corymbosus*** (L.) Kuijt  
Sinónimos: *Phrygilanthus tetrandus* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Loranthus tetrandus* Ruiz & Pav., *Lonicera corymbosa* L., *Tristerix tetrandus* (Ruiz & Pav.) Mart., *Loranthus corymbosus* (L.) Desr., *Loranthus utui* Molina  
Arbusto parásito. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.  
Rango altitudinal: 0-2400 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Quintral.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Tristerix verticillatus*** (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens  
Sinónimos: *Phrygilanthus verticillatus* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Loranthus verticillatus* Ruiz & Pav., *Metastachys verticillata* (Ruiz & Pav.) Tiegh., *Notanthera verticillata* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Loranthus sternbergianus* Schult. & Schult.f., *Notanthera sternbergianus* (Schult. f.) G. Don, *Phrygilanthus sternbergianus* (Schult. f.) Reiche, *Loranthus poeppigii* DC., *Notanthera poeppigii* (DC.) G. Don  
Arbusto parásito. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Quintral.

## LYTHRACEAE

### Ammannia

***Ammannia coccinea*** Rottb.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: MAU.

***Ammannia latifolia*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: MAU.

## Lythrum

***Lythrum hyssopifolia*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Lythrum maritimum*** Kunth  
Sinónimos: *Lythrum album* auct. non Kunth, *Lythrum albicaule* Bertero  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA, VAL, RME, JFE.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Lythrum portula*** (L.) D.A. Webb  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ARA, LLA.

***Lythrum salicaria*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: RME, LLA.

## Pleurophora

***Pleurophora polyandra*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Pleurophora polyandra* Hook. & Arn. fma. *squarrosa* (Steud.) Koehne, *Pleurophora uncinata* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 200-2000 m.

***Pleurophora pungens*** D. Don  
Sinónimos: *Pleurophora pungens* D. Don fma. *imbricata* Koehne  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Nombre vulgar: Lengua de gallina.

***Pleurophora pusilla*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Pleurophora pusilla* Hook. & Arn. fma. *vestita* Koehne, *Pleurophora pilosiuscula* Gay var. *glabra* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-900 m.

## MALPIGHIACEAE

### Dinemagonum

*Dinemagonum gayanum* A. Juss.

Sinónimos: *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss., *Dinemagonum maculigerum* Phil., *Dinemagonum albicaule* Phil., *Dinemagonum gayanum* A. Juss. var. *albicaule* (Phil.) Reiche, *Dinemagonum gayanum* A. Juss. var. *bridgesianum* (A. Juss.) Reiche, *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss. fma. *glanduloso-bracteolata* Nied., *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss. var. *parvifolium* Nied.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Nombre vulgar: Té de burro, pingo blanco.

### Dinemandra

*Dinemandra ericoides* A. Juss.

Sinónimos: *Dinemandra glaberrima* A. Juss., *Dinemandra strigosa* Phil., *Dinemandra ramosissima* Phil., *Dinemandra subaptera* Phil., *Dinemandra glauca* Baill., *Dinemandra ericoides* A. Juss. var. *triandra* Nied., *Dinemandra glaberrima* A. Juss.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

Nombre vulgar: Té de burro, té bravo, colorado.

## MALVACEAE

### Abutilon

*Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet

Arbusto o subarbusto. Introducido.

Distribución: ANT.

### Andeimalva

*Andeimalva chilensis* (Gay) J.A. Tate

Sinónimos: *Malacothamnus chilensis* (Gay) Krapov., *Sphaeralcea glabrata* Phil., *Sphaeralcea grandifolia* Phil., *Sphaeralcea capitata* Phil., *Sphaeralcea viridis* Phil., *Sphaeralcea peteroana* Phil., *Sphaeralcea chilensis* Gay, *Sphaeroma chilense* (Gay) Kuntze, *Sphaeroma glabratum* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 300-3000 m.

### Anoda

*Anoda cristata* (L.) Schlttdl.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

### Corynabutilon

*Corynabutilon bicolor* (Phil. ex K. Schum.) Kearney

Sinónimos: *Abutilon bicolor* Phil. ex K. Schum.

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 200-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Matamora, malva.

*Corynabutilon ceratocarpum* (Hook. & Arn.) Kearney

Sinónimos: *Sida ceratocarpa* Hook. & Arn., *Abutilon ceratocarpum* (Hook. & Arn.) Gay

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 700-2400 m.

Nombre vulgar: Huella.

*Corynabutilon hirsutum* (Phil.) A.E. Martic.

Sinónimos: *Anoda hirsuta* Phil., *Abutilon hirsutum* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 300-500 m.

*Corynabutilon ochsenii* (Phil.) Kearney

Sinónimos: *Anoda ochsenii* Phil., *Abutilon ochsenii* (Phil.) Phil. ex F. Phil., *Abutilon ochsenii* (Phil.) Phil. ex F. Phil. var. *stellaris* Reiche, *Abutilon garckeii* Baker f.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-500 m.

*Corynabutilon salicifolium* (Reiche) Krapov.

Sinónimos: *Abutilon salicifolium* Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

*Corynabutilon viride* (Phil.) A.E. Martic.

Sinónimos: *Abutilon viride* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 1000-1800 m.

***Corynabutilon vitifolium*** (Cav.) Kearney  
Sinónimos: *Sida vitifolia* Cav., *Abutilon vitifolium* (Cav.) D. Don, *Sidalcea triloba* Turcz.  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: VAL, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1400 m.  
Nombre vulgar: Huella.

### **Cristaria**

***Cristaria adenophora*** I.M. Johnst.  
Hierba. Anual o perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 2400-3300 m.

***Cristaria andicola*** Gay  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2000-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Malvilla, primavera.

***Cristaria argyliifolia*** Phil.  
Sinónimos: *Cristaria aspera* Gay var. *pilosa* (Phil.) Reiche, *Cristaria pilosa* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 300-700 m.

***Cristaria aspera*** Gay var. *aspera*  
Sinónimos: *Cristaria intermedia* Gay, *Cristaria urmenetae* Phil., *Cristaria lata* Turcz.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Cristaria aspera*** Gay var. *formosula* (I.M. Johnst.) Muñoz-Schick  
Sinónimos: *Cristaria formosula* I.M. Johnst.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

***Cristaria aspera*** Gay var. *sadae* (Phil.) Muñoz-Schick  
Sinónimos: *Cristaria sadae* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

***Cristaria calderana*** Muñoz-Schick  
Hierba. Anual o perenne. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Cristaria cordato-rotundifolia*** Gay  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 1300-2500 m.

***Cristaria cyanea*** Phil. ex Baker f.  
Sinónimos: *Cristaria cyanea* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: TAR, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 1000-2400 m.  
Nombre vulgar: Malvilla negra.

***Cristaria dissecta*** Hook. & Arn. var. *dissecta*  
Sinónimos: *Lecanophora dissecta* (Hook. & Arn.) Speg., *Cristaria flexuosa* Phil., *Cristaria ovallea* Gay, *Cristaria univittata* Hochr., *Cristaria glandulosa* Phil. non *Cristaria* Phil. 1864 non *C. glandulosa* Phil. 1864  
Hierba. Anual o perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 100-3700 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Malvavisco, malva.

***Cristaria dissecta*** Hook. & Arn. var. *glandulosa* (Phil.) Muñoz-Schick  
Sinónimos: *Cristaria glandulosa* Phil., *Cristaria glomerulata* I.M. Johnst., *Cristaria saniculaefolia* Phil. ex Baker f., *Cristaria saniculifolia* Phil.  
Hierba. Anual o perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 300-2800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cristaria dissecta*** Hook. & Arn. var. *inconspicua* (F. Phil.) Muñoz-Schick  
Sinónimos: *Cristaria inconspicua* F. Phil.  
Hierba. Anual o perenne. Nativa.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 2700-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cristaria fuentesiana*** I.M. Johnst.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 100-800 m.

***Cristaria glaucophylla*** Cav. var. *eriantha* (Hook. & Arn.) Muñoz-Schick  
Sinónimos: *Cristaria australis* Phil., *Cristaria eriantha* Hook. & Arn., *Sida eriantha* (Hook. & Arn.) Steud.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.  
Rango altitudinal: 0-100 m.



***Cristaria glaucophylla*** Cav. var. ***glaucophylla***

Sinónimos: *Lecanophora glaucophylla* (Cav.) Speg., *Cristaria betonicaefolia* Pers., *Cristaria carrizalensis* Phil., *Cristaria glaucophylla* Cav. var. *simplex* Reiche, *Cristaria haenkeana* C. Presl, *Cristaria hirsuta* C. Presl, *Cristaria hispida* Phil., hom. illeg., *Cristaria pannosa* Phil. ex Reiche, *Cristaria trichocaula* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Cristaria gracilis*** Gay

Sinónimos: *Cristaria divaricata* Phil. ex Baker f., *Cristaria humilis* Phil., *Cristaria patens* Phil., *Cristaria ranunculifolia* Phil. ex Baker f., *Cristaria divaricata* Phil. var. *hirsuta* Phil., *Cristaria divaricata* Phil., hom. illeg., *Cristaria ranunculifolia* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1000-4200 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Malvilla.

***Cristaria insularis*** F. Phil. var. ***insularis***

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: IDE.

***Cristaria insularis*** F. Phil. var. ***johowii*** (Skotts.) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Cristaria johowii* Skotts.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: IDE.

***Cristaria integerrima*** Phil. var. ***integerrima***

Sinónimos: *Cristaria diaziana* I.M. Johnst., *Cristaria foliosa* Phil., *Cristaria grandidentata* Phil. ex Baker f., *Cristaria intonsa* I.M. Johnst., *Cristaria oxyptera* Phil., *Cristaria paposana* I.M. Johnst., *Cristaria rotundifolia* Phil., *Cristaria borchersii* Phil., *Cristaria setosa* Phil., *Cristaria larrañagae* Phil., *Cristaria grandidentata* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Cristaria integerrima*** Phil. var. ***lobulata*** (Phil.) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Cristaria lobulata* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 200-500 m.

***Cristaria leucantha*** I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Cristaria molinae*** Gay

Sinónimos: *Cristaria diversifolia* Phil. fma. *parvula* (Phil.) I.M. Johnst., *Cristaria grandiflora* Turcz., *Cristaria heterophylla* Phil., hom. illeg., *Cristaria trifida* Phil., *Cristaria parvula* Phil., *Cristaria diversifolia* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Cristaria multiflora*** Gay

Sinónimos: *Cristaria glabrata* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

***Cristaria ovata*** Muñoz-Schick

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Cristaria tenuissima*** Muñoz-Schick

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Cristaria viridiluteola*** Gay var. ***pinnata*** (Phil.) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Cristaria pinnata* Phil., *Cristaria thinophila* I.M. Johnst.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Cristaria viridiluteola*** Gay var. ***viridiluteola***

Sinónimos: *Cristaria bipinnatifida* Phil., *Cristaria viridiluteola* Gay var. *geraniifolia* (C. Presl) Reiche, *Cristaria seselifolia* Turcz., *Cristaria bipinnata* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Malvilla, malvilla salada.

**Gossypium**

***Gossypium barbadense*** L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, IPA.

## Hibiscus

### *Hibiscus trionum* L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: MAU, BIO.

## Lecanophora

### *Lecanophora subacaulis* Krapov.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## Malva

### *Malva assurgentiflora* (Kellogg) M.F. Ray

Arbusto. Introducido.  
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, JFE.

### *Malva dendromorpha* M.F. Ray

Subarbusto. Introducido.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, LLA.

### *Malva moschata* L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: LLA, AIS.

### *Malva neglecta* Wallr.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, ARA.

### *Malva nicaeensis* All.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

### *Malva parviflora* L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

### *Malva sylvestris* L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, VAL, RME, AIS.

### *Malva verticillata* L.

Arbusto. Introducido.  
Distribución: ANT.

## Malvastrum

### *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke

Subarbusto. Introducido.

Distribución: TAR, RME, IPA.

## Malvella

### *Malvella leprosa* (Ortega) Krapov.

Sinónimos: *Malva albifolia* Larrañaga, *Malva leprosa* Ortega, *Malva sulphurea* Gillies ex Hook. & Arn., *Malvastrum sulfureum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb., *Sida hederacea* (Douglas) Torr., *Sida hederacea* (Douglas) Torr. var. *sulphurea* (Gillies ex Hook. & Arn.) Baker f., *Sida leprosa* (Ortega) K. Schum., *Sida leprosa* (Ortega) K. Schum. var. *sulphurea* (Hook. & Arn.) Hochr., *Sida sulphurea* (Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray, *Disella hederacea* (Douglas ex Hook.) Greene, *Malva hederacea* Douglas ex Hook.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## Modiola

### *Modiola caroliniana* (L.) G. Don

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

## Nototriche

### *Nototriche alternata* A.W. Hill

Sinónimos: *Nototriche sajomensis* (Hieron.) A.W. Hill, *Malvastrum sajamense* Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4000-5000 m.

Países limítrofes: Perú.

### *Nototriche anthemidifolia* (J. Remy) A.W. Hill

Sinónimos: *Malvastrum anthemidifolium* (J. Remy) A. Gray, *Sida anthemidifolia* J. Remy

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3500-4800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### *Nototriche argentea* A.W. Hill

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3300-4500 m.

Países limítrofes: Perú.

### *Nototriche auricoma* (Phil.) A.W. Hill

Sinónimos: *Malvastrum auricomum* Phil., *Malvastrum*

*auricomum* Phil. ex Baker f.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4200-4700 m.

*Nototriche clandestina* (Phil.) A.W. Hill  
Sinónimos: *Malvastrum clandestinum* (Phil.) Baker f., *Sida clandestina* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3000-5100 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Altea.

*Nototriche compacta* (A. Gray) A.W. Hill  
Sinónimos: *Malvastrum compactum* A. Gray, *Malvastrum megalorrhizum* (Phil.) Baker f., *Sida compacta* Gay, hom. illeg., *Sida macrorrhiza* Phil. ex Baker f., nom. nud., *Sida megalorrhiza* Phil., *Nototriche holosericea* A.W. Hill, *Nototriche megalorrhiza* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 1900-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Mostaza.

*Nototriche diminutiva* (Phil.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Malva diminutiva* Phil., *Malvastrum diminutivum* (Phil.) Baker f.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3800-4000 m.

*Nototriche estipulata* A.W. Hill ex B.L. Burt  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3000-4700 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Oqelatalata, tanitani, psike de cordillera.

*Nototriche hillii* Krapov.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA.  
Rango altitudinal: 4000-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

*Nototriche leucosphaera* A.W. Hill  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4300-4600 m.  
Países limítrofes: Bolivia.

*Nototriche meyenii* Ulbr.  
Sinónimos: *Sida borussica* Meyen  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4000-4800 m.  
Países limítrofes: Perú.

*Nototriche nana* A.W. Hill  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3700-4600 m.

*Nototriche obcuneata* (Baker f.) A.W. Hill var. *cinerea* A.W. Hill  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4400-4900 m.  
Países limítrofes: Bolivia.

*Nototriche obcuneata* (Baker f.) A.W. Hill var. *obcuneata*  
Sinónimos: *Malvastrum obcuneatum* Baker f.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4000-4400 m.  
Países limítrofes: Perú.

*Nototriche orbignyana* (Wedd.) A.W. Hill  
Sinónimos: *Malvastrum orbignyanum* Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4400-4500 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

*Nototriche ovata* Krapov.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 3800-4100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Nototriche parviflora* (Phil.) A.W. Hill  
Sinónimos: *Malvastrum parviflorum* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4100-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Layo.

*Nototriche philippii* A.W. Hill  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3200-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Nototriche pulverulenta*** B.L. Burt & A.W. Hill

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 4200-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Nototriche pulvinata*** A.W. Hill

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4000-4900 m.  
Países limítrofes: Bolivia.

***Nototriche pusilla*** A.W. Hill

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3800-4800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Nototriche pygmaea*** (J. Remy) A.W. Hill

Sinónimos: *Malvastrum pygmaeum* (J. Remy) A. Gray,  
*Nototriche werdermannii* Ulbr., *Sida pygmaea* J. Remy  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 3500-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Nototriche rugosa*** (Phil.) A.W. Hill

Sinónimos: *Malvastrum pedicularifolium* (Meyen) A. Gray  
var. *rugosum* (Phil.) Reiche, *Malvastrum rugosum* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 1900-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Malva.

***Nototriche stipularis*** (Phil.) A.E. Martic.

Sinónimos: *Malvastrum stipulare* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3200-4400 m.  
Países limítrofes: Bolivia.

***Nototriche turritella*** A.W. Hill

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 3600-4600 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

**Palaua**

***Palaua concinna*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Sida concinna* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Palaua dissecta*** Benth.

Sinónimos: *Palaua bipinnatifida* Reiche  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 100-400 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Palaua inconspicua*** I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Palaua modesta*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Sida modesta* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 300-400 m.

**Sida**

***Sida rhombifolia*** L.

Hierba o subarbusto. Anual o perenne. Introducida.  
Distribución: COQ, IPA.

***Sida spinosa*** L.

Subarbusto. Introducido.  
Distribución: AYP, ATA.

**Sphaeralcea**

***Sphaeralcea obtusiloba*** (Hook.) G. Don

Sinónimos: *Malva obtusiloba* Hook., *Sphaeralcea gayana*  
Phil., *Sphaeralcea berteriana* Phil., *Sphaeralcea collina*  
Phil., *Sphaeralcea floribunda* Phil., *Sphaeralcea rupestris*  
Phil., *Sphaeralcea coquimbana* Phil., *Sphaeralcea vidali*  
Phil., *Sphaeralcea circinata* Phil., *Sphaeroma obtusilobum*  
(Gay) Kuntze, *Sphaeroma rupestre* (Phil.) Kuntze,  
*Sphaeroma valparadiseum* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma*  
*berteriana* (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma collinum* (Phil.)  
Kuntze, *Sphaeroma coquimbarum* (Phil.) Kuntze,  
*Sphaeroma gayanum* (Phil.) Kuntze, *Sphaeralcea arenaria*  
Phil., *Sphaeralcea valparadisea* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Nombre vulgar: Malvavisca, malva del cerro.

***Sphaeralcea purpurata*** (Lindl.) Krapov.

Sinónimos: *Malva belloa* Gay, *Malva purpurata* Lindl.,  
*Malva purpurea* Gay, *Malva tenuifolia* Hook. & Arn.,  
*Malvastrum belloum* (Gay) A. Gray, *Malvastrum*

*purpuratum* (Lindl.) G. Nicholson, *Malvastrum tenuifolium* (Hook. & Arn.) Baker f., *Malva laeta* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-300 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Malva loca.

### Tarasa

***Tarasa antofagastana*** (Phil.) Krapov.  
Sinónimos: *Malva antofagastana* Phil., *Malvastrum antofagastanum* (Phil.) Baker f., *Malveopsis antofagastana* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 1500-3600 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Tarasa congestiflora*** (I.M. Johnst.) Krapov.  
Sinónimos: *Malvastrum congestiflorum* I.M. Johnst.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2000-3800 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Tarasa humilis*** (Gillies ex Hook. & Arn.) Krapov.  
Sinónimos: *Malva humilis* Gillies ex Hook. & Arn., *Malva subacaulis* Phil., *Malvastrum humile* (Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray, *Malvastrum humile* (Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray var. *subacaule* (Phil.) Reiche, *Malvastrum subacaule* (Phil.) Baker f.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 900-3300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Tarasa martiniana*** Krapov.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 3000 m.

***Tarasa operculata*** (Cav.) Krapov.  
Sinónimos: *Malvastrum plumosum* (C. Presl) A. Gray, *Malva operculata* Cav., *Tarasa rahmeri* Phil., *Malvastrum operculatum* (Cav.) Hochr., *Malva plumosa* C. Presl, *Malvastrum plumosum* (C. Presl) A. Gray var. *atacamensis* Baker f., *Tarasa rahmeri* Phil. var. *atacamensis* (Baker f.) Bruns  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 1500-3800 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Malva, canchalagua.

***Tarasa pediculata*** Krapov.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 1800-3700 m.

***Tarasa reichei*** (Phil.) Krapov.  
Sinónimos: *Malva reichei* Phil., *Sida reichei* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Tarasa tarapacana*** (Phil.) Krapov.  
Sinónimos: *Malva tarapacana* Phil., *Malvastrum tarapacanum* (Phil.) Baker f.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Tarasa tenella*** (Cav.) Krapov.  
Sinónimos: *Malva tenella* Cav., *Malvastrum tenellum* (Cav.) Hieron.  
Hierba. Anual o bienal. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2500-3800 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Malvilla, malva.

***Tarasa umbellata*** Krapov.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, MAU.

### Thespesia

***Thespesia populnea*** (L.) Sol. ex Corrêa  
Árbol. Nativo.  
Distribución: IPA.  
Nombre vulgar: Makoi (Rapa Nui).

### Triumfetta

***Triumfetta semitriloba*** Jacq.  
Arbusto o árbol pequeño. Nativo.  
Distribución: IPA.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Hau hau (Rapa Nui).

### Urocarpidium

***Urocarpidium albiflorum*** Ulbr.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 2600 m.  
Países limítrofes: Perú.



***Urocarpidium chilensis*** (A. Braun & C.D. Bouché) Krapov.  
Sinónimos: *Fuertesimalva chilensis* (A. Braun & C.D. Bouché) Fryxell, *Malva chilensis* A. Braun & C.D. Bouché  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 400-2200 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Urocarpidium mathewsii*** (Turcz.) Krapov.  
Sinónimos: *Malva mathewsii* Turcz.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Urocarpidium peruvianum*** (L.) Krapov.  
Sinónimos: *Malva peruviana* L., *Malvastrum peruvianum* (L.) A. Gray, *Fuertesimalva peruviana* (L.) Fryxell  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.  
Rango altitudinal: 100-2300 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Urocarpidium sanambrosianum*** D.M. Bates  
Sinónimos: *Fuertesimalva sanambrosiana* (D.M. Bates) Fryxell  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: IDE.  
Rango altitudinal: 200-500 m.

## Waltheria

***Waltheria indica*** L.  
Subarbusto. Introducido.  
Distribución: AYP, IPA.

## MELIACEAE

### Melia

***Melia azedarach*** L.  
Árbol. Introducido.  
Distribución: IPA.  
Nombre vulgar: Miro tahiti (Rapa Nui).

## MISODENDRACEAE

### Misodendrum

***Misodendrum angulatum*** Phil.  
Subarbusto parásito. Nativo.  
Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

### ***Misodendrum brachystachium*** DC.

Sinónimos: *Archiphyllum brachystachium* (DC.) Tiegh., *Archiphyllum macrophyllum* (Phil.) Tiegh., *Misodendrum macrophyllum* Phil.  
Subarbusto parásito. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

### ***Misodendrum gayanum*** Tiegh.

Sinónimos: *Misodendrum imbricatum* Hook.f., non Poepp. & Endl.  
Subarbusto parásito. Nativo.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Países limítrofes: Argentina.

### ***Misodendrum linearifolium*** DC.

Sinónimos: *Angelopogon linearifolium* (DC.) Poepp. ex Tiegh., *Misodendrum microphyllum* Hook. & Arn.  
Subarbusto parásito. Nativo.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

### ***Misodendrum macrolepis*** Phil.

Subarbusto parásito. Endémico.  
Distribución: LLA, AIS.

### ***Misodendrum oblongifolium*** DC.

Sinónimos: *Archiphyllum oblongifolium* (DC.) Tiegh.  
Subarbusto parásito. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

### ***Misodendrum punctulatum*** DC.

Sinónimos: *Misodendrum imbricatum* Poepp. & Endl., *Misodendrum punctulatum* DC. var. *magellanicum* DC.  
Subarbusto parásito. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Injerto.

### ***Misodendrum quadriflorum*** DC.

Sinónimos: *Telophyllum quadriflorum* (DC.) Tiegh.  
Subarbusto parásito. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

## MOLLUGINACEAE

### Glinus

*Glinus radiatus* (Ruiz & Pav.) Rohrb.  
Sinónimos: *Mollugo radiata* Ruiz & Pav., *Mollugo araucana* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Hierba del pollo.

## MONIMIACEAE

### Laurelia

*Laurelia sempervirens* (Ruiz & Pav.) Tul.  
Sinónimos: *Pavonia sempervirens* Ruiz & Pav., *Laurelia serrata* Bertero, *Laurelia aromatica* Juss. ex Poir., *Atherosperma sempervirens* (Ruiz & Pav.) Baill., *Thiga chilensis* Molina  
Árbol. Endémico.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Nombre vulgar: Laurel.

### Laureliopsis

*Laureliopsis philippiana* (Looser) Schodde  
Sinónimos: *Laurelia philippiana* Looser  
Árbol. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Tepa, huahuán, laurela.

### Peumus

*Peumus boldus* Molina  
Sinónimos: *Ruizia fragrans* Ruiz & Pav., *Peumus fragrans* (Ruiz & Pav.) Pers., *Boldoa fragrans* (Ruiz & Pav.) Gay, *Boldea boldus* (Molina) Looser, *Boldus chilensis* Molina, *Boldu chilenum* Nees  
Árbol. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Nombre vulgar: Boldo, boldu.

## MONTIACEAE

### Calandrinia

*Calandrinia acaulis* Kunth  
Sinónimos: *Calandrinia megarhiza* Hemsl.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

*Calandrinia affinis* Gillies ex Arn.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Quiaca.

*Calandrinia caespitosa* Gillies ex Arn.  
Sinónimos: *Calandrinia diffusa* Gillies ex Arn., *Calandrinia rupestris* Barnéoud, *Calandrinia densa* Phil., nom. illeg., *Calandrinia rupestris* Barnéoud var. *skottsbergii* (Gand.) Skotts., *Calandrinia caespitosa* Gillies ex Arn. var. *skottsbergii* (Gand.) Añon, *Calandrinia densa* Reiche ex Peralta & D.I. Ford, nom. illeg., *Calandrinia gayana* Barnéoud var. *glomerata* Reiche, *Claytonia caespitosa* (Gillies ex Arn.) Kuntze, *Claytonia diffusa* (Gillies & Hook.) Kuntze, *Claytonia rupestris* (Barnéoud) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, ARA, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

*Calandrinia ciliata* (Ruiz & Pav.) DC.  
Sinónimos: *Talinum ciliatum* Ruiz & Pav., *Calandrinia caulescens* Kunth, *Calandrinia feltonii* Skotts.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, LLA.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

*Calandrinia colchaguensis* Barnéoud  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

*Calandrinia compacta* Barnéoud  
Sinónimos: *Calandrinia occulta* Phil., *Calandrinia armeriifolia* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.  
Países limítrofes: Argentina.

*Calandrinia compressa* Schrad. ex DC.  
Sinónimos: *Calandrinia gaudichaudii* Barnéoud, *Calandrinia macilenta* Barnéoud, *Calandrinia procumbens* Moris, *Calandrinia virgata* Phil., *Calandrinia tenella* Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO,  
MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Países limítrofes: Bolivia.

***Calandrinia fuegiana*** Gand.

Sinónimos: *Calandrinia caespitosa* Gillies ex Arn. var.  
*australis* Skottsbo.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

***Calandrinia graminifolia*** Phil.

Sinónimos: *Calandrinia affinis* Gillies ex Arn. var.  
*graminifolia* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Calandrinia monandra*** (Ruiz & Pav.) DC.

Sinónimos: *Talinum monandrum* Ruiz & Pav., *Monocosmia*  
*corrigioloides* Fenzl, *Corrigiola deltoides* Hook. & Arn.,  
*Monocosmia monandra* (Ruiz & Pav.) Baill.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LLA, AIS, MAG, JFE.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Calandrinia nitida*** (Ruiz & Pav.) DC.

Sinónimos: *Calandrinia multicaulis* Phil., *Calandrinia*  
*axilliflora* Barnéoud, *Talinum diffusum* Colla, *Talinum*  
*nitidum* Ruiz & Pav.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, LRI.

***Calandrinia ranunculina*** J.M. Watson, A.R. Flores &  
Elvebakk

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

***Calandrinia skottsbergii*** Gand.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, AIS.  
Países limítrofes: Argentina.

**Cistanthe**

***Cistanthe amarantoides*** (Phil.) Carolin ex Hershkovitz  
Sinónimos: *Philippiamra amarantoides* (Phil.) Kuntze,  
*Silvaea amarantoides* Phil., *Silvaea corrigioloides* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Nombre vulgar: Anojarjinchu.

***Cistanthe arancioana*** Peralta

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT.

***Cistanthe arenaria*** (Cham.) Carolin ex Hershkovitz

Sinónimos: *Calandrinia arenaria* Cham., *Calandrinia*  
*chamissoi* Barnéoud, *Calandrinia arenaria* Cham. var.  
*chamissoi* (Barnéoud) Reiche, *Calandrinia arenaria* Cham.  
var. *subverticillata* (Phil.) Reiche, *Calandrinia arenaria*  
Cham. var. *vicina* (Phil.) Reiche, *Calandrinia solisii* Phil.,  
*Calandrinia nana* Phil., *Calandrinia subverticillata* Phil.,  
*Talinum trigonum* Colla, *Calandrinia venulosa* Hook. &  
Arn., *Claytonia trigona* (Colla) Kuntze  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cistanthe cabreræ*** (Añon) Peralta

Sinónimos: *Calandrinia cabreræ* Añon  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cistanthe cachinalensis*** (Phil.) Peralta & D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia taltalensis* I.M. Johnst.,  
*Calandrinia cachinalensis* Phil.  
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.

***Cistanthe calycina*** (Phil.) Carolin ex Hershkovitz

Sinónimos: *Calandrinia calycina* Phil., *Calandrinia*  
*bochersii* Phil., nom. illeg.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.

***Cistanthe celosioides*** (Phil.) Carolin ex Hershkovitz

Sinónimos: *Philippiamra celosioides* (Phil.) Kuntze,  
*Philippiamra fastigiata* (Phil.) Pax & K. Hoffm.,  
*Philippiamra pachyphylla* (Phil.) Kuntze, *Silvaea capitata*  
Phil., *Silvaea celosioides* Phil., *Silvaea fastigiata* Phil.,  
*Silvaea pachyphylla* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Básal.

***Cistanthe cephalophora*** (I.M. Johnst.) Carolin ex  
Hershkovitz

Sinónimos: *Calandrinia cephalophora* I.M. Johnst.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.

***Cistanthe chrysantha*** (I.M. Johnst.) Peralta & D.I. Ford  
Sinónimos: *Calandrinia chrysantha* I.M. Johnst.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT.

***Cistanthe coquimbensis*** (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz  
Sinónimos: *Calandrinia coquimbensis* Barnéoud  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.

***Cistanthe cymosa*** (Phil.) Hershkovitz  
Sinónimos: *Calandrinia cymosa* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

***Cistanthe densiflora*** (Barnéoud) Hershkovitz  
Sinónimos: *Calandrinia densiflora* Barnéoud, *Calandrinia barneoudii* Phil., *Calandrinia fasciculata* Phil., *Calandrinia viridis* Phil., *Calandrinia spicata* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Pata de guanaco.

***Cistanthe fenzlii*** (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz  
Sinónimos: *Calandrinia fenzlii* Barnéoud, *Calandrinia lancifolia* Phil., *Calandrinia sanguinea* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, BIO, ARA.

***Cistanthe frigida*** (Barnéoud) Peralta  
Sinónimos: *Calandrinia frigida* Barnéoud, *Cistanthe picta* (Gillies ex Arn.) Carolin ex Hershkovitz var. *frigida* (Barnéoud) Hershkovitz, *Calandrinia picta* Gillies ex Arn. var. *frigida* (Barnéoud) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cistanthe grandiflora*** (Lindl.) Schldl.  
Sinónimos: *Cistanthe discolor* (Schr.) Spach, *Calandrinia grandiflora* Lindl., *Calandrinia speciosa* Lehm., *Cistanthe grandiflora* (Lindl.) Carolin ex Hershkovitz, comb. illeg., *Calandrinia spectabilis* Otto & Dietr., *Calandrinia discolor* Schrad., *Cistanthe speciosa* (Lehm.) Lilja, *Calandrinia glauca* Schrad.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Nombre vulgar: Doquilla, hierba del corrimiento, mármol, pata de guanaco, renilla.

***Cistanthe humilis*** (Phil.) Peralta  
Sinónimos: *Calandrinia humilis* Phil., *Calandrinia*

*oblongifolia* Barnéoud var. *humilis* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cistanthe lamprosperma*** (I.M. Johnst.) Peralta & D.I. Ford  
Sinónimos: *Calandrinia lamprosperma* I.M. Johnst.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT.

***Cistanthe laxiflora*** (Phil.) Peralta & D.I. Ford  
Sinónimos: *Calandrinia aegilitis* F. Phil., *Calandrinia laxiflora* Phil.  
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.

***Cistanthe longiscapa*** (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz  
Sinónimos: *Calandrinia litoralis* Phil., *Calandrinia longiscapa* Barnéoud  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.

***Cistanthe minuscula*** (Añon) Peralta  
Sinónimos: *Calandrinia minuscula* Añon  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cistanthe picta*** (Gillies ex Arn.) Carolin ex Hershkovitz  
Sinónimos: *Calandrinia picta* Gillies ex Arn., *Calandrinia picta* Gillies ex Arn. var. *portulacifolia* (Phil.) Hicken, *Calandrinia portulacifolia* Phil., *Calandrinia villanuevae* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cistanthe salsoloides*** (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz  
Sinónimos: *Calandrinia salsoloides* Barnéoud, *Calandrinia calocephala* Phil., *Calandrinia spicigera* Phil., *Calandrinia acuminata* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Congonilla, kámin.

***Cistanthe stricta*** (Phil.) Peralta  
Sinónimos: *Calandrinia stricta* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA.  
Países limítrofes: Argentina.

***Cistanthe thyrsoides*** (Reiche) Peralta & D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia thyrsoides* Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ.

**Lenzia**

***Lenzia chamaepitys*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Países limítrofes: Argentina.

**Montia**

***Montia fontana*** L.

Sinónimos: *Montia linearifolia* d'Urv., *Calandrinia pusilla* Barnéoud, *Monocosmia verrucosa* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**Montiopsis**

***Montiopsis andicola*** (Gillies) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia andicola* Gillies, *Calandrinia denticulata* Gillies, *Calandrinia denticulata* Gillies var. *andicola* (Gillies) Reiche, *Calandrinia denticulata* Gillies var. *echinata* Barnéoud, *Calandrinia oligantha* Phil., *Calandrinia saxifraga* Barnéoud, *Calandrinia saxifraga* Barnéoud var. *oligantha* (Phil.) Reiche, *Calandrinia tricolor* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Países limítrofes: Argentina.

***Montiopsis berteroa*** (Phil.) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia berteroa* Phil., *Calandrinia floribunda* Phil., *Calandrinia rosea* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

***Montiopsis capitata*** (Hook. & Arn.) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia capitata* Hook. & Arn., *Calandrinia capituligera* Phil., *Calandrinia erithrichioides* Phil., *Calandrinia erythrocoma* Phil., *Calandrinia petiolata* Phil., *Calandrinia prostrata* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, AIS.

Países limítrofes: Argentina.

***Montiopsis cystiflora*** (Gillies ex Arn.) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia dianthoides* Phil., *Calandrinia splendens* Barnéoud, *Calandrinia splendens* Barnéoud var. *dianthoides* (Phil.) Reiche, *Calandrinia cystiflora* Gillies ex Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

***Montiopsis copiapina*** (Phil.) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia copiapina* Phil., *Calandrinia polia* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Países limítrofes: Argentina.

***Montiopsis cumingii*** (Hook. & Arn.) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia cumingii* Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, MAU.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Montiopsis demissa*** (Phil.) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia demissa* Phil., *Calandrinia depressa* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME.

***Montiopsis gayana*** (Barnéoud) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia gayana* Barnéoud, *Calandrinia tenuifolia* Phil., *Calandrinia rahmeri* Phil., *Calandrinia vidali* Phil., *Calandrinia glandulifera* Phil., *Calandrinia conferta* Gillies ex Arn., *Calandrinia hirtella* Phil., *Calandrinia calycotricha* Phil., *Calandrinia gayana* Barnéoud var. *hirtella* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Países limítrofes: Argentina.

***Montiopsis gilliesii*** (Hook. & Arn.) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia gilliesii* Hook. & Arn., *Calandrinia canescens* Phil., *Calandrinia sessiliflora* Phil., *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *sessiliflora* (Phil.) Hauman, *Calandrinia setosa* Phil. var. *longifolia* Phil., *Calandrinia leucotricha* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Países limítrofes: Argentina.

***Montiopsis glomerata*** (Phil.) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia glomerata* Phil., *Calandrinia callithrix* Phil., *Calandrinia leucocephala* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.



Distribución: ATA, COQ.  
Países limítrofes: Argentina.

**Montiopsis modesta** (Phil.) D.I. Ford  
Sinónimos: *Calandrinia modesta* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Países limítrofes: Argentina.

**Montiopsis parviflora** (Phil.) D.I. Ford  
Sinónimos: *Calandrinia bandurriae* Phil., *Calandrinia parviflora* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: AYP, ATA, COQ.

**Montiopsis polycarpoides** (Phil.) Peralta  
Sinónimos: *Calandrinia polycarpoides* Phil.,  
*Calandrinopsis polycarpoides* (Phil.) R. Franz  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, VAL.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

**Montiopsis potentilloides** (Barnéoud) D.I. Ford  
Sinónimos: *Calandrinia potentilloides* Barnéoud,  
*Calandrinia uspallatensis* Phil., *Montiopsis uspallatensis*  
(Phil.) D.I. Ford, *Calandrinia nivalis* Phil., *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *uspallatensis* (Phil.) Reiche,  
*Calandrinia setosa* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Países limítrofes: Argentina.

**Montiopsis ramosissima** (Hook. & Arn.) D.I. Ford  
Sinónimos: *Calandrinia landbeckii* Phil., *Calandrinia poeppigiana* Walp., *Calandrinia ramosissima* Hook. & Arn.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

**Montiopsis sericea** (Hook. & Arn.) D.I. Ford  
Sinónimos: *Calandrinia argentea* Phil., *Calandrinia ferruginea* Barnéoud, *Calandrinia potentilloides* Barnéoud var. *minor* Barnéoud, *Calandrinia sericea* Hook. & Arn., *Calandrinopsis sericea* (Hook. & Arn.) R. Franz, *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *longipes* Hook. & Arn.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB.  
Nombre vulgar: Hierba del chancho.

**Montiopsis trifida** (Hook. & Arn.) D.I. Ford  
Sinónimos: *Calandrinia aurea* Barnéoud, *Calandrinia capitata* Hook. & Arn. var. *prolifera* (Phil.) Reiche, *Calandrinia involucrata* Phil., *Calandrinia leucopogon* Phil., *Calandrinia montana* Phil., *Calandrinia prolifera*

Phil., *Calandrinia trifida* Hook. & Arn., *Calandrinopsis montana* (Phil.) R. Franz  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

**Montiopsis umbellata** (Ruiz & Pav.) D.I. Ford  
Sinónimos: *Talinum umbellatum* Ruiz & Pav., *Calandrinia umbellata* (Ruiz & Pav.) DC., *Calandrinia hispida* Phil., *Calandrinia phalacra* Phil., *Calandrinia sanfurgi* Phil., *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *phalacra* (Phil.) Reiche, *Calandrinopsis umbellata* (Ruiz & Pav.) R. Franz, *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *aequipes* Hook. & Arn.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Flor de la mistela.

## MORACEAE

### Broussonetia

**Broussonetia papyrifera** (L.) L'Hér. ex Vent.  
Arbusto o árbol pequeño. Introducido.  
Distribución: IPA.  
Nombre vulgar: Mahute (Rapa Nui) (Rapa Nui).

## MYRICACEAE

### Morella

**Morella pavonis** (C. DC.) Parra-O  
Sinónimos: *Myrica pavonis* C. DC.  
Arbusto o árbol pequeño. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Países limítrofes: Perú.

## MYRTACEAE

### Amomyrtus

**Amomyrtus luma** (Molina) D. Legrand & Kausel  
Sinónimos: *Eugenia darwinii* Hook.f., *Myrtus luma* Molina, *Myrtus multiflora* Juss. ex J. St.-Hil., *Myrtus darwinii* (Hook.f.) Barnéoud, *Myrcia lechleriana* Miq., *Myrtus valdiviana* Phil., *Pseudocaryophyllus darwinii* (Hook.f.) Burret  
Árbol. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-800 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Luma.

***Amomyrtus meli*** (Phil.) D. Legrand & Kausel  
Sinónimos: *Myrtus meli* Phil., *Pseudocaryophyllus meli* (Phil.) Burret  
Árbol. Endémico.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-600 m.  
Nombre vulgar: Meli.

### **Blepharocalyx**

***Blepharocalyx cruckshanksii*** (Hook. & Arn.) Nied.  
Sinónimos: *Eugenia cruckshanksii* Hook. & Arn., *Eugenia divaricatum* O. Berg, *Luma cruckshanksii* (Hook. & Arn.) A. Gray, *Eugenia divaricatum* O. Berg var. *obovata* O. Berg, *Eugenia divaricatum* O. Berg var. *ovalis* O. Berg, *Eugenia divaricatum* O. Berg var. *pauciflora* O. Berg, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied., *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *obovatus* (O. Berg) Reiche, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *ovalis* (O. Berg) Reiche, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *pauciflorus* (O. Berg) Reiche, *Temu divaricatum* (O. Berg) O. Berg  
Árbol. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Nombre vulgar: Temu, palo colorado.

### **Eucalyptus**

***Eucalyptus camaldulensis*** Dehnh.  
Árbol. Introducido.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

***Eucalyptus globulus*** Labill.  
Árbol. Introducido.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA.

### **Legrandia**

***Legrandia concinna*** (Phil.) Kausel  
Sinónimos: *Eugenia concinna* Phil.  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Nombre vulgar: Luma.

### **Luma**

***Luma apiculata*** (DC.) Burret  
Sinónimos: *Eugenia apiculata* DC., *Eugenia proba* O. Berg, *Myrceugenella apiculata* (DC.) Kausel, *Myrceugenia apiculata* (DC.) Nied., *Eugenia gilliesi* Hook. & Arn., *Eugenia affinis* Gillies ex Hook. & Arn., *Eugenia hookeri* Steud., *Eugenia apiculata* DC. var. *arnyan* Hook.f., *Eugenia barneoudii* O. Berg, *Eugenia spectabilis* Phil., *Eugenia modesta* Phil., *Eugenia mucronata* Phil., *Eugenia palenae* Phil., *Eugenia cuspidata* Phil., *Eugenia ebracteata* F. Phil., *Myrtus chequenilla* Kuntze, *Luma gilliesi* (Hook. & Arn.) Burret, *Luma spectabilis* (Phil.) Burret, *Luma hookeri* (Steud.) Burret, *Myrceugenella apiculata* (DC.) Kausel var. *australis* Kausel, *Myrceugenella grandjotii* Kausel, *Myrceugenella apiculata* (DC.) Kausel var. *spectabilis* (Phil.) Kausel  
Árbol. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Arrayán, palo colorado.

***Luma chequen*** (Molina) A. Gray  
Sinónimos: *Eugenia chequen* Molina, *Myrtus chequen* (Molina) Spreng., *Eugenia gayana* Barnéoud, *Myrtus uliginosa* Miq., *Myrtus uliginosa* Miq. fma. *major* Miq., *Myrtus gayana* (Barnéoud) O. Berg, *Eugenia bella* Phil., *Eugenia pulchra* O. Berg, *Eugenia myrtomimeta* Diels, *Luma gayana* (Barnéoud) Burret, *Myrceugenella chequen* (Molina) Kausel, *Myrceugenella gayana* (Barnéoud) Kausel, *Myrceugenella langerfeldtii* Kausel, *Myrceugenella chequen* (Molina) Kausel var. *myrtomimeta* (Diels) Kausel  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1100 m.  
Nombre vulgar: Chequén, arrayán blanco.

### **Myrceugenia**

***Myrceugenia chrysocarpa*** (O. Berg) Kausel  
Sinónimos: *Luma chrysocarpa* (O. Berg) Burret, *Eugenia chrysocarpa* O. Berg, *Eugenia philippii* O. Berg, *Eugenia buxifolia* Phil., *Eugenia patagonica* Phil., *Eugenia petiolata* Phil., *Myrceugenia buxifolia* (Phil.) Reiche, *Luma philippii* (O. Berg) Burret  
Arbusto o árbol pequeño. Nativo.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 500-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Luma blanca, pitrilla.

***Myrceugenia colchaguensis*** (Phil.) L.E. Navas  
Sinónimos: *Eugenia colchaguensis* Phil., *Myrceugenia malvillana* Kausel  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-400 m.

***Myrceugenia correifolia*** (Hook. & Arn.) O. Berg  
Sinónimos: *Eugenia correifolia* Hook. & Arn., *Eugenia maritima* Barnéoud, *Luma correifolia* (Hook. & Arn.) A. Gray, *Eugenia thalassaia* O. Berg, *Myrceugenia johowi* Gusinde, *Myrceugenia thalassaia* (O. Berg) Gusinde ex Fuentes, *Myrceugenia maritima* (Barnéoud) Kausel  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-700 m.  
Nombre vulgar: Petrillo, petrilla.

***Myrceugenia exsucca*** (DC.) O. Berg  
Sinónimos: *Luma exsucca* (DC.) Burret, *Eugenia exsucca* DC., *Myrceugenia multiflora* (Hook. & Arn.) Kausel, *Eugenia temu* Hook. & Arn., *Luma temu* (Hook. & Arn.) Gray, *Myrceugenia lechleriana* O. Berg, *Myrceugenia camphorata* O. Berg, *Eugenia exsucca* DC. var. *patagua* O. Berg, *Eugenia pitra* O. Berg, *Eugenia exsucca* DC. var. *temu* (Hook. & Arn.) O. Berg, *Eugenia exsucca* DC. var. *apiculata* O. Berg, *Eugenia corralensis* Phil., *Luma pitra* (O. Berg) Burret, *Luma corralensis* (Phil.) Burret  
Árbol. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Pitra, petra, patagua.

***Myrceugenia lanceolata*** (Juss. ex J. St.-Hil.) Kausel  
Sinónimos: *Myrtus lanceolata* Juss. ex J. St.-Hil., *Eugenia dombeyana* DC., *Myrtus gudilla* Colla, *Eugenia stenophylla* Hook. & Arn., *Eugenia gudilla* (Colla) Barnéoud, *Luma stenophylla* (Hook. & Arn.) Gray, *Eugenia stenophylla* Hook. & Arn. var. *latifolia* Hook. ex O. Berg, *Myrceugenia stenophylla* (Hook. & Arn.) O. Berg, *Luma dombeyana* (DC.) Burret  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 200-800 m.  
Nombre vulgar: Arrayancillo, ñipa.

***Myrceugenia leptospermoides*** (DC.) Kausel  
Sinónimos: *Eugenia leptospermoides* DC., *Eugenia leptospermoides* DC. var. *microphylla* O. Berg, *Eugenia leptospermoides* DC. var. *latifolia* O. Berg, *Eugenia leptospermoides* DC. var. *longifolia* O. Berg, *Eugenia thymifolia* Phil. ex Reiche

Arbusto. Endémico.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-400 m.  
Nombre vulgar: Macella, petrillo.

***Myrceugenia obtusa*** (DC.) O. Berg  
Sinónimos: *Eugenia obtusa* DC., *Myrtus raran* Colla, *Eugenia raran* (Colla) Barnéoud, *Luma obtusa* (DC.) A. Gray, *Myrceugenia chilensis* O. Berg, *Eugenia polyantha* Phil., *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *raran* (Colla) O. Berg, *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *berteroana* O. Berg, *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *polyantha* (Phil.) O. Berg  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1400 m.  
Nombre vulgar: Rarán.

***Myrceugenia ovata*** (Hook. & Arn.) O. Berg var. ***nannophylla*** (Burret) Landrum  
Sinónimos: *Myrceugenia montana* Kausel, *Myrceugenia nannophylla* (Burret) Kausel, *Luma nannophylla* Burret, *Myrceugenia valientei* Kausel  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 500-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Myrceugenia ovata*** (Hook. & Arn.) O. Berg var. ***ovata***  
Sinónimos: *Eugenia ovata* Hook. & Arn., *Eugenia cumingii* Hook. & Arn., *Eugenia trichocarpa* Phil., *Luma ovata* (Hook. & Arn.) Burret, *Luma cumingii* (Hook. & Arn.) Burret  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-100 m.  
Nombre vulgar: Huillipeta.

***Myrceugenia parvifolia*** (DC.) Kausel  
Sinónimos: *Eugenia parvifolia* DC., *Luma baeckeoides* Griseb.  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Nombre vulgar: Chequén, chilquilco.

***Myrceugenia pinifolia*** (F. Phil.) Kausel  
Sinónimos: *Eugenia pinifolia* F. Phil., *Myrceugenia stenophylla* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *pinifolia* (F. Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Myrceugenia planipes*** (Hook. & Arn.) O. Berg  
Sinónimos: *Myrceugenia distoma* (O. Berg) Kausel, *Eugenia planipes* Hook. & Arn., *Myrcia planipes* (Hook. & Arn.) Kiaersk., *Eugenia planipes* Hook. & Arn. var. *genuina* O. Berg, nom. illeg., *Eugenia planipes* Hook. & Arn. var. *grandifolia* O. Berg, *Eugenia distoma* O. Berg  
Árbol. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pitra.

***Myrceugenia rufa*** (Colla) Skotts. ex Kausel  
Sinónimos: *Myrtus rufa* Colla, *Eugenia ferruginea* Hook. & Arn., *Eugenia rufa* (Colla) Barnéoud, *Luma ferruginea* (Hook. & Arn.) A. Gray, *Myrceugenia ferruginea* (Hook. & Arn.) Reiche, *Luma rufa* (Colla) Burret

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Myrceugenia schulzei*** Johow  
Sinónimos: *Luma schulzei* (Johow) Burret

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 400 m.

Nombre vulgar: Luma de Más Afuera.

### Myrcianthes

***Myrcianthes coquimbensis*** (Barnéoud) Landrum & Grifo  
Sinónimos: *Reichea coquimbensis* (Barnéoud) Kausel, *Myrtus coquimbensis* Barnéoud, *Aspidogenia coquimbensis* (Barnéoud) Burret

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nombre vulgar: Lucumillo, lucumilla.

### Myrteola

***Myrteola nummularia*** (Poir.) O. Berg  
Sinónimos: *Eugenia humifusa* Phil., *Myrteola barneoudii* (O. Berg) O. Berg var. *humifusa* (Phil.) Reiche, *Myrteola bullata* O. Berg, *Myrteola humifusa* (Phil.) O. Berg, *Myrteola leucomyrtillus* (Griseb.) Reiche, *Myrteola nummularia* (Poir.) O. Berg var. *barneoudii* (O. Berg) Kausel, *Myrteola nummularia* (Poir.) O. Berg var. *repens* (Phil.) Reiche, *Myrteola repens* (Phil.) O. Berg, *Myrtus barneoudii* O. Berg, *Myrtus leucomyrtillus* Griseb., *Myrtus nummularia* Poir., *Myrtus nummularia* Poir. var. *major* Hook.f., *Myrtus repens* Phil., *Myrteola barneoudii* (O. Berg) O. Berg, *Myrteola bullata* O. Berg var. *pentamera* O. Berg, *Myrteola bullata* O. Berg var. *tetramera* O. Berg, *Eugenia humilis* Phil.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 100-1500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Daudapo, huarapo, naurapo.

### Nothomyrcia

***Nothomyrcia fernandeziana*** (Hook. & Arn.) Kausel  
Sinónimos: *Myrceugenia fernandeziana* (Hook. & Arn.) Johow, *Myrtus fernandeziana* Hook. & Arn., *Eugenia lumilla* Phil., *Eugenia fernandeziana* (Hook. & Arn.) Barnéoud, *Myrceugenia luma* O. Berg, *Luma fernandeziana* (Hook. & Arn.) Burret

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Nombre vulgar: Luma de Juan Fernández, lumilla.

### Psidium

***Psidium guajava*** L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Guayaba, tuaba (Rapa Nui).

### Syzygium

***Syzygium jambos*** (L.) Alston

Árbol. Introducido.

Distribución: IPA.

### Tepualia

***Tepualia stipularis*** (Hook. & Arn.) Griseb.

Sinónimos: *Metrosideros stipularis* (Hook. & Arn.) Hook.f., *Myrtus stipularis* Hook. & Arn., *Tepualia patagonica* Phil., *Tepualia philippiana* Griseb., *Tepualia stipularis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *patagonica* (Phil.) Reiche, *Tepualia stipularis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *philippiana* (Griseb.) Speg.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Tepu, tepú.

### Ugni

***Ugni candollei*** (Barnéoud) O. Berg

Sinónimos: *Myrtus candollei* Barnéoud, *Myrtus krausei* Phil., *Ugni krausei* (Phil.) O. Berg, *Ugni candollei* (Barnéoud) O. Berg fma. *litoralis* Kausel, *Ugni candollei* (Barnéoud) O. Berg fma. *monticola* Kausel



Arbusto. Endémico.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 100-800 m.  
Nombre vulgar: Murta, murta blanca, tautau, chauchau, trautrau.

***Ugni molinae*** Turcz.

Sinónimos: *Eugenia ugni* (Molina) Hook. & Arn., *Myrtus ugni* Molina, *Ugni myrtus* Macloskie, *Ugni ugni* (Molina) Macloskie, nom. illeg., *Ugni poeppigii* O. Berg, *Myrtus molinae* Barnéoud, *Ugni philippii* O. Berg

Arbusto. Nativo.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.  
Rango altitudinal: 700-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Murtilla, murta, murtillo, uñi.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Ugni selkirkii*** (Hook. & Arn.) O. Berg

Sinónimos: *Eugenia selkirkii* Hook. & Arn., *Myrtus berteroi* Phil., *Ugni berteroi* (Phil.) F. Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 400-800 m.  
Nombre vulgar: Murtillo.

## NOTHOFAGACEAE

### **Nothofagus**

***Nothofagus alessandrii*** Espinosa

Sinónimos: *Fuscospora alessandrii* (Espinosa) Heenan & Smissen  
Árbol. Endémico.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 100-500 m.  
Nombre vulgar: Ruil.

***Nothofagus alpina*** (Poepp. & Endl.) Oerst.

Sinónimos: *Nothofagus nervosa* (Phil.) Dimitri & Milano, comb. illeg., *Fagus alpina* Poepp. & Endl., *Fagus nervosa* Phil., *Nothofagus procera* (Poepp. & Endl.) Oerst., comb. illeg., *Nothofagus nervosa* (Phil.) Krasser, *Lophozonia alpina* (Poepp. & Endl.) Heenan & Smissen  
Árbol. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 200-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Raulí.

***Nothofagus antarctica*** (G. Forst.) Oerst.

Sinónimos: *Fagus antarctica* G. Forst., *Fagus antarctica* G.

Forst. var. *sublobata* A. DC., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *uliginosa* A. DC., *Calucechinus antactica* Hombr. & Jacq., *Calucechinus montagni* Hombr. & Jacq., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *microphylla* Phil., *Nothofagus montagnei* (Hombr. & Jacq.) Krasser  
Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Ñirre, ñire.

***Nothofagus betuloides*** (Mirb.) Oerst.

Sinónimos: *Fagus betuloides* Mirb., *Nothofagus patagonica* Gand., *Betula antarctica* G. Forst., nom. nud., *Betula antarctica* G. Forst. ex Willd., *Fagus dubia* Mirb., *Fagus forsteri* Hook., *Calusparassus forsteri* Hombr. & Jacq., *Calusparassus betuloides* Hombr. & Jacq.  
Árbol. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Coigüe de Magallanes, guindo.

***Nothofagus dombeyi*** (Mirb.) Oerst.

Sinónimos: *Fagus dombeyi* Mirb., *Fagus dombeyi* Mirb. var. *microphylla* Phil.  
Árbol. Nativo.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Coigüe, coihue.

***Nothofagus glauca*** (Phil.) Krasser

Sinónimos: *Fagus glauca* Phil., *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. var. *glauca* (Phil.) Reiche, *Nothofagus megalocarpa* Reiche, *Lophozonia glauca* (Phil.) Heenan & Smissen  
Árbol. Endémico.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 100-1500 m.  
Nombre vulgar: Roble maulino, hualo, roble colorado.

***Nothofagus macrocarpa*** (A. DC.) F.M. Vázquez & R.A. Rodr.

Sinónimos: *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. var. *macrocarpa* (A. DC.) Reiche, *Fagus obliqua* Mirb. var. *macrocarpa* A. DC., *Lophozonia macrocarpa* (A. DC.) Heenan & Smissen  
Árbol. Endémico.  
Distribución: VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 800-2200 m.  
Nombre vulgar: Roble, roble blanco, roble de Santiago.



***Nothofagus nitida*** (Phil.) Krasser

Sinónimos: *Fagus nitida* Phil.

Árbol. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coigüe de Chiloé, roble de Chiloé.

***Nothofagus obliqua*** (Mirb.) Oerst.

Sinónimos: *Fagus obliqua* Mirb., *Lophozonia heterocarpa*

Turcz., *Fagus obliqua* Mirb. var. *macranthera* A. DC., *Fagus*

*obliqua* Mirb. var. *dentatosquamata* Kuntze, *Nothofagus*

*leoni* Espinosa, *Fagus obliqua* (Mirb.) Oerst. var. *valdiviana*

(Phil.) A. DC., *Fagus valdiviana* Phil., *Fagus obliqua* Mirb.

var. *integrissquamata* Kuntze, *Nothofagus obliqua* (Mirb.)

Oerst. subsp. *valdiviana* (Phil.) F.M. Vázquez & R.A.

Rodr., *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. subsp. *andina*

F.M. Vázquez & R.A. Rodr., *Lophozonia obliqua* (Mirb.)

Heenan & Smissen, *Lophozonia obliqua* (Mirb.) Heenan &

Smissen subsp. *andina* (F.M. Vázquez & R. Rodr.) Heenan

& Smissen, *Lophozonia obliqua* (Mirb.) Heenan & Smissen

subsp. *valdiviana* (Phil.) Heenan & Smissen

Árbol. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hualle, roble, coyán, roble-pellín.

***Nothofagus pumilio*** (Poepp. & Endl.) Krasser

Sinónimos: *Fagus antarctica* G. Forst. var. *bicrenata* A.

DC., *Fagus pumilio* Poepp. & Endl., *Calusparassus pumilio*

Hombr. & Jacq., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *pumilio*

(Poepp. & Endl.) Kuntze

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lengua.

## NYCTAGINACEAE

### **Allionia**

***Allionia incarnata*** L.

Sinónimos: *Allionia puberula* Phil., *Wedeliella incarnata*

(L.) Cockerell, *Wedelia incarnata* (L.) Kuntze, *Allionia*

*bandurriae* Phil., *Allionia jarae* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### **Boerhavia**

***Boerhavia diffusa*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, IPA.

### **Mirabilis**

***Mirabilis acuta*** (Reiche) Heimerl

Sinónimos: *Oxybaphus ovatus* (Ruiz & Pav.) Vahl var. *acutus* Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 500-2900 m.

Nombre vulgar: Tapahua.

***Mirabilis cordifolia*** (Kunze ex Choisy) Heimerl

Sinónimos: *Oxybaphus cordifolius* Kunze ex Choisy, *Allione*

*cordifolia* (Kunze ex Choisy) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Perú.

***Mirabilis elegans*** (Choisy) Heimerl

Sinónimos: *Oxybaphus elegans* Choisy, *Allionia elegans*

(Choisy) Kuntze, *Oxybaphus dichotomus* Phil., *Oxybaphus*

*san-romani* Phil., *Mirabilis elegans* (Choisy) Heimerl var.

*dichotoma* (Phil.) Heimerl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Perú.

***Mirabilis expansa*** (Ruiz & Pav.) Standl.

Sinónimos: *Calyxhymenia expansa* Ruiz & Pav., *Allionia*

*expansa* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Oxybaphus expansa* (Ruiz

& Pav.) Vahl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, VAL.

Rango altitudinal: 100-3600 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Mirabilis jalapa*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, BIO, JFE, IPA.

***Mirabilis ovata*** (Ruiz & Pav.) F. Meigen

Sinónimos: *Oxybaphus campestris* Griseb., *Allionia ovata*

(Ruiz & Pav.) Standl., *Calyxhymenia ovata* Ruiz & Pav.,

*Mirabilis campestris* (Griseb.) I.M. Johnst., *Oxybaphus*

*ovatus* (Ruiz & Pav.) Vahl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-3200 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Mirabilis prostrata*** (Ruiz & Pav.) Heimerl  
Sinónimos: *Oxybaphus micranthus* Choisy, *Oxybaphus prostratus* (Ruiz & Pav.) Vahl, *Allionia micrantha* (Choisy) Molfino, *Calyxhymenia prostrata* Ruiz & Pav., *Allionia excelsa* (Willd.) Kuntze, *Allionia prostrata* (Ruiz & Pav.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-1400 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Mirabilis trollii*** Heimerl  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 2200 m.

## NYMPHAEACEAE

### Nymphaea

***Nymphaea alba*** L.  
Hierba acuática. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

## OLEACEAE

### Fraxinus

***Fraxinus excelsior*** L.  
Árbol. Introducido.  
Distribución: BIO.

### Ligustrum

***Ligustrum ovalifolium*** Hassk.  
Arbusto o árbol pequeño. Introducido.  
Distribución: JFE.  
Nombre vulgar: Ligustrina.

### Menodora

***Menodora linoides*** Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 1200-1800 m.  
Nombre vulgar: Linacillo.

## ONAGRACEAE

### Camissonia

***Camissonia dentata*** (Cav.) Reiche subsp. *dentata*  
Sinónimos: *Oenothera dentata* Cav., *Oenothera contorta* Douglas var. *divaricata* (Gay) Munz, *Chamissonia tenuifolia* (Spach) Reiche, *Camissonia flava* Link, *Oenothera chamissonis* Link, *Holostigma argutum* Spach, *Holostigma heterophyllum* Spach, *Sphaerostigma chamissonis* (Link) Fisch. & C.A. Mey., *Oenothera minutiflora* D. Dietr., *Sphaerostigma dentatum* (Cav.) Gay, *Sphaerostigma divaricatum* Gay, *Sphaerostigma ramosissimum* Phil., *Chamissonia acuminata* (Phil.) Reiche, *Chamissonia paradoxa* (Spach) Reiche var. *divaricata* (Gay) Reiche, *Oenothera torulosa* H. Lév. fma. *chilensis* (D. Dietr.) H. Lév., *Oenothera micrantha* Spreng. var. *acuminata* (Phil.) Munz, *Sphaerostigma heterophylla* (Spach) Gay  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Camissonia dentata*** (Cav.) Reiche subsp. *littoralis* P.H. Raven & D.M. Moore  
Sinónimos: *Sphaerostigma acuminatum* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

### Clarkia

***Clarkia tenella*** (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. *ambigua* (Phil.) D.M. Moore & F.H. Lewis ex Martic.  
Sinónimos: *Clarkia tenella* (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. *ambigua* (Phil.) D.M. Moore & F.H. Lewis, comb. illeg., *Godetia ambigua* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: NUB, BIO, ARA.

***Clarkia tenella*** (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. *araucana* D.M. Moore & F.H. Lewis  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Clarkia tenella*** (Cav.) H.F. Lewis & M.R. Lewis subsp. *tenella*  
Sinónimos: *Oenothera tenella* Cav., *Godetia cavanillesii* Spach, *Godetia tenella* (Cav.) Steud., *Oenothera auricula* H. Lév. var. *tenella* (Cav.) H. Lév., *Godetia dasycarpa* Phil., *Godetia tenella* (Cav.) Steud. var. *dasycarpa* (Phil.) Munz, *Oenothera quadrivulnera* Douglas var. *dasycarpa*

(Cav.) Thell. ex Probst, *Godetia quadrivulnera* (Douglas) Spach var. *tenella* Jeps., *Oenothera prismatica* H. Lévl. var. *dasycarpa* H. Lévl.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Clarkia tenella*** (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. ***tenuifolia*** (Cav.) D.M. Moore & F.H. Lewis

Sinónimos: *Oenothera tenuifolia* Cav., *Godetia tenuifolia* (Cav.) Spach, *Oenothera tenella* Cav. var. *tenuifolia* (Cav.) Lindl., *Godetia gayana* Spach, *Oenothera gayana* (Spach) Steud., *Oenothera prismatica* H. Lévl. var. *tenuifolia* (Cav.) H. Lévl.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nombre vulgar: Inuil, sangre de toro, sangre de buey, huasita.

## **Epilobium**

***Epilobium australe*** Poepp. & Hausskn. ex Hausskn.

Sinónimos: *Epilobium lechleri* Phil. & Hausskn. ex Hausskn., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *andinum* (Phil.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *lechleri* (Phil. & Hausskn. ex Hausskn.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *interruptum* (Sam.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *pumilum* Sam., *Epilobium interruptum* Sam., *Epilobium deflexum* Sam., *Epilobium tetragonum* L. var. *antarcticum* Hook.f., *Epilobium antarcticum* (Hook.f.) Kuntze, *Epilobium transandinum* Sam.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Epilobium barbeyanum*** H. Lévl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Epilobium brachycarpum*** C. Presl

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO.

***Epilobium campestre*** (Jeps.) Hoch & W.L. Wagner

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1700-1900 m.

***Epilobium ciliatum*** Raf.

Sinónimos: *Epilobium hookerianum* Hausskn. ex Skottsbl., *Epilobium valdivense* Hausskn. var. *alboffii* Macloskie, *Epilobium tetragonum* auct. non L., *Epilobium valdiviense* Hausskn., *Epilobium magellanicum* Phil. & Hausskn. ex Hausskn., *Epilobium longipes* Sam., *Epilobium chilense* Hausskn., *Epilobium constrictum* Sam., *Epilobium cunninghami* Hausskn., *Epilobium pedicellare* J. Presl var. *latifolium* Walp., *Epilobium aconcaguinum* Phil., *Epilobium albiflorum* Phil., *Epilobium chilense* Hausskn. var. *latifolium* Sam., *Epilobium chilense* Hausskn. var. *macrum* Sam., *Epilobium leiophyton* Sam.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Epilobium conjugens*** Skottsbl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Epilobium densifolium*** Hausskn.

Sinónimos: *Epilobium nivale* Meyen var. *lignosum* (F. Phil.) Hosseus, *Epilobium lignosum* F. Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 500-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Epilobium denticulatum*** Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Epilobium andicolum* Hausskn., *Epilobium caesium* Hausskn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, BIO.

Rango altitudinal: 1500-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Tuari.

***Epilobium fragile*** Sam.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3300-4200 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Epilobium glaucum*** Phil.

Sinónimos: *Epilobium glaucum* Phil. var. *stenophyllum* Macloskie & Dusén, *Epilobium patagonicum* Rendle, *Epilobium nubigenum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Epilobium nivale*** Meyen

Sinónimos: *Epilobium andinum* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA.  
Rango altitudinal: 300-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Epilobium obscurum*** Schreb.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: RME, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

***Epilobium puberulum*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Epilobium pedunculatum* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Epilobium subdentatum*** (Meyen) Lievens & Hoch

Sinónimos: *Boisduvalia subulata* (Ruiz & Pav.) Raim.,  
*Boisduvalia volckmannii* Phil., *Oenothera gauroides*  
Kuntze, *Boisduvalia tocornalii* Gay, *Nierembergia*  
*subdentata* Meyen, *Oenothera uniflora* Gillies ex Hook.  
& Arn., nom. nud., *Boisduvalia concinna* (D. Don) Spach,  
*Oenothera subulata* Ruiz & Pav., *Oenothera concinna* D.  
Don, *Epilobium concinnum* (D. Don) Hoch & P.H. Raven  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,  
ARA.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Epilobium tetragonum*** L. subsp. *lamyi* (F.W. Schultz)

Nyman  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: RME, MAU, BIO, ARA, LLA.

**Fuchsia**

***Fuchsia lycioides*** Andrews

Sinónimos: *Fuchsia rosea* Ruiz & Pav.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Nombre vulgar: Palo falso, palo de yegua, coralito, palo  
blanco.

***Fuchsia magellanica*** Lam.

Sinónimos: *Fuchsia magellanica* Lam. var. *macrostema*  
(Ruiz & Pav.) Munz, *Fuchsia araucana* F. Phil., *Fuchsia*  
*coccinea* Dryand. var. *robustior* Hook.f., *Fuchsia gracilis*  
Lindl. var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Lindl., *Fuchsia*  
*gracilis* Lindl., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav., *Fuchsia*  
*coccinea* auct. non Dryand., *Dorvalla eucharis* Comm. ex  
Lam., *Thilcum tinctorium* Molina, *Fuchsia magellanica*  
Lam. var. *typica* Munz, nom. illeg., *Fuchsia macrostema*  
Ruiz & Pav. var. *grandiflora* Hook., *Fuchsia coccinea*  
Dryand. var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Hook., *Fuchsia*  
*magellanica* Lam. var. *gracilis* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia*  
*conica* Lindl., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *conica*  
(Lindl.) Sweet, *Fuchsia gracilis* Lindl. var. *multiflora*  
Lindau, *Fuchsia discolor* Lindl., *Fuchsia magellanica*  
Lam. var. *discolor* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia chonotica*  
Phil., *Fuchsia coccinea* Dryand. var. *chonotica* (Phil.)  
Reiche, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *molinae* Espinosa,  
*Fuchsia magellanica* Lam. var. *eburnea* Pisano, *Fuchsia*  
*magellanica* Lam. var. *conica* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia*  
*gracilis* Lindl. var. *tenella* Lindl., *Fuchsia macrostema* Ruiz  
& Pav. var. *tenella* (Lindl.) DC., *Fuchsia macrostema* Ruiz  
& Pav. var. *gracilis* (Lindl.) Sweet

Arbusto. Nativo.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Chilco, chilca, palo blanco.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

**Gayophytum**

***Gayophytum humile*** A. Juss.

Sinónimos: *Gayophytum densifolium* Phil., *Gayophytum*  
*minutum* Phil., *Gayophytum humile* A. Juss. var. *densifolium*  
(Phil.) Reiche, *Gayophytum nuttallii* Torr. & A. Gray,  
*Gayophytum humile* A. Juss. var. *robustum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 500-3600 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Quinchamalí.

***Gayophytum micranthum*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Gayophytum gracile* Phil., *Gayophytum*  
*robustum* Phil., *Gayophytum humile* A. Juss. var. *gracile*  
(Phil.) Reiche, *Sphaerostigma paradoxum* (Spach) Gay,  
*Oenothera gracilis* (Phil.) H. Lév.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1200-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina.



## Ludwigia

**Ludwigia grandiflora** (Michx.) Greuter & Burdet subsp. **hexapetala** (Hook. & Arn.) G.L. Nesom & Kartesz  
Sinónimos: *Jussiaea hexapetala* Hook. & Arn., *Ludwigia hexapetala* (Hook. & Arn.) Zardini, A.G. Gu & P.H. Raven  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 10-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Ludwigia octovalvis** (Jacq.) P.H. Raven  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 10-270 m.

**Ludwigia peploides** (Kunth) P.H. Raven subsp. **montevidensis** (Spreng.) P.H. Raven  
Sinónimos: *Jussiaea montevidensis* Spreng., *Jussiaea repens* L. var. *montevidensis* (Spreng.) Munz, *Jussiaea repens* L., *Ludwigia adscendens* (L.) H. Hara var. *montevidensis* (Spreng.) H. Hara, *Jussiaea glandulosa* Larrañaga  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.  
Nombre vulgar: Pasto de la rana.

**Ludwigia peruviana** (L.) H. Hara  
Hierba acuática. Perenne. Introducida.  
Distribución: LBO, BIO.  
Rango altitudinal: 100-360 m.

## Oenothera

**Oenothera acaulis** Cav.  
Sinónimos: *Lavauxia mutica* Spach, *Oenothera mutica* (Spach) Gay  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 0-1100 m.  
Nombre vulgar: Colsilla, hierba de la apostema, rodalán.

**Oenothera affinis** Cambess.  
Sinónimos: *Oenothera berteriana* Spach, *Oenothera chilensis* Fisch. & C.A. Mey., *Raimannia berteriana* (Spach) Sprague & Riley  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, JFE.  
Rango altitudinal: 0-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Flor de San José, metrón, metrún, Don

Diego de la noche.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

**Oenothera arequipensis** Munz & I.M. Johnst.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-2700 m.  
Países limítrofes: Perú.

**Oenothera biennis** L.  
Hierba. Bienal. Introducida.  
Distribución: VAL.

**Oenothera coquimbensis** Gay  
Sinónimos: *Oenothera grandidentata* Phil., *Oenothera coquimbensis* Gay var. *grandidentata* (Phil.) Reiche  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

**Oenothera glazioviana** Micheli  
Hierba. Bienal. Introducida.  
Distribución: LBO, LLA.

**Oenothera grisea** W. Dietr.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

**Oenothera magellanica** Phil.  
Sinónimos: *Oenothera magellanica* Phil. var. *chubutensis* Macloskie, *Oenothera polymorpha* H. Lév. var. *magellanica* (Phil.) H. Lév.  
Hierba. Anual o bienal. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Oenothera nana** Griseb.  
Hierba. Anual o bienal. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2500-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**Oenothera odorata** Jacq.  
Sinónimos: *Oenothera odorata* Jacq. fma. *glabrescens* Speg., *Oenothera odorata* Jacq. fma. *media* Speg., *Oenothera odorata* Jacq. fma. *undulata* Speg., *Oenothera ibarii* Phil., *Raimannia odorata* (Jacq.) Sprague & Riley, *Onagra undulata* Moench, *Oenothera undulata* Aiton, *Oenothera odorata* Jacq. var. *virescens* Ser., *Oenothera odorata* Jacq. var. *glaucescens* Ser., *Oenothera odoratissima* Tausch, *Oenothera mollissima* L. subsp. *odorata* (Jacq.) Thell.



Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oenothera peruana*** W. Dietr.  
Hierba. Anual o bienal. Nativa.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 2500-3300 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Oenothera picensis*** Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, JFE.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Oenothera ravenii*** W. Dietr. subsp. *chilensis* W. Dietr.  
Hierba. Anual o bienal. Endémica.  
Distribución: VAL, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Oenothera rosea*** L'Hér. ex Aiton  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE, IPA.

***Oenothera sandiana*** Hassk.  
Sinónimos: *Oenothera rubida* Rusby  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2000-4000 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Oenothera stricta*** Ledeb. ex Link  
Sinónimos: *Oenothera propinqua* Spach, *Oenothera bracteata* Phil., *Oenothera propinqua* Spach var. *sparsiflora* Phil., *Oenothera valdiviana* Phil., *Oenothera glabrescens* Phil., *Oenothera brachysepala* Spach, *Oenothera arguta* Greene, *Onagra arguta* (Greene) Small, *Oenothera bracteata* Phil. var. *glabrescens* (Phil.) Reiche, *Oenothera mollissima* L. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Oenothera mollissima* L. subsp. *propinqua* (Spach) Thell., *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link var. *propinqua* (Spach) Reiche  
Hierba. Anual o bienal. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Don Diego de la noche, flor de San José.  
Nota: Introducida en la Isla de Pascua.

***Oenothera villaricae*** W. Dietr.  
Hierba. Anual o bienal. Nativa.  
Distribución: ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## OROBANCHACEAE

### Agalinis

***Agalinis linarioides*** (Cham. & Schldtl.) D'Arcy  
Sinónimos: *Gerardia linarioides* Cham. & Schldtl.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Bolivia.  
Nombre vulgar: Cartucho.

***Agalinis meyeniana*** (Benth.) Barringer  
Sinónimos: *Gerardia rigida* Gillies ex Benth. var. *meyeniana* Benth.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 800-1300 m.

### Bellardia

***Bellardia trixago*** (L.) All.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

***Bellardia viscosa*** (L.) Fisch. & C.A. Mey  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

### Castilleja

***Castilleja attenuata*** (A. Gray) T.I. Chuang & Heckard  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

***Castilleja laciniata*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Orthocarpus australis* Benth., *Orthocarpus laciniatus* (Hook. & Arn.) D.D. Keck  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 300-700 m.  
Países limítrofes: Perú.

*Castilleja pumila* (Benth.) Wedd. ex Herrera  
Sinónimos: *Castilleja nubigena* Kunth var. *pumila* Benth.,  
*Castilleja fissifolia* L. subsp. *pumila* (Benth.) Wedd.,  
*Castilleja fissifolia* L.f. var. *pumila* (Benth.) Wedd.  
Hierba parásita. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 3000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Albahaca.

### **Euphrasia**

*Euphrasia adenonota* I.M. Johnst.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2800-3200 m.

*Euphrasia andicola* Benth.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU, ARA.

*Euphrasia antarctica* Benth.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Euphrasia chrysantha* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 1000-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Euphrasia cockayniana* Petrie  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-820 m.

*Euphrasia flavicans* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.

*Euphrasia formosissima* Skottsbo.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

*Euphrasia intricata* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

*Euphrasia meiantha* Clos  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 1000-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Euphrasia muscosa* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 1200 m.

*Euphrasia perpusilla* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: LLA.  
Rango altitudinal: 200-300 m.

*Euphrasia philippii* Wettst.  
Sinónimos: *Euphrasia picta* Phil., *Euphrasia montana* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.

*Euphrasia subexserta* Benth.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 500-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Euphrasia trifida* Poepp. ex Benth.  
Sinónimos: *Euphrasia aurea* F. Phil., *Euphrasia spectabilis* Phil., *Euphrasia caespitosa* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 1000-2200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Euphrasia villaricensis* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LLA.

### **Neobartsia**

*Neobartsia chilensis* (Benth.) Uribe-Convers & Tank  
Sinónimos: *Bartsia chilensis* Benth.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 300-600 m.

*Neobartsia peruviana* (Walp.) Uribe-Convers & Tank  
Sinónimos: *Bartsia peruviana* Walp., *Bartsia meyeniana* Benth.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 1100-4900 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Neobartsia serrata*** (Molau) Uribe-Convers & Tank  
Sinónimos: *Bartsia serrata* Molau  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2300-3600 m.  
Países limítrofes: Perú.

### Orobanche

***Orobanche chilensis*** (Phil.) Beck  
Sinónimos: *Myzorrhiza chilensis* Phil.  
Hierba parásita. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Orobanca.

***Orobanche minor*** Sm.  
Hierba parásita. Anual. Introducida.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

***Orobanche ramosa*** L.  
Hierba parásita. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

***Orobanche tarapacana*** Phil.  
Hierba parásita. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 0-2800 m.

### Parentucellia

***Parentucellia latifolia*** Caruel  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

## OXALIDACEAE

### Oxalis

***Oxalis adenophylla*** Gillies ex Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Acetosella adenophylla* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella bustillosii* (Phil.) Kuntze, *Oxalis bustillosii* Phil., *Oxalis bustillosii* Phil. var. *biflora* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-2600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis arbuscula*** Barnéoud  
Sinónimos: *Oxalis fruticula* Phil., *Acetosella arbuscula* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella fruticula* (Phil.) Kuntze  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 600-1200 m.

***Oxalis arenaria*** Bertero ex Colla  
Sinónimos: *Oxalis araucana* Reiche, *Oxalis biglandulosa* Steud., *Oxalis hyalinorhiza* Poepp. ex R. Knuth  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1100 m.

***Oxalis articulata*** Savigny  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: RME, BIO.

***Oxalis atacamensis*** Reiche  
Sinónimos: *Acetosella trichocalyx* (Phil.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 400-600 m.

***Oxalis aureoflava*** Steud.  
Sinónimos: *Oxalis corniculata* L. var. *aureoflava* (Steud.) Gunckel, *Acetosella aureoflava* (Steud.) Kuntze, *Xanthoxalis aureoflava* (Steud.) Holub  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Oxalis berteroana*** Barnéoud  
Sinónimos: *Oxalis compacta* Gillies ex Hook. & Arn. subsp. *berteroana* (Barnéoud) Lourteig, *Oxalis falconiana* Steud. *berteroana* (Barnéoud) Lourteig, *Oxalis chaetocalyx* Phil., *Oxalis josephii* R. Knuth, *Oxalis pachyphylla* Phil., *Oxalis peraltae* Phil., *Acetosella berteroana* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella falconiana* (Steud.) Kuntze, *Acetosella pachyphylla* (Phil.) Kuntze, *Oxalis berteroana* Barnéoud var. *uniflora* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1100-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis bulbocastanum*** Phil.  
Sinónimos: *Oxalis breana* Phil., *Oxalis thyrsoidea* Reiche, *Oxalis occidentalis* R. Knuth  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 200-700 m.

***Oxalis caesia*** Phil.

Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Oxalis campanensis*** Lourteig

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1500-1800 m.

***Oxalis cinerea*** Zucc.

Sinónimos: *Oxalis alfalfalis* Phil., *Oxalis lineata* Gillies ex Hook. & Arn., *Oxalis niveiphylla* R. Knuth, *Oxalis pearcei* Phil., *Oxalis spodiophylla* Walp. var. *microphylla* Walp., *Oxalis spodiophylla* Walp., *Oxalis fernandensis* R. Knuth, *Oxalis besseri* R. Knuth, *Acetosella haenkeana* (Zucc.) Kuntze, *Acetosella lineata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella pearcei* (Phil.) Kuntze, *Acetosella spodiophylla* (Walp.) Kuntze  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA.  
Rango altitudinal: 1000-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Oxalis clandestina*** Phil.

Hierba. Anual o bienal. Endémica.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Oxalis colchaguensis*** Lourteig

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

***Oxalis compacta*** Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Oxalis gilliesii* Phil., *Oxalis landbeckii* Phil., *Oxalis platypila* Gillies ex Hook. & Arn., *Oxalis reichei* R. Knuth, *Oxalis uspallatensis* R. Knuth, *Acetosella compacta* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella gayana* (Phil.) Kuntze, *Acetosella platypila* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxalis gayana* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 1600-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis corniculata*** L. var. *atropurpurea* Planch.

Sinónimos: *Oxalis corniculata* L. var. *purpurascens* Speg.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: COQ, RME, JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Oxalis corniculata*** L. var. *corniculata*

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA.

***Oxalis debilis*** Kunth

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: JFE.

***Oxalis dumetorum*** Barnéoud

Sinónimos: *Oxalis prorepens* Phil., *Oxalis hookeriana* Pohl ex Progel, *Oxalis lechleri* Steud., *Acetosella dumetorum* (Barnéoud) Kuntze  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Oxalis enneaphylla*** Cav.

Sinónimos: *Oxalis cunninghamii* R. Knuth, *Oxalis enneaphylla* Cav. subsp. *ibari* (Phil.) Lourteig, *Oxalis patagonica* Speg., *Acetosella enneaphylla* (Cav.) Kuntze, *Oxalis enneaphylla* Cav. var. *patagonica* (Speg.) Skottsbo., *Oxalis frigida* R. Knuth, *Oxalis ibari* Phil., *Oxalis pumila* d'Urv., *Oxalis enneaphylla* Cav. var. *pumila* (d'Urv.) Hook.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-2600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis eremobia*** Phil.

Sinónimos: *Oxalis inesitae* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 2100-3300 m.

***Oxalis ericoides*** R. Knuth

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 1500-3000 m.

***Oxalis erythrorhiza*** Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Oxalis bryoides* Phil., *Oxalis guessfeldtii* R. Knuth, *Acetosella bryoides* (Phil.) Kuntze, *Acetosella erythrorhiza* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1500-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis gigantea*** Barnéoud

Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Nombre vulgar: Churco, churqui.

***Oxalis gyrorhiza*** Bertero ex Colla

Sinónimos: *Oxalis radicans* Ruiz & Pav. ex R. Knuth, *Acetosella gyrorhiza* (Bertero ex Colla) Kuntze, *Oxalis autumnalis* Poepp. ex Progel, nom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

***Oxalis holosericea*** Phil.

Sinónimos: *Acetosella holosericea* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2500-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis hypsophila*** Phil.

Sinónimos: *Oxalis exigua* Phil., *Oxalis coyensis* R. Knuth, *Oxalis fluehmannii* Phil., *Oxalis gracilinervosa* R. Knuth, *Oxalis leptocaulos* Phil., *Oxalis microphylla* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2600-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis incana*** Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Oxalis johnstonii*** R. Knuth

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-900 m.

***Oxalis laciniata*** Cav.

Sinónimos: *Oxalis squamoso-radicosa* Steud., *Acetosella laciniata* (Cav.) Kuntze, *Acetosella squamoso-radicosa* (Steud.) Kuntze, *Oxalis prichardii* Rendle, *Oxalis squamoso-radicosa* Steud. var. *pubescens* Skotts., *Oxalis laciniata* Cav. var. *pubescens* (Skotts.) J.M.H. Shaw

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis laxa*** Hook. & Arn. var. ***hispidissima*** Barnéoud

Sinónimos: *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *violacea* R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *setifera* R. Knuth, *Acetosella platycaulis* (Steud.) Kuntze, *Oxalis chosicensis* R. Knuth, *Oxalis platycaulis* Steud., *Oxalis umbellata* Kuntze ex R. Knuth, nom. nud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Oxalis laxa*** Hook. & Arn. var. ***laxa***

Sinónimos: *Oxalis deflexa* Poepp. ex Progel, *Oxalis dichotomiflora* Steud., *Oxalis geranioides* R. Knuth, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *major* R. Knuth, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *minor* Barnéoud, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *alsinoides* (Walp.) R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *purpurea* R. Knuth, *Oxalis brevicaulis* Steud., *Oxalis alsinoides* Walp.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Perú.

***Oxalis leucophylla*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Oxalis loricata*** Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis magellanica*** G. Forst.

Sinónimos: *Oxalis carnosa* Molina, *Oxalis modesta* Phil., *Acetosella modesta* (Phil.) Kuntze, *Oxalis cataractae* A. Cunn., *Oxalis lactea* Hook.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ojos de agua.

***Oxalis matancillae*** Lourteig

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 100-400 m.

***Oxalis megalorrhiza*** Jacq.

Sinónimos: *Oxalis ornata* Phil., *Oxalis paposana* Phil., *Oxalis borchersii* Phil., *Oxalis darapskyi* Phil. ex Reiche, *Oxalis paniculata* Reiche, *Oxalis paposana* Phil. var. *hirta* R. Knuth, *Oxalis succulenta* Barnéoud, *Oxalis tarapacana* Phil., *Oxalis reticulata* Steud., *Oxalis illapelina* Phil., *Oxalis brevis* Phil., *Oxalis carnosa* Molina var. *incana* Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Perú.



***Oxalis micrantha*** Bertero ex Colla

Sinónimos: *Oxalis cumingii* Herb., *Acetosella cumingii* (Herb.) Kuntze, *Acetosella micrantha* (Bertero ex Colla) Kuntze, *Acetosella pygmaea* (Phil.) Kuntze, *Acetosella vinagrillo* (Steud.) Kuntze, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *major* R. Knuth, *Oxalis pygmaea* Phil., *Oxalis vinaqrillo* Steud., *Xanthoxalis micrantha* (Bertero ex Colla) Holub

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Oxalis mira*** Lourteig

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 400-600 m.

***Oxalis morenoensis*** Lourteig

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Oxalis nahuelhuapiensis*** Speg.

Sinónimos: *Oxalis comberi* R. Knuth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, ARA.

Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis novemfoliolata*** Heibl & Martic.

Subarbusto. Endémica.

Distribución: ATA

Rango altitudinal: 100-450 m.

***Oxalis ornithopus*** Phil.

Sinónimos: *Acetosella ornithopus* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Oxalis ovalleana*** Phil.

Hierba suculenta. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Oxalis pachyrrhiza*** Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Oxalis penicillata*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2000-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis perdicaria*** (Molina) Bertero

Sinónimos: *Oxalis delicatula* Phil., *Oxalis lobata* Sims, *Oxalis mallobolba* Cav., *Acetosella eriorrhiza* (Zucc.)

Kuntze, *Acetosella lobata* (Sims) Kuntze, *Acetosella mallobolba* (Cav.) Kuntze, *Acetosella perdicaria* (Molina)

Kuntze, *Oxalis autumnalis* A. St.-Hil., *Oxalis eriorrhiza* Zucc., *Oxalis tenera* Spreng., *Sassia perdicaria* Molina

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Flor de mayo, flor de la perdiz, mayo, rimu.

***Oxalis pes-caprae*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, LLA, JFE.

***Oxalis purpurea*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: JFE.

***Oxalis pycnophylla*** Wedd.

Sinónimos: *Oxalis hauthalii* R. Knuth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 2200-5000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Oxalis ricardii*** Lourteig

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Oxalis rigida*** (Barnéoud) Lourteig

Sinónimos: *Oxalis adenocaulos* Phil., *Oxalis puberula* Phil., *Oxalis san-romanii* Phil., *Oxalis torcana* Phil.,

*Acetosella puberula* (Phil.) Kuntze, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *rigida* Barnéoud

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, LBO.

Rango altitudinal: 800-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis rosea*** Jacq.

Sinónimos: *Oxalis rosea* Jacq. var. *simplex* Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Culle colorado.

***Oxalis squamata* Zucc.**

Sinónimos: *Oxalis chilensis* R. Knuth, *Oxalis geminata* Hook. & Arn., *Oxalis hirthii* Phil., *Oxalis macropus* Phil., *Oxalis polyantha* Walp., *Acetosella geminata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella macropus* (Phil.) Kuntze, *Acetosella polyantha* (Walp.) Kuntze, *Acetosella squamata* (Zucc.) Kuntze, *Oxalis trichocalyx* Steud., *Xanthoxalis polyantha* (Walp.) Holub

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1000-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis squarrosa* Barnéoud**

Sinónimos: *Oxalis briquetii* R. Knuth, *Oxalis coquimbana* Phil., *Oxalis glutinosa* Phil., *Acetosella squarrosa* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella glutinosa* (Phil.) Kuntze, *Acetosella coquimbana* (Phil.) Kuntze

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1000-2800 m.

***Oxalis strictula* Steud.**

Sinónimos: *Oxalis aberrans* Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 500-1200 m.

***Oxalis tacorensis* B.L. Burt**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4200-5100 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Nombre vulgar: Chincura.

***Oxalis tortuosa* Lindl.**

Sinónimos: *Oxalis gaudichaudii* Barnéoud, *Oxalis maritima* Barnéoud, *Oxalis glomerata* Hook. & Arn., *Oxalis bridgesii* Bertero ex Colla, *Oxalis zonata* Liebm.

Hierba suculenta. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, JFE.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Oxalis tuberosa* Molina**

Hierba suculenta. Perenne. Nativa.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nota: Descrita para Chile por Molina (1782) y citada para Chile por Lourteig (2000), sin mencionar la localidad o material de referencia.

***Oxalis valdiviensis* Barnéoud**

Sinónimos: *Oxalis berningeri* R. Knuth, *Oxalis hapalconidea* Barnéoud, *Oxalis tolguacensis* R. Knuth, *Acetosella antucensis* (Phil.) Kuntze, *Acetosella hapalconidea* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella valdiviensis* (Barnéoud) Kuntze, *Oxalis antucensis* Phil., *Oxalis capillipes* R. Knuth, *Oxalis tinctoria* Poepp. ex Progel, *Oxalis valdiviensis* Barnéoud var. *antucensis* (Phil.) Reiche, *Oxalis valdiviana* Vilm., *Oxalis valdiviensis* Barnéoud var. *humilis* Speg., *Xanthoxalis valdiviensis* (Barnéoud) Holub

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis virgosa* Molina**

Sinónimos: *Oxalis subcarnosa* Klotzsch ex Walp., *Acetosella virgosa* (Molina) Kuntze, *Acetosella subcarnosa* (Klotzsch ex Walp.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

**PAPAVERACEAE**

***Argemone***

***Argemone crassifolia* G.B. Ownbey**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 1300 m.

***Argemone hunnemannii* Otto & A. Dietr.**

Sinónimos: *Argemone mexicana* L. var. *grandiflora* auct. non (Sweet) Reiche, *Argemone platyceras* Link & Otto var. *chilensis* Prain, *Argemone platyceras* Link & Otto var. *hunnemannii* (Otto & A. Dietr.) Fedde, *Argemone mexicana* sensu Gay, non L.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cardo blanco.

***Argemone rosea* Hook.**

Sinónimos: *Argemone mexicana* L. var. *rosea* (Hook.) Reiche, *Argemone mexicana* L. var. *spinosa* Barnéoud ex Reiche, *Argemone mexicana* L. var. *tomentosa* Barnéoud ex Reiche, *Argemone platyceras* Link & Otto var. *hispidosea* Fedde

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-900 m.

***Argemone subfusiformis*** G.B. Ownbey

Sinónimos: *Argemone mexicana* L. var. *ochroleuca* auct. non (Sweet) Lindl., *Argemone mexicana* auct. non L., *Argemone mexicana* L. var. *glauca* Barnéoud ex Reiche  
Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Cardo blanco.

**Eschscholzia**

***Eschscholzia californica*** Cham.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

**Fumaria**

***Fumaria agraria*** Lag.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

***Fumaria capreolata*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

***Fumaria officinalis*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

***Fumaria parviflora*** Lam.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO.

**Papaver**

***Papaver dubium*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAG.

***Papaver hybridum*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME.

***Papaver rhoeas*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO, LLA.

***Papaver somniferum*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO,

LRI, MAG, JFE.

**PASSIFLORACEAE**

**Malesherbia**

***Malesherbia auristipulata*** Ricardi

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 1800-2100 m.

***Malesherbia campanulata*** Ricardi

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 3300-4000 m.

***Malesherbia corallina*** Muñoz-Schick & R. Pinto

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2700-2800 m.

***Malesherbia densiflora*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2500-3100 m.

***Malesherbia deserticola*** Phil.

Sinónimos: *Malesherbia borchersi* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3400-3500 m.

***Malesherbia fasciculata*** D. Don var. *fasciculata*

Sinónimos: *Malesherbia thyrsoides* Bertero ex Steud., *Gynopleura fascicula* (D. Don) Roem.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 400-1000 m.

***Malesherbia fasciculata*** D. Don var. *glandulosa* Ricardi

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

***Malesherbia humilis*** Poepp. var. *gabrielae* (Ricardi) Gengler

Sinónimos: *Malesherbia gabrielae* Ricardi

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 700-2600 m.

***Malesherbia humilis*** Poepp. var. *humilis*

Sinónimos: *Gynopleura humilis* (D. Don) Roem., *Gynopleura dilatata* Walp., *Malesherbia dilatata* (Walp.) F. Phil.

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Piojito, piojillo.

***Malesherbia humilis*** Poepp. var. ***parviflora*** (Phil.) Ricardi  
Sinónimos: *Malesherbia multiflora* Ricardi, *Malesherbia parviflora* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-2900 m.

***Malesherbia humilis*** Poepp. var. ***propinqua*** (Gay) Ricardi  
Sinónimos: *Malesherbia propinqua* Gay, *Malesherbia humilis* D. Don var. *propinqua* (Gay) Reiche  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 600-2000 m.

***Malesherbia humilis*** Poepp. var. ***taltalina*** (Ricardi) Gengler  
Sinónimos: *Malesherbia taltalina* Ricardi  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Malesherbia lactea*** Phil.  
Sinónimos: *Malesherbia rosulata* Werderm.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 2500-3900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Malesherbia lanceolata*** Ricardi  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2900-3300 m.

***Malesherbia linearifolia*** (Cav.) Pers.  
Sinónimos: *Gynopleura linearifolia* Cav., *Malesherbia linearifolia* (Cav.) Poir., comb. illeg., *Malesherbia coronota* D. Don, *Malesherbia subalpina* Poepp. ex Walp., *Gynopleura coronata* (D. Don) Roem., *Malesherbia humilis* D. Don var. *subalpina* (Poepp.) Gay  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 400-3200 m.

***Malesherbia lirana*** Gay var. ***bracteata*** (Phil.) Ricardi  
Sinónimos: *Malesherbia bracteata* Phil., *Malesherbia oblongifolia* auct. non Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 3000-3500 m.

***Malesherbia lirana*** Gay var. ***lirana***  
Sinónimos: *Malesherbia hieronymi* Harms, *Malesherbia lirana* Gay var. *hieronymi* (Harms) Ricardi, *Malesherbia cuneata* Phil., *Malesherbia serpyllifolia* Phil., *Malesherbia lirana* Gay var. *serpyllifolia* (Phil.) Reiche, *Malesherbia lirana* Gay var. *subtomentosa* Kuntze, *Malesherbia incana* Werderm.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Malesherbia obtusa*** Phil. var. ***johnstonii*** (Werderm.) Ricardi  
Sinónimos: *Malesherbia johnstonii* Werderm.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 2500 m.

***Malesherbia obtusa*** Phil. var. ***obtusa***  
Sinónimos: *Malesherbia breviflora* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 500 m.

***Malesherbia paniculata*** D. Don  
Sinónimos: *Gynopleura coerulea* C. Presl, *Malesherbia linearifolia* (Cav.) Pers. var. *paniculata* (D. Don) Reiche  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 400-2500 m.  
Nombre vulgar: Farolito.

***Malesherbia rugosa*** Gay var. ***pseudopulverulenta*** Ricardi  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 2000 m.

***Malesherbia rugosa*** Gay var. ***rugosa***  
Sinónimos: *Malesherbia ovata* Phil., *Malesherbia oblongifolia* Phil., *Malesherbia foliosa* Phil., *Malesherbia prolifera* Phil., *Malesherbia serrata* Phil., *Malesherbia brevipedunculata* Werderm., *Malesherbia glandulifera* Werderm.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 1000-3000 m.

***Malesherbia tenuifolia*** D. Don  
Sinónimos: *Gynopleura tenuifolia* (D. Don) Roem., *Malesherbia pulchra* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 2500 m.

***Malesherbia tocopillana*** Ricardi

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

**Passiflora**

***Passiflora foetida*** L.

Arbusto trepador. Nativo.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 20-50 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Passiflora pinnatistipula*** Cav.

Sinónimos: *Passiflora chilensis* Miers, *Tacsonia pinnatistipula* (Cav.) Juss.  
Arbusto trepador. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 2500-3000 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Flor de la pasión, flor de la corona de Cristo, pasionaria, granadilla.

**PHRYMACEAE**

**Erythranthe**

***Erythranthe bridgesii*** (Benth.) G.L. Nesom

Sinónimos: *Mimulus parviflorus* Lindl. var. *bridgesii* Benth., *Mimulus longipes* Phil., *Mimulus bridgesii* (Benth.) Clos var. *integrifolia* Clos, *Mimulus bridgesii* (Benth.) Clos var. *stoloniformis* Clos, *Mimulus bridgesii* (Benth.) Clos, *Mimulus acutidens* Reiche  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Placa, berro.

***Erythranthe cuprea*** (Dombrain) G.L. Nesom

Sinónimos: *Mimulus luteus* L. var. *cuprea* Hook., *Mimulus cupreus* Dombrain  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 900-2100 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Placa, berro.

***Erythranthe depressa*** (Phil.) G.L. Nesom var. ***ciminum*** (C.

Bohlen) J.M. Watson & A.R. Flores  
Sinónimos: *Mimulus depressus* Phil. var. *ciminum* C. Bohlen

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 2900-3100 m.

***Erythranthe depressa*** (Phil.) G.L. Nesom var. ***depressa***

Sinónimos: *Mimulus pissisi* Phil., *Mimulus acaulis* Phil., *Mimulus depressus* Phil. var. *acaulis* (Phil.) Reiche, *Mimulus depressus* Phil. var. *pissisi* (Phil.) Reiche, *Mimulus depressus* Phil.  
Hierba. Anual o Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2000-4500 m.

***Erythranthe glabrata*** (Kunth) G.L. Nesom

Sinónimos: *Mimulus andicolus* Kunth, *Mimulus parviflorus* Lindl., *Mimulus glabratus* Kunth var. *parviflorus* (Lindl.) Grant, *Mimulus sylvaticus* Phil., *Mimulus kingii* Phil., *Mimulus tener* Phil., *Mimulus parviflorus* Lindl. var. *externa* Skotts., *Mimulus glabratus* Kunth var. *externus* (Skotts.) Skotts., *Mimulus pilosiusculus* Kunth, *Mimulus propinquus* Lindl., *Mimulus parviflorus* Lindl. var. *nana* Wedd., *Mimulus glabratus* Kunth  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Oqororo.

***Erythranthe lutea*** (L.) G.L. Nesom var. ***lutea***

Sinónimos: *Mimulus punctatus* Miers ex Bertero, *Mimulus luteus* L. var. *nummularius* Clos, *Mimulus luteus* L. var. *micranthus* Phil., *Mimulus glabratus* Kunth var. *micranthus* (Phil.) Boivin, *Mimulus luteus* L. var. *rivularis* (Lodd.) Lindl., *Mimulus rivularis* Lodd., *Mimulus luteus* L. fma. *macrophyllus* Clos, *Mimulus punctatus* Miers ex Bertero, *Mimulus luteus* L.  
Hierba. Anual o Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-3700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Erythranthe lutea*** (L.) G.L. Nesom var. ***variegata*** (Lodd.)

Hook.  
Sinónimos: *Mimulus variegatus* Lodd., *Mimulus naiandinus* J.M. Watson & C. Bohlen, *Mimulus luteus* L. var. *variegatus* (Lodd.) Hook.  
Hierba. Anual o Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 500-2700 m.



***Erythranthe minima*** (C. Bohlen) J.M. Watson & A.R. Flores

Sinónimos: *Mimulus minimus* C. Bohlen, *Mimulus depressus* Phil. var. *nanus* (Phil.) Reiche, *Mimulus nanus* auct. non Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

## PHYTOLACCACEAE

### Anisomeria

***Anisomeria coriacea*** D. Don

Sinónimos: *Anisomeria drastica* (Bertero) Moq., *Pircunia drastica* Bertero, *Phytolacca drastica* (Bertero) Poepp. & Endl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 500-2600 m.

Nombre vulgar: Pircún, pirco, congrio.

***Anisomeria littoralis*** (Poepp. & Endl.) Moq.

Sinónimos: *Phytolacca chilensis* Miers, nom. nud., *Phytolacca littoralis* Poepp. & Endl., *Anisomeria chilensis* (Miers) H. Walter, *Anisomeris fruticosa* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

### Ercilla

***Ercilla spicata*** (Bertero) Moq.

Sinónimos: *Ercilla volubilis* A. Juss., *Galvezia spicata* Bertero, *Suriana volubilis* (A. Juss.) Dombey & Cav. ex D. Don, *Bridgesia spicata* (Bertero) Hook. & Arn., *Apodostachys densiflora* Turcz., *Phytolacca volubilis* (A. Juss.) Heimerl, *Ercilla spicata* (Hook. & Arn.) Moq.

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Nombre vulgar: Coralillo, siete huiras, voqui-auca, voquitro.

***Ercilla syncarpellata*** Nowicke

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: MAU, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Nombre vulgar: Coralillo, siete huiras, voqui-auca, voquitro.

### Phytolacca

***Phytolacca bogotensis*** Kunth

Sinónimos: *Phytolacca australis* Phil., *Phytolacca bogotensis* Kunth var. *australis* (Phil.) Hauman, comb. illeg., *Phytolacca micrantha* H. Walter, *Phytolacca parviflora* Hauman

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Carmín.

***Phytolacca chilensis*** (Miers ex Moq.) H. Walter

Sinónimos: *Pircunia chilensis* Miers ex Moq.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO.

## PIPERACEAE

### Peperomia

***Peperomia berteroana*** Miq.

Sinónimos: *Peperomia tristanensis* Christoph., *Peperomia berteroana* Miq. subsp. *tristanensis* (Christoph.) Valdeb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Nota: También presente en Isla Inaccessible e Isla Tristan da Cunha.

***Peperomia coquimbensis*** Skottsdb.

Hierba epífita. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 500 m.

Nombre vulgar: Congonilla.

***Peperomia doellii*** Phil.

Hierba suculenta. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Peperomia fernandeziana*** Miq.

Sinónimos: *Peperomia fernandeziana* Miq. fma. *oblongifolia* Skottsdb., *Peperomia chilensis* C. DC.

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Nombre vulgar: Congonilla.

***Peperomia margaritifera*** Bertero ex Hook.

Sinónimos: *Peperomia margaritifera* Bertero ex Hook. var. *umbraticola* Skottsdb. ex Yunck.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 200-400 m.

***Peperomia nummularioides*** Griseb.  
Sinónimos: *Peperomia australis* Phil., *Peperomia nummulariifolia* Kunth  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Congonilla del monte.

***Peperomia skottsbergii*** C. DC.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 100-600 m.

## PITTOSPORACEAE

### Pittosporum

***Pittosporum crassifolium*** Banks & Sol. ex A. Cunn.  
Arbusto o árbol pequeño. Introducido.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, JFE.

***Pittosporum undulatum*** Vent.  
Arbusto. Introducido.  
Distribución: VAL.  
Nombre vulgar: Pitosporo.

## PLANTAGINACEAE

### Bacopa

***Bacopa monnieri*** (L.) Pennell  
Sinónimos: *Lysimachia monnieri* L., *Herpestis monnieri* (L.) Kunth, *Bacopa monnieri* (L.) Wettst., nom. illeg., *Bramia indica* Lam.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, MAU.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

### Callitriche

***Callitriche albomarginata*** Fassett  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2700 m.

***Callitriche antarctica*** Engelm. ex Hegelm.  
Hierba acuática. Anual. Nativa.

Distribución: RME, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Callitriche deflexa*** A. Braun ex Hegelm.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Callitriche heterophylla*** Pursh  
Hierba acuática. Anual. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Callitriche lechleri*** (Hegelm.) Fassett var. *berteroana* (Hegelm.) Fassett  
Sinónimos: *Callitriche marginata* Torr. var. *berteroana* Hegelm., *Callitriche berteroniana* Steud.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL, LBO, AIS.  
Países limítrofes: Argentina.

***Callitriche lechleri*** (Hegelm.) Fassett var. *lechleri*  
Sinónimos: *Callitriche marginata* Torr. var. *lechleri* Hegelm., *Callitriche oblongicarpa* Fassett  
Hierba acuática. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Callitriche terrestris*** Raf. subsp. *turfosa* (Bertero emend. Hegelm.) Bacigalupo  
Sinónimos: *Callitriche turfosa* Bertero  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Callitriche truncata*** Guss.  
Hierba acuática. Anual. Introducida.  
Distribución: ARA, MAG.

### Cymbalaria

***Cymbalaria muralis*** P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, MAU, BIO, JFE.

## Digitalis

### *Digitalis purpurea* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

## Fonkia

### *Fonkia uliginosa* Phil.

Sinónimos: *Gratiola uliginosa* (Phil.) F. Phil., *Gratiola peruviana* L. var. *uliginosa* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

## Gratiola

### *Gratiola peruviana* L.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

## Hebe

### *Hebe elliptica* (G. Forst.) Pennell

Sinónimos: *Hebe magellanica* J.F. Gmel., *Veronica elliptica* G. Forst., *Veronica simpsoni* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Hebe salicifolia* (G. Forst.) Pennell

Sinónimos: *Veronica salicifolia* G. Forst., *Veronica fonki* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Bolivia.

## Hippuris

### *Hippuris vulgaris* L.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pinito de agua.

## Kickxia

### *Kickxia elatine* (L.) Dumort.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, NUB, BIO, ARA, JFE.

## Limosella

### *Limosella australis* R. Br.

Sinónimos: *Limosella aquatica* L. var. *tenuifolia* (Nutt.) Hook.f., *Limosella aquatica* auct. non L., *Limosella tenuifolia* Nutt.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

## Linaria

### *Linaria canadensis* (L.) Dum. Cours.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, BIO, ARA, LRI.

### *Linaria vulgaris* Mill.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, NUB, BIO, ARA, AIS.

## Littorella

### *Littorella australis* Griseb. ex Benth. & Hook.f.

Sinónimos: *Plantago araucana* Rahn

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

## Mecardonia

*Mecardonia procumbens* (Mill.) Small var. *flagellaris* (Cham. & Schltdl.) V.C. Souza

Sinónimos: *Herpestis flagellaris* Cham. & Schltdl., *Moniera flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Kuntze, *Bacopa flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Wettst., *Moniera procumbens* (Mill.) Kuntze var. *flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Kuntze, *Mecardonia flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Rossow, *Bacopa chamaedryoides* (Kunth) Wettst. var. *flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Chodat & Hassl.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Mecardonia procumbens*** (Mill.) Small var. *procumbens*  
Sinónimos: *Erinus procumbens* Mill., *Herpestis chamaedryoides* Kunth, *Bacopa procumbens* (Mill.) Greenm.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### Melosperma

***Melosperma andicola*** Benth.  
Sinónimos: *Melosperma glabra* Phil., *Herpestis andicola* Gillies ex Benth.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 2300-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Melosperma angustifolia*** Phil.  
Sinónimos: *Melosperma andicola* Benth. var. *angustifolia* (Phil.) Rossow  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 2500-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### Monttea

***Monttea chilensis*** Gay var. *chilensis*  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Uvillo.

***Monttea chilensis*** Gay var. *taltalensis* Reiche  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: ANT, COQ.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

### Ourisia

***Ourisia alpina*** Poepp. & Endl.  
Sinónimos: *Ourisia pallens* Poepp. & Endl., *Ourisia alpina* Poepp. & Endl. var. *pallens* (Poepp. & Endl.) Benth., *Ourisia rosea* Phil., *Ourisia alpina* Poepp. & Endl. var. *glabra* Phil., *Ourisia rancoana* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 1000-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Ourisia breviflora*** Benth. subsp. *breviflora*  
Sinónimos: *Ourisia antarctica* Hook.f.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Ourisia breviflora*** Benth. subsp. *uniflora* (Phil.) Meudt  
Sinónimos: *Ourisia uniflora* Phil., *Ourisia breviflora* Benth. var. *uniflora* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, BIO, LLA.  
Rango altitudinal: 500-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Ourisia coccinea*** (Cav.) Pers. subsp. *coccinea*  
Sinónimos: *Dichroma coccinea* Cav., *Ourisia villosa* Molina, *Ourisia pearcei* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Ourisia coccinea*** (Cav.) Pers. subsp. *elegans* (Phil.) Meudt  
Sinónimos: *Ourisia coccinea* (Cav.) Pers. var. *minor* Benth., *Ourisia coccinea* (Cav.) Pers. var. *elegans* (Phil.) Reiche, *Ourisia elegans* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 100-2600 m.

***Ourisia fragrans*** Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA.  
Rango altitudinal: 1300-2200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Ourisia fuegiana*** Skottsbo.  
Sinónimos: *Ourisia muscosa* auct. non Benth.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Ourisia microphylla*** Poepp. & Endl.  
Sinónimos: *Ourisia polyantha* auct. non Poepp. & Endl.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 800-2200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Ourisia muscosa*** Benth.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3800-5000 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Ourisia polyantha*** Poepp. & Endl.

Sinónimos: *Ourisia diazii* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO.

Rango altitudinal: 1300-2400 m.

***Ourisia pygmaea*** Phil.

Sinónimos: *Ourisia uniflora* auct. non Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1400-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ourisia ruelloides*** (L.f.) Kuntze

Sinónimos: *Ourisia poeppigii* Benth., *Ourisia racemosa* Clos, *Ourisia magellanica* C.F. Gaertn., *Ourisia glabra* Molina, *Chelone ruelloides* L.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ourisia serpyllifolia*** Benth.

Sinónimos: *Ourisia melospermoides* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 1000-2200 m.

**Plantago**

***Plantago australis*** Lam. subsp. *australis*

Sinónimos: *Plantago candollei* Raf., *Plantago accrescens* Pilg., *Plantago kurtzii* Pilg., *Plantago refracta* Pilg., *Plantago stuckertii* Pilg., *Plantago leptophylla* Decne., *Plantago cantagallensis* Zahlbr., *Plantago bicallosa* Decne., *Plantago australis* Lam. subsp. *angustifolia* (Pilg.) Rahn, *Plantago bicallosa* Decne. var. *angustifolia* Pilg., *Plantago gigantea* Decne., *Plantago durvillei* Fisch. & C.A. Mey.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Plantago australis*** Lam. subsp. *cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Rahn

Sinónimos: *Plantago cumingiana* Fisch. & C.A. Mey., *Plantago pugae* Phil., *Plantago calbucana* Phil., *Plantago foncki* Phil., *Plantago tomentosa* Lam. var. *foncki* (Phil.)

Reiche, *Plantago laevigata* Phil., *Plantago ovata* Phil., *Plantago julieti* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Plantago barbata*** G. Forst. subsp. *austroandina* Rahn

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Plantago barbata*** G. Forst. subsp. *barbata*

Sinónimos: *Plantago andicola* Gillies ex Hook.f., *Plantago imberbis* Hook.f., *Plantago pauciflora* Lam., *Plantago barbata* G. Forst. var. *pauciflora* (Gay) Pilg., *Plantago andicola* Decne. ex Barnéoud, *Plantago pauciflora* Lam. var. *major* Barnéoud, *Plantago barbata* G. Forst. var. *imberbis* Hook.f., *Plantago caespitosa* Phil., *Plantago barbata* G. Forst. var. *caespitosa* (Phil.) Pilg., *Plantago pachyrrhiza* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-3600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Plantago barbata*** G. Forst. subsp. *monanthos* (d'Urv.) Rahn

Sinónimos: *Plantago monanthos* d'Urv., *Plantago polymorpha* Banks & Sol. ex Hook.f., *Plantago barbata* G. Forst. var. *elongata* Hook.f., *Plantago barbata* G. Forst. var. *monanthos* (d'Urv.) Pilg.,

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAG.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Plantago barbata*** G. Forst. subsp. *muscooides* (Hook.f.) Rahn

Sinónimos: *Plantago monanthos* d'Urv. var. *muscooides* Hook.f., *Plantago monanthos* d'Urv. var. *abbreviata* Hook.f., *Plantago barbata* G. Forst. fma. *muscooides* (Hook.f.) Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. fma. *abbreviata* (Hook.f.) Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina.



***Plantago brasiliensis* Sims**

Sinónimos: *Plantago brasiliensis* Sims var. *gayana* (Decne. ex Barnéoud) Pilg., *Plantago obtusata* Decne., *Plantago chilensis* Rapin, *Plantago decaisnei* Barnéoud, *Plantago gayana* Decne. ex Barnéoud, *Plantago lasiothrix* Kunze ex Decne., *Plantago brasiliensis* Sims var. *chilensis* (Rapin) Pilg., *Plantago sericea* Ruiz & Pav. var. *decaisnei* (Barnéoud) Wedd., *Plantago brasiliensis* Sims var. *decaisnei* (Barnéoud) Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *lasiothrix* (Decne.) Pilg., *Plantago dolichophylla* Phil., *Plantago vidali* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Plantago coronopus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, LBO, NUB, BIO, ARA.

***Plantago fernandezia* Bertero ex Barnéoud**

Sinónimos: *Robinsonia nervosa* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 500-600 m.

***Plantago firma* Kunze ex Walp.**

Sinónimos: *Plantago brachystachys* Walp., *Plantago virginica* L. var. *firma* (Walp.) Reiche, *Plantago truncata* Cham. & Schltl. var. *canohirsuta* Pilg., *Plantago leonensis* Steud., *Plantago clausa* Steud., *Plantago marginata* Steud., *Plantago skottsbergii* Pilg., *Plantago truncata* Cham. & Schltl. subsp. *skottsbergii* (Pilg.) Pilg., *Plantago truncata* Cham. & Schltl. subsp. *firma* (Kuntze ex Walp.) Pilg.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Plantago grandiflora* Meyen**

Sinónimos: *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud, *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud var. *nitidifolia* Barnéoud, *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud var. *trichophylla* Phil., *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud var. *hirsuta* Phil., *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud var. *argentea* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1300-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Plantago hispidula* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Plantago callosa* Colla, *Plantago macrosperma* Steud., *Plantago subtrinervis* Phil., *Plantago stenopetala*

Phil., *Plantago disticha* Phil., *Plantago albida* Phil., *Plantago steinheilii* Barnéoud, *Plantago heterophylla* Phil., nom. illeg., *Plantago stenopetala* Phil. var. *stricta* Phil., *Plantago tumida* Link

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nombre vulgar: Llantén.

***Plantago johnstonii* Pilg.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT.

***Plantago lanceolata* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Plantago litorea* Phil.**

Sinónimos: *Plantago philippiana* Vatke, *Plantago glabriuscula* Phil., *Plantago oligantha* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-3600 m.

***Plantago lundborgii* Sparre**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Plantago major* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Plantago maritima* L.**

Sinónimos: *Plantago juncooides* Lam., *Plantago maritima* L. var. *juncooides* (Lam.) A. Gray

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Plantago pachyneura* Steud.**

Sinónimos: *Plantago durvillei* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *eupachyneura* (Pilg.) Pilg., nom. illeg., *Plantago australis* Lam. subsp. *pachyneura* (Steud.) Rahn, *Plantago pachyneura* Steud. subsp. *eupachyneura* Pilg., *Plantago hygrophila* Steud., *Plantago pachyneura* Steud. var. *hygrophila* (Steud.) Pilg., *Plantago durvillei* Fisch. & C.A. Mey. var. *hygrophila* (Steud.) Pilg., *Plantago berteroi* Steinh. ex Decne., *Plantago pachystachys* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 1300-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Plantago pulvinata*** Speg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 0-400 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Plantago rancaguae*** Steud.  
Sinónimos: *Plantago quillota* Vatke, *Plantago deserticola* Phil., *Plantago steinheilii* Barnéoud, *Plantago brachyantha* Phil., *Plantago bracteosa* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Plantago sempervivoides*** Dusén  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 700-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Plantago sericea*** Ruiz & Pav. subsp. *araucana* Rahn  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 1200 m.

***Plantago sericea*** Ruiz & Pav. subsp. *sericans* (Pilg.) Rahn  
Sinónimos: *Plantago monticola* Decne., *Plantago monticola* Decne. subsp. *sericans* Pilg., *Plantago monticola* Decne. subsp. *eumonticola* Pilg., nom. illeg.  
Hierba. Anual o bienal. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 2900-4400 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Plantago tehuelcha*** Speg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, MAG.  
Rango altitudinal: 0-900 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Plantago truncata*** Cham. & Schltld.  
Sinónimos: *Plantago australis* Lam. subsp. *truncata* (Cham. & Schltld.) Rahn, *Plantago eschscholtziana* Fisch. & C.A. Mey., *Plantago truncata* Cham. & Schltld. subsp. *eschscholtziana* (Fisch. & C.A. Mey.) Pilg., *Plantago berteroniana* Steud., *Plantago obscura* Steud., *Plantago bridgesii* Decne., *Plantago valparadisiaca* Decne., *Plantago amphibola* Phil., *Plantago angustifolia* Phil., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *angustifolia* (Phil.)

Reiche, *Plantago truncata* Cham. & Schltld. var. *philippii* Pilg.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Plantago tubulosa*** Decne.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2900-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Psike.

***Plantago uniglumis*** Wallr. ex Walp.  
Sinónimos: *Plantago coelorhiza* Morris & Macloskie, *Plantago barbata* G. Forst. var. *uncialis* Wedd., *Plantago uncialis* Decne. ex Barnéoud, *Plantago barbata* G. Forst. fma. *uncialis* (Decne. ex Barnéoud) Pilg., *Plantago uniglumis* Wallr. ex Walp. fma. *maxima* Pilg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 200-3200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## Stemodia

***Stemodia durantifolia*** (L.) Sw. var. *chilensis* (Benth.) C.C. Cowan  
Sinónimos: *Stemodia chilensis* Benth., *Stemodiocra chilensis* Kuntze  
Hierba acuática. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Contrayerba.

## Veronica

***Veronica anagallis-aquatica*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

***Veronica arvensis*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

***Veronica beccabunga*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: LLA.

**Veronica chamaedrys** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: LRI.

**Veronica officinalis** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ARA, LRI.

**Veronica peregrina** L. subsp. *xalapensis* (Kunth) Pennell  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LRI, AIS, MAG.

**Veronica persica** Poir.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,  
NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

**Veronica scutellata** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: LRI, LLA.

**Veronica serpyllifolia** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LRI, LLA, AIS, MAG.

## PLUMBAGINACEAE

### Armeria

**Armeria maritima** (Mill.) Willd.  
Sinónimos: *Armeria maritima* (Mill.) Willd. subsp. *andina* (Poepp. ex Boiss.) D.M. Moore & Yates, *Armeria andina* Poepp. ex Boiss., *Armeria macloviana* Cham., *Armeria curvifolia* Bertero, *Armeria chilensis* Boiss., *Armeria androsacea* Boiss., *Armeria brachyphylla* Boiss., *Armeria delfinii* Phil., *Armeria tenuifolia* Phil., *Armeria patagonica* Phil., *Armeria exaristata* Phil., *Armeria aegialea* Phil., *Armeria bella* Albov., *Statice punicea* Rendle, *Statice macloviana* Mackloskie, *Statice maritima* Mill.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3200 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nota: Para una completa sinonimia, ver E. Ruiz, Flora de Chile 2(3): 2. 2005.

### Bakerolimon

**Bakerolimon plumosum** (Phil.) O.A. Lincz.  
Sinónimos: *Limonium plumosum* (Phil.) Kuntze, *Statice*

*plumosa* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

### Limonium

**Limonium guaicura** (Molina) Kuntze  
Sinónimos: *Plegorrhiza guaicura* Molina, *Statice chilensis* Phil., *Plegorrhiza adstringens* Willd.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Nombre vulgar: Guaicurú.

### Plumbago

**Plumbago caerulea** Kunth  
Arbusto o subarbusto. Nativo.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

## POLEMONIACEAE

### Bryantiella

**Bryantiella glutinosa** (Phil.) J.M. Porter  
Sinónimos: *Gilia glutinosa* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-3700 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Lipelipe, pachareke, alhucema del campo, pasto de lluvia.

### Collomia

**Collomia biflora** (Ruiz & Pav.) Brand  
Sinónimos: *Gilia biflora* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Phlox biflora* Ruiz & Pav., *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn., *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. fma. *coccinea* (Lehm. ex Lindl.) Wherry, *Collomia coccinea* Lehm. ex Lindl., *Collomia soehrensi* Phil., *Collomia stenosisiphon* Kunze, *Collomia lateritia* Don, *Collomia biflora* (Ruiz & Pav.) Brand var. *lateritia* (Don) Brand, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. fma. *lateritia* (Don) Wherry, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. fma. *soehrensi* (Phil.) Wherry, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. fma. *stenosisiphon* (Kunze) Wherry, *Phlox unidentata* Bertero  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Gilia**

#### ***Gilia crassifolia*** Benth.

Sinónimos: *Gilia crassifolia* Benth. var. *andicola* (Phil.) Brand, *Gilia lanigera* Phil., *Gilia andicola* Phil., *Gilia intermedia* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

#### ***Gilia laciniata*** Ruiz & Pav.

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.  
Rango altitudinal: 0-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Latalata, comino del campo.

#### ***Gilia valdiviensis*** Griseb.

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, LLA, JFE.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nota: Introducida en la isla Más Afuera (Archipiélago Juan Fernández).

### **Ipomopsis**

#### ***Ipomopsis gossypifera*** (Gillies ex Benth.) V.E. Grant

Sinónimos: *Gilia gossypifera* Gillies ex Benth., *Gilia involucrata* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 2400-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

### **Leptosiphon**

#### ***Leptosiphon pusillus*** (Benth.) J.M. Porter & L.A. Johnson

Sinónimos: *Linanthus pusillus* (Benth.) Greene, *Gilia pusilla* Benth.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

### **Microsteris**

#### ***Microsteris gracilis*** (Hook.) Greene

Sinónimos: *Gilia gracilis* Hook., *Collomia gracilis* (Hook.) Douglas ex Benth., *Gilia gracilis* Hook. var. *minuartioides* (Franch.) Borsini, comb. illeg., *Collomia gracilis* (Hook.)

Douglas ex Benth. var. *minuartioides* Franch., *Collomia eritrichoides* Griseb., *Gilia gracilis* Hook. var. *eritrichoides* (Griseb.) Brand, *Polemonium morenonis* Kuntze, *Navarretia gracilis* (Hook.) Kuntze, *Phlox gracilis* (Hook.) Greene, *Gilia gracilis* Phil., hom. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-4100 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

### **Navarretia**

#### ***Navarretia involucrata*** Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Gilia berterii* DC., *Gilia navarretia* Steud., *Gilia mucronata* Lehm., *Gilia eryngoides* Lehm., *Collomia navarretia* G. Don  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 1000-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Polemonium**

#### ***Polemonium micranthum*** Benth.

Sinónimos: *Polemonium antarcticum* Griseb., *Polemonium gayanum* (Wedd.) Brand, *Gilia gayana* Wedd., *Gilia diffusa* Phil., *Gilia johowi* F. Meigen, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. fma. *diffusa* (Phil.) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. fma. *gayana* (Wedd.) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. fma. *johowi* (F. Meigen) Wherry  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## **POLYGALACEAE**

### **Monnina**

#### ***Monnina linearifolia*** Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Pteromonnina linearifolia* (Ruiz & Pav.) B. Eriksen  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Agua-rica, quelén-quelén.

***Monnina philippiana*** Chodat

Sinónimos: *Monnina pterocarpa* Ruiz & Pav. var. *angustifolia* (DC.) Hook. & Arn., *Pteromonnina philippiana* (Chodat) B. Eriksen, *Monnina angustifolia* auct. non DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 100-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

**Polygala**

***Polygala darwiniana*** A.W. Benn.

Sinónimos: *Acanthocladus tehuelchum* Speg., *Polygala tehuelchum* (Speg.) Speg.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Polygala gayi*** A.W. Benn.

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

***Polygala gnidioides*** Willd.

Sinónimos: *Polygala thesioides* Willd., *Polygala pratensis* Phil., *Polygala eutaxoides* Turcz.

Hierba. Bienal o perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chin-chín, quelén-quelén, clinclín, quelulahuén.

***Polygala persistens*** A.W. Benn.

Sinónimos: *Polygala paradoxa* Chodat

Hierba. Bienal o perenne. Nativa.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Polygala salasiana*** Gay

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Polygala solieri*** Gay

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2800-3000 m.

***Polygala subandina*** Phil.

Sinónimos: *Polygala oxyantha* Phil., *Polygala philippiana* Chodat, *Polygala mendocina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

**POLYGONACEAE**

**Chorizanthe**

***Chorizanthe commissuralis*** J. Remy

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pegadera, kinchanlawá.

***Chorizanthe dasyantha*** Phil.

Sinónimos: *Chorizanthe fasciculata* Phil., *Chorizanthe humilis* Phil., *Chorizanthe illapelina* Phil., *Chorizanthe intricata* Phil., *Chorizanthe parviflora* Phil., *Chorizanthe tenuis* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

***Chorizanthe densa*** Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 800-900 m.

***Chorizanthe deserticola*** Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Chorizanthe flavescens*** Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Chorizanthe frankenioides*** J. Remy

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Chorizanthe gajardoi*** Teillier & Macaya

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1850-1950 m.



***Chorizanthe glabrescens* Benth.**

Sinónimos: *Chorizanthe tenuis* Phil., *Chorizanthe vaginata* Benth. var. *arida* J. Remy  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ.

***Chorizanthe kingii* Phil.**

Sinónimos: *Chorizanthe pauciflora* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Chorizanthe mieresii* Teillier & Macaya**

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 3-260 m.

***Chorizanthe navasiae* Teillier & Macaya**

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 5-280 m.

***Chorizanthe novoana* Teillier & Macaya**

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Chorizanthe paniculata* Benth.**

Sinónimos: *Chorizanthe macraei* Benth., *Chorizanthe macraei* Benth. var. *humilis* Benth., *Chorizanthe ramosissima* Benth., *Chorizanthe rosea* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Nombre vulgar: Sanguinaria.

***Chorizanthe peduncularis* Benth.**

Sinónimos: *Chorizanthe umbellata* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.

***Chorizanthe rosasii* Teillier & Macaya**

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 1700-2600 m.

***Chorizanthe vaginata* Benth.**

Sinónimos: *Chorizanthe vaginata* Benth. var. *maritima* J. Remy  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Chorizanthe virgata* Benth.**

Sinónimos: *Chorizanthe virgata* Benth. var. *tomentosa* Benth.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 900 m.

***Chorizanthe viridis* Phil.**

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 800-1100 m.

**Emex**

***Emex spinosa* (L.) Campd.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ.

**Fallopia**

***Fallopia japonica* (Houtt.) Ronse Decr.**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: LLA, AIS.

***Fallopia sachalinensis* (F. Schmidt)**

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: LLA.

**Koenigia**

***Koenigia islandica* L.**

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: MAG.

**Lastarriaea**

***Lastarriaea chilensis* J. Remy**

Sinónimos: *Lastarriaea linearis* Phil. ex Parry, *Lastarriaea stricta* Phil., *Chorizanthe chilensis* (J. Remy) Goodman, *Chorizanthe lastarriaea* Parry, nom. illeg.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-200 m.

**Muehlenbeckia**

***Muehlenbeckia fruticulosa* (Walp.) Standl.**

Sinónimos: *Polygonum fruticosum* Walp.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 3400-3500 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Visvisa.

***Muehlenbeckia hastulata*** (Sm.) I.M. Johnst. var. *fascicularis* (Meisn.) Brandbyge

Sinónimos: *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *fascicularis* Meisn.

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Muehlenbeckia hastulata*** (Sm.) I.M. Johnst. var. *hastulata*

Sinónimos: *Muehlenbeckia chilensis* Meisn., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *brachybotrys* Meisn., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *injucunda* (Lindl.) Meisn., *Polygonum hastulatum* (Sm.) Kuntze, *Polygonum injucunda* Lindl., *Rumex hastulatus* Sm., *Karkinetron undulatum* Raf., *Calacinum chilense* (Meisn.) J.F. Macbr.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Mollaca, quilo, voqui negro.

***Muehlenbeckia hastulata*** (Sm.) I.M. Johnst. var. *rotundata* (Phil.) Brandbyge

Sinónimos: *Muehlenbeckia rotundata* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: NUB, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

## Oxytheca

***Oxytheca dendroidea*** Nutt. subsp. *chilensis* (J. Remy) Ertter

Sinónimos: *Brisegnoa chilensis* J. Remy, *Oxytheca apiculata* Miers ex Benth., nom. nud., *Oxytheca spiculata* Miers

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2100-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

## Persicaria

***Persicaria maculosa*** Gay

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

## Polygonum

***Polygonum acuminatum*** Kunth

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, IPA.

Nombre vulgar: Tavari (Rapa Nui).

***Polygonum aviculare*** L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Polygonum bowenkampii*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

***Polygonum brasiliense*** K. Koch

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AIS, MAG.

***Polygonum campanulatum*** Hook. f.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA, AIS.

***Polygonum convolvulus*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

***Polygonum hydropiper*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO, LLA.

***Polygonum hydropiperoides*** Michx.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

***Polygonum lapathifolium*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Polygonum maritimum*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, NUB, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Polygonum mite*** Schrank

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

***Polygonum orientale*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, BIO, ARA.

***Polygonum sanguinaria*** J. Remy

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, AIS.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Nombre vulgar: Sanguinaria.

**Rumex**

***Rumex acetosa*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

***Rumex acetosella*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Rumex conglomeratus*** Murray var. *vulgaris* Wallr.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

***Rumex crispissimus*** Kuntze

Sinónimos: *Rumex decumbens* Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Rumex crispus*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Rumex cristatus*** DC.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, LLA.

***Rumex cuneifolius*** Campd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, VAL, RME, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Rumex darwinianus*** Rech. f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Rumex longifolius*** DC.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG.

***Rumex magellanicus*** Campd.

Sinónimos: *Rumex hippiatricus* J. Remy, *Rumex magellanicus* Griseb., hom. illeg., *Rumex magellanicus* Campd. var. *dusenii* Rech.f., *Rumex erosus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Huaicrahu.

***Rumex maricola*** J. Remy

Sinónimos: *Rumex cuneifolius* Campd. var. *maricola* (J. Remy) Rech.f., *Rumex arenarius* Poepp. ex Endl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Rumex maritimus*** L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAG.

***Rumex obtusifolius*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Rumex patagonicus*** Rehb.f.

Sinónimos: *Rumex chiloensis* Rehb.f.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Rumex pulcher*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG, JFE.

***Rumex romassa*** J. Remy

Sinónimos: *Rumex asplundii* Rech.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

**PORTULACACEAE**

**Portulaca**

***Portulaca oleracea*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA.

***Portulaca philippii*** I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 500-3600 m.

Países limítrofes: Bolivia.

## PRIMULACEAE

### Anagallis

***Anagallis alternifolia*** Cav. var. *alternifolia*

Sinónimos: *Anagallis alternifolia* Cav. var. *minor* R. Knuth,

*Anagallis alternifolia* Cav. var. *tenelliformis* R. Knuth fma.

*laxa* R. Knuth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,

NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Anagallis alternifolia*** Cav. var. *repens* (d'Urv.) Knuth

Sinónimos: *Lysimachia repens* d'Urv., *Anagallis alternifolia*

Cav. var. *densifolia* Hook.f., *Euparea chilensis* Baudo,

*Anagallis alternifolia* Cav. var. *angustifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,

BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Anagallis arvensis*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO,

MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA.

### Androsace

***Androsace salasii*** Kurtz

Sinónimos: *Collomia pusilla* Dusén, *Androsace pusilla*

(Dusén) Lourteig

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

### Centunculus

***Centunculus minimus*** L.

Sinónimos: *Anagallis minima* (L.) E.H.L. Krause

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LLA, JFE.

### Lysimachia

***Lysimachia sertulata*** Baudo

Sinónimos: *Lysimachia chilensis* (Griseb.) Knuth,

*Lysimachia marginata* Macloskie, *Lysimachia umbellata*

Phil., *Theopyxis chilensis* Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Melilukul.

### Pelletiera

***Pelletiera verna*** A. St.-Hil.

Sinónimos: *Pelletiera serpyllifolia* (Poir.) Kuntze,

*Asterolinon serpyllifolium* (Poir.) Ball, *Asterolinon trinum*

Baudo

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### Primula

***Primula comberi*** W.W. Sm.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Primula magellanica*** Lehm.

Sinónimos: *Primula decipiens* Duby, *Primula farinosa* L.

var. *magellanica* (Lehm.) Hook.f., *Primula farinosa* L.

subsp. *magellanica* (Lehm.) W.W. Sm. & Forrest

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Primula, oreja de oso.

### Samolus

***Samolus latifolius*** Duby

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

***Samolus repens*** (J.R. Forst. & G. Forst.) Pers.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO.

Nota: Se encuentra también en Australia.

***Samolus spathulatus*** (Cav.) Duby

Sinónimos: *Androsace spathulata* Cav., *Primula pistiifolia*

Griseb., *Steirostemon spathulatus* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

*Samolus valerandi* L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 10-2500 m.

## PROTEACEAE

### Embothrium

*Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst.  
Sinónimos: *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *cavanillesii* Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *oblanceolatum* Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *lanceolatum* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. var. *obovatum* Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst. fma. *lanceolatum* (Ruiz & Pav.) R.L. Pérez-Mor., *Embothrium lanceolatum* Ruiz & Pav., *Embothrium valdivianum* Gand., *Embothrium gilliesii* Meisn.  
Árbol. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Notro, notru, ciruelillo, fosforito, treumún.

### Gevuina

*Gevuina avellana* Molina  
Sinónimos: *Quadria heterophylla* Ruiz & Pav., *Quadria avellana* (Molina) Gaertn.  
Árbol. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 100-700 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Avellano, Gevuín.

### Lomatia

*Lomatia dentata* (Ruiz & Pav.) R. Br.  
Sinónimos: *Embothrium dentatum* Ruiz & Pav., *Tricondylus dentatus* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Lomatia dentata* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *acutifolia* Meisn., *Lomatia dentata* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *obtusifolia* Meisn.  
Árbol. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Avellanillo, piñol, guardafuego, palo negro.

*Lomatia ferruginea* (Cav.) R. Br.  
Sinónimos: *Embothrium ferrugineum* Cav., *Tricondylus ferrugineus* (Cav.) Salisb., *Lomatia pinnatifida* Hort ex Thornton, nom. nud.  
Árbol. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-800 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Fuínque, romerillo, huínque, piuné, moré.

*Lomatia hirsuta* (Lam.) Diels subsp. *obliqua* (Ruiz & Pav.) R.T. Penn.  
Sinónimos: *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br., *Tricondylus obliqua* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *alnifolia* (Poepp. ex Meisn.) Meisn., *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *subintegrifolia* Meisn., *Embothrium obliquum* Ruiz & Pav.  
Árbol. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Radal, raral, nogal silvestre.

### Orites

*Orites myrtoidea* (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook.f. ex B.D. Jacks.  
Sinónimos: *Lomatia chilensis* Gay, *Roupala myrtoidea* Poepp. & Endl., *Lomatia alpina* Phil., nom. nud., *Embothrium myrtifolium* Poepp. ex Meisn., *Tricondylus chilensis* (Gay) Kuntze  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 700-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Radal enano.

## QUILLAJACEAE

### Quillaja

*Quillaja saponaria* Molina  
Sinónimos: *Quillaja molinae* DC., *Quillaja poeppigii* Walp., *Smegmadermos emarginatus* Ruiz & Pav., *Smegmaria emarginata* (Ruiz & Pav.) Willd.  
Árbol. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.



Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Quillay.

## RAFFLESIACEAE

### *Pilostyles*

#### *Pilostyles berteroi* Guill.

Sinónimos: *Apodanthes berteroi* (Guill.) Gardner, *Frostia berteroi* H. Karst.

Hierba parásita. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, NUB.

Rango altitudinal: 0-3700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

## RANUNCULACEAE

### *Anemone*

#### *Anemone antucensis* Poepp.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 100-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Anemone decapetala* Ard. var. *decapetala*

Sinónimos: *Anemone trilobata* Juss., *Anemone chilensis* Spreng. ex Pritz., nom. nud., *Anemone decapetala* Ard. fma. *primaria* Eichler, *Anemone chilensis* Spreng. ex Eichler, nom. nud., *Anemone decapetala* Ard. var. *grandifolia* Eichler, *Anemone polypetala* Larrañaga, *Anemone bilobata* Phil., *Anemone chilensis* Spreng. ex Eichler, *Anemone chilensis* Spreng. ex Pritzel, *Anemone macrorrhiza* Dombey ex Eichler

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Centella.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

#### *Anemone decapetala* Ard. var. *foliolosa* Eichler

Sinónimos: *Anemone cicutifolia* I.M. Johnst., *Anemone triternata* Vahl, *Anemone decapetala* Ard. var. *triloba* Juss. ex Lorentz, *Anemone fumariaefolia* Juss., *Anemone decapetala* Ard. var. *triternata* (Vahl) Kuntze, *Anemone decapetala* Niederl., *Anemone tridentata* Britton

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Centella, flor de la esperanza.

#### *Anemone hepaticifolia* Hook.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Flor de la estrella.

#### *Anemone moorei* Espinosa

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 500 m.

Nombre vulgar: Pata de león.

#### *Anemone multifida* Poir.

Sinónimos: *Anemone multifida* Poir. var. *grandiflora* Rendle, *Anemone multifida* Poir. var. *lanigera* (Gay) Ulbr., *Anemone commersoniana* Richardson ex Spreng., *Anemone multifida* Poir. var. *magellanica* DC., *Anemone multifida* Poir. var. *commersoniana* (Richardson ex Spreng.) Ulbr., *Anemone multifida* Poir. var. *hudsoniana* DC., *Anemone lanigera* Gay, *Anemone multifida* Poir. var. *uniflora* DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Anemone rigida* Gay

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

### *Aquilegia*

#### *Aquilegia vulgaris* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

### *Barneoudia*

#### *Barneoudia balliana* Britton

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 3000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Barneoudia chilensis* Gay

Sinónimos: *Barneoudia cyanoleuca* Leyb., *Barneoudia domeykoana* Leyb., *Anemone chilensis* (Gay) Kurtz, *Anemone chilensis* (Gay) Reiche, comb. illeg., *Anemone barneoudia* Kuntze, *Anemone gayana* R. Wagner

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Barneoudia major*** Phil.

Sinónimos: *Anemone major* (Phil.) F. Meigen, *Anemone major* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Barneoudia maxima* Leyb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 1000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Callianthemoides**

***Callianthemoides semiverticillata*** (Phil.) Tamura

Sinónimos: *Anemone myriophylla* Speg., *Ranunculus pseudosemiverticillatus* Espinosa & C. Rudolph, *Ranunculus semiverticillatus* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA.  
Rango altitudinal: 100-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Caltha**

***Caltha appendiculata*** Pers.

Sinónimos: *Caltha appendiculata* Pers. var. *chilensis* Huth, *Caltha limbata* Schtdl., *Caltha paradoxa* Sol. ex T.F. Forst., *Psychrophila appendiculata* (Pers.) Gay, *Caltha holophylla* Leyb., *Psychrophila holophylla* Leyb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Caltha dioneifolia*** Hook.f.

Sinónimos: *Psychrophila dioneifolia* (Hook.f.) Gay  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Caltha sagittata*** Cav.

Sinónimos: *Caltha involuta* A.W. Hill, *Caltha alata* A.W. Hill, *Caltha sagittata* Cav. var. *latifolia* Huth, *Psychrophila sagittata* (Cav.) Gay, *Psychrophila andicola* Gay, *Caltha multcapsularis* Sol. ex T.F. Forst., *Caltha andicola* (Gay) Walp., *Caltha de rancho* Steud., *Caltha digitata* A. Cunn.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Maillico.

**Clematis**

***Clematis bonariensis*** Juss. ex DC.

Arbusto trepador. Introducido.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 120-320 m.

***Clematis montevidensis*** Spreng.

Arbusto trepador. Introducido.  
Distribución: ATA.

**Halerpestes**

***Halerpestes cymbalaria*** (Pursh) Greene

Sinónimos: *Ranunculus microcarpus* J. Presl, *Ranunculus tridentatus* Kunth ex DC., *Ranunculus pozoaefolius* Gay, *Ranunculus minutus* Gay, *Ranunculus hemignostus* Steud., *Ranunculus maritimus* Phil., *Ranunculus minutus* Gay var. *microphylla* Phil. ex Reiche, *Ranunculus cymbalaria* Pursh, *Ranunculus cymbalaria* Pursh var. *americanus* DC., *Ranunculus tridentatus* Kunth ex DC. var. *major* DC., *Ranunculus tridentatus* Kunth ex DC. var. *minor* DC., *Ranunculus microcarpus* J. Presl var. *maritima* Phil., *Halerpestes tridentata* (Kunth ex DC.) Greene  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Halerpestes exilis*** (Phil.) Tamura

Sinónimos: *Ranunculus cymbalaria* Pursh fma. *exilis* (Phil.) Lourteig, *Ranunculus cymbalaria* Pursh var. *exilis* (Phil.) R.E. Fr., *Ranunculus exilis* Phil., *Ranunculus minutus* Gay var. *exilis* (Phil.) Reiche, *Ranunculus minutiusculus* Ulbr.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2000-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Halerpestes uniflora*** (Phil. ex Reiche) Emadzade, Lehnebach, P. Lockh. & Hörandl

Sinónimos: *Ranunculus pseudocaltha* Chodat & Wilczek, *Ranunculus pseudocaltha* Chodat & Wilczek fma. *minor* Chodat & Wilczek, *Ranunculus uniflorus* Phil. ex Reiche, *Ranunculus uniflorus* Phil. ex Reiche fma. *bolivianus* (Phil.) Lourteig, *Ranunculus bolivianus* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, MAU, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## Hamadryas

### *Hamadryas delfinii* Phil. ex Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Hamadryas kingii* Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Hamadryas magellanica* Lam.

Sinónimos: *Hamadryas tomentosa* DC., *Hamadryas magellanica* Lam. var. *tomentosa* (DC.) Hook.f., *Hamadryas magellanica* Franchet, *Hamadryas paniculata* Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Hamadryas sempervivoides* Sprague

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 700-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

## Myosurus

### *Myosurus apetalus* Gay

Sinónimos: *Myosurus gracilis* (Speg.) Macloskie, *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook.f. var. *apetalus* (Gay) Huth, *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook.f. var. *gracilis* Speg., *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook.f. var. *brachypoda* Speg., *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook.f.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, RME, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### *Myosurus patagonicus* Speg.

Sinónimos: *Myosurus minimus* auct. non L.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, NUB, BIO, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

## Ranunculus

### *Ranunculus acaulis* Banks & Sol. ex DC.

Sinónimos: *Ranunculus skottsbergii* Gand., *Ranunculus stenopetalus* Hook., *Ranunculus litoralis* Schldl. ex Lechl.,

nom. nud., *Ranunculus litoralis* Phil., *Ranunculus biternatus* Vallengin & Cotton, *Ranunculus uniflorus* Colenso

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Ranunculus apiifolius* Pers.

Sinónimos: *Ranunculus sceleratus* auct. non L., *Aphanostemma apiifolium* (Pers.) A. St.-Hil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Apio cimarrón.

### *Ranunculus aquatilis* L.

Hierba acuática. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

### *Ranunculus arvensis* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

### *Ranunculus biternatus* Sm.

Sinónimos: *Ranunculus exiguus* d'Urv., *Ranunculus commersonii* DC. ex Poir., *Ranunculus montteanus* Phil., *Ranunculus crassipes* Hook.f., *Ranunculus flaccidus* Banks & Sol. ex Hook.f., *Ranunculus montteanus* Phil. var. *obtusilobus* Phil. ex Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Ranunculus bonariensis* Poir. var. *trisepalus* (Gillies ex Hook. & Arn.) Lourteig

Sinónimos: *Ranunculus trisepalus* Gillies ex Hook. & Arn., *Ranunculus obtusatus* Poepp., *Ranunculus bonariensis* Poir. var. *beta* Eichler, *Ranunculus humilis* Collie ex Hook. & Arn., *Ranunculus berteronianus* Steud., nom. nud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Ranunculus caprarum* Skottsbo.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 1200 m.

***Ranunculus chilensis* DC.**

Sinónimos: *Ranunculus sericans* Steud., *Ranunculus protractus* Steud., *Ranunculus elatus* Steud., *Ranunculus berterioanus* Phil., *Ranunculus chilensis* DC. var. *lasius* Phil. ex Reiche, *Ranunculus chilensis* DC. var. *gayi* Phil. ex Reiche, *Ranunculus valdivianus* Phil. ex Reiche, *Ranunculus chilensis* DC. var. *alpha* Poepp., *Ranunculus chilensis* DC. var. *beta* Poepp.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3600 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Cáustico de vega, ranunculo.

***Ranunculus flagelliformis* Sm.**

Sinónimos: *Casalea flagelliformis* (Sm.) A. St.-Hil., *Casalea flagelliformis* (Sm.) A. St.-Hil. var. *lutescens* A. St.-Hil., *Casalea hederacea* Mart. ex Eichler

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Ranunculus fuegianus* Speg.**

Sinónimos: *Ranunculus biternatus* Wild.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus hydrophilus* Gaudich.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus maclovianus* d'Urv.**

Sinónimos: *Ranunculus colliguensis* Steud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus minutiflorus* Bertero ex Phil.**

Sinónimos: *Ranunculus savatieri* Franch., *Ranunculus aysenensis* Gand., *Ranunculus chilensis* auct. non DC., *Casalea chilensis* A. St.-Hil., *Ranunculus saxifragaefolius* Steud., *Ranunculus miser* Phil., *Ranunculus minutiflorus* Bertero ex Phil. var. *miser* (Phil.) Reiche, *Hydrocotyle pauciflora* Phil., *Ranunculus berterioanus* Presl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,

LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus muricatus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, ARA, LRI, MAG, JFE.

***Ranunculus parviflorus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

***Ranunculus peduncularis* Sm. var. *erodiifolius* (Gay) Reiche**

Sinónimos: *Ranunculus erodiifolius* Gay, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *polypetalus* (Gillies ex Hook. & Arn.) Macloskie, *Ranunculus polypetalus* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Ranunculus andinus* Phil., *Ranunculus polypetalus* Gillies ex Hook. & Arn. var. *acaulis* Gillies

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus peduncularis* Sm. var. *peduncularis***

Sinónimos: *Ranunculus alboffii* Macloskie, *Ranunculus glandulifer* Poepp., *Ranunculus patagonicus* Poepp., *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *alboffiana* Speg., *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *glandulifer* (Poepp.) Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *patagonicus* (Poepp.) Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *minor* Wedd. ex Franch., *Ranunculus gilliesii* Steud., *Ranunculus talquinus* Phil. ex Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *glabrata* Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *saffordi* Phil. ex Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *longavinus* Phil. ex Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *chillanensis* Phil. ex Reiche, *Ranunculus polypetalus* Steud. nom. nud., *Ranunculus pratensis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus pseudotrullifolius* Skottsbo.**

Sinónimos: *Ranunculus dusenii* Lourteig, *Ranunculus caespitosus* Dusén, *Ranunculus trullifolius* Dusén, hom. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus repens* L. var. *flore-pleno* DC.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

***Ranunculus repens* L. var. *repens***

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Ranunculus sceleratus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO.

***Ranunculus sericocephalus* Hook.f.**

Sinónimos: *Ranunculus fueginos* Phil. ex Reiche, *Ranunculus sericocephalus* Hook.f. var. *major* Albov, *Ranunculus phillipianus* De Wild.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus spegazzinii* Lourteig**

Sinónimos: *Ranunculus oligocarpus* Speg., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus trichophyllus* Chaix**

Sinónimos: *Ranunculus aquatilis* auct. non L., *Ranunculus aquatilis* L. var. *caespitosa* auct. non DC., *Ranunculus aquatilis* L. var. *capillacea* auct. non DC., *Ranunculus fluitans* Lam. fma. *minor* auct. non Gelert, *Ranunculus fluitans* Lam. var. *fluviatilis* auct. non (G. Weber ex F.H. Wigg.) Gelert, *Ranunculus curvirostris* Freyn

Hierba acuática. Anual. Nativa.

Distribución: LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Ranunculus trullifolius* Hook.f.**

Sinónimos: *Ranunculus monanthos* Phil., *Ranunculus monanthos* Phil. var. *chiloensis* Phil. ex Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

## RESEDACEAE

### Reseda

***Reseda decursiva* Forssk.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: VAL.

***Reseda lutea* L.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: NUB, BIO.

***Reseda luteola* L.**

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: VAL, BIO.

***Reseda odorata* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA.

***Reseda phyteuma* L.**

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: ATA, BIO.

## RHAMNACEAE

### Colletia

***Colletia hystrix* Clos**

Sinónimos: *Colletia valdiviana* Phil., *Colletia spinosa* Lam. var. *armata* (Miers) Reiche, *Colletia armata* Miers, *Colletia pungens* Miers, *Colletia spinosa* Lam. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. var. *valdiviana* (Phil.) Escal., *Colletia aciculata* Miers, *Colletia armata* Miers var. *insularis* Miers, *Colletia brevispina* Phil., *Colletia cataphracta* Miers, *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *veprecula* (Miers) Suess., *Colletia hystrix* Clos var. *brevispina* (Phil.) Reiche, *Colletia spinosa* Lam., *Colletia tomentosa* Phil., *Colletia spinosa* Lam. var. *cataphracta* (Miers) Reiche, *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *dumosa* (Miers) Suess., *Colletia spinosa* Lam. var. *pungens* (Miers) Reiche, *Colletia veprecula* Miers, *Colletia spinosa* Lam. var. *veprecula* (Miers) Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Crucero, yaquil.

***Colletia spartioides* Bertero ex Colla**

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.



Rango altitudinal: 0-600 m.

Nombre vulgar: Yaquil.

***Colletia ulicina*** Gillies & Hook.

Sinónimos: *Colletia valenzuela* Bertero ex Steud., nom. nud.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Crucero, junco minero, yaquil.

### **Discaria**

***Discaria articulata*** (Phil.) Miers

Sinónimos: *Colletia articulata* Phil., *Retamilia articulata* (Phil.) Miers

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Crucero, yaquil.

***Discaria chacaye*** (G. Don) Tortosa

Sinónimos: *Colletia chacaye* G. Don, *Colletia discolor* Hook., *Colletia crenata* Clos, *Colletia serratifolia* Vent. var. *foliosa* Hook. & Arn., *Notophaena magellanica* Miers, *Notophaena cognata* Miers, *Discaria cognata* (Miers) Reiche, *Colletia montana* Phil., *Colletia dumosa* Phil., *Discaria magellanica* (Miers) Reiche, *Colletia nivalis* Phil., *Discaria foliosa* (Hook. & Arn.) Reiche, *Discaria crenata* (Clos) Regel, *Colletia serratifolia* auct. non Vent., *Discaria dumosa* (Phil.) Reiche, *Discaria montana* (Phil.) Reiche, *Notophaena discolor* (Hook.) Miers, *Notophaena foliosa* (Hook. & Arn.) Miers, *Discaria discolor* (Hook.) Reiche, comb. illeg.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chacaye.

***Discaria nana*** (Clos) Benth. & Hook. ex Weberb.

Sinónimos: *Colletia nana* Clos, *Ochetophila parvifolia* Miers, *Ochetophila prostrata* Miers, nom. illeg., *Colletia stipellacea* Phil., *Discaria prostrata* (Miers) Reiche, nom. illeg., *Discaria nana* (Clos) Benth. & Hook. ex Weberb. var. *inermis* Kuntze, *Discaria prostrata* (Miers) Reiche var. *inermis* Chodat & Wilczek, nom. nud., *Ochetophila nana* (Clos) J. Kellerm., *Medán* & Aagesen

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Discaria trinervis*** (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche

Sinónimos: *Sageretia trinervis* Gillies ex Hook. & Arn., *Ochetophila hookeriana* Reissek ex Clos, nom. illeg., *Colletia doniana* Clos, *Discaria doniana* (Clos) Weberb., *Rhamnus linearis* Clos, *Ochetophila trinervis* (Gillies ex Hppk.) Poepp. ex Miers

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chacay.

### **Retanilla**

***Retanilla ephedra*** (Vent.) Brongn.

Sinónimos: *Retanilla ephedra* (Vent.) Brongn. var. *crassa* (Phil.) Reiche, *Colletia ephedra* Vent., *Colletia obcordata* Vent., *Retanilla obcordata* (Vent.) Brongn., *Retanilla crassa* Phil., *Retanilla moelleri* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Retamilla, coquilla, camán, yaquil.

***Retanilla stricta*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Trevoa frutilla* Steud., nom. nud., *Retanilla affinis* Clos

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 200-1500 m.

Nombre vulgar: Frutilla del campo.

***Retanilla trinervia*** (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Trevoa trinervia* Gillies & Hook., *Colletia trebu* Bertero ex Colla, *Trevoa trinervis* Miers, nom. nud.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Nombre vulgar: Trevu, trevo.

### **Rhamnus**

***Rhamnus diffusus*** Clos

Sinónimos: *Colletia maytenoides* Griseb., *Sciadophila maytenoides* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Nombre vulgar: Murta negra, palo negro, molfuenmamel.

## Trevoa

### *Trevoa quinquenervia* Gillies & Hook.

Sinónimos: *Talguenea quinquenervia* (Gillies & Hook.) I.M. Johnst., *Talguenea costata* Miers, *Colletia tralhuen* Bertero ex Colla, *Talguenea costata* Hook. & Arn., nom. illeg., *Talguenea mollis* Miers, nom. illeg.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Nombre vulgar: Tralhuén, talguén, tuluhuén.

## ROSACEAE

### Acaena

#### *Acaena alpina* Poepp. ex Walp.

Sinónimos: *Acaena digitata* Phil., *Acaena digitata* Phil. var. *latifoliolata* Bitter, *Acaena digitata* Phil. var. *subpinnata* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 2200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Acaena antarctica* Hook.f.

Sinónimos: *Acaena microcephala* Schldl., *Acaena pearcei* Phil., *Acaena pumila* Phil., hom. illeg., *Acaena tenuifolia* Bitter, *Acaena pearcei* Phil. var. *glabrinervis* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1000-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Acaena argentea* Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *breviscapa* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. fma. *nigricans* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. fma. *viridis* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *coriacea* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *grandiceps* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *interrupte-pinnata* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *lanigera* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *subcalvescens* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. fma. *epargyrea* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 700-1000 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Cadillo, trun, amor seco, zarparrilla, proquín.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

#### *Acaena caespitosa* Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Acaena integerrima* Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Acaena integerrima* Gillies ex Hook. & Arn. var. *oligantha* Bitter, *Acaena integerrima* Gillies ex Hook. & Arn. var. *subpiloscupula* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Acaena leptacantha* Phil.

Sinónimos: *Acaena capitata* Phil., *Acaena leptacantha* Phil. var. *conferta* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. subsp. *connectens* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. var. *longissima* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. var. *negeri* (E. Duse) Bitter, *Acaena macrocephala* Poepp. var. *negeri* E. Duse

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1000-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pimpinela.

#### *Acaena lucida* (Aiton) Vahl

Sinónimos: *Ancistrum lucidum* Aiton, *Acaena parvifolia* Phil., *Acaena lucida* (Lam.) Vahl, nom. illeg., *Acaena lucida* (Lam.) Vahl var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Ancistrum lucidum* Lam., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 700-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Acaena macrocephala* Poepp.

Sinónimos: *Acaena macrocephala* Poepp. var. *caput-medusae* Bitter, nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

#### *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl

Sinónimos: *Acaena canescens* Phil., *Acaena glandulifera* Bitter, *Acaena glaucella* Bitter, *Acaena krausei* Phil., *Acaena laevigata* Aiton, *Acaena macropoda* Bitter, *Ancistrum magellanicum* Lam., *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl, *Acaena acutifida* Bitter, *Acaena brachyglochis* Bitter, *Acaena colchaguensis* Bitter, *Acaena hirsuta* Phil., *Acaena cadilla* Hook.f., *Acaena closiana* Gay, *Acaena coxi* Phil.,

*Acaena petiolulata* Phil., *Acaena macrostemon* Hook.f., *Acaena depauperata* Bitter, *Acaena exaltata* Bitter, *Acaena grandistipula* Bitter, *Acaena grossifolia* Bitter, *Acaena hirta* Citerne, *Acaena humilis* Bitter, *Acaena ischnostemon* Bitter, *Acaena krausei* Phil. var. *hirsuta* (Phil.) Reiche, *Acaena krausei* Phil. var. *massonandra* Bitter, *Acaena krausei* Phil. var. *meionandra* Bitter, *Acaena laevigata* Aiton var. *venulosa* (Griseb.) Reiche, *Acaena longiaristata* H. Ross, *Acaena longistipula* Bitter, *Acaena macrophytes* Bitter, *Acaena macrostemon* Hook.f. subsp. *closiana* (Gay) Bitter, *Acaena macrostemon* Hook.f. var. *basipilosa* Bitter, *Acaena macrostemon* Hook.f. subsp. *longiaristata* (H. Ross) Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *pygmaea* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl var. *glabrescens* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *venulosa* (Griseb.) Bitter, *Acaena neglecta* Bitter, *Acaena obtusiloba* Bitter, *Acaena oligoglochis* Bitter, *Acaena pliglochis* Bitter, *Acaena rubescens* Bitter, *Acaena subflaccida* Bitter, *Acaena venulosa* Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Amor seco, cadilla, trun, sitor.

***Acaena masafuerana* Bitter**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 1000-1100 m.

***Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Acaena elegans* Gay, *Acaena micranthera* Bitter, *Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav. subsp. *elegans* (Gay) Bitter, *Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav. var. *elegans* (Gay) Reiche, *Acaena tenuipila* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Cadillo.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Acaena patagonica* A.E. Martic.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Acaena multifida* Hook.f., *Acaena multifida* Hook.f. var. *utriquepilosa* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *pliacantha* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz

& Pav. var. *depauperata* Bitter, *Acaena calcitraba* Phil., *Acaena euacantha* Phil., *Acaena leptophylla* Phil., *Acaena longifolia* Phil., *Acaena multifida* Hook.f. subsp. *intercedens* Bitter, *Acaena multifida* Hook.f. subsp. *quinquefida* Bitter, *Acaena oligacantha* Phil., *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *macrura* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *heterotricha* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *parvifrons* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *hypoleuca* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *liocarpa* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *longifolia* (Phil.) Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *nudiscapa* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *oligacantha* (Phil.) Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *intermedia* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *uspallatensis* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *calcitraba* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *euacantha* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *leptophylla* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *longifolia* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *oligacantha* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1300-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cadillo, amor seco, pimpinela, pimpinela cimarrona, cepacaballo.

***Acaena platyacantha* Speg.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena poeppigiana* Gay**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 2400-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena pumila* Vahl**

Sinónimos: *Acaena pumila* Vahl var. *acrocoma* Bitter, *Acaena glaberrima* Phil., *Acaena pumila* Vahl var. *glaberrima* (Phil.) Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 900-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena sericea* J. Jacq.**

Sinónimos: *Acaena fuegina* Phil., *Acaena cuneata* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Acaena splendens*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *gracilis* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *brachyphylla* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *brevisericea* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *macrophylla* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Abrojo, cadillo, choncli, amores secos, cepacaballo.

***Acaena tenera*** Albov

Sinónimos: *Acaena antarctica* Hook.f. var. *laxiuscula* Bitter  
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena trifida*** Ruiz & Pav. var. *glabrescens* Regel & Körn.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, RME.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Acaena trifida*** Ruiz & Pav. var. *trifida*

Sinónimos: *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *quinquefida* (Phil.) Reiche, *Acaena quinquefida* Phil., *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *mollissima* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *nanodes* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *robusta* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *argentella* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *plurifoliolata* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *brachyphylla* Bitter

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Pimpinela, amores secos.

**Aphanes**

***Aphanes arvensis*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, RME, LBO, ARA, LLA.

***Aphanes berteriana*** Rothm. fma. *berteriana*

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LBO.

Rango altitudinal: 200-900 m.

***Aphanes berteriana*** Rothm. fma. *vegeta* Rothm.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LBO.

Rango altitudinal: 200-900 m.

***Aphanes looseri*** (Rothm.) Rothm.

Sinónimos: *Alchemilla looseri* Rothm.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 500-700 m.

***Aphanes neglecta*** (Rothm.) Rothm.

Sinónimos: *Alchemilla neglecta* Rothm.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

**Cotoneaster**

***Cotoneaster francheti*** Bois.

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL.

Nombre vulgar: Cotoneaster.

**Duchesnea**

***Duchesnea indica*** (Andrews) Focke

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA.

**Fragaria**

***Fragaria chiloensis*** (L.) Mill.

Sinónimos: *Fragaria chilensis* Ehrh., *Fragaria vesca* L. var. *chiloensis* L., *Fragaria chilensis* Ehrh. var. *tincta* Ser., *Fragaria chiloensis* (L.) Mill., *Fragaria chiloensis* (L.) Duchesne, nom. illeg., *Potentilla chiloensis* (L.) Mabb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Frutilla, lahueña.

**Geum**

***Geum andicola*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Sierversia andicola* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.



***Geum involucratum*** Pers.

Sinónimos: *Oncostylus involucratus* (Pers.) F. Bolle, *Geum parviflorum* Comm. ex Sm.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Geum lechlerianum*** Schltld.

Sinónimos: *Oncostylus lechlerianus* (Schltld.) F. Bolle  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Geum magellanicum*** Comm. ex Pers.

Sinónimos: *Geum chilense* auct. non Balb. ex Ser.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Geum quellyon*** Sweet

Sinónimos: *Geum coccineum* Lindl., hom. illeg., *Geum grandiflorum* Steud., *Geum chilense* Balb. ex Ser., *Geum coccineum* Sibth. & Sm.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2600 m.  
Nombre vulgar: Yerba del clavo, llallante, quillón.

**Kageneckia**

***Kageneckia angustifolia*** D. Don

Árbol. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-3200 m.  
Nombre vulgar: Olivillo, pulpica, frangel.

***Kageneckia oblonga*** Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Kageneckia crataegoides* D. Don, *Kageneckia crataegifolia* Lindl., *Kageneckia ovata* Colla, *Lydaea lyday* Molina  
Árbol. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 300-600 m.  
Nombre vulgar: Huayu, huayu colorado, bollén.

**Lachemilla**

***Lachemilla diplophylla*** (Diels) Rothm.

Sinónimos: *Alchemilla diplophylla* Diels  
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3900-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Pasto, champa del bofedal.

***Lachemilla pinnata*** (Ruiz & Pav.) Rothm.

Sinónimos: *Alchemilla calchaquina* Lillo, *Alchemilla pinnata* Ruiz & Pav., *Alchemilla alata* Ruiz & Pav. ex Steud., *Aphanes alata* Steud., *Aphanes pinnata* Pers., *Zygalmilla pinnata* (Ruiz & Pav.) Rydb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3600-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Lachemilla sandiense*** (Pilg.) Rothm.

Sinónimos: *Alchemilla sandiense* Pilg.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4500-4700 m.

**Margyacaena**

***Margyacaena x skottsbergii*** Bitter

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 200-400 m.  
Nota: Extinta en estado silvestre. Origen híbrido entre *Acaena argentea* y *Margyricarpus dyginus*.

**Margyricarpus**

***Margyricarpus digynus*** (Bitter) Skottsbb.

Sinónimos: *Margyricarpus setosus* Ruiz & Pav. var. *digynus* Bitter  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 100-500 m.  
Nombre vulgar: Hierba de la perlilla, perla, romerillo, sabinilla.

***Margyricarpus pinnatus*** (Lam.) Kuntze

Sinónimos: *Empetrum pinnatum* Lam., *Margyricarpus setosus* Ruiz & Pav., *Margyricarpus imberbis* C. Presl  
Arbusto o subarbusto. Nativo.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Perlilla, perla, sabinilla, romerillo.



## Polylepis

### *Polylepis rugulosa* Bitter

Sinónimos: *Polylepis tenuiruga* Bitter

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3000-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Keñoa, keñua.

### *Polylepis tarapacana* Phil.

Sinónimos: *Polylepis tarapacana* Phil. var. *multisquamata*

Bitter, *Polylepis tarapacana* Phil. var. *brevifilamentosa*

Bitter, *Polylepis tarapacana* Phil. var. *pycnolopha* Bitter,

*Polylepis tarapacana* Phil. var. *sajamensis* Bitter

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3900-4700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Queñoa, queñua.

## Potentilla

### *Potentilla anserina* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,

AIS, MAG.

### *Potentilla reptans* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME.

## Prunus

### *Prunus cerasus* L.

Árbol. Introducido.

Distribución: JFE.

Nombre vulgar: Cerezo.

## Rosa

### *Rosa canina* L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: RME, MAU, BIO, LLA.

### *Rosa rubiginosa* L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,

LLA, AIS, MAG.

## Rubus

### *Rubus constrictus* P.J. Müll. & Lefèvre

Arbusto. Introducido.

Distribución: COQ, BIO, ARA, LRI, LLA.

Nombre vulgar: Mora, murra.

### *Rubus geoides* Sm.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Miñe miñe, frutilla.

### *Rubus praecox* Bertol.

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,

LLA, JFE.

Nombre vulgar: Mora.

### *Rubus radicans* Cav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 900-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Frutilla, miñemiñe.

### *Rubus ulmifolius* Schott

Arbusto. Introducido.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LLA, JFE.

Nombre vulgar: Mora.

## Sanguisorba

### *Sanguisorba minor* Scop.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA.

## Tetraglochin

### *Tetraglochin acanthocarpum* (Speg.) Speg.

Sinónimos: *Margyricarpus acanthocarpus* Speg.,

*Tetraglochin acanthocarpus* (Speg.) Speg. fma. *macropoda*

Speg., *Tetraglochin acanthocarpus* (Speg.) Speg. var.

*typica* Speg., nom. illeg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Tetraglochin alatum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze

Sinónimos: *Margyricarpus alatus* Gillies ex Hook. & Arn.,

*Tetraglochin strictum* Poepp., *Tetraglochin microphyllum*

Phil., *Margyricarpus strictus* (Poepp.) J. F. Macbride

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pimpinela, horizonte, caulia, caulla.

***Tetraglochin cristatum*** (Britton) Rothm.

Sinónimos: *Tetraglochin acanthocarpus* (Speg.) Speg. fma. *leiocarpum* Speg., *Margyricarpus cristatus* Britton

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Caulla, cailla, queiña, sangia, canela, añawayá.

## RUBIACEAE

### Coprosma

***Coprosma oliveri*** Fosberg

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Olivo, olivillo.

***Coprosma pyrifolia*** (Hook. & Arn.) Skottsbo.

Sinónimos: *Psychotria pyrifolia* Hook. & Arn.

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Peralillo.

### Cruckshanksia

***Cruckshanksia hymenodon*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Cruckshanksia bustillosii* Phil., *Cruckshanksia hymenodon* Hook. & Arn. var. *bustillosii* (Phil.) Ricardi &

Quezada, *Rotheria lanceolata* Meyen

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Rosa del campo.

***Cruckshanksia lithiophila*** Ricardi

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3000-3600 m.

***Cruckshanksia macrantha*** Phil.

Sinónimos: *Oreopolus macranthus* (Phil.) Ricardi

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cruckshanksia montiana*** Clos

Sinónimos: *Cruckshanksia capitata* Phil., *Cruckshanksia densifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Cruckshanksia palmae*** Clos

Sinónimos: *Oreopolus palmae* (Clos) Ricardi

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cruckshanksia pumila*** Clos

Sinónimos: *Cruckshanksia tripartita* Phil., *Cruckshanksia chrysantha* Phil., *Cruckshanksia geisseana* Phil., *Cruckshanksia darapskyana* Phil.

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 800-2300 m.

Nombre vulgar: Rosa, rosita.

***Cruckshanksia verticillata*** Phil.

Sinónimos: *Cruckshanksia paradoxa* Phil., *Cruckshanksia capitata* Phil. var. *paradoxa* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

### Galium

***Galium antarcticum*** Hook.f.

Sinónimos: *Galium debile* Banks & Sol., *Galium trifidum* auct. non L.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Galium aparine*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Galium araucanum*** Phil.

Sinónimos: *Galium suffruticosum* Hook. & Arn. var. *araucanum* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1900 m.

***Galium corymbosum*** Ruiz & Pav.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.  
Rango altitudinal: 2000-5000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Galium cotinoides*** Cham. & Schldtl.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Galium diffusoramosum*** Dempster & Ehrend.  
Sinónimos: *Galium diffusum* Clos  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, MAU.  
Rango altitudinal: 100-700 m.

***Galium divaricatum*** Pourr. ex Lam.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Nota: Dempster (1982) señala que Gay lo habría encontrado en algún lugar de Chile.

***Galium eriocarpum*** Bartl. ex DC.  
Sinónimos: *Galium brevifolium* Phil., *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *normale* Kuntze, *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *leiocarpum* Kuntze, *Galium philippii* Briq.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 1000-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Galium fuegianum*** Hook.f.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Galium gilliesii*** Hook. & Arn. subsp. *gilliesii*  
Sinónimos: *Galium lanatum* Kuntze  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 2000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Galium gilliesii*** Hook. & Arn. subsp. *telanthos* (Phil.)  
Dempster  
Sinónimos: *Galium telanthos* Phil., *Galium trichocarpum* DC. var. *telanthos* (Phil.) Reiche, *Galium volckmanni* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1500-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Galium hypocarpium*** (L.) Endl. ex Griseb.  
Sinónimos: *Relbunium hypocarpium* (L.) Hemsl., *Valantia hypocarpia* L., *Rubia relbun* Cham. & Schldtl., *Galium relbun* (Cham. & Schldtl.) Clos  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Relbún, kantoría.

***Galium inconspicuum*** Phil.  
Sinónimos: *Galium hypnoides* Clos var. *inconspicuum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1000-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Galium leptum*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 1800 m.

***Galium magellanicum*** Hook.f.  
Sinónimos: *Galium chonoense* Hook.f. var. *chonoense*, *Galium nigricans* Clos, *Galium forsteri* Phil., *Galium valdivianum* Phil., *Galium chonoense* Hook.f. var. *valdivianum* Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Galium masafueranum*** Skottsbo.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 1100-1400 m.

***Galium murale*** (L.) All.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

***Galium ovalleanum*** Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 1100-2600 m.

***Galium parisiense*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: RME.

***Galium philippianum*** Dempster

Sinónimos: *Galium dasycarpon* Kunze ex Walp.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 1200-2200 m.

***Galium suffruticosum*** Hook. & Arn.

Sinónimos: *Galium andinum* Phil., *Galium peteroanum* Phil., *Rubia margaritifera* Reiche  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Galium trichocarpum*** DC.

Sinónimos: *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *trichocarpum* (DC.) Wedd. ex Hauman, *Galium chamissonis* Hook. & Arn., *Galium lasiocarpum* Phil., *Galium scandens* Phil., *Galium laxum* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 400-2200 m.

***Galium tricornutum*** Dandy

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: NUB, BIO.

***Galium werdermannii*** Standl.

Sinónimos: *Galium hypnoides* Clos var. *hypnoides*, *Galium closianum* Briq.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1100 m.

**Leptostigma**

***Leptostigma arnottianum*** Walp.

Sinónimos: *Nertera arnottiana* (Walp.) B.L. Rob., *Hedyotis repens* Clos, *Coprosma calycina* Gray, *Oldenlandia uniflora* Ruiz & Pav. var. *repens* (Clos) Reiche, nom. illeg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Nertera**

***Nertera granadensis*** (Mutis ex L.f.) Druce

Sinónimos: *Gomozia granadensis* Mutis ex L.f., *Nertera depressa* Banks & Sol. ex Gaertn., *Cunina sanfuentesii* Clos  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.  
Rango altitudinal: 500-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coralito, chaquirita del monte, rucachucao, coralillo.

**Oldenlandia**

***Oldenlandia brachypetala*** (Phil.) E.L. Cabral & Bacigalupo

Sinónimos: *Hedyotis brachypetala* Phil., *Hedyotis minuta* Phil. ex Benth. & Hook., nom. nud.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AIS.

***Oldenlandia salzmännii*** (DC.) Benth. & Hook.

Sinónimos: *Anotis salzmännii* DC., *Hedyotis salzmännii* (DC.) Steud., *Oldenlandia uniflora* Ruiz & Pav., *Hedyotis uniflora* DC., *Hedyotis pilosa* Poepp., *Hedyotis chiloensis* Phil., *Hedyotis inconspicua* F. Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Oreopolus**

***Oreopolus glacialis*** (Poepp.) Ricardi

Sinónimos: *Cruckshanksia glacialis* Poepp., *Oreopolus patagonicus* Speg., *Cruckshanksia patagonica* (Speg.) Macloskie, *Oreopolus glacialis* (Poepp.) Ricardi var. *pilosus* Ricardi, *Oreopolus citrinus* Schltdl., *Oreocaryon nivalis* Kuntze ex K. Schum.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 300-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Rubia**

***Rubia tinctorum*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: RME.

**Sherardia**

***Sherardia arvensis*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

## RUTACEAE

### Fagara

*Fagara externa* Skottsbo.

Sinónimos: *Zanthoxylum externum* (Skottsbo.) Stuessy

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Nombre vulgar: Naranjillo.

*Fagara mayu* (Bertero ex Colla) Engl.

Sinónimos: *Zanthoxylum mayu* Bertero ex Colla, *Zanthoxylon mayu* Hook. & Arn., *Xanthoxylon mayu* Bertero ex Colla

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Nombre vulgar: Mayu, naranjillo, palo amarillo.

### Pitavia

*Pitavia punctata* (Ruiz & Pav.) Molina

Sinónimos: *Galvezia punctata* Ruiz & Pav.

Árbol. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Pitao.

### Ruta

*Ruta chalepensis* L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

## SALICACEAE

### Azara

*Azara alpina* Poepp. & Endl.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

*Azara celastrina* D. Don

Sinónimos: *Azara sparsiflora* Steud., nom. nud., *Azara lilen* Bertero, nom. nud.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Lilén.

*Azara dentata* Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Azara tomentosa* Bertero ex Steud., *Azara celastrina* D. Don var. *tomentosa* (Steud.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Nombre vulgar: Corcolén.

*Azara integrifolia* Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Azara intermedia* Gay, *Azara hirtella* Miq., *Azara berteroniana* Steud., *Azara lechleriana* Steud., *Azara pycnophylla* Phil., *Azara browneae* F. Phil., *Azara integrifolia* Ruiz & Pav. var. *pycnophylla* (Phil.) Reiche, *Azara integrifolia* Ruiz & Pav. var. *browneae* (F. Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 200-2000 m.

Nombre vulgar: Corcolén, aramo, chin-chin.

*Azara lanceolata* Hook.f.

Sinónimos: *Azara chiloensis* Hook.f., *Azara serrata* Ruiz & Pav. var. *chiloensis* (Hook.f.) Reiche, *Azara brumalis* Gand., *Azara lanceolata* Hook.f. var. *chiloensis* (Hook.f.) Reiche

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

*Azara microphylla* Hook.f.

Sinónimos: *Azara borealis* F. Phil., *Azara valdiviae* Lechl. ex Steud., *Myrtophyllum chilense* Turcz.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chinchín.

*Azara petiolaris* (D. Don) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Azara gilliesii* Hook. & Arn., *Quillaja petiolaris* D. Don, *Azara crassifolia* Hort., *Azara gilliesii* Hook. & Arn. var. *minor* Reiche

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 600-1500 m.

Nombre vulgar: Maqui blanco, maquicillo, lilén, corcolén.

*Azara serrata* Ruiz & Pav. var. *fernandeziana* (Gay) Reiche

Sinónimos: *Azara fernandeziana* Gay

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 300-400 m.



***Azara serrata*** Ruiz & Pav. var. *serrata*

Sinónimos: *Azara umbellata* Phil., *Azara dubia* Steud., *Azara bergii* Phil., *Azara subandina* Phil., *Azara serrata* Ruiz & Pav. var. *bergii* (Phil.) Reiche  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 200-2000 m.  
Nombre vulgar: Corcolén, aroma de castilla.

**Populus**

***Populus nigra*** L.

Árbol. Introducido.  
Distribución: BIO.

**Salix**

***Salix alba*** L.

Árbol. Introducido.  
Distribución: BIO.

***Salix babylonica*** L.

Árbol. Introducido.  
Distribución: COQ, RME, NUB, BIO, ARA, JFE.

***Salix caprea*** L.

Arbusto. Introducido.  
Distribución: NUB, BIO.

***Salix humboldtiana*** Willd.

Sinónimos: *Salix chilensis* Molina, *Salix magellanica* Lam.  
Árbol. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-3900 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Sauce amargo, sauce chileno.  
Nota: Existen híbridos naturales de *Salix humboldtiana* y *S. babylonica*.

***Salix viminalis*** L.

Arbusto o árbol pequeño. Introducido.  
Distribución: RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, AIS, MAG.

**SANTALACEAE**

**Antidaphne**

***Antidaphne punctulata*** (Clos) Kuijt

Sinónimos: *Eremolepis punctulata* (Clos) Griseb., *Lepidoceras punctulatum* Clos, *Eremolepis verrucosa* Griseb.

Arbusto parásito. Endémico.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.

**Lepidoceras**

***Lepidoceras chilense*** (Molina) Kuijt

Sinónimos: *Lepidoceras kingii* Hook.f., *Lepidoceras dombei* Hook.f., *Lepidoceras squamifer* Clos, *Myrtobium microphyllum* Miq., *Viscum chilense* Molina  
Arbusto parásito. Endémico.  
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Nombre vulgar: Chiuchiu, quintral del temu.

**Myoschilos**

***Myoschilos oblongum*** Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Miyoschilos angusta* Phil., *Myoschilos oblongum* Ruiz & Pav. var. *angusta* (Phil.) Macloskie  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Orocoi, orochoipo.

**Nanodea**

***Nanodea muscosa*** Banks ex C.F. Gaertn.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Santalum**

***Santalum fernandezianum*** F. Phil.

Árbol. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Nombre vulgar: Sándalo de Juan Fernández.  
Nota: Extinta.

**SAPINDACEAE**

**Bridgesia**

***Bridgesia incisifolia*** Bertero ex Cambess.

Sinónimos: *Bridgesia incisifolia* Bertero ex Cambess. var. *parvifolia* Barnéoud  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Nombre vulgar: Rumpiata, rumpaito, rumpe-ato.

## **Dodonaea**

*Dodonaea viscosa* Jacq.  
Arbusto. Introducido.  
Distribución: COQ, IPA.

## **Guindilia**

*Guindilia trinervis* Gillies ex Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Valenzuela trinervis* Bertero ex Cambess.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 200-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Guindillo.

## **Llagunoa**

*Llagunoa glandulosa* (Hook. & Arn.) G. Don  
Sinónimos: *Amirola glandulosa* Hook. & Arn., *Orbignya trifolia* Bertero  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Nombre vulgar: Árbol de cuentas, atutemo.

## **Sapindus**

*Sapindus saponaria* L.  
Árbol. Introducido.  
Distribución: AYP, IPA.  
Nombre vulgar: Marikuru (Rapa Nui).  
Nota: Los Rapanui la consideran como nativa.

## **SAPOTACEAE**

### **Pouteria**

*Pouteria lucuma* (Ruiz & Pav.) Kuntze  
Sinónimos: *Achras lucuma* Ruiz & Pav., *Richardella lucuma* (Ruiz & Pav.) Aubrév.  
Árbol. Nativo.  
Distribución: ATA.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nota: Sólo hay un ejemplar que respalda la distribución natural en Chile (ATA). Aún es dudoso su origen.

*Pouteria splendens* (A. DC.) Kuntze  
Sinónimos: *Lucuma valparadisea* Molina, *Lucuma splendens* A. DC., *Gayella valparadisaea* (Molina) Pierre, *Vitellaria valparadisaea* (Molina) Radlk. ex Dubard, *Gayella splendens* (A. DC.) Aubrév.  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nombre vulgar: Palo colorado, lúcuma silvestre.

## **SAXIFRAGACEAE**

### **Chrysosplenium**

*Chrysosplenium macranthum* Hook.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Chrysosplenium valdivicum* Hook.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Saxifraga**

*Saxifraga magellanica* Poir.  
Sinónimos: *Saxifraga cordillerana* C. Presl var. *magellanica* (Poir.) Dusén, *Saxifraga cordillerana* C. Presl  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

*Saxifraga umbrosa* L.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: MAG.

### **Saxifragella**

*Saxifragella bicuspidata* (Hook.f.) Engl.  
Sinónimos: *Saxifraga bicuspidata* Hook.f.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 500-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Saxifragodes**

*Saxifragodes albowiana* (Kurtz ex Albov) D.M. Moore  
Sinónimos: *Saxifraga albowiana* Kurtz ex Albov, *Saxifragella albowiana* (Kurtz ex Albov) Engl.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## SCHOEPFIACEAE

### Arjona

*Arjona patagonica* Hombr. & Jacq. ex Decne.  
Sinónimos: *Arjona andina* Phil., *Arjona rigida* Miers,  
*Arjona ruscifolia* Poepp., *Arjona tuberosa* Cav. var.  
*patagonica* DC.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, LBO, NUB, ARA, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

*Arjona pusilla* Hook.f.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

*Arjona tuberosa* Cav.  
Sinónimos: *Arjona apressa* Phil., *Arjona pungens* Phil.,  
*Arjona tuberosa* Cav. var. *lanata* Macloskie  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Países limítrofes: Argentina.

### Quinchamalium

*Quinchamalium chilense* Molina  
Sinónimos: *Quinchamalium procumbens* Ruiz & Pav.,  
*Quinchamalium chilense* Molina var. *gracile* Hook. &  
Arn., *Quinchamalium gracile* (Hook. & Arn.) Brongn.,  
*Quinchamalium chilense* Molina var. *robustior* Hook. &  
Arn., *Quinchamalium majus* Brongn., *Quinchamalium*  
*ericoides* Brongn. ex Gay, *Quinchamalium elegans*  
C. Presl, *Quinchamalium brevifolium* C. Presl,  
*Quinchamalium andinum* Phil., *Quinchamalium platense*  
Phil., *Quinchamalium excrescens* Phil., *Quinchamalium*  
*purpureum* Phil., *Quinchamalium linarioides* Phil.,  
*Quinchamalium berteroanum* Phil., *Quinchamalium*  
*bracteosum* Phil., *Quinchamalium carnosum* Phil.,  
*Quinchamalium parviflorum* Phil., *Quinchamalium*  
*chilense* Molina var. *parviflorum* (Phil.) L.E. Navas,  
*Quinchamalium thesioides* Phil., *Quinchamalium thesioides*  
Phil. var. *flaccidum* Phil., *Quinchamalium minutum* Phil.,  
*Quinchamalium rugosum* Phil., *Quinchamalium litorale*  
Phil., *Quinchamalium tarapacanicum* Phil., *Quinchamalium*  
*araucanicum* F. Meigen  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,  
LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Quinchamalf.

## SCROPHULARIACEAE

### Alonsoa

*Alonsoa honoraria* Grau  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 300-400 m.

*Alonsoa meridionalis* (L.f.) Kuntze  
Sinónimos: *Scrophularia meridionalis* L.f., *Alonsoa*  
*urticifolia* Steud., *Alonsoa incisifolia* Ruiz & Pav.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Flor del soldado, ajcillo.

### Buddleja

*Buddleja araucana* Phil.  
Sinónimos: *Buddleja globosa* Hope var. *araucana* (Phil.)  
Reiche  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, BIO.  
Rango altitudinal: 300-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Buddleja globosa* Hope  
Sinónimos: *Buddleja capitata* Jacq., *Buddleja connata* Ruiz  
& Pav.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,  
BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Matico, pañil, palquil, palguín.

*Buddleja suaveolens* Kunth & Bouché  
Sinónimos: *Buddleja gayana* Benth.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 500-2900 m.  
Nombre vulgar: Acerillo.

### Myoporum

*Myoporum laetum* G. Forst.  
Arbusto o árbol pequeño. Introducido.  
Distribución: COQ, VAL, MAU.

## Scrophularia

### *Scrophularia auriculata* L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: RME, MAU, ARA.

## Verbascum

### *Verbascum densiflorum* Bertol.

Hierba. Bienal. Introducida.  
Distribución: ARA.

### *Verbascum thapsus* L.

Hierba. Bienal. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.

### *Verbascum virgatum* Stokes

Hierba. Bienal. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA.

## SIMAROUBACEAE

## Ailanthus

### *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle

Árbol. Introducido.  
Distribución: RME, BIO, JFE.

## SOLANACEAE

## Benthamiella

### *Benthamiella azurella* (Skotts.) A.Soriano

Sinónimos: *Saccardophyton azurella* Skotts.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 500-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### *Benthamiella lanata* A. Soriano

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### *Benthamiella nordenskiöldii* Dusén ex N.E. Br.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### *Benthamiella patagonica* Speg.

Sinónimos: *Benthamiella aurea* Skotts., *Benthamiella intermedia* Skotts., *Benthamiella abietina* Skotts.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 500-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## Calibrachoa

### *Calibrachoa parviflora* (Juss.) D'Arcy

Sinónimos: *Nicotiana parviflora* (Juss.) Lehm., *Petunia parviflora* Juss.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 0-300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## Cestrum

### *Cestrum parqui* L'Hér.

Sinónimos: *Cestrum campestre* Griseb., *Cestrum parqui* L'Hér. var. *glabriusculum* Kuntze, *Cestrum parqui* L'Hér. var. *longiflorum* Francey, *Cestrum parqui* L'Hér. var. *poepigii* Dunal, *Cestrum virgatum* Ruiz & Pav.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Palqui, parqui, hediondilla.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

## Combera

### *Combera minima* (Phil.) Sandwith

Sinónimos: *Nicotiana minima* Phil., *Petunia minima* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LLA.  
Rango altitudinal: 1800 m.

### *Combera paradoxa* Sandwith

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: NUB, AIS.  
Rango altitudinal: 1800-3200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## Datura

### *Datura ferox* L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA.

***Datura inoxia*** Mill.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: ANT, ATA.

***Datura stramonium*** L.  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

### **Dunalia**

***Dunalia spinosa*** (Meyen) Dammer  
Sinónimos: *Dunalia lycioides* Miers, *Atropa spinosa* Meyen, *Dierbachia lycioides* (Miers) Kuntze  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 3500 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Chañar silvestre, chilka.

### **Exodeconus**

***Exodeconus flavus*** (I.M. Johnst.) Axelius & D'Arcy  
Sinónimos: *Cacabus flavus* I.M. Johnst.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2000-2500 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Exodeconus integrifolius*** (Phil.) Axelius  
Sinónimos: *Cacabus integrifolius* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 2300-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Oreja de ratón.

***Exodeconus pusillus*** (Bitter) Axelius  
Sinónimos: *Cacabus pusillus* Bitter  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2500-3000 m.  
Países limítrofes: Perú.

### **Fabiana**

***Fabiana bryoides*** Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2900-4900 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Pata de perdiz, pata de pizaca.

***Fabiana densa*** J. Remy  
Sinónimos: *Fabiana clarenii* Dammer  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ATA.  
Rango altitudinal: 2700-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Khachukipa.

***Fabiana denudata*** Miers  
Sinónimos: *Fabiana hieronymi* Niederl.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 300-3700 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Tolilla, alma tola.

***Fabiana imbricata*** Ruiz & Pav.  
Sinónimos: *Fabiana araucana* Phil., *Fabiana biflora* J. Remy, *Fabiana imbricata* Ruiz & Pav. var. *biflora* (J. Remy) Reiche, *Fabiana lutescens* Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 2600-3200 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Pichi, peta, romero.

***Fabiana ramulosa*** (Wedd.) Hunz. & Barboza  
Sinónimos: *Fabiana densa* J. Remy var. *ramulosa* Wedd., *Fabiana deserticola* Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3200-4000 m.  
Nombre vulgar: Kipa, tara macho.

***Fabiana squamata*** Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3000-4400 m.  
Países limítrofes: Bolivia.  
Nombre vulgar: Koba.

***Fabiana stephanii*** Hunz. & Barboza  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 3000-3900 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Fabiana viscosa*** Hook. & Arn.  
Sinónimos: *Fabiana coridifolia* Dunal, *Fabiana ericoides* Dunal, *Fabiana barrioi* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.



Rango altitudinal: 100-2200 m.  
Nombre vulgar: Pichinilla, copatola, husillo, pichanilla.

### **Jaborosa**

***Jaborosa caulescens*** Gillies & Hook. var. ***bipinnatifida***  
(Dunal) Reiche

Sinónimos: *Lonchostigma caulescens* (Gillies & Hook.)  
Dunal var. *bipinnatifidum* Dunal, *Jaborosa bipinnatifida*  
(Dunal) Meigen, *Lonchostigma bipinnatifidum* (Dunal)  
Phil., *Trechonaetes bipinnatifida* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.  
Rango altitudinal: 3000-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Jaborosa caulescens*** Gillies & Hook. var. ***caulescens***

Sinónimos: *Dorystigma caulescens* (Gillies & Hook.)  
Miers, *Lonchostigma caulescens* (Gillies & Hook.) Dunal  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.  
Rango altitudinal: 2000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Teqerere.

***Jaborosa laciniata*** (Miers) Hunz. & Barboza  
Sinónimos: *Trechonaetes laciniata* Miers, *Trechonaetes*  
*bridgesii* Dunal

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.  
Rango altitudinal: 2500-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Jaborosa magellanica*** (Griseb.) Dusén  
Sinónimos: *Himeranthus magellanicus* Griseb., *Jaborosa*  
*magellanica* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Jaborosa parviflora*** (Phil.) Hunz. & Barboza  
Sinónimos: *Trechonaetes parviflora* Phil., *Lonchostigma*  
*parviflorum* (Phil.) Cabrera, *Jaborosa crispa* auct. non

Benth. & Hook., *Trechonaetes machucana* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3700-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Psike.

***Jaborosa pinnata*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO, MAU.

***Jaborosa reflexa*** Phil.

Sinónimos: *Jaborosa araucana* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 200-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Jaborosa riojana*** Hunz. & Barboza

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 3000-4300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Jaborosa squarrosa*** (Miers) Hunz. & Barboza

Sinónimos: *Dorystigma squarrosus* Miers, *Lonchostigma*  
*squarrosus* (Miers) Dunal  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ATA.  
Rango altitudinal: 3000-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Jaborosa volkmannii*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Dolichosiphon volkmanni* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1500-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Latua**

***Latua pubiflora*** (Griseb.) Baill.

Sinónimos: *Lycioplesium pubiflorum* Griseb., *Latua*  
*venenosa* Phil.  
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.  
Distribución: LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 300-900 m.  
Nombre vulgar: Latúe, palo de los brujos, latué, palo mato.

### **Lycium**

***Lycium boerhaviaefolium*** L.f.

Sinónimos: *Grabowskia boerhaviifolia* (L.f.) Schldl.,  
*Grabowskia glauca* (Phil.) I.M. Johnst., *Lycium glaucum*  
Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 300-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Lycium bridgesii*** (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G.  
Bernardello

Sinónimos: *Phrodus bridgesii* Miers, *Phrodus microphyllus*  
(Miers) Miers, *Phrodus pendulus* (Phil.) Phil., *Alona*  
*microphylla* Miers, *Phrodus nodosus* Miers, *Phrodus*

*breviflorus* Phil., *Phrodus thymifolius* (Phil.) Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 500-2900 m.

*Lycium carolinianum* Walter var. *sandwicense* (A. Gray)  
C.L. Hitchc.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: IPA.  
Nombre vulgar: Pua nako nako (Rapa Nui).

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *chilense*  
Sinónimos: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *petiolatum* Phil., *Lycium scoparium* Miers, *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *normale* Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *tomentosulum* Phil., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *chilense* (Bertero) Kuntze, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *ovatum* Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Coralillo.

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *confertifolium* (Miers) F.A. Barkley  
Sinónimos: *Lycium scoparium* Miers var. *confertifolium* Miers  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *filifolium* (Gillies ex Miers) Bernardello  
Sinónimos: *Lycium filifolium* Gillies ex Miers, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *capillare* (Miers) A. Terracc.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *glaberrimum* Phil.  
Sinónimos: *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *gracile* (Meyen) Reiche, *Lycium sessiliflorum* Phil., *Lycium rhadinum* Phil., *Lycium gracile* Meyen, *Lycium venosum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero fma. *glaberrimum* (Phil.) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *gracile* (Meyen) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *glabriusculum* Phil., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *gracile* (Meyen) Kuntze, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *venosum* (Phil.) Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *rhadinum* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 500-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *minutifolium* (Miers) F.A. Barkley  
Sinónimos: *Lycium filifolium* Gillies ex Miers var. *minutifolium* Miers, *Lycium minutifolium* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero fma. *minutifolium* (Miers) A. Terracc.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *vergarae* (Phil.) Bernardello  
Sinónimos: *Lycium vergarae* Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: TAR, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

*Lycium deserti* Phil.  
Sinónimos: *Lycium breanum* Phil., *Lycium pachyclados* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 500-3200 m.

*Lycium distichum* Meyen  
Sinónimos: *Grabowskia disticha* (Meyen) Nees ex Dunal  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 2000 m.  
Países limítrofes: Perú.

*Lycium humile* Phil.  
Sinónimos: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum* A. Terracc.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, RME.  
Rango altitudinal: 2000-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Jume, june, wicha.

*Lycium leiostemum* Wedd.  
Sinónimos: *Lycium bieseii* F.A. Barkley  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 1000 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Lycium minutifolium*** J. Remy

Sinónimos: *Lycium implexum* Miers, *Lycium horridum* Phil., *Lycium rhudolphi* Speg., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum* A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *implexum* (Miers) A. Terracc.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1000-3200 m.

Nombre vulgar: Calpiche, coralillo.

***Lycium rachidocladum*** Dunal

Sinónimos: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *rachidocladum* (Dunal) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *rachidocladum* (Dunal) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

***Lycium stenophyllum*** J. Remy

Sinónimos: *Lycium fragosum* Miers

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Perú.

***Lycium tenuispinosum*** Miers var. *calycinum* (Griseb.) Bernardello

Sinónimos: *Lycium scoparium* Miers var. *calycinum* Griseb., *Lycium ovalilobum* C.L. Hitchc.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

**Nicandra**

***Nicandra physalodes*** (L.) Gaertn.

Sinónimos: *Atropa physalodes* L.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**Nicotiana**

***Nicotiana acuminata*** (Graham) Hook. var. *acuminata*

Sinónimos: *Petunia acuminata* Graham, *Nicotiana longiflora* Cav. var. *oligantha* (Phil.) Millán, *Nicotiana uspallatensis* Phil., *Nicotiana oligantha* Phil., *Nicotiana copiapina* Phil., *Nicotiana modesta* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 100-3400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Tabaco del campo, tabaco cimarrón.

***Nicotiana acuminata*** (Graham) Hook. var. *compacta* Goodsp.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 2700-3500 m.

***Nicotiana acuminata*** (Graham) Hook. var. *multiflora* (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Nicotiana angustifolia* Ruiz & Pav., *Nicotiana heterophylla* Phil., *Nicotiana multiflora* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 100-3100 m.

***Nicotiana cordifolia*** Phil. subsp. *cordifolia*

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Nicotiana cordifolia*** Phil. subsp. *sanctaclarae* Danton

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

***Nicotiana corymbosa*** J. Remy

Sinónimos: *Nicotiana monticola* Dunal, *Nicotiana scapigera* Phil., *Nicotiana oulophylla* Dunal

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, MAG.

Rango altitudinal: 700-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Nicotiana glauca*** Graham

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Palqui inglés, palqui extranjero, belén-belén.

***Nicotiana linearis*** Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, MAU.

Rango altitudinal: 200-2100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Nicotiana longibracteata*** Phil.

Sinónimos: *Nicotiana frigida* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3400-3700 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Palpapalpa.

***Nicotiana miersii*** J. Remy var. *lychnoides* (J. Remy) Goodsp.  
Sinónimos: *Nicotiana floribunda* (Phil.) Reiche, *Nicotiana lychnoides* J. Remy, *Waddingtonia floribunda* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1400 m.

***Nicotiana miersii*** J. Remy var. *miersii*  
Sinónimos: *Nicotiana collae* Phil., *Nicotiana coquimbana* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-1400 m.

***Nicotiana paa*** Mart. Crov.  
Sinónimos: *Nicotiana noctiflora* Hook. var. *albiflora* Comes, *Nicotiana cavanillesii* Dunal var. *albiflora* (Comes) Millán  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 100-1600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Nicotiana pauciflora*** J. Remy  
Sinónimos: *Nicotiana longiflora* Cav. var. *pauciflora* (J. Remy) Comes, *Nicotiana caudigera* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 500-2500 m.

***Nicotiana petunioides*** (Griseb.) Millán  
Sinónimos: *Fabiana petunioides* Griseb., *Nicotiana pampasana* Kuntze, *Nicotiana philippii* Millán  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3700-4600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Nicotiana solanifolia*** Walp.  
Sinónimos: *Nicotiana breviloba* Phil., *Nicotiana cardiophylla* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Nicotiana tabacum*** L.  
Hierba. Anual o perenne. Introducida.  
Distribución: JFE, IPA.  
Nombre vulgar: Tabaco, aba aba (Rapa Nui).

***Nicotiana undulata*** Ruiz & Pav.  
Sinónimos: *Nicotiana chilensis* Millán nom. illeg., *Nicotiana brachysolen* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2700-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Lipelipe.

### **Nierembergia**

***Nierembergia repens*** Ruiz & Pav.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Nota: Presente también en Ecuador.

### **Nolana**

***Nolana acuminata*** (Miers) Miers ex Dunal  
Sinónimos: *Sorema lanceolata* Miers, *Sorema acuminata* Miers, *Sorema longifolia* auct. non (Lindl.) Miers, *Nolana lanceolata* (Miers) Miers ex Dunal, *Nolana angustifolia* Phil., *Nolana navarri* Phil., *Nolana rupestris* Phil.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 0-900 m.

***Nolana adansonii*** (Roem. & Schult.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Tula adansonii* Roem. & Schult.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 0-800 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Nolana albescens*** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Dolia albescens* Phil. ex Wettst., *Bargemontia albescens* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia albescens* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Nolana aplocaryoides*** (Gaudich.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Nolana sedifolia* Poepp. var. *aplocaryoides* (Gaudich.) Mesa, *Leloutrea aplocaryoides* Gaudich., *Bargemontia aplocaryoides* (Gaudich.) I.M. Johnst., *Alona pusilla* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Nolana arenicola*** I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 200-700 m.

Países limítrofes: Perú.

***Nolana baccata*** (Lindl.) Dunal

Sinónimos: *Alona baccata* Lindl., *Sorema linearis* Miers, *Gubleria baccata* Gaudich., *Nolana linearis* (Miers) Miers ex Dunal, *Nolana stans* Phil., *Nolana carrera* Phil., *Nolana leucantha* Phil., *Nolana carrera* Phil. var. *leucantha* (Phil.) Reiche, *Periloba stans* (Phil.) I.M. Johnst., *Nolana alba* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Nolana balsamiflua*** (Gaudich.) Mesa

Sinónimos: *Alona balsamiflua* Gaudich.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 500 m.

***Nolana carnosa*** (Lindl.) Miers ex Dunal

Sinónimos: *Alona carnosa* Lindl., *Nolana rostrata* (Lindl.) Miers ex Dunal var. *carnosa* (Lindl.) Mesa, *Alona vernicosa* Phil., *Alona sedifolia* Phil., *Osteocarpus lepidophyllus* Phil., *Alona lepidophylla* (Phil.) Reiche

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ATA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Nolana clivicola*** (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Bargemontia clivicola* I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Nolana coelestis*** (Lindl.) Miers ex Dunal

Sinónimos: *Alona coelestis* Lindl., *Alona ericifolia* Miers, *Nolana ericifolia* (Miers) Miers ex Dunal, *Alona floribunda* Phil., *Alona coelestis* Lindl. var. *ericifolia* (Miers) F.H. Brandt

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 100-800 m.

***Nolana crassulifolia*** Poepp.

Sinónimos: *Alona tomentosa* Lindl., *Alibrexia rupicola* Miers, *Nolana grossulifolia* Kunze ex Gay, *Dolia clavata* auct. non Miers, *Alona micrantha* Phil., *Dolia tomentosa* (Lindl.) Benth., *Dolia rupicola* (Miers) Benth. & Hook. ex Wettst., *Dolia canescens* Phil., *Dolia eremobia* Phil., *Dolia*

*grandiflora* Phil., *Dolia crassifolia* Kuntze, *Bargemontia crassulifolia* (Poepp.) I.M. Johnst., *Bargemontia micrantha* (Phil.) I.M. Johnst., *Bargemontia eremobia* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia philippi* (Braun) F.H. Brandt, *Dolia atacamensis* F.H. Brandt, *Alibrexia philippii* A. Braun

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Nolana deflexa*** (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Bargemontia deflexa* I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

***Nolana diana*** M.O. Dillon

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 300-600 m.

***Nolana diffusa*** I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Nolana divaricata*** (Lindl.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Nolana peruviana* (Gaudich.) I.M. Johnst. subsp. *divaricata* (Lindl.) Mesa, *Aplocarya divaricata* Lindl., *Dolia clavata* Miers, *Alona xerophila* Phil., *Dolia divaricata* (Lindl.) Hook. & Arn. ex W. Brandt, *Alona rigida* Phil., *Dolia puberula* Phil., *Dolia hirsutula* Phil., *Dolia clavata* Miers var. *puberula* (Phil.) Reiche, *Bargemontia divaricata* (Lindl.) I.M. Johnst., *Bargemontia clavata* (Miers) I.M. Johnst., *Osteocarpus clavatus* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-4100 m.

***Nolana elegans*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Sorema elegans* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, VAL.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Nolana filifolia*** (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Alona filifolia* (Hook. & Arn.) I.M. Johnst., *Convolvulus filifolius* Hook. & Arn., *Nolana chastenayana* Gaudich., *Alona glandulosa* Lindl., *Ipomoea cruckshanskii* Choisy, *Fabiana grandiflora* Dunal, *Nolana glandulosa* (Lindl.) Miers ex Dunal, *Osteocarpus foliolosus* Phil., *Alona chastenayana* (Gaudich.) Gaudich. ex Wettst.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.



***Nolana foliosa*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Dolia foliosa* Phil., *Bargemontia foliosa* (Phil.) I.M. Johnst.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR.

***Nolana glauca*** (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Bargemontia glauca* I.M. Johnst., *Nolana peruviana* (Gaudich.) I.M. Johnst. var. *glauca* (I.M. Johnst.) Mesa  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Nolana gracillima*** (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Nolana sedifolia* Poepp. subsp. *confinis* (I.M. Johnst.) Mesa, *Bargemontia gracillima* I.M. Johnst.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 0-2400 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Nolana incana*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Alibrexia incana* Phil., *Dolia incana* (Phil.) Wettst., *Dolia incana* (Phil.) Benth. & Hook. ex F.H. Brandt  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-800 m.

***Nolana inconspicua*** (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Bargemontia inconspicua* I.M. Johnst.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Nolana intonsa*** I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 200-800 m.

***Nolana jaffuelii*** I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Nolana lachimbensis*** M.O. Dillon & Luebert

Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 500 m.

***Nolana leptophylla*** (Miers) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Dolia leptophylla* Miers, *Velpeaulia alibrexioides* Gaudich., *Alona deserticola* Phil., *Alona*

*dubia* Phil., *Bargemontia leptophylla* (Miers) I.M. Johnst., *Bargemontia deserticola* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia deserticola* (Phil.) W. Brandt  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-4200 m.

***Nolana linearifolia*** Phil.

Sinónimos: *Nolana decemloba* Herzog, *Bargemontia linearifolia* (Phil.) I.M. Johnst.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Nolana lycioides*** I.M. Johnst.

Sinónimos: *Nolana sedifolia* Poepp. subsp. *confinis* (I.M. Johnst.) Mesa  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 200-2100 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Nolana mollis*** (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Nolana leptophylla* (Miers) I.M. Johnst. subsp. *mollis* (Phil.) Mesa, *Alona mollis* Phil., *Dolia macrocalyx* Phil., *Bargemontia mollis* (Phil.) I.M. Johnst.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

***Nolana onoana*** M.O. Dillon & M. Nakaz.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 100-600 m.

***Nolana paradoxa*** Lindl.

Sinónimos: *Nolana paradoxa* Lindl. subsp. *atriplicifolia* (D. Don) Mesa, *Periloba paradoxa* (Lindl.) Raf., *Sorema paradoxa* (Lindl.) Lindl., *Sorema litoralis* Miers, *Nolana litoralis* (Miers) Dunal, *Nolana paradoxa* Lindl. var. *glaberrima* Dunal, *Nolana atriplicifolia* D. Don var. *cuneifolia* Dunal, *Nolana paradoxa* Lindl. var. *violacea* Van Houtte, *Sorema petiolata* Phil., *Nolana ochrocarpa* Phil. ex Wettst., *Nolana geminiflora* Phil., *Nolana petiolata* (Phil.) Reiche, *Nolana atriplicifolia* D. Don, *Nolana grandiflora* Lehm. ex G. Don, *Sorema atriplicifolia* (D. Don) Lindl., *Sorema paradoxa* (Lindl.) Lindl. var. *atriplicifolia* (D. Don) Miers, *Nolana napiformis* Phil., *Nolana grandiflora* Herzog  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Nombre vulgar: Suspiro del campo.

***Nolana parviflora*** (Phil.) Phil.

Sinónimos: *Sorema parviflora* Phil., *Periloba parviflora* (Phil.) I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Nolana patula*** (Phil.) Mesa ex M.O. Dillon

Sinónimos: *Alona patula* Phil., *Nolana patula* (Phil.) Mesa, comb. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

***Nolana peruviana*** (Gaudich.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Bargemontia peruviana* Gaudich., *Dolia macrocalyx* Phil. ex Herzog

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Suspiro.

***Nolana philippiana*** M.O. Dillon & Luebert

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 700-1600 m.

***Nolana pterocarpa*** Phil. ex Wettst.

Sinónimos: *Nolana pterosperma* Phil., *Nolana debilis* Phil., *Nolana pulchella* Phil. ex Reiche, *Periloba pterosperma* (Phil.) I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: TAR, ATA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Nolana ramosissima*** I.M. Johnst.

Sinónimos: *Dolia salsoloides* auct. non Lindl.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Nolana reichei*** M.O. Dillon & Arancio

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Nolana rhombifolia*** Martic. & Quezada

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 1800-1900 m.

***Nolana rostrata*** (Lindl.) Miers ex Dunal

Sinónimos: *Alona rostrata* Lindl., *Alona obtusa* Lindl., *Nolana obtusa* (Lindl.) Miers ex Dunal, *Alona miersii* Phil., *Alona phyllicifolia* Phil., *Alona fonckii* Phil., *Rayera*

*teretifolia* Gaudich., *Osteocarpus brevifolius* Phil., *Nolana lepidophylla* (Phil.) I.M. Johnst., *Osteocarpus rostratus* (Lindl.) Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 500-4100 m.

***Nolana rupicola*** Gaudich.

Sinónimos: *Alona longifolia* Lindl., *Sorema longifolia* (Lindl.) Miers, *Nolana longifolia* (Lindl.) Miers ex Dunal, *Nolana triquetra* Koch & Bouché, *Sorema glutinosa* Phil., *Sorema bracteosa* Phil., *Nolana lanceolata* auct. non (Miers) Miers ex Dunal, *Nolana glutinosa* (Phil.) Reiche, *Nolana bracteosa* (Phil.) Reiche, *Periloba longifolia* (Lindl.) I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Nombre vulgar: Suspiro.

***Nolana salsoloides*** (Lindl.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Dolia salsoloides* Lindl., *Osteocarpus spathulatus* Phil., *Dolia micrantha* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-900 m.

***Nolana sedifolia*** Poepp.

Sinónimos: *Fabiana lanuginosa* Hook. & Arn., *Salsola glomerulata* Meyen, *Dolia vermiculata* Lindl., *Alibrexia brevifolia* Phil., *Dolia brevifolia* (Phil.) Phil. ex Wettst., *Bargemontia sedifolia* (Poepp.) I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Nolana sessiliflora*** Phil.

Sinónimos: *Nolana sessilifolia* Phil. ex I.M. Johnst., *Periloba sessiliflora* (Phil.) I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2000-2100 m.

***Nolana sphaerophylla*** (Phil.) Mesa ex M.O. Dillon

Sinónimos: *Nolana flaccida* (Phil.) I.M. Johnst., *Alona sphaerophylla* Phil., *Bargemontia sphaerophylla* (Phil.) I.M. Johnst., *Alona flaccida* Phil., *Bargemontia flaccida* (Phil.) I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

***Nolana stenophylla*** I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Alona stenophylla* (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-600 m.

***Nolana tarapacana*** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Dolia tarapacana* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 1000-3000 m.  
Nombre vulgar: Deditos.

***Nolana tocopillensis*** (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Bargemontia tocopillensis* I.M. Johnst.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Nolana villosa*** (Phil.) I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Alibrexia villosa* Phil., *Dolia villosa* (Phil.)  
Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-1700 m.

***Nolana werdermannii*** I.M. Johnst.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 800 m.

### **Physalis**

***Physalis peruviana*** L.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, JFE.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Capulí, amor en bolsa, bolsa de amor.  
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Physalis viscosa*** L.  
Sinónimos: *Physalis mendocina* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA, IPA.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nota: Introducida en la Isla de Pascua. Probablemente introducida en regiones del centro y sur.

### **Reyesia**

***Reyesia cactorum*** (I.M. Johnst.) D'Arcy  
Sinónimos: *Salpiglossis cactorum* I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 2900-3500 m.

***Reyesia chilensis*** Gay  
Sinónimos: *Pteroglossis laxa* Miers, *Salpiglossis chilensis* (Gay) Wettst., *Salpiglossis brachysiphon* I.M. Johnst., *Reyesia laxa* (Miers) D'Arcy  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Reyesia juniperoides*** (Werderm.) D'Arcy  
Sinónimos: *Salpiglossis juniperoides* Werderm.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2500 m.  
Nombre vulgar: Canchanlahua.

***Reyesia parviflora*** (Phil.) Hunz.  
Sinónimos: *Salpiglossis parviflora* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, RME.  
Rango altitudinal: 2900-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Salpichroa**

***Salpichroa origanifolia*** (Lam.) Baill.  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, BIO.  
Rango altitudinal: 900-1000 m.

***Salpichroa scandens*** Dammer  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 2000-3600 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Salpichroa tristis*** Miers var. *lehmanni* (Dammer) Keel  
Arbusto o árbol pequeño. Nativo.  
Distribución: TAR.  
Rango altitudinal: 3500-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

### **Salpiglossis**

***Salpiglossis sinuata*** Ruiz & Pav.  
Sinónimos: *Salpiglossis purpurea* Miers, *Salpiglossis fulva* Courtois, *Salpiglossis picta* Sweet, *Salpiglossis purpurea* Miers var. *atropurpurea* (Graham) Miers, *Salpiglossis straminea* Hook., *Salpiglossis straminea* Hook. var. *picta* (Sweet) Hook.  
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Panza de burro.

***Salpiglossis spinescens*** Clos

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 700-2800 m.

Nombre vulgar: Panza de burro.

**Schizanthus**

***Schizanthus alpestris*** Poepp.

Sinónimos: *Schizanthus angustifolius* Phil., *Schizanthus glanduliferus* Phil., *Schizanthus alpestris* Poepp. var. *glandulifera* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 900-2900 m.

***Schizanthus candidus*** Lindl.

Sinónimos: *Schizanthus albiflorus* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Mariposa blanca, cacaatúa.

***Schizanthus coccineus*** (Phil.) J.M. Watson

Sinónimos: *Schizanthus grahamii* Gill. var. *coccinea* Phil.

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2600-2800 m.

Nombre vulgar: Mariposita roja.

***Schizanthus grahamii*** Gillies ex Hook.

Sinónimos: *Schizanthus retusus* Hook., *Schizanthus incanus* Hort. ex C. Morr., *Schizanthus gilliesii* Phil., *Schizanthus araucanus* Phil., *Schizanthus diazii* Phil.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Schizanthus hookeri*** Gillies ex Graham

Sinónimos: *Schizanthus calycosus* Phil.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1300-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Schizanthus integrifolius*** Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 700-1500 m.

Nombre vulgar: Palito.

***Schizanthus lacteus*** Phil.

Sinónimos: *Schizanthus sanromanii* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

***Schizanthus laetus*** Phil.

Sinónimos: *Schizanthus fallax* I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Schizanthus litoralis*** Phil.

Sinónimos: *Schizanthus splendens* Sudzuki

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 100-800 m.

***Schizanthus parvulus*** Sudzuki

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 300-600 m.

***Schizanthus pinnatus*** Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Schizanthus gayanus* Phil., *Schizanthus gracilis* Clos, *Schizanthus humilis* Phil., *Schizanthus lacinosus* Phil., *Schizanthus latifolius* Phil., *Schizanthus lilacinus* Kunze, *Schizanthus heterophyllus* Phil., *Schizanthus tenuifolius* Phil., *Schizanthus tenuis* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 100-1500 m.

Nombre vulgar: Pajarito.

***Schizanthus porrigens*** Graham

Sinónimos: *Schizanthus floribundus* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Schizanthus tricolor*** Grau & Gronbach

Sinónimos: *Schizanthus pinnatus* Ruiz & Pav. var. *humilis* Lindl.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-500 m.

## Solanum

### *Solanum alphonsei* Dunal

Sinónimos: *Solanum alphonsei* Dunal var. *taguatagua* Dunal, *Solanum germainii* Phil., *Solanum tenuicaule* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.

### *Solanum americanum* Mill.

Sinónimos: *Solanum nigrum* L. var. *americanum* (Mill.) O.E. Schulz  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Hierba mora.

### *Solanum argenteum* Dunal

Arbusto. Introducido.  
Distribución: JFE.

### *Solanum brachyantherum* Phil.

Sinónimos: *Solanum geissei* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, IDE.  
Rango altitudinal: 100-700 m.

### *Solanum bridgesii* Phil. var. *bridgesii*

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: RME, LBO, ARA.

### *Solanum bridgesii* Phil. var. *ocellatum* (Phil.) Witasek ex Reiche

Sinónimos: *Solanum ocellatum* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: RME.

### *Solanum chilense* (Dunal) Reiche

Sinónimos: *Lycopersicon chilense* Dunal, *Lycopersicon atacamense* Phil., *Lycopersicon bipinnatifidum* Phil., *Lycopersicon puberulum* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Nombre vulgar: Tomatillo, tomate silvestre.

### *Solanum coxii* Phil.

Arbusto. Endémico.  
Distribución: LLA.

### *Solanum crispum* Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Solanum ligustrinum* Lodd., *Solanum congestiflorum* Dunal, *Solanum gayanum* (J. Remy) F. Phil.,

*Solanum pannosum* Phil., *Solanum pyrrocarpum* Phil., *Witheringia crispa* (Ruiz & Pav.) J. Remy, *Witheringia tomatillo* J. Remy, *Solanum crispum* Ruiz & Pav. var. *ligustrinum* (Lodd.) Dunal, *Solanum tomatillo* (J. Remy) F. Phil., *Solanum concavum* Lindl., *Solanum syringaeifolium* Kunth & Bouché, *Witheringia berteriana* J. Remy, *Witheringia gayana* J. Remy, *Solanum congestiflorum* Dunal var. *longifolium* Dunal, *Solanum crispum* Ruiz & Pav. var. *elaeagnifolium* Dunal, *Solanum sadae* Phil., *Solanum landbeckii* Phil., *Solanum angustifolium* Lam. var. *brevifolium* Dunal, *Solanum congestiflorum* Dunal var. *pannosum* (Phil.) Reiche, *Solanum congestiflorum* Dunal var. *syringaeifolium* (Kunth & Bouché) Reiche, *Solanum izquierdii* Phil., *Solanum pugae* Phil., *Solanum tagua* Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hierba del chabalongo, huevil, natri.

### *Solanum echegarayi* Hieron.

Sinónimos: *Solanum juncalense* Reiche, *Solanum juncalense* Reiche subsp. *aconcaguae* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### *Solanum elaeagnifolium* Cav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 200-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Tomatillo.

### *Solanum etuberosum* Lindl.

Sinónimos: *Solanum bustillosii* Phil., *Solanum subandinum* F. Meigen, *Solanum looseri* Juz., *Solanum tuberosum* L. var. *polemoniifolium* Hook.f., *Solanum kunzei* Phil., *Solanum etuberosum* Lindl. var. *antucense* Bitter, *Solanum etuberosum* Lindl. var. *bustillosii* (Phil.) Witasek, *Solanum etuberosum* Lindl. var. *chillanense* Bitter

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 400-3000 m.

### *Solanum fernandezianum* Phil.

Sinónimos: *Solanum brevistylum* Wittm., nom. nud., *Solanum tuberosum* L. var. *fernandezianum* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 100-1700 m.



***Solanum forsteri*** Seem.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Poporo (Rapa Nui).

***Solanum fragile*** Wedd.

Sinónimos: *Solanum grandidentatum* Phil., *Solanum tarapacatum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Ñuñumaya.

***Solanum furcatum*** Dunal

Sinónimos: *Solanum tredecimgranum* Bitter, *Solanum andinum* Reiche, *Solanum crenato-dentatum* Dunal, *Solanum furcatum* Dunal var. *acutedentatum* Nees, *Solanum furcatum* Dunal var. *obtusdentatum* Nees, *Solanum furcatum* Dunal var. *subintegerrimum* Nees, *Solanum rancaguense* Dunal, *Solanum robinsonianum* Bitter, *Witheringia furcata* (Dunal) J. Rémy

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 200-1900 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Hierba mora.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Solanum gaudichaudii*** Dunal

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Solanum herba-bona*** Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

Nombre vulgar: Hierba mora.

***Solanum heterantherum*** Witasek ex Reiche

Sinónimos: *Solanum tomentosum* (J. Remy) F. Phil., *Witheringia tomentosa* J. Remy

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

***Solanum infundibuliforme*** Phil.

Sinónimos: *Solanum infundibuliforme* Phil. var. *angustepinnatum* Bitter, *Solanum infundibuliforme* Phil. var. *albiflorum* Ochoa

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Aparuma.

***Solanum lycopersicoides*** Dunal

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 1500-3600 m.

Países limítrofes: Perú.

***Solanum maglia*** Schltld.

Sinónimos: *Solanum collinum* Dunal, *Solanum maglia* Schltld. var. *collinum* (Dunal) Bitter, *Solanum maglia* Schltld. var. *witasekianum* Bitter, *Solanum maglia* Molina, nom. nud., *Solanum tuberosum* L. var. *maglia* (Schltld.) A. DC., *Solanum maglia* Schltld. var. *brevifrons* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Papa cimarrona, papa de zorro.

***Solanum marginatum*** L.f.

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL, MAU, BIO, JFE.

Rango altitudinal: 5-450 m.

***Solanum medians*** Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3100-3600 m.

Países limítrofes: Perú.

***Solanum montanum*** L.

Sinónimos: *Solanum phyllanthum* Cav. var. *crassipes* (Phil.) Witasek ex Reiche, *Solanum crassipes* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Países limítrofes: Perú.

***Solanum nigrum*** L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

***Solanum nitidibaccatum*** Bitter

Sinónimos: *Solanum physalifolium* Rusby var. *nitidibaccatum* (Bitter) Edmonds

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Solanum nitidum*** Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 3000-3500 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Ñuñumaya.

***Solanum palustre*** Schldtl.

Sinónimos: *Solanum brevidens* Phil., *Solanum palustre* Schldtl. var. *glabrescens* Walp., *Solanum brevidens* Phil. var. *glabrescens* (Dunal) Hawkes, *Solanum tuberosum* L. var. *brevidens* (Phil.) Reiche, *Solanum tuberosum* L. var. *pearcei* (Phil.) Reiche  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, LBO, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1200 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Papa de monte.

***Solanum paposanum*** Phil.

Sinónimos: *Solanum aberrans* Phil., *Solanum crassipes* Phil. var. *aberrans* (Phil.) Bitter, *Solanum phyllanthum* Cav. var. *aberrans* (Phil.) Witasek ex Reiche  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.

***Solanum pennellii*** Correll var. *elachistus* Martic. & Quezada

Arbusto. Endémico.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 1500 m.

***Solanum pentlandii*** Dunal subsp. *interandinum* (Bitter) Edmonds

Sinónimos: *Solanum masafueranum* Bitter & Scottsb., *Solanum interandinum* Bitter  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: JFE.  
Nota: Presente también en Ecuador.

***Solanum pentlandii*** Dunal subsp. *pentlandii*

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: TAR.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Solanum peruvianum*** L.

Sinónimos: *Lycopersicon peruvianum* (L.) Mill.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 0-400 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Solanum pimpinellifolium*** L.

Sinónimos: *Lycopersicon pimpinellifolium* (L.) Mill.,

*Lycopersicon pissisi* Phil., *Solanum pissisi* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativo.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Solanum pinnatum*** Cav.

Sinónimos: *Solanum maritimum* Meyen ex Nees, *Solanum albiflorum* Phil., *Solanum feuillei* Dunal, *Solanum novemlobum* Dunal, *Solanum novemlobum* Dunal var. *pauciflorum* Dunal, *Solanum pinnatum* Cav. var. *subintegrifolium* (Dunal) Reiche, nom. illeg., *Solanum pinnatum* Cav. var. *tomentosum* Reiche, *Solanum runcinatum* Ruiz & Pav., *Solanum cavanillesii* Dunal var. *subintegrifolium* Dunal, *Solanum gaudichaudiana* (J. Remy) Phil., *Witheringia gaudichaudiana* J. Remy, *Solanum gaudichaudii* Dunal var. *viride* Dunal, *Witheringia pinnata* (Cav.) J. Remy  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, JFE.  
Rango altitudinal: 100-800 m.  
Nombre vulgar: Hierba del chabalongo, serilla.

***Solanum polyphyllum*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR.

***Solanum pseudocapsicum*** L.

Subarbusto. Nativo.  
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, BIO, JFE.  
Rango altitudinal: 0-2600 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Solanum radicans*** L.f.

Sinónimos: *Solanum ruderales* (J. Remy) F. Phil., *Witheringia ruderales* J. Remy  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, LBO.  
Rango altitudinal: 500-2800 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Solanum remyanum*** Phil.

Sinónimos: *Solanum flexuosum* (J. Remy) Phil., *Witheringia flexuosa* J. Remy  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

***Solanum sanfurgoi*** Phil.

Arbusto. Endémico.  
Distribución: MAU.

***Solanum sarrachoides*** Sendtn.  
Sinónimos: *Solanum styleanum* Dunal  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: VAL, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 200-2300 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.  
Nombre vulgar: Mora.

***Solanum sinuatirecurvum*** Bitter  
Sinónimos: *Solanum metarsium* C.V. Morton  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 3000-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Solanum sisymbriifolium*** Lam.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, NUB.  
Rango altitudinal: 0-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Solanum sitiens*** I.M. Johnst.  
Sinónimos: *Solanum rickii* Correll  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 2500-3400 m.

***Solanum tuberosum*** L.  
Sinónimos: *Solanum chiloense* (A. DC.) Berthault, *Solanum molinae* Juz., *Solanum oceanicum* Brücher, *Solanum tuberosum* L. var. *chiloense* A.DC., *Solanum tuberosum* L. var. *cultum* A. DC., *Solanum tuberosum* L. var. *vulgare* Hook.f., *Solanum fonckii* Phil. ex Reiche, nom. nud., nom. nud., *Solanum chilotanum* Hawkes, nom. nud., *Solanum zykini* Lechn.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 500-3000 m.  
Países limítrofes: Perú.  
Nombre vulgar: Papa, poñi.

***Solanum tweedianum*** Hook.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Solanum valdiviense*** Dunal  
Sinónimos: *Solanum cyrtopodium* Dunal, *Solanum krauseanum* Phil., *Solanum puberulum* Phil., *Solanum poeppigianum* Dunal, nom. nud., *Solanum sembarto* Kuntze, *Solanum sembarto* Kuntze var. *pubescens* Kuntze,

*Solanum sembarto* Kuntze var. *varians* Kuntze, *Solanum spiraeoides* Dunal, *Solanum subnervium* Dunal  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 100-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Huevil, llaguecillo.

***Solanum weddellii*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 4000-4200 m.

### **Vestia**

***Vestia foetida*** Hoffmanns.  
Sinónimos: *Vestia lycioides* Willd.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 200 m.  
Nombre vulgar: Chuplín, echuelcúb, huevil.

### **STYLIDIACEAE**

#### **Donatia**

***Donatia fascicularis*** J.R. Forst. & G. Forst.  
Sinónimos: *Donatia magellanica* Lam., *Polycarpon magellanicum* L.f.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Hierba de Donati, donacia.

#### **Phyllachne**

***Phyllachne uliginosa*** J.R. Forst. & G. Forst.  
Sinónimos: *Forstera muscifolia* Willd., *Forstera uliginosa* (J.R. Forst. & G. Forst.) Hombr. & Jacquinot  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-700 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Musguillo.

## TETRACHONDRACEAE

### Tetrachondra

#### *Tetrachondra patagonica* Skottsbo.

Sinónimos: *Tetrachondra patagonica* Skottsbo. subsp. *fuigiana* D.M. Moore

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Tetracondra.

## THYMELAEACEAE

### Drapetes

#### *Drapetes muscosus* Lam.

Sinónimos: *Drapetes muscooides* Lam.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

### Ovidia

#### *Ovidia andina* (Poepp. & Endl.) Meisn.

Sinónimos: *Daphne andina* Poepp. & Endl., *Daphne tenera* Phil., *Ovidia tenera* (Phil.) Macloskie

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 700-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Traro-voqui.

#### *Ovidia pillo-pillo* (Gay) Meisn.

Sinónimos: *Daphne pillo-pillo* Gay, *Ovidia parviflora* Meisn.

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Nombre vulgar: Lloime, palo hediondo, pillopillo.

## TROPAEOLACEAE

### Tropaeolum

#### *Tropaeolum austropurpureum* (J.M. Watson & A.R.

Flores) J.M. Watson & A.R. Flores

Sinónimos: *Tropaeolum hookerianum* Barnéoud subsp. *austropurpureum* J.M. Watson & A.R. Flores

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-200 m.

#### *Tropaeolum azureum* Bertero ex Colla

Sinónimos: *Rixea azurea* (Colla) Morren, *Tropaeolum aureum* C.A. Muell., *Tropaeolum azureum* Bertero ex Colla var. *oblongilobum* Buchenau, *Tropaeolum violaeiflorum* A. Dietr., *Tropaeolum azureum* Bertero ex Colla var. *angustilobum* Buchenau, *Tropaeolum azureum* Bertero ex Colla var. *grandiflorum* Van Houtte, *Tropaeolum lepidum* Phil. ex Buchenau, *Tropaeolum lepidum* Phil. ex Buchenau var. *luteum* Reiche, *Tropaeolum reicheanum* Buchenau ex Reiche, *Tropaeolum luteum* (Reiche) Buchenau

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Nombre vulgar: Pajarito azul.

#### *Tropaeolum beuthii* Klotzsch

Sinónimos: *Tropaeolum leptoceras* I.M. Johnst., *Tropaeolum benthamii* Van Houtte

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 300-1000 m.

#### *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn.

Sinónimos: *Tropaeolum chilense* Bertero ex Colla, *Chymocarpus brachyceras* (Hook. & Arn.) Heynh., *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *genuinum* Buchenau, *Tropaeolum minimum* Miers, *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *grandiflorum* Reinecke ex Walp., *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *sulphureum* Walp., *Tropaeolum tenellum* G. Don

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Malla, pajarito.

#### *Tropaeolum ciliatum* Ruiz & Pav. subsp. *ciliatum*

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 400-1000 m.

#### *Tropaeolum ciliatum* Ruiz & Pav. subsp. *septentrionale* Sparre

Sinónimos: *Tropaeolum venosum* Phil. ex Buchenau

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 400-2000 m.

#### *Tropaeolum hookerianum* Barnéoud subsp. *hookerianum*

Sinónimos: *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *hookerianum* (Barnéoud) Buchenau

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.  
Nombre vulgar: Mastuerzo.

***Tropaeolum hookerianum*** Barnéoud subsp. ***pilosum*** J.M. Watson & A.R. Flores  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Tropaeolum incisum*** (Speg.) Sparre  
Sinónimos: *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var. *incisum* Speg., *Tropaeolum polyphyllum* Cav. fma. *schizophyllum* H. Ross ex Neger, nom. nud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 1000-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Tropaeolum jilesii*** Sparre  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 2000-2500 m.

***Tropaeolum kingii*** Phil.  
Sinónimos: *Tropaeolum buchenau* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 900-1500 m.

***Tropaeolum leptophyllum*** G. Don subsp. ***gracile*** (Hook. & Arn.) Sparre  
Sinónimos: *Tropaeolum gracile* (Hook. & Arn.) Sparre, *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var. *gracile* Hook. & Arn.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-1900 m.

***Tropaeolum leptophyllum*** G. Don subsp. ***leptophyllum***  
Sinónimos: *Tropaeolum chilense* Bertero ex Colla var. *eximium* Steud., *Tropaeolum edule* Bridges, *Tropaeolum bridgesii* Field & Gardner, *Tropaeolum linearifolium* Steud.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 1000-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Púa.

***Tropaeolum looseri*** Sparre  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 800-2400 m.

***Tropaeolum majus*** L.  
Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, BIO, JFE.

***Tropaeolum myriophyllum*** (Poepp. & Endl.) Sparre  
Sinónimos: *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var. *myriophyllum* Poepp. & Endl.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 400-3500 m.

***Tropaeolum nubigenum*** Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 3000-4000 m.

***Tropaeolum nuptae-jucundae*** Sparre  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Tropaeolum polyphyllum*** Cav.  
Sinónimos: *Chymocarpus polyphyllus* (Cav.) Heynh., *Tropaeolum prostratum* Miers, *Tropaeolum paniculatum* Meyen, *Tropaeolum floribundum* Turcz.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 2000-3700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Tropaeolum porifolium*** (Cav.) L. Andersson & S. Andersson  
Sinónimos: *Magallana porrifolia* Pers., *Magallana cavanillesii* Scala, *Magallana porifolia* Cav.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Tropaeolum rhomboideum*** Lem.  
Sinónimos: *Tropaeolum tenuirostre* Steud. var. *majus* Buchenau  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 1000-2000 m.

***Tropaeolum sessilifolium*** Poepp. & Endl.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 1500-3400 m.

***Tropaeolum speciosum*** Poepp. & Endl.  
Sinónimos: *Chymocarpus speciosus* (Poepp. & Endl.) Walp., *Tropaeolum lechleri* Steud., *Anisocentra cardiopetala* Turcz.  
Hierba. Perenne. Endémica.



Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Nombre vulgar: Martillo del carpintero, pajarito, voqui, quintralito.

***Tropaeolum tricolor* Sweet**

Sinónimos: *Chymocarpus tricolor* (Sweet) Heynh., *Tropaeolum coccineum* Miers, *Tropaeolum elegans* G. Don, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *majus* Marnock, *Tropaeolum jarrattii* Youell ex Paxton, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *jarrattii* (Paxton) Lem., *Tropaeolum subincrassatum* Steud., *Tropaeolum incrassatum* Steud., *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *grandiflorum* Reinecke ex Walp., *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *splendens* Reinecke ex Walp., *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *pallescens* Barnéoud, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *aurantiacum* Morren, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *grandiflorum* Morren, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *versicolor* Morren, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *venustum* Paxton ex Otto, *Tropaeolum violaceum* Steud., *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *regelianum* Möhring ex Regel, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *schultzii* Regel  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-2800 m.  
Nombre vulgar: Relicario, soldadillo, chupa-chupa, gargantilla, arguenita.

**ULMACEAE**

**Ulmus**

*Ulmus minor* Mill.  
Árbol. Introducido.  
Distribución: RME.

**URTICACEAE**

**Boehmeria**

*Boehmeria excelsa* (Bertero ex Steud.) Wedd.  
Sinónimos: *Splitgerbera denudata* Gay, *Procris excelsa* Bertero ex Steud.  
Árbol. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-400 m.  
Nombre vulgar: Manzano.

**Parietaria**

*Parietaria debilis* G. Forst.  
Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, JFE.

***Parietaria feliciana* Phil.**  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: IDE.

***Parietaria judaica* L.**  
Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: VAL, RME.

**Pilea**

***Pilea elegans* Gay**  
Sinónimos: *Pilea elliptica* Hook.f. var. *gayana* Wedd.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 0-700 m.  
Nombre vulgar: Coyanlahuén, mellahuvilu.

***Pilea elliptica* Hook.f.**  
Sinónimos: *Pilea chilensis* Wedd., *Pilea pedunculata* Blume, *Pilea uliginosa* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1100 m.

***Pilea hyalina* Fenzl**  
Sinónimos: *Pilea hyalina* Fenzl var. *longipes* Miq.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: LBO.  
Rango altitudinal: 0-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

**Soleirolia**

***Soleirolia soleirolii* (Req.) Dandy**  
Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI.

**Urtica**

***Urtica berteriana* Phil.**  
Sinónimos: *Urtica echinata* Benth. var. *berteroana* (Phil.) Wedd.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-600 m.

***Urtica dioica* L.**  
Arbusto. Introducido.  
Distribución: BIO, ARA, LLA.

***Urtica echinata*** Benth.

Sinónimos: *Urtica echinata* Benth. var. *punctulata* Hauman, *Urtica andicola* Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3600-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Urtica flabellata*** Kunth

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4000-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Urtica glomeruliflora*** Steud.

Sinónimos: *Urtica fernandeziana* (Gay) H. Ross ex Skottsb., comb. illeg., *Boehmeria fernandeziana* Gay  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 200-1300 m.

***Urtica gracilis*** Aiton subsp. *mollis* (Steud.) Weigend

Sinónimos: *Urtica buchtienii* R. Ross, *Urtica mollis* Steud., *Urtica dioica* L. var. *mollis* (Steud.) Wedd., *Urtica diplotricha* Phil., *Urtica dioica* L. var. *diplotricha* (Phil.) Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Urtica magellanica*** Poir.

Sinónimos: *Urtica darwinii* Hook.f., *Urtica magellanica* Poir. subsp. *bracteata* (Steud.) Geltman, *Urtica pseudodioica* Steud., *Urtica bracteata* Steud., *Urtica magellanica* Poir. var. *bracteata* (Steud.) Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Ortiga caballuna.

***Urtica masafuerae*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Urtica trichantha*** (Wedd.) Acevedo & L.E. Navas

Sinónimos: *Urtica echinata* Benth. var. *trichantha* Wedd.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3400-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Itapilla.

***Urtica urens*** L.

Hierba. Anual. Introducida.  
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

## VERBENACEAE

### ***Aloysia***

***Aloysia deserticola*** (Phil.) Lu-Irving & O'Leary

Sinónimos: *Acantholippia deserticola* (Phil.) Moldenke, *Acantholippia punensis* Botta, nom. illeg., *Lippia deserticola* Phil., *Lippia microphylla* Phil., nom. illeg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 2300-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Kore.

***Aloysia gratissima*** (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc.

Sinónimos: *Verbena gratissima* Gillies & Hook.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: VAL.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nota: Moroni et al. 2016 sólo cita un ejemplar para Chile en Valparaíso, Limache recolectado por Garaventa 7092 (SI). No existen otros materiales.

***Aloysia salviifolia*** (Hook. & Arn.) Moldenke

Sinónimos: *Aloysia chilensis* (Schauer) Moldenke, *Verbena salviifolia* Hook. & Arn., *Lippia chilensis* Schauer  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-1600 m.  
Nombre vulgar: Salvia blanca, salvia.

***Aloysia tarapacana*** (Botta) Lu-Irving & O'Leary

Sinónimos: *Acantholippia tarapacana* Botta  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 2800-3300 m.

***Aloysia trifida*** (Gay) Lu-Irving & O'Leary

Sinónimos: *Aloysia fonckii* (Phil.) Moldenke, *Aloysia reichei* Moldenke var. *reichei*, *Aloysia reichei* Moldenke var. *trilobata* Moldenke, *Acantholippia trifida* (Gay) Moldenke, *Lippia trifida* Gay, *Aloysia gracilis* (Phil.) Acevedo, comb. illeg., *Lippia trifida* Gay var. *gracilis* (Phil.) Reiche, *Lippia fonckii* Phil., *Acantholippia trifida* (Gay) Moldenke var. *reichei* Moldenke

Arbusto. Nativo.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

### **Diostea**

***Diostea juncea*** (Gillies & Hook.) Miers  
Sinónimos: *Verbena juncea* Gillies & Hook., *Lippia juncea* (Gillies & Hook.) Schauer, *Baillonia juncea* Benth. & Hook.f., *Dipyrena spartioides* Ravenna, *Dipyrena juncea* (Gillies & Hook.) Ravenna, *Dipyrena valdiviana* Phil., *Diostea valdiviana* (Phil.) Miers, *Dipyrena dentata* Phil., *Diostea infusca* Miers, *Dipyrena infusca* (Miers) Ravenna, *Citharexylum germaini* Briq., *Diostea chamaedryfolia* Hort ex Hook.f., nom. illeg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Retama.

### **Glandularia**

***Glandularia araucana*** (Phil.) Botta  
Sinónimos: *Verbena araucana* Phil., *Verbena chilensis* Moldenke, *Verbena glabrata* Phil., nom. illeg.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 900-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Glandularia atacamensis*** (Reiche) J.M. Watson & A. Hoffm.  
Sinónimos: *Verbena atacamensis* Reiche, *Verbena trifida* Kunth var. *deserticola* Moldenke  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-700 m.

***Glandularia berteroi*** (Schauer) Muñoz-Schick  
Sinónimos: *Glandularia reichei* (Acevedo) L.E. Navas, *Verbena berteroi* Schauer fma. *albiflora* Moldenke, *Verbena reichei* Acevedo, *Shuttleworthia berteroi* Meisn., *Verbena berteroi* Schauer  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 100-3400 m.

***Glandularia corymbosa*** (Ruiz & Pav.) N. O'Leary & P. Peralta  
Sinónimos: *Verbena corymbosa* Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 0-700 m.  
Nombre vulgar: Corre-caballito, verbena.  
Nota: Se encuentra también en Brasil y Uruguay.

***Glandularia gynobasis*** (Wedd.) N. O'Leary & P. Peralta  
Sinónimos: *Verbena bella* Phil., *Verbena gynobasis* Wedd. var. *strigosa* Phil., *Verbena gynobasis* Wedd.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 1900-4000 m.

***Glandularia laciniata*** (L.) Schnack & Covas  
Sinónimos: *Verbena laciniata* (L.) Briq., *Verbena trachea* Phil., *Erinus laciniatus* L., *Verbena odorata* Meyen  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-2100 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Glandularia landbeckii*** (Phil.) P. Peralta  
Sinónimos: *Verbena landbeckii* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 300-1500 m.

***Glandularia lipozygioides*** (Walp.) L.E. Navas  
Sinónimos: *Verbena lipozygioides* Walp., *Verbena lipozygioides* Walp. var. *minima* Walp.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 1200-1400 m.

***Glandularia macrosperma*** (Speg.) Tronc.  
Sinónimos: *Glandularia sulphurea* (D. Don) Schnack & Covas var. *intermedia* (Kuntze) L.E. Navas, *Verbena sulphurea* D. Don var. *intermedia* Kuntze, *Verbena macrosperma* Speg.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 2800-3100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Glandularia multiglandulosa*** (Moldenke) P. Peralta  
Sinónimos: *Verbena multiglandulosa* Moldenke  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 1300 m.

***Glandularia porrigens*** (Phil.) J.M. Watson & A. Hoffm.  
Sinónimos: *Verbena cumingii* Moldenke, *Verbena paulsenii* Phil., *Verbena porrigens* Phil.

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Glandularia ribifolia*** (Walp.) P. Peralta  
Sinónimos: *Verbena ribifolia* Walp., *Verbena ribifolia* Walp. var. *foetida* (Phil.) Acevedo, *Verbena ribifolia* Walp. fma. *alba* Acevedo, *Verbena ribifolia* Walp. fma. *longavina* (Phil.) Acevedo, *Verbena foetida* Phil., *Verbena longavina* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 500-2500 m.

***Glandularia sulphurea*** (D. Don) Schnack & Covas var. ***pedunculata*** (Clos) L.E. Navas  
Sinónimos: *Verbena sulphurea* D. Don var. *fuscobruba* Skotts., *Verbena sulphurea* D. Don var. *pedunculata* Clos, *Verbena sulphurea* D. Don fma. *alba* Moldenke ex Skotts.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Glandularia sulphurea*** (D. Don) Schnack & Covas var. ***sulphurea***  
Sinónimos: *Verbena sulphurea* D. Don var. *taltalensis* Moldenke, *Verbena sulphurea* D. Don, *Verbena sulphurea* D. Don var. *longituba* Kuntze, *Verbena sulphurea* D. Don var. *scabra* Acevedo, *Shuttleworthia sulphurea* (D. Don) Meisn., *Uwarowia sulphurea* (D. Don) Meisn.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, ARA.  
Rango altitudinal: 2600-3300 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Hierba del incordio.

## **Junellia**

***Junellia aretioides*** (R.E. Fr.) Moldenke  
Sinónimos: *Verbena aretioides* R.E. Fr.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 2700-4400 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Junellia bryoides*** (Phil.) Moldenke  
Sinónimos: *Verbena bryoides* Phil.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: AYP, TAR.  
Rango altitudinal: 3100-3900 m.  
Nombre vulgar: Culesoro, pata de perdiz.

***Junellia caespitosa*** (Gillies & Hook.) Moldenke  
Sinónimos: *Verbena caespitosa* Gillies & Hook.

Arbusto. Nativo.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 1400-3600 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Junellia crithmifolia*** (Gillies & Hook.) N. O'Leary & P. Peralta  
Sinónimos: *Verbena crithmifolia* Gillies & Hook., *Glandularia crithmifolia* (Gillies & Hook.) Schnack & Covas  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Junellia digitata*** (Phil.) Moldenke var. ***digitata***  
Sinónimos: *Verbena triternata* Phil., *Junellia tridactyla* (Phil.) Moldenke, *Junellia punctulata* Hieron. ex Moldenke, *Verbena digitata* Phil., *Verbena tridactyla* Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3500-4700 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Altea.

***Junellia digitata*** (Phil.) Moldenke var. ***integerrima*** (Botta) Botta  
Sinónimos: *Verbena digitata* Phil. var. *integerrima* Botta  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 3200-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Junellia juniperina*** (Lag.) Moldenke  
Sinónimos: *Verbena juniperina* Lag.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, RME.  
Rango altitudinal: 1900-3600 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Tola.

***Junellia lavandulaefolia*** (Phil.) Moldenke  
Sinónimos: *Junellia lavandulaefolia* (Phil.) Moldenke var. *colchaguensis* (Phil.) Moldenke, *Verbena lavandulaefolia* Phil., *Verbena colchaguensis* Phil., *Verbena lavandulaefolia* Phil. var. *colchaguensis* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1000-3200 m.

***Junellia micrantha*** (Phil.) Múlgura  
Sinónimos: *Junellia micrantha* (Phil.) Moldenke, nom. illeg., *Verbena ramulosa* Phil., *Verbena micrantha* Phil.  
Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Junellia minima*** (Meyen) Moldenke  
Sinónimos: *Junellia minima* (Meyen) Moldenke var. *strigosa* Moldenke, *Junellia stragulosoides* Moldenke, *Verbena minima* Meyen, *Verbena stragulooides* (Moldenke) Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Junellia odonellii*** Moldenke  
Sinónimos: *Verbena o'donelli* (Moldenke) Tronc., comb. illeg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Junellia origenes*** (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta  
Sinónimos: *Verbena origenes* Phil., *Verbena origenes* Phil. var. *glabriflora* Moldenke, *Verbena deserticola* Phil., *Verbena origenes* Phil. var. *semperi* Moldenke, *Verbena palmata* Reiche, *Glandularia origenes* (Phil.) Schnack & Covas  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Rica-rica, core, costilla.

***Junellia pappigera*** (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta  
Sinónimos: *Urbania egañoides* Phil., *Urbania pappigera* Phil.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: TAR, ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 3100-4800 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Junellia pseudojuncea*** (Gay) Moldenke  
Sinónimos: *Verbena pseudojuncea* Gay, *Verbena spathulata* Gillies & Hook. var. *pseudojuncea* (Gay) Reiche, *Thryothamnus junciformis* Phil., *Verbena junciformis* (Phil.) Reiche  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 2000-2500 m.

***Junellia selaginoides*** (Kunth ex Walp.) Moldenke var. ***illapelina*** (Phil.) Botta  
Sinónimos: *Junellia illapelina* (Phil.) Moldenke, *Verbena illapelina* Phil., *Verbena selaginoides* Kunth ex Walp. var. *illapelina* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 600-1500 m.

***Junellia selaginoides*** (Kunth ex Walp.) Moldenke var. ***selaginoides***  
Sinónimos: *Verbena polycephala* Turcz., *Verbena selaginoides* Kunth ex Walp., *Verbena alternifolia* Hort ex Schauer  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ANT, COQ.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Junellia seriphioides*** (Gillies & Hook.) Moldenke  
Sinónimos: *Verbena echinata* Phil., *Verbena seriphioides* Gillies & Hook.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: AYP, TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 1300-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Rosa de la cordillera, kaylla.

***Junellia silvestrii*** (Speg.) Moldenke  
Sinónimos: *Verbena silvestrii* Speg.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Junellia spathulata*** (Gillies & Hook.) Moldenke var. ***glauca*** (Gillies & Hook.) Botta  
Sinónimos: *Junellia glauca* (Gillies & Hook.) Moldenke, *Verbena glauca* Gillies & Hook.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.  
Rango altitudinal: 500-2700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Junellia spathulata*** (Gillies & Hook.) Moldenke var. ***spathulata***  
Sinónimos: *Verbena spathulata* Gillies & Hook.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 1900-2200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Junellia thymifolia*** (Lag.) Moldenke  
Sinónimos: *Verbena thymifolia* Lag.  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-500 m.  
Países limítrofes: Argentina.



***Junellia tridactylites*** (Lag.) Moldenke

Sinónimos: *Junellia minutifolia* (Phil.) Moldenke, *Verbena minutifolia* Phil., *Verbena philippiana* Kuntze, nom. illeg., *Verbena tridactylites* Lag.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 2300-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Junellia trifurcata*** (Phil.) Moldenke

Sinónimos: *Verbena trifurcata* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2300-3400 m.

***Junellia ulicina*** (Phil.) Moldenke

Sinónimos: *Verbena ulicina* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Junellia uniflora*** (Phil.) Moldenke

Sinónimos: *Verbena uniflora* Phil., *Lycium nanum* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 2500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

**Lampayo**

***Lampayo hieronymi*** K. Schum. ex Moldenke

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 2500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lampaya macho.

Nota: El nombre de género *Lampaya* es considerado inválido.

***Lampayo medicinalis*** Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2000-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Nombre vulgar: Lampaya hembra.

Nota: El nombre de género *Lampaya* es considerado inválido.

**Lantana**

***Lantana camara*** L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL, IPA.

**Lippia**

***Lippia fragrans*** Turcz.

Sinónimos: *Lippia geisseana* (Phil.) Soler., *Buddleja geisseana* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Orégano.

***Lippia turbinata*** Griseb.

Sinónimos: *Lippia aprica* Phil., *Lippia disepala* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

**Mulguraea**

***Mulguraea arequipensis*** (Botta) N. O'Leary & P. Peralta

Sinónimos: *Verbena arequipense* Botta, *Junellia arequipense* (Botta) Botta, *Dipyrena arequipensis* (Botta) Ravenna

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2200-4300 m.

Países limítrofes: Perú.

***Mulguraea asparagoides*** (Gillies & Hook.) N. O'Leary & P. Peralta

Sinónimos: *Verbena asparagoides* Gillies & Hook., *Junellia asparagoides* (Gillies & Hook.) Moldenke

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 2000-2800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Mulguraea cinerascens*** (Schauer) N. O'Leary & P. Peralta

Sinónimos: *Diostea cinerascens* (Schauer) Moldenke, *Verbena cinerascens* Schauer, *Junellia cinerascens* (Schauer) Botta, *Dipyrena cinerascens* (Schauer) Ravenna

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

***Mulguraea hystrix*** (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta

Sinónimos: *Verbena hystrix* Phil., *Junellia hystrix* (Phil.) Moldenke

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2600-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

**Mulguraea scoparia** (Gillies & Hook.) N. O'Leary & P. Peralta

Sinónimos: *Verbena scoparia* Gillies & Hook., *Diostea scoparia* (Gillies & Hook.) Miers, *Diostea scirpea* (Phil.) Miers, *Lippia aphylla* Phil., *Lippia scirpea* Phil., *Verbena scoparia* Gillies & Hook. var. *aphylla* (Phil.) Acevedo, comb. illeg., *Junellia scoparia* (Gillies & Hook.) Botta, *Dipyrena scoparia* (Hook.) Ravenna  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1800-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Mulguraea tridens** (Lag.) N. O'Leary & P. Peralta

Sinónimos: *Verbena tridens* Lag., *Junellia tridens* (Lag.) Moldenke  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: MAG.  
Rango altitudinal: 0-800 m.  
Países limítrofes: Argentina.

## Phyla

**Phyla nodiflora** (L.) Greene var. *minor* (Gillies & Hook.) N. O'Leary & P. Peralta

Sinónimos: *Phyla canescens* (Kunth) Greene, *Lippia canescens* Kunth, *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *minor* Gillies & Hook., *Lippia litoralis* Phil., *Phyla nodiflora* (L.) Greene fma. *copiapina* Acevedo  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

**Phyla nodiflora** (L.) Greene var. *nodiflora*

Sinónimos: *Lippia nodiflora* (L.) Michx., *Verbena nodiflora* L.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: TAR, ATA.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.  
Nombre vulgar: Hierba de la virgen María, tiqui-tiqui, tiquil-tiquil.

## Pitraea

**Pitraea cuneato-ovata** (Cav.) Caro

Sinónimos: *Castelia cuneato-ovata* Cav., *Pitraea chilensis* Turcz., *Priva cuneato-ovata* (Cav.) Rusby, *Bouchea copiapensis* Gay  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.  
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Chámen.

## Rhaphithamnus

**Rhaphithamnus spinosus** (Juss.) Moldenke

Sinónimos: *Volkameria spinosa* Juss., *Duranta umbilicata* Miers, *Duranta umbellata* Miers, *Citharexylum cyanocarpum* Hook. & Arn., *Citharexylum ovatum* Turcz., *Rhaphithamnus cyanocarpum* (Hook. & Arn.) Miers, *Rhaphithamnus amoenus* Miers, *Rhaphithamnus buxifolius* Miers, *Rhaphithamnus parvifolius* Miers, *Rhaphithamnus macranthus* Gand., *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke fma. *albiflorus* G. Kunkel, *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke var. *inermis* G. Kunkel, *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke fma. *microphyllus* G. Kunkel  
Arbusto. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Arrayán macho, espino negro, arrayán de espino, huayún, espino blanco, hayún, repu, arrayancillo.

**Rhaphithamnus venustus** (Phil.) B.L. Rob.

Sinónimos: *Citharexylum venustum* Phil., *Rhaphithamnus longiflorus* Miers, *Rhaphithamnus serratifolius* Miers, *Rhaphithamnus venustus* (Phil.) Skotts., comb. illeg.  
Árbol. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Nombre vulgar: Juan bueno.

## Verbena

**Verbena bonariensis** L.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-2100 m.  
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.  
Nombre vulgar: Verbena.

**Verbena cuneifolia** Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2000-4000 m.  
Países limítrofes: Perú.

**Verbena hispida** Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP, TAR, VAL, RME, LBO, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Verbena litoralis*** Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Verbena.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández y en la Isla de Pascua.

***Verbena officinalis*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, MAU, BIO, ARA, LRI.

**VIOLACEAE**

**Pombalia**

***Pombalia parviflora*** (Mutis ex L.f.) Paula-Souza

Sinónimos: *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill., *Viola parviflora* Mutis ex L.f., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *latifolius* (Eichler) Hassl., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *argentiniensis* Sparre, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *glutinosus* (Vent.) Hassl., *Ionidium parviflorum* (Mutis ex L.f.) Vent., *Ionidium glutinosum* Vent., *Hybanthus glutinosus* (Vent.) Taub., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *typicus* Hassl., nom. illeg., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. fma. *membranaceus* Schulze-Menz, *Calceolaria bangii* Rusby, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *chamaedrifolius* (C. Presl) Sparre, *Ionidium chamaedryfolium* Poepp. ex Walp., *Solea parviflora* (Mutis ex L.f.) Spreng., *Ionidium glutinosum* Vent. var. *latifolium* Eichler, *Ionidium glutinosum* Vent. var. *angustifolium* Eichler, *Ionidium glutinosum* Vent. var. *paraguayense* Chodat, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *bangii* (Rusby) Sparre, *Hybanthus maytencillo* Baill., *Hybanthus microphyllus* (Willd. ex Schult.) Baill., *Ionidium microphyllum* (Willd. ex Schult.) Kunth, *Solea glutinosa* (Vent.) Spreng., *Viola glutinosa* (Vent.) Poir., *Viola microphylla* Willd. ex Schult., nom. illeg., *Viola parvifolia* Schult., *Viola venezuelensis* Steyererm.

Hierba. Anual o perenne. Nativa.

Distribución: LBO, BIO.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

**Viola**

***Viola acanthophylla*** Leyb. ex Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

***Viola aizoon*** Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, ARA.

***Viola angustifolia*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LBO.

***Viola araucaniae*** W. Becker

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ARA.

***Viola arvensis*** Murray

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

***Viola atropurpurea*** Leyb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Escarapela, carabello.

***Viola aurantiaca*** Leyb.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2600-3000 m.

***Viola aurata*** Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 900-1100 m.

Nombre vulgar: Estrellita.

***Viola auricolor*** Skottsb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 780-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Viola auricula*** Leyb.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2200-2500 m.

***Viola brachypetala*** Gay

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL.

***Viola bustillosia*** Gay

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO.

Rango altitudinal: 2100-2400 m.

***Viola calderensis*** W. Becker

Sinónimos: *Viola pseudasterias* Reiche, *Viola pseudasterias* Reiche var. *psammophila* (Phil.) Reiche, *Viola psammophila* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Viola cano-barbata*** Leyb.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 2500-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola capillaris*** Pers. var. *araucana* (Phil.) Reiche

Subarbusto. Endémico.  
Distribución: NUB, BIO, ARA.

***Viola capillaris*** Pers. var. *capillaris*

Sinónimos: *Viola stipularis* Cav.  
Subarbusto. Nativo.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-300 m.  
Países limítrofes: Perú.

***Viola capillaris*** Pers. var. *dumetorum* (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Viola dumetorum* Phil., *Viola dumetorum* Phil. var. *araucana* Phil.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: BIO.

***Viola chamaedrys*** Leyb.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1500-1900 m.

***Viola columnaris*** Skottsbo.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 800-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola commersonii*** DC. ex Ging.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola congesta*** Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, MAU.

***Viola corralensis*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Viola cotyledon*** Ging.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 900-3300 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Hierba del corazón.

***Viola curicoensis*** W. Becker

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 2000-2500 m.

***Viola cyathiformis*** W. Becker

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: NUB.  
Rango altitudinal: 600-700 m.

***Viola decipiens*** Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, RME, NUB.  
Rango altitudinal: 2700-3500 m.

***Viola domeykoana*** Gay

Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.  
Rango altitudinal: 3000-4100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola escarapela*** J.M. Watson & A.R. Flores

Sinónimos: *Viola pulchella* Leyb. ex Reiche  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ, VAL, MAU.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.

***Viola farkasiana*** J.M. Watson & A.R. Flores

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO.  
Rango altitudinal: 1400-1500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola flühmannii*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LRI.  
Rango altitudinal: 1500-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola friderici*** W. Becker

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.

***Viola frigida*** Phil.

Sinónimos: *Viola frigida* Phil. var. *borchersii* (Phil.) Reiche,  
*Viola borchersi* Phil.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.  
Rango altitudinal: 3000-4100 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola germainii*** Sparre

Sinónimos: *Viola nivalis* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 3000 m.

***Viola glacialis*** Poepp. & Endl.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 2500 m.

***Viola glechomoides*** Leyb.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2200-2800 m.

***Viola godoyae*** Phil.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA.

***Viola granulosa*** Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AYP.  
Rango altitudinal: 4000-4500 m.  
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

***Viola huesoensis*** Martic.

Sinónimos: *Viola litoralis* Phil., nom. illeg.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Viola huidobrii*** Gay

Sinónimos: *Viola lechlerii* Griseb.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: BIO, ARA, LLA.  
Rango altitudinal: 100-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola johnstonii*** W. Becker

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: ANT.

***Viola karlreicheana*** Sanso, Seo & Xifreda

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: RME.

***Viola lanifera*** W. Becker

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 3000-3200 m.

***Viola leyboldiana*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: VAL, MAU.

***Viola llullaillacoensis*** W. Becker

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA.  
Rango altitudinal: 4000-4200 m.

***Viola maculata*** Cav. var. *maculata*

Sinónimos: *Viola maculata* Cav. var. *pubescens* Reiche,  
*Viola valdiviana* Kalela, *Viola buchtienii* Gand., *Viola maculata* Cav. fma. *chilensis* Weibel, *Viola maculata* Cav. fma. *chillanensis* Sparre, *Viola maculata* Cav. fma. *constitucionensis* Sparre, *Viola maculata* Cav. fma. *munozii* Sparre, *Viola maculata* Cav. fma. *valdiviana* (Kalela) Weibel, *Viola maculata* Cav. var. *buchtienii* (Gand.) Weibel  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Pilludén, violeta del monte.

***Viola maculata*** Cav. var. *microphyllus* (Poir.) DC. ex Ging.

Sinónimos: *Viola microphyllus* Poir., *Viola maculata* Cav. subsp. *microphyllus* (Poir.) Weibel  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola maculata*** Cav. var. *popetae* Sparre

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO.

***Viola magellanica*** G. Forst.

Sinónimos: *Viola magniflora* Molina  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, MAG.  
Rango altitudinal: 0-700 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola minutiflora*** Phil.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: BIO, ARA.  
Rango altitudinal: 0-500 m.



***Viola montagnei*** Gay var. *glandulosa* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: COQ, RME.  
Rango altitudinal: 2600-4100 m.

***Viola montagnei*** Gay var. *montagnei*

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 2900-4200 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola muscoides*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 700 m.

***Viola nassauvioides*** Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME.

***Viola nubigena*** Leyb.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2500-3000 m.

***Viola odorata*** L.

Hierba. Perenne. Introducida.  
Distribución: VAL, LBO, BIO.

***Viola ovalleana*** Phil.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ.  
Rango altitudinal: 2600-2800 m.

***Viola philippii*** Leyb. var. *arbuscula* (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Viola arbuscula* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 2000-4000 m.

***Viola philippii*** Leyb. var. *philippii*

Sinónimos: *Viola microphylla* Phil.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 2500-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola polypoda*** Turcz.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 0-3500 m.

***Viola portalesia*** Gay var. *integerrima* (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Viola integerrima* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU.  
Rango altitudinal: 0-3000 m.

***Viola portalesia*** Gay var. *portalesia*

Sinónimos: *Viola rubella* auct. non Cav.  
Subarbusto. Endémico.  
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-1800 m.

***Viola portulacea*** Leyb.

Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: RME, LBO.  
Rango altitudinal: 2500-4500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola pulvinata*** Reiche

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: RME.  
Rango altitudinal: 1900 m.

***Viola pusilla*** Poepp.

Sinónimos: *Viola asterias* Hook. & Arn., *Viola miersii* Bertero ex Steud., *Viola stellata* Miers, *Viola asterias* Hook. & Arn. var. *genuina* Reiche  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 0-2700 m.

***Viola reichei*** Skottsbo.

Sinónimos: *Viola maculata* Cav. subsp. *reichei* (Skottsbo.) Weibel, *Viola reichei* Skottsbo. fma. *gunckelii* Sparre  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola rhombifolia*** Leyb.

Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

***Viola rosulata*** Poepp. & Endl.

Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 2000-2200 m.

***Viola rubella*** Cav.

Sinónimos: *Viola rubella* Cav. var. *angustifolia* Ging., *Viola rubella* Cav. var. *latifolia* Ging.  
Subarbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 0-300 m.

***Viola rudolphii*** Sparre  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 1100 m.

***Viola rugosa*** Phil. ex W. Becker  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: MAU.

***Viola sacculus*** Skottsbo.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: AIS.  
Rango altitudinal: 1000-1300 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola santiagoensis*** W. Becker  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.

***Viola sempervivum*** Gay  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: COQ, VAL, RME.  
Rango altitudinal: 2000-3500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola skottsbergiana*** W. Becker  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: LBO, MAU, BIO.  
Rango altitudinal: 2000-3000 m.

***Viola subandina*** J.M. Watson  
Sinónimos: *Viola pusilla* Hook. & Arn. ex Hook.  
Hierba. Anual. Nativa.  
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB.  
Rango altitudinal: 2000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola taltalensis*** W. Becker var. ***glaberrima*** W. Becker  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Viola taltalensis*** W. Becker var. ***taltalensis***  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Viola toroensis*** Martic.  
Sinónimos: *Viola chrysantha* Phil., nom. illeg.  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: COQ.

***Viola tricolor*** L.  
Hierba. Anual o bienal. Introducida.  
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,  
LRI, LLA.

***Viola tridentata*** Menzies ex Ging.  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1000 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola truncata*** Meyen var. ***glaberrima*** W. Becker  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.

***Viola truncata*** Meyen var. ***glandulifera*** W. Becker  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: MAU.  
Rango altitudinal: 2000-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.

***Viola truncata*** Meyen var. ***truncata***  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME, LBO.  
Rango altitudinal: 300-2300 m.

***Viola vallenarensis*** W. Becker  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ATA.  
Rango altitudinal: 4000 m.

***Viola volcanica*** Gillies ex Hook. & Arn. var. ***chillanensis***  
(Phil.) Reiche  
Sinónimos: *Viola chillanensis* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: NUB.  
Rango altitudinal: 1300-1400 m.

***Viola volcanica*** Gillies ex Hook. & Arn. var. ***exilis*** (Phil.)  
Reiche  
Sinónimos: *Viola exilis* Phil.  
Hierba. Perenne. Endémica.  
Distribución: RME.

***Viola volcanica*** Gillies ex Hook. & Arn. var. ***volcanica***  
Sinónimos: *Viola congesta* auct. non Gillies  
Hierba. Perenne. Nativa.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.  
Rango altitudinal: 1200-4000 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Marmo.

*Viola werdermannii* W. Becker var. *glaberrima* W. Becker  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: TAR, ANT.  
Rango altitudinal: 700 m.

*Viola werdermannii* W. Becker var. *werdermannii*  
Hierba. Anual. Endémica.  
Distribución: ANT.  
Rango altitudinal: 0-500 m.

## VITACEAE

### Cissus

*Cissus striata* Ruiz & Pav.  
Sinónimos: *Cissus deficiens* Hook. & Arn., *Adenopetalum palmatum* Turcz., *Cissus striata* Ruiz & Pav. var. *chilensis* Suess., *Cissus striata* Ruiz & Pav. var. *deficiens* (Hook. & Arn.) Reiche, *Cissus striata* Bertero ex Steud., *Cissus stricta* Bertero ex Steud., *Cissus violacea* Meyen, *Vitis straita* E.G. Baker, *Cissus bonariensis* Hook & Arn.  
Arbusto trepador. Nativo.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1700 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Pilpilvoqui, voqui colorado.

### Vitis

*Vitis vinifera* L.  
Arbusto trepador. Introducido.  
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, JFE.  
Nombre vulgar: Vid, parra.

## WINTERACEAE

### Drimys

*Drimys andina* (Reiche) R. A. Rodr. & Quezada  
Sinónimos: *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *andina* Reiche, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *chilensis* (DC.) A. Gray fma. *andina* (Reiche) Hauman, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *quinoensis* Kuntze  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.  
Rango altitudinal: 800-1500 m.  
Nombre vulgar: Canelo enano.

### *Drimys confertifolia* Phil.

Sinónimos: *Drimys fernandeziana* Steud., *Drimys fernandezianus* Miers, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *fernandeziana* (Steud.) Reiche, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *confertifolia* (Phil.) Johow  
Árbol. Endémico.  
Distribución: JFE.  
Rango altitudinal: 100-1200 m.  
Nombre vulgar: Canelo de Juan Fernández.

### *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *chilensis* (DC.) A. Gray

Sinónimos: *Drimys paniculata* Steud., *Drimys chilensis* DC. var. *latifolia* Miers, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. fma. *chilensis* Eichler, *Drimys chilensis* DC.  
Árbol. Endémico.  
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-1700 m.  
Nombre vulgar: Canelo.

### *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *winteri*

Sinónimos: *Wintera aromatica* Sol. ex Foth., *Drimys punctata* Lam., *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *punctata* (Lam.) DC., *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. fma. *magellanica* Eichler, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *morenonis* Kuntze, *Drimys wintera* Thell., *Drimys aromatique* Descourt. ex Baill.  
Árbol. Nativo.  
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.  
Rango altitudinal: 0-2500 m.  
Países limítrofes: Argentina.  
Nombre vulgar: Canelo, foye.

## ZYGOPHYLLACEAE

### Bulnesia

#### *Bulnesia chilensis* Gay

Sinónimos: *Gonoptera chilensis* Turcz.  
Arbusto. Endémico.  
Distribución: ATA, COQ.  
Rango altitudinal: 100-4000 m.  
Nombre vulgar: Retama, retama del cerro.

### Fagonia

#### *Fagonia chilensis* Hook. & Arn.

Sinónimos: *Fagonia chilensis* Hook. & Arn. var. *aspera* (Gay) I.M. Johnst., *Fagonia subaphylla* Phil., *Fagonia aspera* Gay  
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Hualputilla, rosita.

### **Larrea**

*Larrea divaricata* Cav.

Sinónimos: *Covillea divaricata* (Cav.) Vail, *Neoschroetera divaricata* (Cav.) Briq., *Schroeterella divaricata* (Cav.)

Briq.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, VAL, RME, BIO.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Jarrilla.

*Larrea nitida* Cav.

Sinónimos: *Larrea balsamica* I.M. Johnst., *Covillea nitida* (Cav.) Vail

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-3400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Jarrilla.

### **Metharme**

*Metharme lanata* Phil. ex Engl.

Sinónimos: *Metharme lanata* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2100-2200 m.

### **Pintoa**

*Pintoa chilensis* Gay

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 200-1500 m.

### **Porlieria**

*Porlieria chilensis* I.M. Johnst.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Guayacán, palo santo.

### **Tribulus**

*Tribulus terrestris* L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: TAR, ANT, ATA, RME.

ANEXO 1. Lista alfabética de géneros con su respectiva familia y clase. Los acrónimos de las clases son: LYCOP (Lycopodiopsida), POLYP (Polypodiopsida), GNETO (Gnetopsida), PINOP (Pinopsida), LILIO (Liliopsida) y MAGNO (Magnoliopsida). / Alphabetic list of genera with family and class. Each class acronym: LYCOP (Lycopodiopsida), POLYP (Polypodiopsida), GNETO (Gnetopsida), PINOP (Pinopsida), LILIO (Liliopsida) y MAGNO (Magnoliopsida).

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Abrotanella</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Ammophila</i>	Poaceae	LILIO
<i>Abutilon</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Amomyrtus</i>	Myrtaceae	MAGNO
<i>Acacia</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Amphibromus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Acaena</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Amphiscirpus</i>	Cyperaceae	LILIO
<i>Achillea</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Amsinckia</i>	Boraginaceae	MAGNO
<i>Achyrocline</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Anagallis</i>	Primulaceae	MAGNO
<i>Acmella</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Anaphalis</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Acrisione</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Anarthrophyllum</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Adenocaulon</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Anatherostipa</i>	Poaceae	LILIO
<i>Adenopeltis</i>	Euphorbiaceae	MAGNO	<i>Andeimalva</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Adesmia</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Androsace</i>	Primulaceae	MAGNO
<i>Adiantum</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Anemone</i>	Ranunculaceae	MAGNO
<i>Aextoxicon</i>	Aextoxicaceae	MAGNO	<i>Anethum</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Agalinis</i>	Orobanchaceae	MAGNO	<i>Anisomeria</i>	Phytolaccaceae	MAGNO
<i>Ageratum</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Anoda</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Agoseris</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Anredera</i>	Basellaceae	MAGNO
<i>Agropyron</i>	Poaceae	LILIO	<i>Antennaria</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Agrostemma</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Anthemis</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Agrostis</i>	Poaceae	LILIO	<i>Anthoxanthum</i>	Poaceae	LILIO
<i>Ailanthus</i>	Simaroubaceae	MAGNO	<i>Anthriscus</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Aira</i>	Poaceae	LILIO	<i>Antidaphne</i>	Santalaceae	MAGNO
<i>Albizia</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Apera</i>	Poaceae	LILIO
<i>Aldama</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Aphanes</i>	Rosaceae	MAGNO
<i>Alisma</i>	Alismataceae	LILIO	<i>Aphyllocladus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Allionia</i>	Nyctaginaceae	MAGNO	<i>Apium</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Allium</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Apodasmia</i>	Restionaceae	LILIO
<i>Alnus</i>	Betulaceae	MAGNO	<i>Aponogeton</i>	Aponogetonaceae	LILIO
<i>Alonsoa</i>	Scrophulariaceae	MAGNO	<i>Aquilegia</i>	Ranunculaceae	MAGNO
<i>Alopecurus</i>	Poaceae	LILIO	<i>Arabidopsis</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Aloysia</i>	Verbenaceae	MAGNO	<i>Arachnitis</i>	Corsiaceae	LILIO
<i>Alshehbazia</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Araeoandra</i>	Francoaceae	MAGNO
<i>Alstroemeria</i>	Alstroemeriaceae	LILIO	<i>Araucaria</i>	Araucariaceae	PINOP
<i>Alternanthera</i>	Amaranthaceae	MAGNO	<i>Arctium</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Alyssum</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Arctotheca</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Amaranthus</i>	Amaranthaceae	MAGNO	<i>Arenaria</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Amaryllis</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Argemone</i>	Papaveraceae	MAGNO
<i>Amblyopappus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Argyria</i>	Bignoniaceae	MAGNO
<i>Ambrosia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Argyranthemum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Amelichloa</i>	Poaceae	LILIO	<i>Argyrochosma</i>	Pteridaceae	POLYP
<i>Ammannia</i>	Lythraceae	MAGNO	<i>Aristida</i>	Poaceae	LILIO
<i>Ammi</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Aristolochia</i>	Aristolochiaceae	MAGNO



GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Aristolelia</i>	Elaeocarpaceae	MAGNO	<i>Benthamiella</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Arjona</i>	Schoepfiaceae	MAGNO	<i>Berberidopsis</i>	Berberidopsidaceae	MAGNO
<i>Armeria</i>	Plumbaginaceae	MAGNO	<i>Berberis</i>	Berberidaceae	MAGNO
<i>Arnica</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Beta</i>	Chenopodiaceae	MAGNO
<i>Arrhenatherum</i>	Poaceae	LILIO	<i>Bidens</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Artemisia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Bipinnula</i>	Orchidaceae	LILIO
<i>Arthropteris</i>	Oleandraceae	POLYP	<i>Blechnum</i>	Blechnaceae	POLYP
<i>Arundo</i>	Poaceae	LILIO	<i>Blennosperma</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Asclepias</i>	Apocynaceae	MAGNO	<i>Blepharocalyx</i>	Myrtaceae	MAGNO
<i>Asperugo</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Blumenbachia</i>	Loasaceae	MAGNO
<i>Asphodelus</i>	Asphodelaceae	LILIO	<i>Boehmeria</i>	Urticaceae	MAGNO
<i>Asplenium</i>	Aspleniaceae	POLYP	<i>Boerhavia</i>	Nyctaginaceae	MAGNO
<i>Astelia</i>	Asteliaceae	LILIO	<i>Bolax</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Asteranthera</i>	Gesneriaceae	MAGNO	<i>Bolboschoenus</i>	Cyperaceae	LILIO
<i>Asteriscium</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Bomarea</i>	Alstroemeriaceae	LILIO
<i>Astragalus</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Boopis</i>	Calyceraceae	MAGNO
<i>Astrolepis</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Boquila</i>	Lardizabalaceae	MAGNO
<i>Atacama</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Borago</i>	Boraginaceae	MAGNO
<i>Atriplex</i>	Chenopodiaceae	MAGNO	<i>Bothriochloa</i>	Poaceae	LILIO
<i>Augustea</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Botrychium</i>	Ophioglossaceae	POLYP
<i>Austrocactus</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Bouteloua</i>	Poaceae	LILIO
<i>Austrocedrus</i>	Cupressaceae	PINOP	<i>Bowlesia</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Austrolycopodium</i>	Lycopodiaceae	LYCOP	<i>Brachyclados</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Austrostipa</i>	Poaceae	LILIO	<i>Brachypodium</i>	Poaceae	LILIO
<i>Avellanita</i>	Euphorbiaceae	MAGNO	<i>Brachystele</i>	Orchidaceae	LILIO
<i>Avena</i>	Poaceae	LILIO	<i>Brassica</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Avenella</i>	Poaceae	LILIO	<i>Bridgesia</i>	Sapindaceae	MAGNO
<i>Axonopus</i>	Poaceae	LILIO	<i>Briza</i>	Poaceae	LILIO
<i>Azara</i>	Salicaceae	MAGNO	<i>Bromelia</i>	Poaceae	LILIO
<i>Azolla</i>	Salviniaceae	POLYP	<i>Bromidium</i>	Poaceae	LILIO
<i>Azorella</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Bromus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Baccharis</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Broussonetia</i>	Moraceae	MAGNO
<i>Bacopa</i>	Plantaginaceae	MAGNO	<i>Browningia</i>	Cactaceae	MAGNO
<i>Bahia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Bryantiella</i>	Polemoniaceae	MAGNO
<i>Bakerolimon</i>	Plumbaginaceae	MAGNO	<i>Buddleja</i>	Scrophulariaceae	MAGNO
<i>Balbisia</i>	Francoaceae	MAGNO	<i>Buglossoides</i>	Boraginaceae	MAGNO
<i>Balsamocarpon</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Bulnesia</i>	Zygophyllaceae	MAGNO
<i>Barbarea</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Caesalpinia</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Barneoudia</i>	Ranunculaceae	MAGNO	<i>Caiophora</i>	Loasaceae	MAGNO
<i>Bassia</i>	Chenopodiaceae	MAGNO	<i>Calandrinia</i>	Montiaceae	MAGNO
<i>Beilschmiedia</i>	Lauraceae	MAGNO	<i>Calceolaria</i>	Calceolariaceae	MAGNO
<i>Bellardia</i>	Orobanchaceae	MAGNO	<i>Caldcluvia</i>	Cunoniaceae	MAGNO
<i>Bellis</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Calendula</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Belloa</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Calibrachoa</i>	Solanaceae	MAGNO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Calliandra</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Chersodoma</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Callianthemoides</i>	Ranunculaceae	MAGNO	<i>Chevreulia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Callitriche</i>	Plantaginaceae	MAGNO	<i>Chiliotrichum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Calopappus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Chiropetalum</i>	Euphorbiaceae	MAGNO
<i>Calothea</i>	Poaceae	LILIO	<i>Chloraea</i>	Orchidaceae	LILIO
<i>Caltha</i>	Ranunculaceae	MAGNO	<i>Chloris</i>	Poaceae	LILIO
<i>Calycera</i>	Calyceraceae	MAGNO	<i>Chorispora</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Calydorea</i>	Iridaceae	LILIO	<i>Chorizanthe</i>	Polygonaceae	MAGNO
<i>Calyptocarpus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Chrysanthemoides</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Calystegia</i>	Convolvulaceae	MAGNO	<i>Chrysanthemum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Camelina</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Chrysosplenium</i>	Saxifragaceae	MAGNO
<i>Camissonia</i>	Onagraceae	MAGNO	<i>Chuquiraga</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Campanula</i>	Campanulaceae	MAGNO	<i>Chusquea</i>	Poaceae	LILIO
<i>Campsidium</i>	Bignoniaceae	MAGNO	<i>Cicendia</i>	Gentianaceae	MAGNO
<i>Capsella</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Cichorium</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Cardamine</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Cirsium</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Cardionema</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Cissarobryon</i>	Francoaceae	MAGNO
<i>Carduus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Cissus</i>	Vitaceae	MAGNO
<i>Carex</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Cistanthe</i>	Montiaceae	MAGNO
<i>Carica</i>	Caricaceae	MAGNO	<i>Citronella</i>	Cardiopteridaceae	MAGNO
<i>Carpha</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Cladanthus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Carpobrotus</i>	Aizoaceae	MAGNO	<i>Clarkia</i>	Onagraceae	MAGNO
<i>Carthamus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Clematis</i>	Ranunculaceae	MAGNO
<i>Castilleja</i>	Orobanchaceae	MAGNO	<i>Cleome</i>	Cleomaceae	MAGNO
<i>Catabrosa</i>	Poaceae	LILIO	<i>Clinanthus</i>	Amaryllidaceae	LILIO
<i>Catapodium</i>	Poaceae	LILIO	<i>Cliococca</i>	Linaceae	MAGNO
<i>Catharanthus</i>	Apocynaceae	MAGNO	<i>Codonorchis</i>	Orchidaceae	LILIO
<i>Cenchrus</i>	Poaceae	LILIO	<i>Coix</i>	Poaceae	LILIO
<i>Centaurea</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Coleostephus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Centaurium</i>	Gentianaceae	MAGNO	<i>Colletia</i>	Rhamnaceae	MAGNO
<i>Centaurodendron</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Colliguaja</i>	Euphorbiaceae	MAGNO
<i>Centella</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Collomia</i>	Polemoniaceae	MAGNO
<i>Centipeda</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Colobanthus</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Centranthus</i>	Caprifoliaceae	MAGNO	<i>Colocasia</i>	Araceae	LILIO
<i>Centunculus</i>	Primulaceae	MAGNO	<i>Combera</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Cerastium</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Commelina</i>	Commelinaceae	LILIO
<i>Ceratophyllum</i>	Ceratophyllaceae	MAGNO	<i>Conanthera</i>	Tecophilaeaceae	LILIO
<i>Cestrum</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Conium</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Chaetanthera</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Convolvulus</i>	Convolvulaceae	MAGNO
<i>Chaptalia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Conyza</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Chascolytrum</i>	Poaceae	LILIO	<i>Copiapoa</i>	Cactaceae	MAGNO
<i>Cheilanthes</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Coprosma</i>	Rubiaceae	MAGNO
<i>Chenopodiastrum</i>	Chenopodiaceae	MAGNO	<i>Cordia</i>	Boraginaceae	MAGNO
<i>Chenopodium</i>	Chenopodiaceae	MAGNO	<i>Cordyline</i>	Asparagaceae	LILIO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Coreopsis</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Datura</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Coriandrum</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Daucus</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Coriaria</i>	Coriariaceae	MAGNO	<i>Davallia</i>	Davalliaceae	POLYP
<i>Correorchis</i>	Orchidaceae	LILIO	<i>Delairea</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Corrigiola</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Dendroseris</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Corryocactus</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Dennstaedtia</i>	Dennstaedtiaceae	POLYP
<i>Cortaderia</i>	Poaceae	LILIO	<i>Deschampsia</i>	Poaceae	LILIO
<i>Corynabutilon</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Descurainia</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Corynephorus</i>	Poaceae	LILIO	<i>Desfontainia</i>	Columelliaceae	MAGNO
<i>Cotoneaster</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Desmanthus</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Cotula</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Desmaria</i>	Loranthaceae	MAGNO
<i>Crassula</i>	Crassulaceae	MAGNO	<i>Deuterocohnia</i>	Bromeliaceae	LILIO
<i>Cremolobus</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Deyeuxia</i>	Poaceae	LILIO
<i>Crepis</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Dianthus</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Cressa</i>	Convolvulaceae	MAGNO	<i>Dichantherium</i>	Poaceae	LILIO
<i>Crinodendron</i>	Elaeocarpaceae	MAGNO	<i>Dichelachne</i>	Poaceae	LILIO
<i>Cristaria</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Dichondra</i>	Convolvulaceae	MAGNO
<i>Crocasmia</i>	Iridaceae	LILIO	<i>Dicksonia</i>	Dicksoniaceae	POLYP
<i>Crotalaria</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Dicliptera</i>	Acanthaceae	MAGNO
<i>Croton</i>	Euphorbiaceae	MAGNO	<i>Dielsiochloa</i>	Poaceae	LILIO
<i>Cruckshanksia</i>	Rubiaceae	MAGNO	<i>Digitalis</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Cryptantha</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Digitaria</i>	Poaceae	LILIO
<i>Cryptocarya</i>	Lauraceae	MAGNO	<i>Dinemagonum</i>	Malpighiaceae	MAGNO
<i>Cryptogramma</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Dinandra</i>	Malpighiaceae	MAGNO
<i>Cuatrecasasiella</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Dioscorea</i>	Dioscoreaceae	LILIO
<i>Cuminia</i>	Lamiaceae	MAGNO	<i>Diostea</i>	Verbenaceae	MAGNO
<i>Cumulopuntia</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Diphasium</i>	Lycopodiaceae	LYCOP
<i>Cuscuta</i>	Convolvulaceae	MAGNO	<i>Diplachne</i>	Poaceae	LILIO
<i>Cyclospermum</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Diplazium</i>	Athyriaceae	POLYP
<i>Cylindropuntia</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Diplolepis</i>	Apocynaceae	MAGNO
<i>Cymbalaria</i>	Plantaginaceae	MAGNO	<i>Diplostephium</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Cymbopogon</i>	Poaceae	LILIO	<i>Diptotaxis</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Cynara</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Dipogon</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Cynodon</i>	Poaceae	LILIO	<i>Diposis</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Cynoglossum</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Dipsacus</i>	Caprifoliaceae	MAGNO
<i>Cynosurus</i>	Poaceae	LILIO	<i>Discaria</i>	Rhamnaceae	MAGNO
<i>Cyperus</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Distichia</i>	Juncaceae	LILIO
<i>Cyphocarpus</i>	Campanulaceae	MAGNO	<i>Distichlis</i>	Poaceae	LILIO
<i>Cystopteris</i>	Cystopteridaceae	POLYP	<i>Dittrichia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Cytisus</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Dodonaea</i>	Sapindaceae	MAGNO
<i>Dactylis</i>	Poaceae	LILIO	<i>Domeykoa</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Dalea</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Donatia</i>	Stylidiaceae	MAGNO
<i>Danthonia</i>	Poaceae	LILIO	<i>Doniophyton</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Dasyphyllum</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Downingia</i>	Campanulaceae	MAGNO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Draba</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Errazurizia</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Drapetes</i>	Thymelaeaceae	MAGNO	<i>Eruca</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Drimys</i>	Winteraceae	MAGNO	<i>Eryngium</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Drosera</i>	Droseraceae	MAGNO	<i>Erythranthe</i>	Phrymaceae	MAGNO
<i>Drymaria</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Escallonia</i>	Escalloniaceae	MAGNO
<i>Dryopteris</i>	Dryopteridaceae	POLYP	<i>Eschscholzia</i>	Papaveraceae	MAGNO
<i>Duchesnea</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Eucalyptus</i>	Myrtaceae	MAGNO
<i>Dunalia</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Eucryphia</i>	Cunoniaceae	MAGNO
<i>Dysopsis</i>	Euphorbiaceae	MAGNO	<i>Eulychnia</i>	Cactaceae	MAGNO
<i>Dysphania</i>	Chenopodiaceae	MAGNO	<i>Eupatorium</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Eccremocarpus</i>	Bignoniaceae	MAGNO	<i>Euphorbia</i>	Euphorbiaceae	MAGNO
<i>Echinochloa</i>	Poaceae	LILIO	<i>Euphrasia</i>	Orobanchaceae	MAGNO
<i>Echinopsis</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Evolvulus</i>	Convolvulaceae	MAGNO
<i>Echium</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Exodeconus</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Eclipta</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Fabiana</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Egeria</i>	Hydrocharitaceae	LILIO	<i>Facelis</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Ehrharta</i>	Poaceae	LILIO	<i>Fagara</i>	Rutaceae	MAGNO
<i>Eichhornia</i>	Pontederiaceae	LILIO	<i>Fagonia</i>	Zygophyllaceae	MAGNO
<i>Elaphoglossum</i>	Dryopteridaceae	POLYP	<i>Fallopia</i>	Polygonaceae	MAGNO
<i>Elatine</i>	Elatinaceae	MAGNO	<i>Famatina</i>	Amaryllidaceae	LILIO
<i>Eleocharis</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Fascicularia</i>	Bromeliaceae	LILIO
<i>Eleusine</i>	Poaceae	LILIO	<i>Festuca</i>	Poaceae	LILIO
<i>Elodea</i>	Hydrocharitaceae	LILIO	<i>Ficinia</i>	Cyperaceae	LILIO
<i>Elymus</i>	Poaceae	LILIO	<i>Ficus</i>	Euphorbiaceae	MAGNO
<i>Elytrigia</i>	Poaceae	LILIO	<i>Fitzroya</i>	Cupressaceae	PINOP
<i>Elytropus</i>	Apocynaceae	MAGNO	<i>Flaveria</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Embothrium</i>	Proteaceae	MAGNO	<i>Flourensia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Emex</i>	Polygonaceae	MAGNO	<i>Foeniculum</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Empetrum</i>	Ericaceae	MAGNO	<i>Fonkia</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Encelia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Fragaria</i>	Rosaceae	MAGNO
<i>Enneapogon</i>	Poaceae	LILIO	<i>Francoa</i>	Francoaceae	MAGNO
<i>Ephedra</i>	Ephedraceae	GNETO	<i>Frankenia</i>	Frankeniaceae	MAGNO
<i>Epilobium</i>	Onagraceae	MAGNO	<i>Fraxinus</i>	Oleaceae	MAGNO
<i>Equisetum</i>	Equisetaceae	POLYP	<i>Fuchsia</i>	Onagraceae	MAGNO
<i>Eragrostis</i>	Poaceae	LILIO	<i>Fumaria</i>	Papaveraceae	MAGNO
<i>Ercilla</i>	Phytolaccaceae	MAGNO	<i>Gaillardia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Erechtites</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Gaimardia</i>	Restionaceae	LILIO
<i>Eremium</i>	Poaceae	LILIO	<i>Galega</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Eremocharis</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Galenia</i>	Aizoaceae	MAGNO
<i>Eriachaenium</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Galeopsis</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Erigeron</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Galinsoga</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Eriochloa</i>	Poaceae	LILIO	<i>Galium</i>	Rubiaceae	MAGNO
<i>Eriogyne</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Gamocarpha</i>	Calyceraceae	MAGNO
<i>Erodium</i>	Geraniaceae	MAGNO	<i>Gamochaeta</i>	Asteraceae	MAGNO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Gardoquia</i>	Lamiaceae	MAGNO	<i>Hebe</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Gastridium</i>	Poaceae	LILIO	<i>Hedera</i>	Araliaceae	MAGNO
<i>Gaultheria</i>	Ericaceae	MAGNO	<i>Hedypnois</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Gavilea</i>	Orchidaceae	LILIO	<i>Helenium</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Gayophytum</i>	Onagraceae	MAGNO	<i>Helianthus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Gentiana</i>	Gentianaceae	MAGNO	<i>Helictotrichon</i>	Poaceae	LILIO
<i>Gentianella</i>	Gentianaceae	MAGNO	<i>Heliotropium</i>	Heliotropiaceae	MAGNO
<i>Geoffroea</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Helminthotheca</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Geranium</i>	Geraniaceae	MAGNO	<i>Helogyne</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Gethyum</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Herbertia</i>	Iridaceae	LILIO
<i>Geum</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Herniaria</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Gevuina</i>	Proteaceae	MAGNO	<i>Herreria</i>	Asparagaceae	LILIO
<i>Gilia</i>	Polemoniaceae	MAGNO	<i>Hesperis</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Gilliesia</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Heterosperma</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Glandularia</i>	Verbenaceae	MAGNO	<i>Hibiscus</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Glechoma</i>	Lamiaceae	MAGNO	<i>Hieracium</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Glinus</i>	Molluginaceae	MAGNO	<i>Hippuris</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Glyceria</i>	Poaceae	LILIO	<i>Hirschfeldia</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Glycyrrhiza</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Histiopteris</i>	Dennstaedtiaceae	POLYP
<i>Gochnatia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Hoffmannseggia</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Gomortega</i>	Gomortegaceae	MAGNO	<i>Holcus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Gomphrena</i>	Amaranthaceae	MAGNO	<i>Hollermayera</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Gossypium</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Homalocarpus</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Grammitis</i>	Polypodiaceae	POLYP	<i>Hordeum</i>	Poaceae	LILIO
<i>Gratiola</i>	Plantaginaceae	MAGNO	<i>Hornungia</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Grausa</i>	Loasaceae	MAGNO	<i>Huidobria</i>	Loasaceae	MAGNO
<i>Greigia</i>	Bromeliaceae	LILIO	<i>Huperzia</i>	Lycopodiaceae	LYCOP
<i>Grindelia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Hydrangea</i>	Hydrangeaceae	MAGNO
<i>Griselinia</i>	Griselinaceae	MAGNO	<i>Hydrocleys</i>	Butomaceae	LILIO
<i>Guindilia</i>	Sapindaceae	MAGNO	<i>Hydrocotyle</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Gunnera</i>	Gunneraceae	MAGNO	<i>Hymenoglossum</i>	Hymenophyllaceae	POLYP
<i>Gutierrezia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Hymenophyllum</i>	Hymenophyllaceae	POLYP
<i>Guynesomia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Hypericum</i>	Hypericaceae	MAGNO
<i>Gymnophyton</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Hypochaeris</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Gynerium</i>	Poaceae	LILIO	<i>Hypolepis</i>	Dennstaedtiaceae	POLYP
<i>Gypothamnium</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Imperata</i>	Poaceae	LILIO
<i>Haageocereus</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Indigofera</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Habenaria</i>	Orchidaceae	LILIO	<i>Ipheion</i>	Amaryllidaceae	LILIO
<i>Hainardia</i>	Poaceae	LILIO	<i>Ipomoea</i>	Convolvulaceae	MAGNO
<i>Halerpestes</i>	Ranunculaceae	MAGNO	<i>Ipomopsis</i>	Polemoniaceae	MAGNO
<i>Haloragis</i>	Haloragaceae	MAGNO	<i>Iris</i>	Iridaceae	LILIO
<i>Hamadryas</i>	Ranunculaceae	MAGNO	<i>Isatis</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Haplopappus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Isoetes</i>	Isoetaceae	LYCOP
<i>Haplorhus</i>	Anacardiaceae	MAGNO	<i>Isolepis</i>	Cyperaceae	LILIO



GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Ivania</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Lecanophora</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Jaborosa</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Legenere</i>	Campanulaceae	MAGNO
<i>Jarava</i>	Poaceae	LILIO	<i>Legrandia</i>	Myrtaceae	MAGNO
<i>Johnstonella</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Lemna</i>	Araceae	LILIO
<i>Jovellana</i>	Calceolariaceae	MAGNO	<i>Lenzia</i>	Montiaceae	MAGNO
<i>Juania</i>	Arecaceae	LILIO	<i>Leontochir</i>	Alstroemeriaceae	LILIO
<i>Jubaea</i>	Arecaceae	LILIO	<i>Leontodon</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Juncus</i>	Juncaceae	LILIO	<i>Lepechinia</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Junellia</i>	Verbenaceae	MAGNO	<i>Lepidium</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Jungia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Lepidoceras</i>	Santalaceae	MAGNO
<i>Kageneckia</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Lepidophyllum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Kickxia</i>	Plantaginaceae	MAGNO	<i>Lepidothamnus</i>	Podocarpaceae	PINOP
<i>Kieslingia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Leptinella</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Knautia</i>	Caprifoliaceae	MAGNO	<i>Leptocarpha</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Koeleria</i>	Poaceae	LILIO	<i>Leptophyllochloa</i>	Poaceae	LILIO
<i>Koenigia</i>	Polygonaceae	MAGNO	<i>Leptosiphon</i>	Polemoniaceae	MAGNO
<i>Krameria</i>	Krameriaceae	MAGNO	<i>Leptostigma</i>	Rubiaceae	MAGNO
<i>Kurzamra</i>	Lamiaceae	MAGNO	<i>Lepturus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Lablab</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Lepuropetalon</i>	Celastraceae	MAGNO
<i>Lachemilla</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Leucaena</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Lachnagrostis</i>	Poaceae	LILIO	<i>Leucanthemum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Lactoris</i>	Aristolochiaceae	MAGNO	<i>Leucheria</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Lactuca</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Leucocoryne</i>	Amaryllidaceae	LILIO
<i>Laennecia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Leucojum</i>	Amaryllidaceae	LILIO
<i>Lagenophora</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Leunisia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Lagurus</i>	Poaceae	LILIO	<i>Levisticum</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Lamarckia</i>	Poaceae	LILIO	<i>Leymus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Lamium</i>	Lamiaceae	MAGNO	<i>Libertia</i>	Iridaceae	LILIO
<i>Lampayo</i>	Verbenaceae	MAGNO	<i>Ligaria</i>	Loranthaceae	MAGNO
<i>Landoltia</i>	Araceae	LILIO	<i>Ligustrum</i>	Oleaceae	MAGNO
<i>Lantana</i>	Verbenaceae	MAGNO	<i>Lilaea</i>	Juncaginaceae	LILIO
<i>Lapageria</i>	Philesiaceae	LILIO	<i>Lilaeopsis</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Lappula</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Limnobium</i>	Hydrocharitaceae	LILIO
<i>Lapsana</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Limonium</i>	Plumbaginaceae	MAGNO
<i>Lardizabala</i>	Lardizabalaceae	MAGNO	<i>Limosella</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Larrea</i>	Zygophyllaceae	MAGNO	<i>Linaria</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Lastarriaea</i>	Polygonaceae	MAGNO	<i>Lindernia</i>	Linderniaceae	MAGNO
<i>Lasthenia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Linum</i>	Linaceae	MAGNO
<i>Latace</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Lippia</i>	Verbenaceae	MAGNO
<i>Lathyrus</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Lithrea</i>	Anacardiaceae	MAGNO
<i>Latua</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Littorella</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Laurelia</i>	Monimiaceae	MAGNO	<i>Llagunoa</i>	Sapindaceae	MAGNO
<i>Laureliopsis</i>	Monimiaceae	MAGNO	<i>Loasa</i>	Loasaceae	MAGNO
<i>Lebetanthus</i>	Ericaceae	MAGNO	<i>Lobelia</i>	Campanulaceae	MAGNO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Lobularia</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Medicago</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Logfia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Megalachne</i>	Poaceae	LILIO
<i>Lolium</i>	Poaceae	LILIO	<i>Megalastrum</i>	Dryopteridaceae	POLYP
<i>Lomatia</i>	Proteaceae	MAGNO	<i>Megathyrsus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Lophopappus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Melia</i>	Meliaceae	MAGNO
<i>Lophosoria</i>	Dicksoniaceae	POLYP	<i>Melica</i>	Poaceae	LILIO
<i>Lotus</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Melilotus</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Lucilia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Melinis</i>	Poaceae	LILIO
<i>Ludwigia</i>	Onagraceae	MAGNO	<i>Melissa</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Luma</i>	Myrtaceae	MAGNO	<i>Melosperma</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Lupinus</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Menodora</i>	Oleaceae	MAGNO
<i>Luzula</i>	Juncaceae	LILIO	<i>Menonvillea</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Luzuriaga</i>	Luzuriagaceae	LILIO	<i>Mentha</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Lycapsus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Mentzelia</i>	Loasaceae	MAGNO
<i>Lychnis</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Mercurialis</i>	Euphorbiaceae	MAGNO
<i>Lycium</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Mesembryanthemum</i>	Aizoaceae	MAGNO
<i>Lycopus</i>	Lamiaceae	MAGNO	<i>Metharme</i>	Zygophyllaceae	MAGNO
<i>Lysimachia</i>	Primulaceae	MAGNO	<i>Microchloa</i>	Poaceae	LILIO
<i>Lythrum</i>	Lythraceae	MAGNO	<i>Microlepis</i>	Dennstaedtiaceae	POLYP
<i>Machaerina</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Micromeria</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Macrachaenium</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Microphyes</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Macroptilium</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Microopsis</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Madia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Microseris</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Maihuenia</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Microsorium</i>	Polypodiaceae	POLYP
<i>Maihueniopsis</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Microsteris</i>	Polemoniaceae	MAGNO
<i>Maireana</i>	Chenopodiaceae	MAGNO	<i>Miersia</i>	Amaryllidaceae	LILIO
<i>Malacothrix</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Mikania</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Malesherbia</i>	Passifloraceae	MAGNO	<i>Miqueliopuntia</i>	Cactaceae	MAGNO
<i>Malva</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Mirabilis</i>	Nyctaginaceae	MAGNO
<i>Malvastrum</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Miscanthus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Malvella</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Misodendrum</i>	Misodendraceae	MAGNO
<i>Mancoa</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Mitraria</i>	Gesneriaceae	MAGNO
<i>Margyraea</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Mniodes</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Margyricarpus</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Modiola</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Marrubium</i>	Lamiaceae	MAGNO	<i>Molucella</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Marsilea</i>	Marsileaceae	POLYP	<i>Monnina</i>	Polygalaceae	MAGNO
<i>Marsippospermum</i>	Juncaceae	LILIO	<i>Montia</i>	Montiaceae	MAGNO
<i>Martcorenia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Montiopsis</i>	Montiaceae	MAGNO
<i>Mastigostyla</i>	Iridaceae	LILIO	<i>Monttea</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Mathewsia</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Morella</i>	Myricaceae	MAGNO
<i>Matricaria</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Moscharia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Matthiola</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Moschopsis</i>	Calyceraceae	MAGNO
<i>Maytenus</i>	Celastraceae	MAGNO	<i>Mostacillastrum</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Mecardonia</i>	Plantaginaceae	MAGNO	<i>Muehlenbeckia</i>	Polygonaceae	MAGNO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Muhlenbergia</i>	Poaceae	LILIO	<i>Nymphaea</i>	Nymphaeaceae	MAGNO
<i>Mulguraea</i>	Verbenaceae	MAGNO	<i>Ochagavia</i>	Bromeliaceae	LILIO
<i>Munroa</i>	Poaceae	LILIO	<i>Ocyroe</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Mutisia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Oenothera</i>	Onagraceae	MAGNO
<i>Myoporum</i>	Scrophulariaceae	MAGNO	<i>Oldenlandia</i>	Rubiaceae	MAGNO
<i>Myoschilos</i>	Santalaceae	MAGNO	<i>Olsynium</i>	Iridaceae	LILIO
<i>Myosotis</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Ombrophytum</i>	Balanophoraceae	MAGNO
<i>Myostemma</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Omphalodes</i>	Boraginaceae	MAGNO
<i>Myosurus</i>	Ranunculaceae	MAGNO	<i>Onopordum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Myrceugenia</i>	Myrtaceae	MAGNO	<i>Onuris</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Myrcianthes</i>	Myrtaceae	MAGNO	<i>Ophioglossum</i>	Ophioglossaceae	POLYP
<i>Myriophyllum</i>	Haloragaceae	MAGNO	<i>Ophryosporus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Myriopteris</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Oreobolus</i>	Cyperaceae	LILIO
<i>Myrosmodes</i>	Orchidaceae	LILIO	<i>Oreocereus</i>	Cactaceae	MAGNO
<i>Myrteola</i>	Myrtaceae	MAGNO	<i>Oreomyrrhis</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Nama</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Oreopolus</i>	Rubiaceae	MAGNO
<i>Nanodea</i>	Santalaceae	MAGNO	<i>Oriastrum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Nardophyllum</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Orites</i>	Proteaceae	MAGNO
<i>Nasa</i>	Loasaceae	MAGNO	<i>Ornithopus</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Nassauvia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Orobanche</i>	Orobanchaceae	MAGNO
<i>Nassella</i>	Poaceae	LILIO	<i>Ortachne</i>	Poaceae	LILIO
<i>Nastanthus</i>	Calyceraceae	MAGNO	<i>Oryza</i>	Poaceae	LILIO
<i>Nasturtium</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Osmorhiza</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Navarretia</i>	Polemoniaceae	MAGNO	<i>Otholobium</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Neobartsia</i>	Orobanchaceae	MAGNO	<i>Ourisia</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Neowerdermannia</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Ovidia</i>	Thymelaeaceae	MAGNO
<i>Nertera</i>	Rubiaceae	MAGNO	<i>Oxalis</i>	Oxalidaceae	MAGNO
<i>Nesocaryum</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Oxybasis</i>	Chenopodiaceae	MAGNO
<i>Neuontobotrys</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Oxychloë</i>	Juncaceae	LILIO
<i>Nicandra</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Oxyphyllum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Nicoraepoa</i>	Poaceae	LILIO	<i>Oxytheca</i>	Polygonaceae	MAGNO
<i>Nicotiana</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Oziroë</i>	Asparagaceae	LILIO
<i>Nierembergia</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Pachylaena</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Nitrophila</i>	Chenopodiaceae	MAGNO	<i>Palaua</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Noccaea</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Panicum</i>	Poaceae	LILIO
<i>Nolana</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Papaver</i>	Papaveraceae	MAGNO
<i>Notanthera</i>	Loranthaceae	MAGNO	<i>Pappostipa</i>	Poaceae	LILIO
<i>Nothofagus</i>	Nothofagaceae	MAGNO	<i>Parapholis</i>	Poaceae	LILIO
<i>Notholaena</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Parastrephia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Nothomyrcia</i>	Myrtaceae	MAGNO	<i>Parentucellia</i>	Orobanchaceae	MAGNO
<i>Nothoscordum</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Parietaria</i>	Urticaceae	MAGNO
<i>Noticastrum</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Paronychia</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Notopappus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Pascalía</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Nototriche</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Pasithea</i>	Asphodelaceae	LILIO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Paspalum</i>	Poaceae	LILIO	<i>Pitavia</i>	Rutaceae	MAGNO
<i>Passiflora</i>	Passifloraceae	MAGNO	<i>Pitraea</i>	Verbenaceae	MAGNO
<i>Pastinaca</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Pittosporum</i>	Pittosporaceae	MAGNO
<i>Patosia</i>	Juncaceae	LILIO	<i>Placea</i>	Amaryllidaceae	LILIO
<i>Pectocarya</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Plagiobothrys</i>	Boraginaceae	MAGNO
<i>Pellaea</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Plantago</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Pelletiera</i>	Primulaceae	MAGNO	<i>Plazia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Pennellia</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Pleocarphus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Peperomia</i>	Piperaceae	MAGNO	<i>Pleopeltis</i>	Polypodiaceae	POLYP
<i>Perezia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Pleurophora</i>	Lythraceae	MAGNO
<i>Perityle</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Pleurosorus</i>	Aspleniaceae	POLYP
<i>Persea</i>	Lauraceae	MAGNO	<i>Pluchea</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Persicaria</i>	Polygonaceae	MAGNO	<i>Plumbago</i>	Plumbaginaceae	MAGNO
<i>Petroravenia</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Poa</i>	Poaceae	LILIO
<i>Petrorhagia</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Podagrostis</i>	Poaceae	LILIO
<i>Petroselinum</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Podanthus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Peumus</i>	Monimiaceae	MAGNO	<i>Podocarpus</i>	Podocarpaceae	PINOP
<i>Phacelia</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Podophorus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Phalaris</i>	Poaceae	LILIO	<i>Polemonium</i>	Polemoniaceae	MAGNO
<i>Philesia</i>	Philesiaceae	LILIO	<i>Polyachyrus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Philibertia</i>	Apocynaceae	MAGNO	<i>Polycarpon</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Philippiella</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Polygala</i>	Polygalaceae	MAGNO
<i>Phleum</i>	Poaceae	LILIO	<i>Polygonum</i>	Polygonaceae	MAGNO
<i>Phragmites</i>	Poaceae	LILIO	<i>Polylepis</i>	Rosaceae	MAGNO
<i>Phycella</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Polypodium</i>	Polypodiaceae	POLYP
<i>Phyla</i>	Verbenaceae	MAGNO	<i>Polypogon</i>	Poaceae	LILIO
<i>Phyllachne</i>	Stylidiaceae	MAGNO	<i>Polypsecadium</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Phylloscirpus</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Polystichum</i>	Dryopteridaceae	POLYP
<i>Physalis</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Pombalia</i>	Violaceae	MAGNO
<i>Phytolacca</i>	Phytolaccaceae	MAGNO	<i>Populus</i>	Salicaceae	MAGNO
<i>Picradeniopsis</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Porlieria</i>	Zygophyllaceae	MAGNO
<i>Picris</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Porophyllum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Picosia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Portulaca</i>	Portulacaceae	MAGNO
<i>Pilea</i>	Urticaceae	MAGNO	<i>Potamogeton</i>	Potamogetonaceae	LILIO
<i>Pilgerodendron</i>	Cupressaceae	PINOP	<i>Potentilla</i>	Rosaceae	MAGNO
<i>Pilostyles</i>	Rafflesiaceae	MAGNO	<i>Pouteria</i>	Sapotaceae	MAGNO
<i>Pilularia</i>	Marsileaceae	POLYP	<i>Pozoa</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Pinguicula</i>	Lentibulariaceae	MAGNO	<i>Presliophytum</i>	Loasaceae	MAGNO
<i>Pinnasa</i>	Loasaceae	MAGNO	<i>Primula</i>	Primulaceae	MAGNO
<i>Pintoa</i>	Zygophyllaceae	MAGNO	<i>Prosopis</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Pinus</i>	Pinaceae	PINOP	<i>Proustia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Piptatherum</i>	Poaceae	LILIO	<i>Prumnopitys</i>	Podocarpaceae	PINOP
<i>Piptochaetium</i>	Poaceae	LILIO	<i>Prunella</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Pistia</i>	Araceae	LILIO	<i>Prunus</i>	Rosaceae	MAGNO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Pseudognaphalium</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Rytidosperma</i>	Poaceae	LILIO
<i>Psidium</i>	Myrtaceae	MAGNO	<i>Sabulina</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Psilocarphus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Saccharum</i>	Poaceae	LILIO
<i>Psilotum</i>	Psilotaceae	POLYP	<i>Sagina</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Pteris</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Sagittaria</i>	Alismataceae	LILIO
<i>Pterocactus</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Salix</i>	Salicaceae	MAGNO
<i>Puccinellia</i>	Poaceae	LILIO	<i>Salpichroa</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Puya</i>	Bromeliaceae	LILIO	<i>Salpiglossis</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Pycnophyllopsis</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Salsola</i>	Chenopodiaceae	MAGNO
<i>Pycnophyllum</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Salvia</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Pyrolirion</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Salvinia</i>	Salviniaceae	POLYP
<i>Quercus</i>	Fagaceae	MAGNO	<i>Sambucus</i>	Caprifoliaceae	MAGNO
<i>Quillaja</i>	Quillajaceae	MAGNO	<i>Samolus</i>	Primulaceae	MAGNO
<i>Quinchamalium</i>	Schoepfiaceae	MAGNO	<i>Sanguisorba</i>	Rosaceae	MAGNO
<i>Ranunculus</i>	Ranunculaceae	MAGNO	<i>Sanicula</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Raphanus</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Santalum</i>	Santalaceae	MAGNO
<i>Rapistrum</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Sapindus</i>	Sapindaceae	MAGNO
<i>Raukaua</i>	Araliaceae	MAGNO	<i>Saponaria</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Reicheella</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Sarcocornia</i>	Chenopodiaceae	MAGNO
<i>Relchela</i>	Poaceae	LILIO	<i>Sarcodraba</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Reseda</i>	Resedaceae	MAGNO	<i>Sarmienta</i>	Gesneriaceae	MAGNO
<i>Retanilla</i>	Rhamnaceae	MAGNO	<i>Saxegothaea</i>	Podocarpaceae	PINOP
<i>Reyesia</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Saxifraga</i>	Saxifragaceae	MAGNO
<i>Rhamnus</i>	Rhamnaceae	MAGNO	<i>Saxifragella</i>	Saxifragaceae	MAGNO
<i>Rhaphithamnus</i>	Verbenaceae	MAGNO	<i>Saxifragodes</i>	Saxifragaceae	MAGNO
<i>Rhodolirium</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Scabiosa</i>	Caprifoliaceae	MAGNO
<i>Rhodophiala</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Scandix</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Rhodoscirpus</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Schinus</i>	Anacardiaceae	MAGNO
<i>Rhynchosia</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Schismus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Rhynchospora</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Schizachyrium</i>	Poaceae	LILIO
<i>Ribes</i>	Grossulariaceae	MAGNO	<i>Schizaea</i>	Schizaeaceae	POLYP
<i>Ricinus</i>	Euphorbiaceae	MAGNO	<i>Schizanthus</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Robinia</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Schizopetalon</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Romulea</i>	Iridaceae	LILIO	<i>Schkuhria</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Rorippa</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Schoenoplectus</i>	Cyperaceae	LILIO
<i>Rosa</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Schoenus</i>	Cyperaceae	LILIO
<i>Rostkovia</i>	Juncaceae	LILIO	<i>Schyzachyrium</i>	Poaceae	LILIO
<i>Rostraria</i>	Poaceae	LILIO	<i>Scirpus</i>	Cyperaceae	LILIO
<i>Rubia</i>	Rubiaceae	MAGNO	<i>Scleranthus</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Rubus</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Scolymus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Rumex</i>	Polygonaceae	MAGNO	<i>Scrophularia</i>	Scrophulariaceae	MAGNO
<i>Rumohra</i>	Dryopteridaceae	POLYP	<i>Scutellaria</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Ruppia</i>	Ruppiceae	LILIO	<i>Scyphanthus</i>	Loasaceae	MAGNO
<i>Ruta</i>	Rutaceae	MAGNO	<i>Sedum</i>	Crassulaceae	MAGNO



GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Selaginella</i>	Selaginellaceae	LYCOP	<i>Stenandrium</i>	Acanthaceae	MAGNO
<i>Selkirkia</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Stenotaphrum</i>	Poaceae	LILIO
<i>Selliera</i>	Goodeniaceae	MAGNO	<i>Stevia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Senecio</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Sticherus</i>	Gleicheniaceae	POLYP
<i>Senna</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Stuckenia</i>	Potamogetonaceae	LILIO
<i>Serpyllopsis</i>	Hymenophyllaceae	POLYP	<i>Suaeda</i>	Chenopodiaceae	MAGNO
<i>Seseli</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Symphytotrichum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Sesuvium</i>	Aizoaceae	MAGNO	<i>Synammia</i>	Polypodiaceae	POLYP
<i>Setaria</i>	Poaceae	LILIO	<i>Syzygium</i>	Myrtaceae	MAGNO
<i>Sherardia</i>	Rubiaceae	MAGNO	<i>Taeniatherum</i>	Poaceae	LILIO
<i>Sibara</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Tagetes</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Sicyos</i>	Cucurbitaceae	MAGNO	<i>Tanacetum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Sida</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Tapeinia</i>	Iridaceae	LILIO
<i>Sigesbeckia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Tarasa</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Silene</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Taraxacum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Silybum</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Tecoma</i>	Bignoniaceae	MAGNO
<i>Sinapis</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Tecophilaea</i>	Tecophilaeaceae	LILIO
<i>Sisymbrium</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Teesdalia</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Sisyrinchium</i>	Iridaceae	LILIO	<i>Teline</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Sium</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Tepualia</i>	Myrtaceae	MAGNO
<i>Skytanthus</i>	Apocynaceae	MAGNO	<i>Tessaria</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Smallanthus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Tetilla</i>	Francoaceae	MAGNO
<i>Solanum</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Tetrachondra</i>	Tetrachondraceae	MAGNO
<i>Solaria</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Tetraglochin</i>	Rosaceae	MAGNO
<i>Soleirolia</i>	Urticaceae	MAGNO	<i>Tetragonia</i>	Aizoaceae	MAGNO
<i>Solenomelus</i>	Iridaceae	LILIO	<i>Tetroncium</i>	Juncaginaceae	LILIO
<i>Solidago</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Teucrium</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Soliva</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Thamnoseria</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Sonchus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Thelypteris</i>	Thelypteridaceae	POLYP
<i>Sophora</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Thespesia</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Sorghum</i>	Poaceae	LILIO	<i>Thlaspi</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Spartium</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Thyrsopteris</i>	Dicksoniaceae	POLYP
<i>Speea</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Tigridia</i>	Iridaceae	LILIO
<i>Spergula</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Tillandsia</i>	Bromeliaceae	LILIO
<i>Spergularia</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Tiquilia</i>	Boraginaceae	MAGNO
<i>Sphaeralcea</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Tolpis</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Spilanthes</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Tomostima</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Spinoliva</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Torilis</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Spirodela</i>	Araceae	LILIO	<i>Tradescantia</i>	Commelinaceae	LILIO
<i>Sporobolus</i>	Poaceae	LILIO	<i>Tragopogon</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Stachys</i>	Lamiaceae	MAGNO	<i>Traubia</i>	Amaryllidaceae	LILIO
<i>Stangea</i>	Caprifoliaceae	MAGNO	<i>Trevoa</i>	Rhamnaceae	MAGNO
<i>Stellaria</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Trianthera</i>	Aizoaceae	MAGNO
<i>Stemodia</i>	Plantaginaceae	MAGNO	<i>Tribeles</i>	Escalloniaceae	MAGNO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Tribulus</i>	Zygophyllaceae	MAGNO	<i>Valeriana</i>	Caprifoliaceae	MAGNO
<i>Trichocline</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Valerianella</i>	Caprifoliaceae	MAGNO
<i>Trichomanes</i>	Hymenophyllaceae	POLYP	<i>Verbascum</i>	Scrophulariaceae	MAGNO
<i>Trichoneura</i>	Poaceae	LILIO	<i>Verbena</i>	Verbenaceae	MAGNO
<i>Trichopetalum</i>	Asparagaceae	LILIO	<i>Verbesina</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Trifolium</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Veronica</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Triglochin</i>	Juncaginaceae	LILIO	<i>Vestia</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Trigonella</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Vicia</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Triodanis</i>	Campanulaceae	MAGNO	<i>Villanova</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Tripleurospermum</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Vinca</i>	Apocynaceae	MAGNO
<i>Tripogon</i>	Poaceae	LILIO	<i>Viola</i>	Violaceae	MAGNO
<i>Triptilion</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Vitis</i>	Vitaceae	MAGNO
<i>Trisetum</i>	Poaceae	LILIO	<i>Vittaria</i>	Pteridaceae	POLYP
<i>Trismeria</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Viviania</i>	Francoaceae	MAGNO
<i>Tristagma</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Volutaria</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Tristerix</i>	Loranthaceae	MAGNO	<i>Vulpia</i>	Poaceae	LILIO
<i>Triticum</i>	Poaceae	LILIO	<i>Wahlenbergia</i>	Campanulaceae	MAGNO
<i>Triumfetta</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Waltheria</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Trixis</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Weberbaueria</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Tropaeolum</i>	Tropaeolaceae	MAGNO	<i>Weberbauerella</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Tropidocarpum</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Weinmannia</i>	Cunoniaceae	MAGNO
<i>Tunilla</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Werneria</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Tweedia</i>	Apocynaceae	MAGNO	<i>Wolffia</i>	Araceae	LILIO
<i>Typha</i>	Typhaceae	LILIO	<i>Wolffiella</i>	Araceae	LILIO
<i>Ugni</i>	Myrtaceae	MAGNO	<i>Woodsia</i>	Woodsiaceae	POLYP
<i>Ulantha</i>	Orchidaceae	LILIO	<i>Xanthium</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Ulex</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Xenophyllum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Ulmus</i>	Ulmaceae	MAGNO	<i>Xerodraba</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Uncinia</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Yunquea</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Urmenetea</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Zameioscirpus</i>	Cyperaceae	LILIO
<i>Urocarpidium</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Zannichellia</i>	Potamogetonaceae	LILIO
<i>Urospermum</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Zantedeschia</i>	Araceae	LILIO
<i>Urtica</i>	Urticaceae	MAGNO	<i>Zea</i>	Poaceae	LILIO
<i>Utricularia</i>	Lentibulariaceae	MAGNO	<i>Zephyra</i>	Tecophilaeaceae	LILIO
<i>Vahlodea</i>	Poaceae	LILIO	<i>Zostera</i>	Zosteraceae	LILIO
<i>Valdivia</i>	Escalloniaceae	MAGNO			

Recibido: 02.03.2018  
 Aceptado: 07.05.2018